53024/A vol. 6

DICTIONNAIRE

UNIVERSEL

D'HISTOIRE NATURELLE.

N—PIE

553 86

DICTIONNAIRE
RAISONNÉ UNIVERSEL
D'HISTOIRE NATURELLE,

CONTENANT

L'HISTOIRE

DES ANIMAUX, DES VÉGÉTAUX ET DES MINÉRAUX,

Celle des Corps céleſtes, des Météores & des autres principaux Phénomenes de la Nature;

AVEC

L'HISTOIRE ET LA DESCRIPTION

DES DROGUES SIMPLES TIRÉES DES TROIS REGNES,

Le détail de leurs uſages dans la Médecine, dans l'Économie domeſtique & champêtre, & dans les Arts & Métiers:

Avec une Table concordante des Noms Latins, & le renvoi aux objets mentionnés dans cet Ouvrage.

Par M. VALMONT DE BOMARE, Demonſtrateur d'Hiſtoire Naturelle avoué du Gouvernement; Cenſeur Royal; Directeur des Cabinets d'Hiſtoire Naturelle, de Phyſique, &c. de S. A. S. M. le Prince de Condé; Honoraire de la Société Économique de Berne; Membre des Académies, Impériale des Curieux de la Nature, Impériale & Royale des Sciences de Bruxelles; Aſſocié regnicole de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres & Beaux-Arts de Rouen; des Sociétés Royales des Sciences de Montpellier, Littéraires de Caen, de la Rochelle, &c. d'Agriculture de Paris; Maître en Pharmacie.

TROISIEME ÉDITION, revue & conſidérablement augmentée par l'Auteur.

TOME SIXIEME.

A LYON,
Chez JEAN-MARIE BRUYSET Pere & Fils,

M. DCC. LXXVI.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

DICTIONNAIRE

RAISONNÉ

D'HISTOIRE NATURELLE.

N.

NACELLE. Espece de *lépas* à coquille chambrée, & qui ressemble parfaitement bien à une nacelle : il se plaît dans les sables, & s'attache quelquefois aux autres coquillages : il se trouve au Sénégal.

NACRE, est dans certains coquillages la partie blanche, brillante, argentée ou orientée comme les perles. La plupart des coquillages n'ont une nacre qu'en leur surface intérieure ; d'autres ont besoin d'être dépouillées de leur drap marin & même de leur pellicule, pour que leur nacre soit à découvert.

NACRE DE PERLES ou MERE DE PERLES, ou HUITRE A ÉCAILLE NACRÉE, *mater perlarum, seu concha margaritifera.* Ce riche coquillage est une huître à écailles nacrées, qui varie en grandeur & qui se pêche dans les Mers Orientales & dans l'île de Tabago. On lui a donné le nom de *mere des perles*, parce qu'on y trouve beaucoup plus de perles & de plus belles que dans d'autres coquillages.

La *nacre de perles*, (mot tiré de l'Espagnol, qui appelle *nacar de perlas* la coquille des perles), est un coquillage bivalve fort pesant, gris en dehors, ridé & âpre, mais non cannelé, blanc ou de couleur argentée, uni & luisant en dedans, d'une substance plus dure & plus solide que les perles mêmes qu'il produit. Il est un peu verdâtre, de figure aplatie & circulaire, ayant vers le milieu intérieur la marque des muscles de l'animal qui en ont été arrachés. La coquille de l'huître perliere est grande, épaisse & peu creuse.

Les perles, *perlæ aut margaritæ*, qu'on y trouve sont, de même que la coquille nacre, des substances pierreuses & calcaires, c'est-à-dire calcinables & dissolubles aux acides, rondes & anguleuses, grenées, comme transparentes, d'une saveur terreuse, ainsi que les écailles mêmes.

Origine des Perles.

Stenon, ce savant Auditeur de Bartholin, qui fut élevé à l'Episcopat, & qui a eu l'honneur d'être inhumé dans le tombeau des Grands Ducs de Florence; *Stenon*, dis-je, dans sa *Dissertation sur les Corps solides qui se trouvent naturellement contenus dans d'autres corps solides*, prétend, en parlant des coquilles, que la variété de leurs couleurs, leurs piquans & leurs inégalités, doivent leur origine au limbe de l'animal renfermé dans la coquille. A mesure que l'animal croît, s'étend & change de place, le limbe de l'animal s'étend aussi, s'avance successivement, & laisse son empreinte sur le limbe de chaque petite coquille, soit que ce dernier limbe soit formé de la matiere qui transude de celui de l'animal, ou qu'il ne soit autre chose que le limbe même de l'animal qui se détache tous les ans du reste du corps, & qui est remplacé tous les ans par de nouveaux limbes qui se développent successivement.

C'est par ces mêmes principes que *Stenon* explique la formation des perles, tant de celles qui sont fixées à la coquille & qui sont peu rondes, que de celles qui se trouvent dans l'intérieur de l'animal, & qui y ont

acquis ou conservé une rondeur parfaite ; car la seule différence qui se trouve entre les lames dont sont composées les perles, & celles des petites coquilles de la nacre, c'est que ces dernieres sont presque planes, & les autres courbes ou concentriques. *Stenon* ajoute, 1°. que certaines perles inégales, qu'on appelle *baroques*, ne le sont que parce qu'elles faisoient partie d'un grouppe de plusieurs petites perles renfermées sous une enveloppe commune ; 2°. qu'un grand nombre de perles jaunes le sont non-seulement à la surface, mais encore dans tous les points de leur substance ; vice qui doit provenir de l'altération des humeurs de l'animal : il ajoute que les perles les plus belles deviennent quelquefois jaunes, étant long-temps portées.

Ce sentiment de *Stenon* sur l'origine des perles, est conforme à celui des Modernes, qui pensent que la matiere des perles n'est autre chose que celle qui forme la nacre de la coquille, & non une lepre ou excrément des huîtres, ni une concrétion graveleuse, formée du suc nourricier dans les huîtres vieilles ou attaquées de maladies. Et M. *Geoffroy* le jeune n'a rangé les perles parmi les bézoards, que parce qu'il a mis dans cette classe toutes les pierres formées par couches, qui s'engendrent dans les animaux.

La perle n'est exactement produite que par l'abondance de la liqueur nacrée qui, en transudant de l'animal au lieu de s'aplatir & de former des couches dans le fond de la coquille, a stillé par gouttes ou par petits pelotons qui se sont conglomérés. Cette liqueur est repliée tantôt réguliérement, tantôt d'une maniere chiffonnée ; ce qui a formé des perles plus ou moins régulieres. En dissolvant lentement dans un acide nitreux & très-affoibli une perle, on s'est convaincu de la vérité de ce qu'on avance ici. *Voyez les art.* CORAIL, CORALLINES & COQUILLES, pour la théorie de cette petite expérience, & l'histoire de ces sortes de productions formées par de petits animaux.

Pour une perle que l'on trouve dans la partie charnue de l'huître, on en trouve mille attachées à la nacre, où elles sont comme autant de globules ou de verrues. Il arrive même quelquefois que les perles, qui sont

distribuées indistinctement dans toutes les parties de l'huître, s'accroissent au point d'empêcher les coquilles de se fermer, & alors les huîtres périssent. On trouve ordinairement dans chaque nacre une ou deux perles, mieux formées que les autres. On a observé que toutes les coquilles bivalves, dont l'intérieur est nacré, produisent des perles: on en trouve dans le *marteau*, dans la *pintade grise*, dans l'*hirondelle* ou *mouchette*, &c.

L'*huître à écaille nacrée* n'est point désagréable à manger, à moins qu'elle n'habite des côtes fangeuses.

Pêche des Perles.

Presque toutes les perles viennent des pays étrangers: il y en a quatre pêcheries dans l'Orient. *Tavernier* dit que la premiere est autour de l'île de Barhen ou Baharen dans le golfe Persique; la seconde sur la côte de l'Arabie heureuse, proche de la ville de Catifa: elle appartient à un Prince Arabe; la troisieme près de l'île de Ceylan, dans la mer qui bat un gros Bourg appelé *Manar*, là est le lieu qui s'appelle *côte de la pêcherie*; la quatrieme sur la côte du Japon: & il ajoute qu'on en pêche rarement dans cette derniere, parce que les Japonnois ne se soucient guere de joyaux. On compte aussi quatre pêcheries de perles en Occident, qui sont toutes situées dans le golfe du Mexique, le long de la côte de la Nouvelle Espagne. La premiere est le long de l'île de Cubagna, à cent soixante lieues de Saint-Domingue; la deuxieme est à l'île de la Marguerite (*île des Perles*), à une lieue de Cubagna; la troisieme est à Comogote, assez proche de la Terre-ferme; la quatrieme est au Rio de la Hacha ou riviere de la *Rencheria*, le long de la même côte. On pêche encore des perles dans la Méditerranée: on en pêche aussi sur les côtes de l'Océan, en Ecosse & ailleurs. La pêche des perles près de l'île de Ceylan est la plus considérable, & produit un grand bénéfice à la Compagnie des Indes de Hollande. Cette Compagnie ne fait pas pêcher pour son compte, mais elle permet aux habitans du pays, d'avoir pour cette pêche autant de bateaux qu'ils veulent, & chaque bateau lui paye soixante écus, &

même quelquefois davantage. Vers le commencement de l'année, en Mars & en Avril, la Compagnie envoie d'abord dix ou douze bateaux qui se séparent en diverses rades; des plongeurs pêchent chacun quelques milliers d'huîtres à perles qu'ils apportent sur ce rivage. On ouvre chaque millier à part, & on met aussi à part les perles qu'on en tire. Si le prix de ce qui se trouve dans ce millier se monte au-delà d'un écu, c'est une marque que la pêche sera en ce lieu très-abondante. Si le prix est de moitié moins, on ne pêche point cette année-là. Si l'épreuve réussit, on publie que la pêche se fera; alors une affluence extraordinaire de peuple & de bateaux arrive. Les Commissaires Hollandois viennent de Colombo pour présider à la pêche, le jour qu'elle doit commencer, l'ouverture s'en fait dès le matin par un coup de canon. Dans ce moment tous les bateaux partent & s'avancent dans la mer, précédés de deux grosses chaloupes Hollandoises, qui mouillent l'une à droite & l'autre à gauche, pour assigner à chacun les limites de l'endroit où il peut pêcher uniquement, & aussi-tôt les plongeurs de chaque bateau se jettent à la hauteur de trois, quatre & cinq brasses. Un bateau a plusieurs plongeurs qui vont à l'eau tour à tour; aussi-tôt que l'un remonte, l'autre s'enfonce. Ils sont attachés à une corde dont le bout tient à la vergue du petit bâtiment, & qui est tellement disposée, que les Matelots du bateau, par le moyen d'une poulie la peuvent aisément lâcher ou tirer selon le besoin qu'on a; celui qui plonge a une pierre du poids d'environ trente livres attachée aux pieds (rarement à l'estomac), afin d'enfoncer plus vîte, & une espece de sac à sa ceinture pour y mettre les huîtres qu'il pêche. Dès qu'il est descendu au fond de la mer, sans perdre de temps il court çà & là, quelquefois sur un sable, tantôt sur une vase très-visqueuse, & tantôt parmi les pointes des rochers; il ramasse promptement ce qu'il trouve d'huîtres & les met dans son sac. S'il y a plus d'huîtres qu'il n'en peut emporter, il en fait un monceau, & revenant sur l'eau pour prendre haleine, il retourne ensuite ou envoie un de ses camarades pour le ramasser. Le Plongeur pour revenir à

l'air donne le signal, en tirant fortement une petite corde différente de celle qui lui tient le corps : il y a toujours un ou deux Matelots dans le bateau qui tiennent l'autre bout de la corde pour observer le mouvement. Il est rare qu'un Plongeur accoutumé dès son enfance à plonger puisse retenir son haleine plus d'un quart-d'heure ; il a toujours soin de mettre du coton dans ses narines & ses oreilles, souvent il arme ses doigts d'especes de mitaines de cuir pour éviter d'être blessé aux rochers. Comme les huîtres à perles sont quelquefois attachées aux pierres & rochers, alors ils les détachent avec un instrument de fer dont ils sont munis. Les bateaux ne sont pas si éloignés les uns des autres, que les Plongeurs ne se battent assez souvent sous les eaux pour s'enlever les monceaux d'huîtres qu'ils ont ramassés. Ils prétendent qu'à soixante pieds de profondeur ils y voient aussi clair qu'à terre. Ces Pêcheurs sont exposés à de grands périls ; car outre les risques de se précipiter si profondément dans la mer, de demeurer accrochés en quelque endroit, de s'estropier, ou même de se tuer en tombant sur quelque pierre, ou de s'évanouir en manquant d'air, ils courent encore celui d'être dévorés par des requins. Voilà pour eux le danger le plus grand & plus ordinaire. On présume bien qu'un tel métier est très-fatiguant, aussi ces habitans quoiqu'habiles ne peuvent guere plonger que sept ou huit fois par jour. Le travail dure jusqu'à midi, & alors tous les bateaux regagnent le rivage ; quand on est arrivé, le maître du bateau fait transporter dans une espece de parc ou de fosses creusées dans le sable les huîtres qui lui appartiennent, là il les étale à l'air, & l'on attend qu'elles s'ouvrent d'elles-mêmes, ce qui dure trois ou quatre jours, afin d'en retirer les perles sans les endommager ; les perles étant tirées & bien lavées, on a cinq ou six petits bassins à cribles qui s'enchâssent les uns dans les autres, en sorte qu'il reste une distance entre ceux de dessus & ceux de dessous. Les trous du second crible sont plus petits que ceux du premier, & ainsi des autres. Les perles qui ne passent point par le premier crible, sont du premier ordre ; celles qui restent

dans le second, sont du deuxieme ordre; & de même jusqu'au dernier, lequel n'étant point percé reçoit les *semences de perles*, ce sont les plus petites. Ces différens ordres font la différence des perles pour la grosseur, & leur donnent ordinairement le prix lorsqu'elles sont bien conformées & d'une belle nacre. Les Hollandois se réservent toujours le droit d'acheter les plus grosses, au moins ils ont la préférence sur le prix que l'on en offre. Toutes les perles qu'on pêche le premier jour appartiennent au Roi de Maduré ou au Prince de Marava, suivant la rade où se fait la pêche.

La pêche des perles Occidentales se fait depuis le mois d'Octobre jusqu'au mois de Mars. On fait quelquefois une seconde pêche de perles dans les Indes Orientales; celle-ci a lieu dans les mois d'Août & de Septembre. Il regne pour l'ordinaire de grandes maladies sur ces parages au temps de la pêche, elles peuvent être causées par la quantité du peuple qui s'y rend & qui n'habite pas fort à l'aise, ou parce que plusieurs se nourrissent de la chair des huîtres qui est indigeste & mal-faisante, soit encore à cause de l'infection de l'air, occasionnée par la chair des huîtres qui étant exposée à l'ardeur du soleil, se corrompt en peu de jours & exhale une puanteur qui peut seule causer des maladies contagieuses.

Il y a d'autres animaux testacées que l'huître, qui fourniſſent des perles, comme les *moules* du Nord & de la Lorraine; l'*hirondelle*, le *marteau*, la *pintade grise* & les *huîtres* communes. Celles de Lorraine se trouvent communément dans une petite riviere des Vosges; Son Alteſſe Royale le Duc Léopold avoit établi des gardes pour veiller à ce que perſonne n'en pêchât, s'en réſervant pour lui ſeul le produit. Feue Madame la Princeſſe Charlotte, Abbeſſe de Mons, avoit un collier fait avec ces perles; mais quoique brillantes & blanches, elles ſont la plupart *baroques*, & nullement comparables en beauté à celles des mers d'Orient & d'Occident: on ſait cependant que le Roi de Suede vient d'ennoblir M. *Linnæus* pour avoir trouvé le moyen de faire groſſir les perles des moules & des huîtres du Nord, & de les rendre belles, &c. En

faveur de cette découverte, les Etats du Royaume ont permis aussi à ce savant Naturaliste de se nommer un successeur dans ses différens emplois; mais le secret n'a point été rendu public. Ce moyen seroit-il de faire parquer des moules dans des étangs où l'on mettroit des scolopendres marines? car on a remarqué que toutes les moules taraudées par ces insectes marins, contenoient les plus grosses & les plus belles perles.

Parmi les perles, il y en a de différentes couleurs, de blanches, de jaunâtres, de verdâtres & de noirâtres; la couleur blanche paroît leur être la plus naturelle. Les perles de couleur plombée ne se trouvent qu'en Afrique, où le fol de la mer est très-vaseux. La couleur jaunâtre ou verdâtre, si estimée des Arabes, peut provenir de ce que les Pêcheurs, vendant leurs huîtres par monceaux, & les Marchands attendant quelquefois quinze jours qu'elles s'ouvrent d'elles-mêmes pour en tirer les perles, quelques-unes de ces huîtres nacrées perdent dans cet intervalle leur eau, se gâtent, s'empuantissent, & produisent des émanations qui colorent les perles qu'elles contiennent. Nous le répétons, plus les nacres de la coquille sont belles, plus les perles le sont: le volume des perles répond aussi à la grandeur de l'animal: la *pintade* gris de lin donne des perles dont la couleur est aussi d'un gris de lin: celles-ci sont fort rares, ainsi que celles de couleur de corail rouge qui se trouvent quelquefois attachées à la nacre intérieure & vineuse de la *pinne marine*. Parmi les huîtres nacrées qu'on pêche, il y en a beaucoup qui ne contiennent pas de perles. Les années pluvieuses sont les plus favorables pour cette pêche: on a fait cette même observation à l'égard de nos perles d'Ecosse & de Lorraine.

Observations sur les Perles.

La concrétion ou loupe pierreuse qu'on appelle *perle*, est d'une eau argentée comme celle de la nacre; la beauté de la perle peut surpasser même celle de la nacre de la coquille, quoique formées toutes deux d'une même matiere. Cette différence vient de ce que

la nacre de perles touche par ſes extrémités à la bourbe; au lieu que la matiere de la perle a été reçue entre les membranes qui la tiennent à couvert. M. *de Réaumur* a obſervé auſſi que la couleur des perles répondoit à la couleur de la coquille où elles ſe trouvoient renfermées; & que les perles, moitié couleur de nacre & moitié noirâtres, avoient été formées dans le confluent de deux vaiſſeaux qui contenoient des ſucs de différentes couleurs. *Mémoires de l'Académie des Sciences, année 1717.*

Les Jouailliers appellent *loupe* ou *coque de perles* un ſuc pierreux & nacré qui s'eſt extravaſé en forme de nœud. Quand ils en trouvent de demi-ſphériques, ils les font ſcier; & de deux de même groſſeur, collées enſemble, ils compoſent une perle. Les perles d'une figure irréguliere, c'eſt-à-dire qui ne ſont ni rondes ni en poires, ſont appelées *baroques*: telles ſont les perles d'Écoſſe. Les perles *parangones* ſont des perles d'une groſſeur extraordinaire.

Les perles les plus eſtimées en Europe ſont celles d'Orient; & entre celles-là on choiſit par préférence celles qui ſont les plus groſſes, parfaitement rondes, polies, blanches, luiſantes, qui réfléchiſſent les objets, qui ſont rayonnantes & paroiſſent tranſparentes ſans l'être: c'eſt ce qu'on appelle *perles d'une belle eau* ou *d'un bel Orient.* Leur prix eſt plus ou moins haut, ſuivant qu'elles approchent plus ou moins de ces qualités. En Perſe & dans les Régions Orientales, elles ne ſe vendent qu'au poids de l'or; mais en Europe elles ſuivent le tarif des pierreries. L'uſage des perles pour le luxe & la parure des Dames, en a fait un très-gros objet de commerce. Colliers, braſſelets, pendans d'oreilles, coiffures ou aigrettes, ajuſtemens, toutes ces parures introduites par le caprice, adoptées par la mode, perfectionnées par l'art & le goût, ſont des bijoux de toilette faits pour ajouter aux graces de la beauté & quelquefois pour y ſuppléer. Parmi la quantité de perles que l'on préſente tous les ans au Roi d'Eſpagne, ce Prince fait mettre à part les plus belles & les deſtine à l'ornement du Service Divin. On peut juger de la quantité qu'il en conſacre à cet uſage pieux

par un habit de la ſtatue de la Vierge *Notre-Dame de la Guadeloupe*. Dans cet habillement tout le blanc n'eſt autre choſe que des perles, le rouge & le vert ſont d'émeraudes & de rubis. Il n'y a dans le monde que le Souverain des Indes qui puiſſe mettre une ſi grande magnificence dans ſa dévotion. En 1579 on préſenta au Roi Philippe II une perle trouvée à Panama : elle étoit naturellement faite en poire, & de la groſſeur d'un œuf de pigeon. Elle eſt priſée à 14400 ducats. *Tavernier* en a vu une entre les mains de l'Empereur de Perſe, en 1633, & que l'on avoit achetée d'un Arabe 110400 livres ſterling. *Pline* évalue la perle de *Cléopatre* à quatre-vingt mille livres ſterling. On ſait que cette Reine crut ne pouvoir mieux prouver ſon luxe & ſon opulence à *Marc-Antoine*, qu'en avalant dans un repas qu'elle lui donnoit, une des fameuſes perles qui lui ſervoient de pendans d'oreilles. L'hiſtoire nous apprend encore que *Clodius Eſopus*, fameux Comédien Romain, voulant ſurpaſſer en magnificence ſon pere, fit avaler des perles diſſoutes dans le vinaigre à tous les convives de ſon feſtin.

En Médecine on ne ſe ſert que des perles menues, qu'on appelle *ſemences de perles*. Quoique moins cheres que les groſſes, elles n'ont pas moins de vertu : leur préparation conſiſte à les réduire, ſur le porphyre, en une poudre impalpable. La nacre de perle préparée par cette même méthode, n'eſt pas moins bonne. Ces ſubſtances ſont abſorbantes, & propres à arrêter le vomiſſement & le dévoiement. On fait entrer ces différens produits de l'huître dans pluſieurs diſpenſations médicinales ; mais les Médecins inſtruits & de bonne foi, conviennent que les perles & la nacre de perles ne ſont que des abſorbans terreux qui n'ont pas plus de vertu que la nacre des huîtres les plus communes, & que leur préparation ne peut être employée par préférence que pour relever la pompe & le prix des médicamens.

Les Dames employoient autrefois dans leur fard la nacre de perles ; enſuite on leur a fait accroire que les préparations coſmétiques étoient de perles fines : aujourd'hui on gâte leur teint avec le blanc de biſmuth.

Les Tabletiers font avec la nacre de perles des cuillers, des jetons, des manches de couteaux, des navettes & beaucoup d'autres petits ouvrages fort agréables, mais qui jaunissent ainsi que les perles à force d'être exposés à l'air : moins d'un siecle suffit pour en altérer la béauté.

Avant que de finir cet article nous croyons devoir parler de la charlatanerie de certains Juifs, qui prétendent qu'ils ont l'estomac propre à nétoyer les perles, & à en augmenter le poids. Ce fait est d'autant plus impossible, que les perles, comme les os, l'ivoire & les dents s'amollissent dans des liqueurs acidulées & chaudes, & qu'elles perdent de leur poids. On en a des preuves qu'on ne peut révoquer en doute. Si les perles se nétoyoient dans un estomac Juif, il en seroit de même dans un estomac Musulman ou Chrétien; mais dans tous ce seroit aux dépens du volume des perles. Voici un exemple bien frappant du ramollissement des perles : en jetant les fondations de S. Pierre de Rome on trouva un caveau où avoient été déposés 1118 ans auparavant les corps de deux jeunes filles de Stilicon, qui avoient été promises, l'une après l'autre, à l'Empereur Honorius ; toutes les richesses qui y étoient renfermées, étoient en très-bon état, à l'exception des perles qui étoient si tendres qu'elles s'écrasoient facilement entre les doigts.

On tire parti aussi de la charniere des huîtres nacrées ; c'est un gros ligament que des Hollandois, voisins des pêcheries de perles, font dessécher, ont l'art de tailler & de polir ensuite de maniere à imiter une plume : ils le vendent sous le nom de *plume de paon ;* elle est d'un beau bleu verdâtre chatoyant. A l'égard des fausses perles, *voyez à l'article* ABLE.

NACRÉ. *Voyez à l'article* PRINCE *& le mot* ROI.

NADDE ou MELETTE ou APHIE PHALARIQUE. C'est un poisson rare, du genre des carpes & de la famille des poissons à nageoires molles : on le trouve plus communément dans les parties boréales de la Suede que par-tout ailleurs : il a un pied de longueur, quatre pouces de large ; la tête obtuse ; les trous des nageoires sont doubles ; la bouche est sans

dents ; la membrane des ouies a trois rayons ; la queue eſt fourchue ; la couleur du dos eſt brune, blanche aux côtés, argentée au ventre, & rouſſe à la poitrine. Les écailles ſont larges, obtuſes & ſtriées : on mange ce poiſſon en Weſtrobothnie. La *nadelle* eſt une petite ſardine.

NAGEUR, *natrix torquata*. Nom donné à un ſerpent aquatique qui crie, dit-on, comme la grenouille : il ſe nourrit de grains, d'inſectes, de tout ce qu'il trouve, & comme la vipere il fait la chaſſe aux rats. Les François appellent ce ſerpent le *charbonnier*. Voyez ce mot.

NAGEOIRES. *Voyez à l'article* POISSON *& au mot* BALEINE.

NAGMAUL. *Voyez* SCHINDEL.

NAGOR. Nom que l'on donne à une eſpece particuliere de gazelle d'Afrique. Ses cornes ſont ſemblables à celles du *nanguer*.

NAIN. Nom donné à celui qui eſt petit au-delà de ce que naturellement il doit être. Le nain & le géant ſont les deux extrêmes de la ſtature des hommes. *Voyez* GÉANT.

Pour avoir une idée de la race des *nains*, nous donnerons un extrait de l'origine, de la vie, de la conformation de *Bebé*, de M. *Borwſlaski* & de M. *Bereſchny*.

Bebé, ce fameux nain du Roi de Pologne, naquit à ſept mois dans les Voſges, de parens bien faits, bien conſtitués & ſains. Il n'avoit pas tout-à-fait huit pouces en naiſſant : il ne peſoit alors qu'une livre & un quart. Sa mere l'éleva avec beaucoup de peine ; ſa petite bouche ne pouvant s'appliquer qu'en partie ſur le mamelon, une chevre fut ſa nourrice. Un ſabot qu'on rempliſſoit de laine à moitié, lui ſervit longtemps de berceau : on l'eût pris pour un *Lilliputien* : à l'âge de deux ans il commença à marcher : on lui fit des ſouliers de dix-huit lignes de longueur. A ſix ans il étoit haut de quinze pouces. Son accroiſſement fut proportionné à ſa petiteſſe premiere juſqu'à l'âge de douze ans : à cet âge la nature fit un effort dans quelques parties ſeulement. Les côtes grandirent plus d'un côté que de l'autre. L'épine du dos s'arqua en cinq endroits, & l'apophyſe naſale s'étendit beaucoup.

Ce petit individu n'a jamais donné que des marques trés-imparfaites d'intelligence : il sembloit qu'elle ne passoit pas les bornes de l'instinct, & malgré la bonne éducation qu'il a reçue, il n'a conçu aucune notion de l'Être suprême. Il paroissoit aimer la musique, on étoit même parvenu à le faire danser & à battre quelquefois la mesure assez juste. Il avoit sans cesse les yeux dressés sur son maître qui par des signes dirigeoit tous ses mouvemens, ainsi qu'on le remarque dans les animaux brutes qu'on a dressés. Les passions cependant régnerent dans son ame : il étoit susceptible de colere, de jalousie & d'emportement dans ses désirs. Il avoit tous les organes libres, & tout ce qui tient à la physiologie paroissoit selon l'ordre ordinaire de la nature. A l'âge de quinze ou seize ans il avoit vingt-neuf pouces de hauteur; c'étoit son âge brillant; il étoit joli. A l'âge de dix-sept à dix-huit ans les signes de sa virilité ou de puberté furent très-évidens & même très-forts pour sa petite structure : il paroît même prouvé qu'une gouvernante en avoit long-temps abusé, & l'on attribue aux excès de *Bébé* l'avancement de sa vieillesse, car dès l'âge de vingt-deux ans ce petit être cessa d'être gai, ses forces s'affoiblirent, sa tête se pencha, il commença à tomber dans une espece de caducité où l'on distinguoit une enfance marquée : la derniere année de sa vie (il avoit alors vingt-six ans, trente-trois pouces de hauteur, & trente-six selon quelques-uns) il paroissoit accablé par le poids des années; il ne pouvoit supporter l'air extérieur que par un temps chaud, & marchoit à peine cent pas. On a disséqué *Bebé*, & l'on a trouvé un des os pariétaux un peu enfoncé, le lobe gauche du cervelet étoit pressé dans un endroit & un peu relevé en d'autres, & hors de la position naturelle, la moelle alongée étoit comprimée de même, ce qui doit vraisemblablement avoir empêché la force végétative de s'étendre avec régularité, & ce qui peut aussi avoir occasionné le dérangement des vertebres : on a conservé le squelette de *Bebé*; on le voit actuellement dans la Bibliotheque publique de Nanci. Au premier coup d'œil ce squelette paroît être celui d'un enfant de trois ou quatre

ans au plus ; mais à l'examen on voit que c'eſt celui d'un adulte. Voici l'interprétation de l'épitaphe que le Roi de Pologne a fait faire & poſer à la mémoire de *Bebé*. (M. le Comte de *Treſſan* en eſt l'Auteur.) *Ci gît* Nicolas Ferri, *Lorrain, jeu de la nature, merveilleux par la petiteſſe de ſa ſtructure, chéri du nouvel* Antonin, *vieux dans l'âge de la jeuneſſe. Cinq luſtres furent un ſiecle pour lui. Il eſt mort le 9 Juin 1764.*

Paſſons maintenant à l'hiſtoire de M. *Borwſlaski.*

M. Borwſlaski, Gentilhomme Polonois arriva à Luneville en 1760; il étoit à la ſuite de Madame la Comteſſe Humiecska, Grande Porte-Glaive de la Couronne de Pologne & parente du Roi Staniſlas. Sa ſtature étoit plus ſurprenante que celle de Bebé : à l'âge de vingt-deux ans il n'avoit que vingt-huit pouces de hauteur. Sa taille étoit bien priſe, ſes membres bien proportionnés, de beaux yeux & les traits aſſez agréables ; il avoit beaucoup de force, jouiſſoit d'une bonne ſanté, ne buvoit que de l'eau, mangeoit peu & dormoit bien. Cette miniature vivante étoit pleine de graces, danſoit avec juſteſſe, & avoit l'eſprit auſſi bien fait que le corps : il avoit la mémoire bonne, le jugement fort ſain, un cœur ſenſible & ſans méchanceté. Il étoit fort inſtruit dans la Religion Catholique, liſoit, écrivoit & calculoit bien: il s'exprimoit facilement en Allemand & en François. Le pere & la mere de M. Borwſlaski ſont de taille ordinaire, & ont eu ſix enfans: ſon aîné n'a que trente-quatre pouces, & ſa ſœur qui étoit la moins âgée, n'avoit que vingt-un pouces à l'âge de ſix ans ; les trois cadets de M. Borwſlaski ont chacun cinq pieds & demi. La mere eſt toujours accouchée à terme. Ces nains en venant au monde repréſentoient une maſſe informe, preſqu'auſſi large que longue : leur tête, leurs membres, leur corps ne ſe ſont déployés que par degrés.

Le fameux nain Lucius, dont Auguſte donna le ſpectacle au Peuple de Rome, n'avoit que dix-neuf pouces de haut, & ne peſoit que dix-ſept livres ; ſa voix étoit tonnante. On en voit la figure en bronze à la Bibliotheque du Roi dans le Cabinet des médailles.

On trouve dans l'Hiſtoire d'Angleterre l'oppoſé de

ces deux nains. En 1731 un Payſan du Comté de Berks amena à Londres ſon fils âgé de ſix ans, qui avoit près de cinq pieds de haut, robuſte, fort & à-peu-près de la groſſeur d'un homme fait.

Voici la deſcription d'un autre nain, mais monſtrueux qui vit actuellement dans la ville de Lubni en Ruſſie : il s'eſt lui-même décrit en Langue Ruſſe, en voici la traduction communiquée en 1770.

Pierre Danilow Bereſchny, fils d'un Coſaque Podpornoghtchik du Régiment de Lubni. Ses pere & mere, freres & ſœurs ſont de ſtature ordinaire ; mais ce nain parvenu à l'âge de trente ans, n'a que vingt-neuf pouces trois quarts de hauteur. Il n'a point de bras, ſes épaules ſe terminent en petits moignons de chair ; à peine peut-on paſſer un doigt entre ſa tête & ſes épaules, tant ces deux parties ſont étroitement liées enſemble ; cependant il n'eſt pas laid à voir. Il porte une grande mouſtache qui lui va preſque juſqu'aux oreilles. Il a beaucoup d'eſprit, de jugement & de mémoire. Sa poitrine eſt aplatie, & les jambes courbes comme ſi on les avoit retournées ; les genoux ſont ſans jointures, les os ſont continus aux deux jambes juſqu'aux talons, les gras de jambe ſont preſque totalement obliterés ; chaque pied n'a que quatre orteils, y compris le pouce, tous quatre recourbés & deux ſeuls ſont mobiles. Il marche fort vîte ; mais quand il tombe, faute de jointures aux genoux, il ne peut ſe relever. Il écrit fort couramment du pied gauche ; le caractere de ſon écriture eſt des plus liſibles, tant en Ruſſe qu'en Latin : il deſſine très-correctement au crayon, à la plume & à l'encre de la Chine : il chante, joue aux cartes & aux échecs : il fume & remplit lui-même ſa pipe : il tricote des bas, & ſe ſert pour cela d'aiguilles de bois qu'il fait lui-même : il ſe débotte : il mange auſſi à l'aide du pied gauche & fait quantité d'autres choſes très-ſurprenantes : il n'emploie les deux orteils ſéparés qu'il a au pied droit, que pour aider les opérations du pied gauche. Autant il témoigne un grand déſir de s'inſtruire, autant il apprend avec beaucoup de facilité. Il appartient à un Colonel qui eſt jaloux de cultiver ces heureuſes diſpoſitions, & qui lui en

facilite les progrès. On apprend que l'Impératrice de Russie fait élever un semblable nain monstrueux à l'Académie des Arts. Celui-ci a maintenant seize ans. (1772.)

On voit actuellement (mois de Mars 1774) à la foire St. Germain à Paris, une naine que l'on assure être âgée de vingt ans, & qui n'a que vingt-huit pouces de hauteur. Cette fille naine est assez bien proportionnée, excepté le front qui est fort grand. A sa voix & à ses manieres enfantines on ne diroit pas qu'elle est aussi âgée; mais en examinant les traits de son visage, & d'autres qui ne paroissent pas équivoques, on y trouve écrits très-distinctement les caracteres de son âge.

NALIM. Nom qu'on donne en Russie à la *lotte*. Voyez ce mot.

NANGUER ou NANGUEUR. Nom donné à une espece de gazelle qui se trouve au Sénégal & qui pourroit bien être le daim des Anciens.

NAPAUL ou FAISAN CORNU. Cet oiseau de Bengale est ainsi appelé, dit M. *de Buffon*, parce qu'il a en effet deux cornes sur la tête; ces cornes sont de couleur bleue, de forme cylindrique, obtuses à leur extrémité, couchées en arriere, & d'une substance analogue à la chair calleuse: il n'a point autour des yeux ce cercle de peau rouge, quelquefois pointillé de noir qu'ont les faisans; mais il a tout cet espace garni de poils noirs en guise de plumes: au dessous de cet espace & de la base du bec inférieur prend naissance une sorte de gorgerette, formée d'une peau seche, laquelle tombe & flotte librement sur la gorge & la partie supérieure du cou: cette gorgerette est noire dans son milieu, semée de quelques poils de même couleur, & sillonée par des rides plus ou moins profondes, ensorte qu'elle paroît capable d'extension dans l'oiseau vivant, & l'on peut croire qu'il sait la gonfler ou la resserrer à sa volonté: les parties latérales en sont bleues, avec quelques taches orangées & sans aucun poil en dehors; mais la face intérieure qui s'applique sur le cou, est garnie de petites plumes noires, ainsi que la partie du cou qu'elle recouvre:

le

le ſommet de la tête eſt rouge ; la partie antérieure du corps, rougeâtre, la partie poſtérieure plus rembrunie ; ſur le tout, y compris la queue & les ailes, on voit des taches blanches entourées de noir, ſemées près-à-près aſſez régulièrement : ces taches ſont rondes ſur l'avant, oblongues ou en forme de larmes ſur l'arriere, & celles-ci tournées de maniere que la pointe regarde la tête : les ailes ne paſſent guere l'origine de la queue, d'où l'on peut conclure que c'eſt un oiſeau peſant.

NAPEL, *napellus aut aconitum cæruleum.* Quoique nous ayons déjà dit quelque choſe de cette plante prétendue venimeuſe au mot ACONIT, nous croyons devoir nous étendre davantage ſur l'hiſtoire de cette eſpece de végétal, depuis que nous avons lu les nouvelles expériences que M. *Antoine Storck* en a faites, ainſi que nous le dirons plus bas.

Le napel eſt une plante qui croît naturellement dans la Forêt noire en Siléſie, & ailleurs aux lieux montagneux ; on la cultive auſſi dans les jardins, elle y prend très-facilement, elle y dure fort long-temps, quoique négligée & même maltraitée. Sa racine eſt vivace, de la groſſeur d'un petit navet, noire en dehors, blanchâtre en dedans, produiſant ſouvent d'autres navets collatéraux. Elle pouſſe pluſieurs tiges à la hauteur de trois pieds, rondes, liſſes, moelleuſes, roides, difficiles à rompre, garnies de feuilles amples, arrondies, verdâtres, nerveuſes & découpées en beaucoup de parties étroites, d'une maniere plus remarquable que dans toute autre eſpece d'aconit. Ses fleurs ſont diſpoſées en maniere d'épi aux ſommités des tiges, ayant la figure d'une tête couverte d'un heaume de couleur bleue rayée, & plus court que dans les autres eſpeces. A cette fleur ſuccede un fruit à pluſieurs graines membraneuſes diſpoſées en maniere de tête, qui renferment des ſemences menues, ridées & noires dans leur maturité.

Jean Bauhin dit qu'il ſeroit prudent de bannir de nos jardins un poiſon auſſi mortel à tout animal qui en mange, que l'eſt le napel. Tous les Auteurs de Botani-

que s'accordent aussi à dire, qu'entre tous les poisons qui se tirent de la famille des végétaux, le napel a toujours été regardé comme un des plus dangereux; quelques Auteurs assurent que sa racine échauffée dans la main, suffit pour causer la mort. Toujours est-il vrai que sa fleur portée en bouquet, produit quelquefois des syncopes: nous en avons vu les effets sur deux jeunes personnes. On rapporte qu'un jeune homme, habitant du mont Pilat en Suisse, prit des fleurs de napel dans sa main & descendit la montagne pour aller à une danse. Arrivé à la salle du bal champêtre, il sentit sa main s'engourdir, jeta les fleurs, dansa quelques heures de suite avec une jeune fille: le poison se communiqua par le simple attouchement, & tous deux moururent le soir du même jour. Un autre homme, pour avoir mordu dans la racine, eut une heure après la tête toute enflée. Il paroît par ses effets qu'elle est caustique & corrosive: car elle produit en peu de temps dans ceux qui ont le malheur d'en manger, des enflures, des inflammations, des convulsions, la gangrene & la mort. *Mathiole* raconte l'histoire d'un criminel condamné à mort, à qui l'on fit manger de cette racine pour essayer quelques antidotes qu'on proposoit contre ce poison. Cet homme y trouva d'abord un goût de poivre un peu fort, & au bout de deux heures il fut saisi de vertiges & de si violentes commotions de cerveau, qu'il s'imaginoit avoir la tête pleine d'eau bouillante; cet état fut suivi d'une enflure générale de tout le corps, le visage devint livide, les yeux sortoient d'une maniere affreuse hors de la tête; enfin des convulsions horribles terminerent bientôt la vie & l'espérance de ce criminel. Autrefois on empoisonnoit les fleches avec le suc de cette plante, & l'on détruisoit aussi les animaux sauvages & féroces, lions, tigres, loups, pantheres, &c. avec le napel adroitement mêlé à l'appât des viandes qu'ils aiment le plus. *Wesper* dit, qu'en temps de peste, on s'est servi de cette plante pilée en guise de véscatoire: ce qui démontre évidemment la qualité caustique & érosive de cette plante. On sait encore que les fleurs du napel, portées sur la tête, ont la propriété de détruire l'espece vermineuse

qui ronge les chairs, & de cauſer en place une migraine très-douloureuſe.

M. *Haller* rapporte qu'on a des exemples récens en Allemagne & en Suede de l'effet dangereux & même funeſte du napel. Son poiſon, dit-il, a cependant de la peine à tuer un chien, & les animaux des Alpes ſavent s'en abſtenir. Pour l'odeur ou l'attouchement, même des mains en ſueur, le même Obſervateur dit qu'on n'a rien à en redouter. Nous avons cependant cité ce que peut produire ſa fleur portée en bouquet.

Un tel expoſé des propriétés du napel ſuffit bien pour en proſcrire l'uſage intérieur; mais l'illuſtre *Storck* accoutumé d'après l'expérience à douter de la violence des poiſons végétaux, a voulu s'aſſurer par lui-même des effets de celui-ci. Pour les mieux éprouver, il mit ſur ſa langue une petite quantité de poudre des feuilles & des tiges de l'aconit napel; elle produiſit de l'ardeur & lui cauſa une ſalivation qui durerent long-temps; il reſſentoit auſſi des douleurs momentanées, vagues & lancinantes; mais il ne s'en ſuivit aucun mal.

Cette même poudre jetée ſur un ulcere chancreux & fongueux, ne le conſuma pas.

M. *Storck* fit enſuite l'extrait de napel avec le ſuc exprimé de cette plante: il en mit un grain entre la paupiere inférieure de ſon œil droit & l'œil même, il n'en fut affecté que comme il l'auroit été par tout autre corps étranger. Il fit enſuite un mélange de deux grains de cet extrait avec deux gros de ſucre en poudre, & pour obſerver particuliérement ce qui ſe paſſeroit dans le corps, il avala lui-même ſix grains de ce mélange qui ne lui firent rien. Le ſecond jour il en prit huit, qui ne lui produiſirent aucune ſenſation, & il en fut de même des dix grains qu'il prit le troiſieme jour. Enhardi par le ſuccès de ces eſſais, il en prit vingt grains: aucune des fonctions animales n'en fut dérangée, mais il tranſpira un peu plus qu'à l'ordinaire. Il continua ainſi pendant ſept jours, & le huitieme il ſe repoſa; il recommença le neuvieme & continua juſqu'au quatorzieme, ſans s'appercevoir de rien de nouveau. M. *Storck* conclut de-là, que la poudre de napel excite la tranſpiration & la ſueur, qu'on

peut en donner aux malades intérieurement avec sécurité, en l'administrant en petites doses pour commencer; qu'elle convient dans les maladies, dont on peut chasser la matiere ou la cause par les voies de la transpiration & de la sueur: telles que les fievres, les douleurs sciatiques, même pour les glandes enflées & squirreuses. Ainsi l'art de guérir peut tirer parti de cette plante mortelle.

Le Docteur *Bernhard de Bernitz* dit que la plante de napel desséchée ou transplantée des Alpes dans les jardins, perd sa qualité vénéneuse, & qu'elle n'est point un poison dans le Nord comme dans l'Italie. M. *Deslandes* assure la même chose dans la Bretagne; mais il est très-probable, ainsi que l'observe M. *Haller*, que ces Auteurs parlent d'une plante différente du napel: c'est, dit-il, une espece d'aconit à fleur bleue, mais du reste très-semblable à l'*aconitum lycoctonum*. Il est sûr du moins que le napel a tué un Chirurgien en Suede, & qu'il est mortel pour les chevres de Falhun. C'est aux Médecins qu'il convient de prononcer si l'usage interne du napel doit être permis ou défendu.

Quant aux remedes propres contre le poison du napel, on commence par donner promptement un émétique, suivi d'une boisson abondante de lait & de beurre bouillis ensemble, l'on finit le traitement par des bols de thériaque ou par un autre antidote, & on y joint les sels volatils de viperes ou de corne de cerf, &c.

NAPHTE. *Voyez* PÉTROLE.

NARCAPHTE, *narcaphtum*. Nom donné à l'écorce odoriférante & résineuse de l'arbre qui produit l'oliban; les Juifs Orientaux s'en servent dans leurs parfums; en Europe on l'emploie quelquefois pour les maladies du poumon. On appelle aussi le narcaphte *tignamé* ou *thymiama*. Voyez OLIBAN.

NARCISSE, *narcissus latifolius*, est une plante dont la racine est bulbeuse, noirâtre en dehors, blanche en dedans, visqueuse, amere, & poussant en dessous des fibres comme les autres racines bulbeuses. Il sort de sa racine des feuilles vertes pâles, assez semblables à celles du poireau. Il s'éleve d'entr'elles une tige haute d'un pied, creuse, nue, cannelée, portant en sa som-

mité une grande fleur à une seule feuille évasée en godet, blanche, & entourée de six feuilles pâles & purpurines, d'une odeur fort agréable. A cette fleur succede un fruit oblong, triangulaire, rempli intérieurement de semences arrondies, noires & ameres : la fleur de cette plante est un peu narcotique, & sa racine est aglutinante & vomitive.

On cultive cette plante dans les jardins à cause de la beauté & de la bonne odeur de sa fleur : elle est une des premieres dont la fleur décore nos parterres au retour du printems. Il y en a de plusieurs sortes : 1°. le *narcisse de Constantinople ;* 2°. le *grand narcisse d'Inde ;* 3°. le *narcisse rouge ;* 4°. celui qui est *jaune ;* 5°. le *narcisse d'Angleterre.* Il se trouve aussi dans les bois & les prairies une espece de narcisse jaune qu'on nomme *aiau.* Voyez CAMPANE JAUNE.

On plante les narcisses dans les parterres en planches, à quatre doigts de distance, à la fin de Janvier : on les multiplie de caïeux, & on les replante en Octobre. Les Jonquilles & les tubéreuses ne sont que des especes de narcisse. *Voyez ces mots.* En général les narcisses ont les fleurs disposées en épi, en pannicule, ou en ombelle.

NARCISSE D'AUTOMNE. *Voyez* LYS NARCISSE.

NARCISSE DE MER ou PETITE SCILLE BLANCHE. *Voyez à la suite du mot* SCILLE.

NARCISSITE. Nom donné à une pierre qui imite la fleur du narcisse. Ce n'est peut-être qu'une empreinte.

NARD, *nardus.* On a donné ce nom à différentes plantes d'usage en Médecine, & dont nous ferons mention dans cet article.

Le NARD INDIEN ou SPICA-NARD, *nardus Indica.* C'est, selon M. *Geoffroi* (*Mat. Médic.*) une racine chevelue, ou plutôt un assemblage de fibres entortillées, attachées à la tête de la racine, qui ne sont rien autre chose que les filamens nerveux des feuilles fanées, desséchées, ramassées en un petit paquet, de la grosseur & de la longueur du doigt, de couleur brune roussâtre, d'un goût amer, âcre, d'une odeur aromatique, approchante de celle du souchet. Cette partie filamen-

teuse de la plante qui est en usage, n'est, dit aussi M. *Geoffroi*, ni un épi, ni une racine, mais c'est la partie inférieure des tiges, qui est d'abord garnie de plusieurs petites feuilles, qui en se fanant & en se desséchant tous les ans, se changent en des filets, n'y ayant que leurs fibres nerveuses qui subsistent.

On a donné au nard le nom d'*épi*, à cause de sa figure; la racine à laquelle il est attaché, est de la grosseur du doigt, fibreuse, brunâtre, solide & cassante. Parmi ces filamens on trouve quelquefois des feuilles encore entieres, blanchâtres & de petites tiges creuses, cannelées, &c.

Le nard Indien croit en grande quantité dans la grande Java, & les habitans en font beaucoup d'usage dans leurs cuisines, pour assaisonner les poissons & les viandes. On en apportoit autrefois de la Syrie & du Gange, dont la couleur & la longueur des fibres varioient beaucoup.

La plante de ce nard s'appelle *gramen cyperoïdes aromaticum Indicum*. BREYN. On estime le spica-nard alexitere, céphalique, stomachique, néphrétique & hystérique. *Riviere* dit qu'il convient, pris en substance dans du bouillon pour l'hémorragie des narines. *Bontius* dit que dans les Indes on fait infuser dans du vinaigre le nard desséché, & qu'après y avoir ajouté un peu de sucre, on fait usage de ce remede contre les obstructions du foie & de la rate: il convient encore, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, pour la morsure des bêtes venimeuses.

Le NARD CELTIQUE, *nardus Celtica; Spica Gallica aut Romana*. C'est une espece de valériane, dit M. *Haller;* sa racine est rampante, chevelue, roussâtre, garnie de petites écailles, d'un vert jaunâtre, d'un goût âcre, un peu amer, aromatique, d'une odeur forte & un peu désagréable. Les petits rameaux de cette plante basse, poussent par intervalle des fibres un peu chevelues & brunes; à leur partie supérieure ils donnent naissance à plusieurs petites têtes qui soutiennent de petites feuilles oblongues de couleur jaunâtre. Il s'éleve d'entre ces feuilles une petite tige, haute d'un pied, ayant sur chaque nœud deux petites feuilles op-

posées ; elle porte en sa sommité beaucoup de fleurs, qui ont la figure d'une étoile d'un jaune tirant sur le rouge, & qui dans la suite deviennent de petites graines oblongues & aigretées.

Toutes les parties de cette plante sont aromatiques, & imitent, étant récemment séchées, l'odeur de la petite valériane. *Clusius* dit que le nard celtique fleurit en Août, presque sous les neiges même, sur le sommet des Alpes de Styrie. M. *Haller* dit qu'il est commun sur les Alpes de la vallée d'Aoste, & qu'il y en a aussi sur le Saint-Bernard; les feuilles paroissent ensuite, lorsque les fleurs commencent à tomber. Les habitans le ramassent vers le commencement de Septembre, lorsque les feuilles jaunissent ; car alors son odeur est agréable, au lieu qu'il n'en a point lorsqu'elles ne font que de paroître, ou que la plante est encore verte. Ce nard qu'on trouve en bottes chez les Droguistes, a les mêmes propriétés que le précédent ; il est cependant plus diurétique & plus carminatif. On en transporte en Egypte, où, suivant M. *Haller*, on lui attribue une vertu pour adoucir la peau.

Le NARD DE MONTAGNE, *nardus montana tuberosa.* C'est une espece de valériane des Pyrénées &c. dont la racine est oblongue, arrondie, & en forme de navet, de la grosseur du petit doigt. Sa tête qui est portée sur une petite tige rougeâtre, est garnie de fibres chevelues, brunâtres & un peu dures. Cette racine est vivace, d'un goût âcre & aromatique.

Le petit *nardus Indica* est une espece de *gramen.* Voyez ci-dessus.

Le *nard bâtard du Languedoc*, est une sorte de chiendent.

Le *faux nard*, est la racine de l'ail serpentin des Alpes. *Voyez* AIL.

Le *nard sauvage*, *nardus rustica*, est la racine du cabaret. *Voyez ce mot.*

Le *nard commun*, est l'aspic ou lavande mâle. *Voyez* LAVANDE.

NARHWAL ou LICORNE DE MER, *unicornu marinum.* Voyez à l'article BALEINE,

NARI-NARI. Espece de raie du Brésil ; les Hollandois l'appellent *piilsert :* ce poisson est charnu, il a le corps & les nageoires triangulaires ; sa tête est grosse & ramassée, au milieu il y a une espece de fosse : au lieu de dents, il a dans la bouche des os qui sont composés de plusieurs osselets : ses yeux sont petits : le dessus du corps est rouge-bleuâtre, tiqueté de blanc ; le ventre est assez blanc & sa peau unie. Proche de sa queue, sont deux crochets longs de trois doigts, & faits comme les hameçons d'un Pêcheur : sa chair est fort délicate.

NARKA. Nom que les naturels du pays de Kamtschatka donnent au poisson rouge de leurs mers. *Voyez à la fin de l'article* POISSON.

NASICORNE. Nom donné au rhinocéros insecte, dont il est parlé à l'article *scarabée monoceros*. Voyez ce mot.

NASITOR. *Voyez* CRESSON ALÉNOIS.

NATICE, *natica*. Nom que M. *Adanson* donne d'après les Anciens à un genre de coquillage operculé assez semblable à la nérite, & qui, selon M. d'*Argenville*, est un limaçon à bouche demi-ronde, qui n'a point de gencives, ni de dents, seul caractere qui le distingue de la *nérite*. Voyez ce mot.

NATIF. Dans l'Histoire Naturelle du regne minéral c'est un synonyme de *vierge ;* il exprime un métal, ou un demi-métal qui se trouve dans le sein de la terre sous la forme qui lui est propre & sans être mélangé. On dit de l'argent *vierge*, du cuivre & de l'or *natifs*.

NATRON, *natrum*. C'est un sel alkali terreux, appelé quelquefois *alkali terrestre Oriental*. Il est en partie fixe, & toujours mêlé avec des corps terrestres. Quelquefois il contient du sel marin, ou un sel alkali volatil, de maniere cependant que l'alkali fixe y domine. Le natron fond aisément à l'humidité de l'air ; résous en liqueur, il fait moins d'effervescence avec tous les acides que sous une forme solide, il se dissout dans quatre fois son poids d'eau chaude. Cette espece de sel minéral, qu'il ne faut pas confondre avec la véritable soude végétale en pains durs & assez blancs, que l'on fabrique en Egypte, & dont on se servoit autre-

fois en France pour faire du savon & du verre, se trouve aussi en Egypte, en Syrie, dans l'Asie mineure & dans les Indes Orientales. On peut même le regarder comme le *nitre des Anciens*, lequel fermentoit avec des liqueurs acides, & ils s'en servoient comme d'un sel lixiviel pour laver leurs habits, & pour mettre dans leurs bains purificatoires. (Jérémie, chap. 2. vers. 22.) Ils le mêloient avec du sable pour en faire du verre. (Tacit. liv. 5.) *Salomon* fait entendre cette effervescence du nitre d'Egypte avec le vinaigre, lorsqu'il dit dans les Proverbes, (chap. 25. vers. 20.) *celui qui chante des airs à un cœur affligé, fait comme si l'on méloit du nitre avec du vinaigre.* Or, il n'y a que le natron qui possede cette propriété. Aujourd'hui nous voyons rarement ce sel dans le commerce, ainsi que la soude végétale d'Egypte, que l'on appeloit aussi *natron*, celle-ci ayant été prohibée sous le ministere du Grand Colbert. On lui substitue le sel de verre ou l'anatron factice. Le natron naturel, tel qu'il se trouve dans la terre, est ordinairement d'un blanc rougeâtre & en masses informes.

Nous avons donné dans notre Minéralogie un détail assez circonstancié de la préparation & de l'usage de ce sel en Egypte. C'est dans l'hiver que ce sel suinte naturellement de la terre : on le ramasse dans l'état de liqueur dans deux grands lacs, dont l'un est situé près de Memphis, & l'autre aux environs d'Alexandrie. Les vents qui regnent dans ces contrées ne tardent pas d'en faire évaporer la surabondance d'eau, & lorsque l'eau est assez diminuée pour que le sel commence à se cristalliser, on le retire avec des pelles faites en écumoire, puis après l'avoir égoutté, on le transporte dans de grands magasins à Terrané & à Damanchou. Les Payſans sont contraints par corvée d'en voiturer quarante-cinq mille quintaux, partie en bateau sur le Nil, & l'autre partie sur des chameaux : mais cette obligation forcée leur tient lieu de la taille qu'ils devroient pour leurs terres ensemencées.

Les Arabes emploient ce sel pour blanchir leur cuivre & le linge ; les Egyptiens s'en servent au lieu de soude dans leur savon & leur verre ; les Boulangers

d'Alexandrie en mettent dans leur forgo ; les Tanneurs du pays en préparent leurs cuirs ; les Bouchers, &c. s'en ſervent auſſi pour attendrir ou conſerver les viandes, &c. *Voyez notre Minéral. Tom. I. pag. 468 à 470.* Le ſel alkali qui ſe trouve dans quelques eaux thermales & minérales, a beaucoup de rapport avec le natron : l'on donne auſſi au ſel d'Ebshom le nom de *natron d'Angleterre.* Voyez SEL D'EBSHOM.

NATURALISTE. C'eſt un Phyſicien & un Philoſophe qui conſidere l'aſſemblage & l'état des choſes créées dans la nature : il y en a peu qui s'occupent également de toutes les parties de cette ſcience ; l'un étudie les foſſiles & les minéraux ; l'autre tâche de connoître méthodiquement les individus du regne végétal ; ſouvent il ſe borne à la culture des plantes : d'autres ne trouvent d'agrément que dans les curieuſes recherches & obſervations du regne animal, ou même d'une de ſes parties : quelques-uns étendant la ſphere de leur génie, n'étudient point ce qui les environne immédiatement, leurs yeux armés du téleſcope, conſiderent & obſervent ce qui ſe paſſe dans l'immenſité des cieux ; d'autres enfin, ſe reſtreignent à l'obſervation météorologique. Ainſi le Minéralogiſte, le Botaniſte, le Zoologiſte, l'Aſtronome, &c. ſont les démonſtrateurs ou les interpretes des ouvrages & des opérations de la Nature. *Voyez les articles* CIEL & PLANETE, ANIMAL, PLANTE, MINÉRAL & HISTOIRE NATURELLE.

NATURE, *natura.* Ce mot pris en général comprend le ſyſtême du monde, la machine ou le mécaniſme de l'univers, l'aſſemblage de toutes les choſes créées. La nature eſt le monde réel, poſſible, ou l'univers créé, *natura naturata.* Les Phyſiciens étudient la nature ſuivant l'ordre & le cours naturel des choſes, ſuivant la ſuite des cauſes ſecondes, ou les lois du mouvement que Dieu a établies, & qui agiſſent dans toutes les occaſions par une néceſſité inévitable. Les Théologiens appellent l'Être qui a ordonné & préſidé à cet enchaînement des cauſes & des effets, *natura naturans.* Tout ſe tient dans l'univers ; ce n'eſt qu'un tout ſubſiſtant par l'accord & la correſpondance de toutes ſes

parties : il n'y existe rien, jusqu'au plus petit atome, qui n'y soit aussi nécessaire que l'existence de la mouche l'est à la subsistance de l'araignée : tout est soumis à l'ordre universel : la nature entiere n'est qu'un seul & vaste système que tous les êtres composent. Les animaux composent un système qui se réunit à celui des végétaux ; celui-ci au système des autres corps qui couvrent la surface de notre globe : tout prouve que tous ces systêmes ne sont que des parties d'un système général ou plus étendu. Ces principes seront établis & confirmés dans toute la suite de cet Ouvrage.

On fait encore un autre usage du terme de *nature :* on dit la *nature* de l'homme, pour exprimer son tempérament, son humeur, ses inclinations. La *belle nature* est la nature embellie par les Beaux Arts pour l'usage & l'agrément. C'est ainsi qu'on cultive l'oreille d'ours, les œillets, &c. & que la Peinture & la Sculpture ajoutent au charme des yeux. On dit qu'un corps est naturel, quand l'art ne l'a pas produit.

NATURE DE BALEINE ou BLANC DE BALEINE. *Voyez à l'article* BALEINE.

NAUCORE OU MOUCHE SCORPION. En voici la description par M. *de Cayeu de Valernod.*

La naucore est un insecte hémiptere aquatique, qui tient de la mouche par la tête, de la punaise par la trompe & les étuis, de la procigale par le port de ces mêmes étuis, du cancre par les deux premieres pattes, & enfin des dytiques & des hydrophiles par les quatre dernieres. Les ruisseaux n'ont point d'insecte plus agile ni qui saute mieux, quoiqu'à son désavantage, parce que les deux dernieres pattes, destinées à faire ressort, sont trop longues relativement à la longueur du corps, & articulées trop bas, savoir à l'origine de cette partie du ventre qui commence à diminuer. La naucore ne laisse pas d'être un fort bel insecte. La gaine de la trompe est noire à son extrémité ; mais cette couleur s'éclaircit peu-à-peu en remontant vers la tête, & prend alors une couleur verte fort agréable. Cette gaine est d'une seule piece, dure comme de la corne, faite en bec d'oiseau & creusée

intérieurement dans toute sa longueur. La trompe est logée dans ce canal & en remplit toute la capacité. Elle est également creuse en-dedans, très-fine, très-aiguë, & d'une roideur qu'on croiroit incompatible avec sa délicatesse. Les yeux sont d'une couleur de café clair, extérieurement convexes & placés aux deux côtés de la tête dont ils occupent les deux tiers en longueur & en largeur. L'entre-deux, à commencer un peu au-dessous de la jonction de la trompe, est d'un blanc jaunâtre, mêlé d'une légere teinte de vert, ainsi que la moitié antérieure du corselet, les pattes & les antennes. Celles-ci sont très-courtes & placées au-dessous des yeux. La moitié postérieure du corselet est parfaitement semblable aux écailles d'ablette, dont on se sert pour contrefaire les perles. Le dessus des étuis est d'un noir satiné par-tout, excepté à l'angle extérieur de leur base, d'où sortent deux lignes en maniere d'V consonne, d'un blanc terne, dont la plus longue branche s'étend le long de l'écusson, & se termine à la suture, à l'endroit où la partie cartilagineuse de ces mêmes étuis se joint à la partie membraneuse; l'autre branche plus courte d'un tiers & moins large, s'étend entre la premiere & le bord extérieur des étuis, & finit dans leur milieu. Le ventre & le corselet sont bordés en-dessous d'un rang de poils d'un gris sale, qui touchent par leurs extrémités à d'autres poils, lesquels naissent d'une strie qui partage le ventre longitudinalement en deux parties égales, & s'écartent des deux côtés de maniere qu'ils ressemblent parfaitement à un V consonne renversé. Les pattes n'ont que deux articulations aux tarses. Celles de la premiere paire se replient en devant & en-dessous, en forme de pinces; mais les autres ne different en rien de celles des dytiques & des hydrophiles, c'est-à-dire qu'elles sont faites en nageoires. Les ailes que les étuis couvrent à demi, sont d'un gris de lin tendre dans leur partie supérieure, & noires dans la partie inférieure qui reste toujours découverte.

Cette naucore que je nommerois volontiers *androsacée*, parce que je l'ai prise dans une touffe d'herbes, mêlée de beaucoup d'androsace, se trouve, comme

toutes les autres naucores, communément dans les ruisseaux, & se nourrit du parenchyme des plantes qui y croissent, & même de la substance des insectes qui y vivent. Le ventre renferme un canal d'un tiers de ligne de diametre à ses deux extrémités; mais il se renfle dans son milieu, & forme une espece d'estomac capable de contenir un grain de lentille. Les parties qui servent à la génération sont contenues dans le dernier anneau du ventre, qui est beaucoup plus long que chacun des six autres qui le composent. Celles du mâle consistent en un amas de petits vaisseaux blancs qui aboutissent tous à une verge de couleur blonde, très-fine & très-courte, rayée en-dessus dans toute sa longueur, & armée d'un petit crochet à son extrémité: elle sort à l'extérieur par une ouverture pratiquée au *rectum* tout près de l'anus. L'ovaire de la femelle est situé à la partie latérale & externe du rectum, & communique à cette partie par une ouverture qui est placée tout près de l'orifice extérieur. Cet ovaire est un amas de petits grains blancs qui s'apperçoivent d'autant mieux à la vue simple, que les autres parties du ventre sont d'une couleur verdâtre. Le tout est enveloppé, dans les deux sexes, par une membrane adipeuse qui tapisse l'intérieur, & qu'on pourroit appeler *péritoine*. D'après cette description des parties internes de cet insecte, il n'est pas difficile de s'imaginer que le ventre doit être plus aigu en-dessus qu'en dessous, & que par conséquent ses ailes sont pliées en toit.

Les naucores piquent très-vivement, & font couler dans la blessure une liqueur venimeuse qui fait enfler la partie & cause une douleur d'autant plus insupportable qu'elle approche plus du chatouillement. Le meilleur remede que j'aye trouvé pour ces sortes de piqûres, pour celles des guêpes & des abeilles, est la salive appliquée sur le champ, & qu'on y laisse sécher. La douleur cesse en un quart d'heure.

NAVET, *napus*. Le navet est la racine d'une plante qui porte le même nom, & que l'on cultive dans les champs & dans les jardins. Il y a des navets que l'on cultive pour la table, & d'autres pour la nourriture des bestiaux; nous parlerons d'abord des premiers.

La racine du navet eſt de forme, de groſſeur & de couleur différentes, ſuivant l'eſpece ; elle eſt charnue & douce, exhalant une petite odeur aſſez agréable. Sa feuille eſt un peu alongée, découpée profondément, rude & velue, d'un gros vert. Sa tige qui s'éleve de deux ou trois pieds, eſt branchue, liſſe, plus ou moins groſſe, ſuivant l'eſpece. Les fleurs naiſſent en abondance aux extrémités de ſes rameaux. Ces fleurs ſont de couleur jaune, quelquefois blanches, à quatre feuilles diſpoſées en croix. Aux fleurs ſuccedent des ſiliques qui contiennent des ſemences rondes & brunes.

Il y a pluſieurs eſpeces de navets, mais dont quelques-uns ne ſe plaiſent que dans certains terrains ; tels ſont les navets de Freneuſe, de Saulieu en Bourgogne, de Saint-Jôme, du Gatinois, qui dégénerent notablement quand on veut les élever ailleurs. C'eſt de toutes les plantes celle qui s'accoutume le moins au changement de terrain natal, & qui vient le mieux dans les terres arides, ſablonneuſes & caillouteuſes, où toutes les autres ne font que languir.

Les ſix eſpeces dont la culture réuſſit le mieux dans nos climats, ſont le petit navet de Berlin, qui eſt fort menu, plus rond que long, & blanc ; c'eſt le plus petit & le meilleur : le navet de Vaugirard, qui eſt de médiocre groſſeur, un peu alongé, tirant ſur le gris du côté de la tête, d'un bon goût, tendre ; il eſt fort commun à Paris & fort eſtimé : le navet commun, tant le rond que le long, qui eſt celui qu'on cultive le plus communément à Aubervilliers : le navet gris, ainſi nommé de ſa couleur, & dont la forme eſt alongée : le navet de Meaux, qui rend le plus de profit par ſa groſſeur & par ſa longueur, qui eſt communément de huit à dix pouces ; cette eſpece, élevée aux environs de Meaux, eſt meilleure que la même élevée aux environs de Paris. Il y a auſſi le navet jaune, qui eſt excellent.

Toutes ces eſpeces ſe cultivent de la même maniere, & réuſſiſſent mieux en général dans les terres légeres que dans toutes les autres. On ſeme les navets en deux temps, au mois de Mars & au mois d'Août ; & ils vien-

nent ordinairement mieux dans cette dernière saison. Il faut que la terre ait été bien labourée, qu'elle ne soit ni trop seche ni trop trempée, & avoir attention de semer très-clair. Quand la graine est levée on éclaircit le plan, de maniere qu'il reste environ six pouces de distance d'un pied à l'autre, & on sarcle toutes les mauvaises herbes. Les navets sont ordinairement bons au bout de deux mois, & il faut les arracher alors de crainte qu'ils ne se cordent, ou que les vers ou les mulots ne les attaquent. Ceux du printems servent pour l'été; & ceux du mois d'Août passent l'hiver, étant mis dans le sable après qu'on leur a tordu la fanne, ou entassés en pleine terre, dans un trou qu'on couvre de chaume; il faut que ce trou soit pratiqué de façon que l'eau des pluies ait un écoulement, & que les pleurs de la terre ne puissent pas l'inonder.

On peut aussi semer les navets dès le mois de Février sur une couche chargée de huit à neuf pouces de terreau, & dont la chaleur soit presque amortie: on en jouit par ce moyen dès le commencement de Mai.

Pour se procurer la graine de toutes ces especes on choisit les plus belles racines, qu'on remet en terre au mois de Mars, à un pied de distance les unes des autres. Au mois d'Août on les arrache, & au bout de quelques jours on bat la graine. Elle ne se conserve bonne que pendant deux ans.

Le navet a pour principal ennemi la *lisette*, qui dévore les jeunes feuilles & fait périr la plante, sur-tout dans les années seches. On n'y connoît point de remede, si ce n'est de donner une nouvelle façon à la terre & de semer de nouveau, lorsqu'un plant de navets a été ainsi ravagé. M. *Bourgeois* a cependant observé qu'on peut éloigner & détruire cet insecte en arrosant ces jeunes plantes, même les choux & les raves, pendant plusieurs soirs de suite avec de l'urine de cochon mêlée avec moitié eau. Cette espece d'urine n'a point, selon notre Observateur, la propriété brûlante qu'ont celles des autres animaux; elle rafraîchit les plantes, les préserve de la sécheresse, & les fait croître & prospérer très-facilement. On a aussi remarqué qu'en semant après la mi-Août, le plant est ordinairement

beaucoup moins fatigué de ces insectes, parce qu'ils commencent alors à se retirer.

Le navet est un légume assez sain, quoiqu'un peu venteux; on le met dans les soupes, on le mange à la sauce blanche & à la moutarde: on le frit en pâte, & il se marie bien avec la plupart des viandes, singuliérement avec le mouton & le canard. On tire par expression de la graine du navet une huile qui sert à brûler, & qu'on mêle avec celle de la navette.

Le navet a de grandes propriétés dans la Médecine; sa décoction est d'un usage très-familier dans les bouillons propres pour la poitrine; mêlée avec le sucre elle forme un sirop très-estimé pour appaiser la toux invétérée & pour l'asthme. La semence du navet est incisive & apéritive.

Les navets que l'on cultive pour la nourriture du bétail, se réduisent à trois especes. L'une est le navet à grande racine, que l'on cultive pour le service de la table, mais qu'on donne aussi au bétail quand on se trouve en avoir une assez grande quantité. L'autre espece est la *turnip* des Anglois ou la *rabioule* du Limousin, du Poitou, de la Bretagne. L'espece la plus estimée en Angleterre est la turnip rouge d'Ecosse. Enfin la troisieme est la rave du Limousin.

La rabioule ou la turnip (*turneps*) que les Anglois cultivent pour leurs bestiaux, a la racine beaucoup plus large que longue. Cette grosse racine, qui est presque hors du terrain, jette dans l'intérieur de la terre un filet gros comme le doigt, qui sert à lui fournir de la nourriture. Ces navets deviennent si gros, qu'on en voit qui ont jusqu'à neuf pouces de diametre. Ces racines se plaisent dans des terres légeres & bien amandées. On les seme ordinairement dans le courant du mois de Juin; on les arrache au mois d'Octobre, & on les garde pour l'hiver, où la disette d'herbe oblige de mettre les bestiaux au sec.

NAVET DU DIABLE. *Voy. à l'art.* BRYONE.

NAVETTE ou NAVET SAUVAGE, *napus sylvestris*. Cette plante ne differe du navet commun & cultivé que par sa racine, qui est beaucoup plus petite, d'un goût âcre & qui sent le sauvageon. Sa fleur est

est jaune, & quelquefois blanchâtre. Ses feuilles sont plus découpées. La navette croît naturellement entre les blés, sur les levées & les bords des fossés: elle fleurit en Avril & en Mai, & produit beaucoup de graine.

Toute la plante est beaucoup plus alexitere que la précédente, sur-tout la semence. Tout le monde sait que les Oiseliers en nourrissent dans des cages bien des especes de petits oiseaux, comme serins, chardonnerets, linottes, pinçons, &c. C'est de cette même graine émulsive qu'on tire par expression une huile appelée *rabette* ou *navette*, dont on se sert pour brûler à la lampe, & que les Ouvriers en laine emploient aussi dans leurs ouvrages. La grande consommation que l'on fait de cette huile a engagé depuis quelques années divers particuliers à cultiver cette plante, sur-tout aux environs de Rouen, dans le pays de Caux, & dans la Picardie. On seme la navette depuis le commencement d'Avril jusqu'en Juillet, & en plein champ. Il lui faut des terres fortes & bien labourées, & que l'on herse après la semaille. On connoît que la semence est mûre, quand la cosse est devenue blanche. La graine appelée *grosse navette* est la graine du *colsa*. Voyez ce mot. M. l'Abbé *Rozier* a fait un très-bon Traité sur *la meilleure maniere de cultiver la navette & le colsa, & d'en extraire une huile dépouillée de son mauvais goût & de son odeur désagréable*. Cet Ouvrage est précédé d'un avant-propos, dans lequel l'Auteur examine si l'huile de pavot, dite d'*œillet*, est narcotique & somnifere; en un mot si elle est aussi dangereuse que quelques-uns l'ont soupçonné; & il conclut pour la négative.

NAVETTE DE TISSERAND. On donne ce nom à un coquillage univalve du genre des porcelaines. La navette est rare & ressemble à un petit œuf blanc, dont les deux bouts seroient alongés, pointus & creusés en gouttiere.

NAUTILE ou VAISSEAU-COQUILLE, ou VOILIER, *nautilus aut polypus testaceus*. C'est un genre de coquillage univalve, fait comme une gondole à poupe élevée. Les nautiles sont contournés en spi-

rales de deux ou trois révolutions, toutes dans un même plan, & dont la derniere paroît seule extérieurement. On distingue deux sortes de nautiles :

1°. Le NAUTILE ÉPAIS & CHAMBRÉ, *nautilus crassus Indicus*, est à cloisons, ombiliqué & sans oreilles, nacré en dedans, à flammes onduleuses & fauves sur la moitié de sa robe la plus voisine de la tête, avec une grande tache noire à la seconde révolution.

Quand on divise longitudinalement la coquille de ce nautile en deux, on voit dans l'intérieur le tuyau ou siphon qui communique d'une concamération à l'autre; on y compte souvent quarante cellules ou compartimens, dont la grandeur diminue à mesure qu'ils approchent du centre. C'est par ce petit tuyau ou siphon que l'animal passe un muscle ou sa queue qu'il attache à sa coquille, aussi ne la quitte-t-il jamais. Ce siphon lui-même est composé d'articulations, ensorte qu'il paroît être produit à différentes repriſes comme la coquille même, dont l'animal bâtit les cloisons à mesure qu'il augmente de volume. Ces concamérations ou cloisons sont simples, unies, courbées, & non découpées ou à futures comme dans la corne d'Ammon, qui paroît extérieurement herborisée uniquement par cette disposition de pieces de rapport.

2°. La coquille du nautile qui est mince, s'appelle NAUTILE PAPIRACÉ, *nautilus papyraceus polyposus*. Celle-ci est à oreilles & sans oreilles, cannelée, d'un seul vide, à carene tuberculeuse, plus ou moins large, & d'un roux enfumé, le reste d'un blanc de lait, sans articulations ou concamérations, & l'animal qui y demeure ne tient point, dit-on, à sa coquille comme dans l'espece précédente.

On distingue plus exactement 1°. le nautile poli & épais; 2°. le même ombiliqué; 3°. le nautile commun, chambré & partagé en plusieurs cellules; 4°. le nautile cannelé, mais vide & sans aucune séparation en dedans; 5°. le nautile papiracé, aplati & mince; 6°. le nautile à oreilles & à large carene; 7°. le même nautile à carene ondée en sillon & dentelée des deux côtés; 8°. celui dont la carene est par-tout dentelée. Enfin si toutes les cornes d'Ammon fossiles, &c. que nous

trouvons dans la terre sont autant de moules intérieurs de nautiles, il doit se trouver autant d'especes de nautiles qu'il y a de cornes d'Ammon, & par conséquent le nombre des especes de nautiles encore inconnues seroit bien grand par rapport au nombre des especes connues.

On a donné le nom de *nautile* à cette coquille, parce qu'on a prétendu que c'est de l'animal qui l'habite que les hommes ont appris à naviguer. Au moins la forme de cette coquille approche de celle d'un vaisseau, & l'animal semble se conduire sur la mer comme un Pilote conduiroit un navire. Quand le nautile veut nager, il éleve deux de ses bras en haut & étend la membrane mince & légere qui se trouve entre ses deux bras comme une voile; il se sert des deux autres appendices, qu'il alonge & plonge dans la mer, & qui lui tiennent lieu d'avirons, un autre lui tient lieu de gouvernail. Il ne prend d'eau dans sa coquille que ce qu'il lui en faut pour lester ce petit navire, & pour marcher avec autant de vîtesse que de sureté; mais à l'approche d'un ennemi ou dans les tempêtes, il replie sa voile, retire ses avirons & remplit sa coquille d'eau pour couler ou se précipiter plus aisément au fond de la mer. Il retourne sa barque sens dessus dessous lorsqu'il veut s'élever du fond de la mer, & à la faveur de certaines parties qu'il gonfle ou comprime à volonté, il peut traverser la masse des eaux; mais dès qu'il a atteint la superficie de l'eau, il tourne adroitement son petit vaisseau, dont il vide l'eau, & épanouissant ses barbes palmées, il se met à voguer en s'abandonnant au gré des vents. C'est un navigateur perpétuel, qui est tout à la fois le Pilote & le vaisseau. On voit quelquefois dans les temps calmes de petites flottes de cette espece sur la superficie de la mer.

L'animal qui habite cette coquille est une espece de polype à huit pieds, *polypus octipes testaceus*: quand il se retire, il n'emplit pas tout-à-fait sa coquille. Le derriere de son corps est creux & couvert de porreaux; le dessus est plat, cartilagineux & ridé, tirant sur la couleur sombre, avec de certaines taches noires. On voit, dit M. *d'Argenville*, à la partie de devant une

multitude de petits pieds, posés l'un sur l'autre, avec plusieurs lambeaux couvrant la bouche des deux côtés. Ces lambeaux ressemblent à la main d'un enfant, & se divisent en vingt doigts très-petits. Ils servent à l'animal pour s'alonger, se retirer, saisir sa proie & la porter à sa bouche. Cet animal n'ayant point de couverture à l'entrée de sa coquille, ni de défense, est en prise aux crabes, aux araignées & aux scorpions de mer. On fait peu d'usage dans les tables de ce testacée, parce que sa chair est fort dure; mais l'écaille, dans l'espece qui est épaisse & nacrée en dedans, sert à faire des vases à boire, qu'on grave en dehors: les Sauvages en font des cuillers, qu'ils nomment *papeda*; on en tire aussi une sorte de burgaudine.

Les plus beaux nautiles, ceux à coquilles épaisses, se pêchent dans l'Inde, à Amboine, à Batavia, aux Moluques & au Cap de Bonne-Espérance. Celui qui est papiracé se trouve dans plusieurs lieux de la Méditerranée; son écaille est d'un blanc de lait, quelquefois tirant sur le jaune & enfumé par la carene.

NAUTILITE. On appelle ainsi le nautile qui est devenu fossile ou pétrifié: on en connoît quatre à cinq variétés. On rencontre plus communément celui qui est chambré que le papiracé. Les *nautilites* ont un certain rapport avec les cornes d'Ammon; les uns & les autres sont composés de plusieurs spirales tournées sur elles-mêmes, & qui vont en diminuant jusqu'au centre, leurs volutes sont séparées intérieurement en plusieurs cellules traversées d'un petit siphon articulé, qui passe de l'une à l'autre: mais la corne d'Ammon a plus de volutes extérieurement, &c. *Voyez* CORNE D'AMMON & NAUTILE.

NECTAR, se dit d'un suc végétal, dont l'odeur & la saveur sont exquises, mais dont la vertu est nourrissante, & même enivrante. On trouve beaucoup de ce suc mielleux dans les *nectaires*, *nectaria*, (organes de la sécrétion du miel) de certains végétaux. *Voyez à l'article* PLANTE *& à celui de* FLEUR.

NECYDALE, *necydalis*. Petit insecte noirâtre à étuis & à antennes filiformes, qui ressemble assez à nos *cicindeles*, mais qui en differe par le nombre des articles

de ſes tarſes, (il y en a quatre à toutes les pattes) & par la forme de ſes étuis qui ſont beaucoup plus courts que ſon corps: les ailes débordent les élytres & recouvrent tout ſon ventre. Ses yeux ſont gros & ſaillans; le corſelet a un rebord. Cet inſecte n'eſt pas commun aux environs de Paris: on le trouve ſur le chêne. On donne auſſi le nom de *necydale* à la *nymphe* des inſectes.

NÉFLIER, *meſpilus*. Il y a pluſieurs ſortes d'arbriſſeaux compris ſous ce nom générique; tels ſont les *azeroliers*, les *aubepins*, le *buiſſon ardent*, les *amelanchiers*, l'*alchminier*.

Le NÉFLIER, *meſpilus vulgaris*, eſt un arbriſſeau ou un arbre de médiocre grandeur, dont le tronc eſt ordinairement tortu: ſon bois eſt doux & s'uſe par le frottement; ſes gros troncs ſont recherchés pour les vis de preſſoir: les branches ſont difficiles à rompre; on fait avec les plus jeunes qui ſont pliantes & élaſtiques les meilleurs manches de fouet: les feuilles ſont aſſez ſemblables à celles du cerifier, lanugineuſes & blanches en deſſous; ſes fleurs ſont en roſe, blanches ou rouges; le fruit eſt comme une petite pomme ſauvage, preſque rond, rougeâtre lorſqu'il eſt mûr, charnu, terminé par une eſpece de couronne comme un ombilic. Ce fruit a une ſaveur âpre; mais en mûriſſant il acquiert une ſaveur douce, vineuſe, fort agréable, de ſorte qu'il peut ſervir à garnir les deſſerts ſur les tables: il contient quatre ou cinq oſſelets pierreux, très-durs.

Il y a une eſpece de néflier dont le fruit eſt ſans noyau; ſon fruit eſt le plus petit de tous & de moindre qualité. Comme les nefles commencent d'abord à mollir par le cœur, il arrive ſouvent que cette partie eſt pourrie avant que le deſſus ſoit en état d'être mangé. Pour prévenir cet inconvénient, avant que les nefles molliſſent on les ſecoue dans un van, pour meurtrir le deſſus, qui alors s'amollit auſſi promptement que le dedans. Pour que le fruit du néflier ſoit bon, il faut qu'il ait été greffé: on l'ente ſur le poirier ſauvage, ou ſur l'épine blanche.

Le néflier épineux eſt l'arbriſſeau connu ſous le nom

de *pyracantha* ou *buiſſon ardent* : nous en parlerons ci-après.

L'AZEROLIER ou POMMETTE, *azarolus*. Les feuilles de cet arbriſſeau ſont reſſemblantes à celles de l'aubépin, mais plus grandes ; ſes fleurs ſont en grappe, de couleur herbeuſe, en roſe ; le fruit eſt rond, plus petit que la neſle, avec une couronne formée par les pointes du calice : il eſt d'abord vert, mais en mûriſſant il devient rouge, aigrelet & fort agréable au goût ; il contient trois oſſelets. On le cultive en Italie & en Languedoc où il ſe nomme *pommette*. Les azeroles blanches ne ſont pas ſi bonnes ; en Provence on en fait des confitures. Les azeroliers font un fort joli effet dans le mois de Mai, lorſqu'ils ſont en fleurs. Cet arbriſſeau mis dans les remiſes, attire le gibier par ſes fruits ; il n'a pas tant d'épines que l'aubépine, il croît plus vîte & devient plus grand. L'azerolier de Virginie mérite d'être cultivé à cauſe du brillant de ſes feuilles & de l'éclat de ſon fruit.

L'AUBÉPINE ou ÉPINE BLANCHE, *oxiacantha*, eſt un arbriſſeau médiocrement gros, rameux, armé d'épines fortes & piquantes, plus dures encore que le bois : ce bois eſt couvert d'une écorce rougeâtre ou brune cendrée, ſuivant l'âge ; ſes branches fermes & piquantes, ſont très-propres à préſenter toutes ſortes de figures ſous la taille du Jardinier. Ses fleurs, qui ſont très-odorantes, ſont en roſe, ramaſſées en bouquet : ſes fruits ſont un peu plus gros que les baies de mirthe, ronds, rouges dans leur maturité, ayant un ombilic noir, remplis d'une pulpe molle, glutineuſe, douceâtre ; il croît par-tout dans les haies. Cet arbriſſeau eſt très-agréable dans le mois de Mai, ſur-tout l'aubépine à fleurs doubles. Il ne paroît point vraiſemblable que l'odeur de cette fleur ſoit capable de gâter la marée, comme quelques-uns le diſent. Le fruit de cet arbriſſeau reſte attaché aux branches bien avant dans l'hiver, & ſert de nourriture aux oiſeaux, ſur-tout aux grives & aux merles ; les hommes en mangent dans le Nord, & on en peut tirer un eſprit ardent. Son bois excelle pour la dureté & l'égalité ; il va immédiatement après le buis, & l'on en fait grand cas pour les ouvrages du tour.

Le BUISSON ARDENT ou ARBRE DE MOÏSE, *pyracantha, aut mespilus aculeata pyrifolio*, est un arbrisseau épineux dont les feuilles ressemblent en quelque façon à celles du poirier sauvage : ses fleurs sont disposées en roses, de couleur jaune rougeâtre ; ses fruits ressemblent à ceux de l'aubépine, mais ils sont d'un beau rouge écarlate : lorsqu'ils sont en grande quantité, ils font paroître l'arbrisseau comme en feu. Le buisson ardent croît naturellement dans les haies & dans les jardins en Provence & en Italie ; ses feuilles sont toujours vertes, & ses fruits ne quittent point durant tout l'hiver : son écorce est noirâtre. La conformité du nom a fait croire que cet arbrisseau étoit le buisson où Dieu apparut à Moïse, & lui ordonna de défaire ses souliers, parce qu'il étoit en Terre-Sainte ; & que c'est à raison de cette prérogative que son fruit reste perpétuellement attaché à l'arbre. Peut-être n'est-il nommé *buisson ardent* qu'à cause de l'éclat de son fruit.

L'AMELANCHIER, *diospyros*, est un arbrisseau qui a beaucoup de rapport avec les précédens ; ses fleurs sont blanches ; ses feuilles ressemblent à celles du poirier & sont lanugineuses en dessous. Le fruit devient bleu, dit M. *Haller*, & on peut le manger. Il observe que c'est plutôt une poire par la quantité de graines, qui va jusqu'à dix.

L'*amelanchier velu*, ou *cotonaster*, est un très-joli arbuste.

Toutes les especes de néfliers dont je viens de parler, ont, ainsi que le néflier lui-même, deux stipules (ce sont deux especes de petites feuilles) aux pédicules de leurs feuilles. Le cotonaster & le pyracantha ont pour stipules deux petits filets.

Toutes ces especes de néfliers s'accommodent assez bien de toutes sortes de terrains. La graine de néflier ne leve souvent qu'à la seconde année. C'est une excellente pratique, que de répandre beaucoup de fruits d'aubépine, d'azeroliers & de buissons ardens dans les semis des bois ; car ces arbrisseaux, qui ne font aucun tort au chêne ni au châtaigner, couvrent la terre, font périr les herbes, & le grand bois y croît mieux.

Toutes les especes de néfliers sont longues à croî-

tre, leur bois eſt dur; ils ſont très-propres pour greffer des poiriers qui reſtent nains, & qui donnent du fruit plutôt que s'ils étoient greffés ſur des poiriers ſauvageons.

Tous les fruits de ces arbriſſeaux paſſent pour aſtringens.

NÉGA. *Voyez* CERISIER.

NEGRE. Nom qu'on donne à une variété d'hommes qui ſont tout noirs & qui ſe trouvent dans la Zone torride, ſur-tout en Afrique, entre les deux Tropiques. La femme s'appelle *Négreſſe*, & ſon enfant *Négrillon* ou *Négrite*. Nous avons donné à la ſuite du mot HOMME la deſcription des différentes races noires. En général les Negres varient entr'eux par la nuance de leur teint, mais ils different encore des autres hommes par tous les traits de leur viſage, des nez larges, écraſés ou plats, de groſſes levres; en un mot une laideur, une irrégularité dans la figure. Les femmes ont les reins écraſés & une croupe monſtrueuſe, ce qui fait paroître leur dos en forme de ſelle de cheval. Cette variété d'humains paroît être plus vicieuſe que celle des autres parties du Monde. On prétend que la pareſſe, la perfidie, la vengeance, la cruauté, l'impudence, le vol, le menſonge, l'irréligion, le libertinage, la mal-propreté & l'intempérance, ſemblent avoir étouffé chez eux tous les principes de la Loi naturelle & les remords de la conſcience; les ſentimens de compaſſion leur ſont donc preſque inconnus: ſeroit-ce un exemple terrible de la corruption de l'homme laiſſé à lui-même?

L'on peut juſqu'à certain point regarder les races des Negres comme des Nations barbares & dégénérées ou avilies. Leurs uſages ſont quelquefois ſi extravagans & ſi déraiſonnables, que leur conduite jointe à leur couleur, a fait douter pendant long-temps, s'ils étoient véritablement des hommes iſſus du premier homme comme nous, tant leur férocité & leur animalité les faiſoit en certaines circonſtances reſſembler aux bêtes les plus ſauvages. On a vu de ces peuples ſe nourrir de leurs freres & dévorer leurs propres enfans. Preſque tous les Noirs ne regardent leurs femmes, notamment celles de Loanga, que comme de viles eſclaves

créées uniquement pour les amuser, les servir & leur obéir : souvent elles n'osent les regarder & leur parler qu'à genoux. Seroit-il vrai qu'un état si pénible & si humiliant ne les afflige point ? On trouve cependant des Negres assez attachés à leurs femmes ou très-amoureux de leurs maitresses : celles-ci ne le cedent en rien aux hommes, suivant sans réserve l'ardeur de leur tempérament. On voit aussi des Negres du Congo, qui dans le dessein de plaire, deviennent grands railleurs, pantomimes, &c. un seul Congo suffit pour mettre en bonne humeur tous les Negres d'une habitation. Mais par quelle singularité les Négresses qui sont très-fécondes en Afrique, ne multiplient-elles pas autant dans l'Amérique ? Le Gouvernement a intérêt de découvrir la cause d'une pareille stérilité, disons plutôt d'un avortement; car l'amertume de leur sort les porte à se délivrer d'un fardeau qui fait la joie des autres meres. Un peu plus d'humanité de la part des *Blancs*, préviendroit bien des maux. Je frémis d'horreur en apprenant qu'on fait des parties de plaisir dans nos Iles pour aller à la chasse des *Negres Marons* (Negres fugitifs) comme nous faisons des loups & des sangliers en Europe, & que la chasse est bonne, quand on en a tué un grand nombre : quelquefois encore les barbares & impitoyables maîtres de ces hommes noirs poignardent inhumainement les malades mutilés ou trop vieux, dans la crainte que les frais n'absorbent le prix de la vente de ces esclaves. Comment certains habitans de l'Amérique, policés & élevés en Europe, peuvent-ils, malgré le cri de l'humanité, ne donner que peu ou point de nourriture à leurs esclaves Negres ? Ces hommes infortunés sacrifient leur vie & leurs travaux aux besoins de leurs maîtres, & souvent à satisfaire leur luxe & leurs passions frivoles, sans attirer sur eux la même pitié qu'on a pour les bêtes de somme que l'on fait travailler.

Les Turcs, qui passent pour moins barbares, semblent imiter le commerce infame des Negres, en vendant des *Blancs* de l'un & l'autre sexe, achetés exprès dans la Géorgie, dans la Mingrélie, dans la Circassie & dans divers lieux voisins de la mer Noire. Ce mar-

ché qui se tient à Constantinople, s'appelle *Jassir-Barat ;* c'est un endroit fermé de murailles & planté de grands arbres. Là on commence par prier pour le Sultan : les jeunes filles sont nues sous une couverture qui les enveloppe, un Crieur en publie le prix. L'acheteur visite la marchandise ; si elle lui convient, il la paye & l'emmene. Qu'il nous soit permis ici de faire encore une réflexion qui est un cri de douleur & de pitié sur les égaremens & les préjugés qui subjuguent quelquefois des Nations entieres, & qui blessent leur sensibilité au point de leur laisser voir de sang froid les usages les plus barbares, (nous parlons des Eunuques) : l'humanité, la raison, la Religion sont également outragées par les voies factices, qu'on fait payer si cher aux malheureux à qui on les donne. Qui ne gémit en voyant des peres cruels immoler eux-mêmes leurs fils, leur postérité, & peut-être des Citoyens qui auroient été quelque jour la gloire & l'appui de leur Patrie ? *Voyez l'article* EUNUQUE *à la suite du mot* HOMME.

La couleur des Noirs ou des Negres a fait enfanter nombre de systêmes : on a beaucoup disputé sans que personne ait pu donner encore des raisons satisfaisantes sur le principe de cette couleur si contradictoire avec la nôtre, & si constante à se perpétuer dans ces races lorsqu'elles ne s'expatrient pas. On prétend avec beaucoup de vraisemblance que l'action du soleil est la cause primitive & principale de la couleur des hommes noirs. Les peuples du Nord sont les plus blancs ; & insensiblement à mesure que les terres sont plus près de la ligne équinoxiale, & qu'elles reçoivent les rayons du soleil plus perpendiculairement, la couleur des hommes prend une nuance de noir ; & si ces mêmes hommes, noircis par la puissante action du soleil, vont habiter le Nord, ils blanchissent peu-à-peu, du moins leur postérité, & perdent leur couleur brûlée. Jusqu'ici la couleur des Negres ne paroît que locale extrinseque, accidentelle, & leurs cheveux courts & frisés ressemblent à une fine laine. Ne pourroit-on pas dire aussi que la variété de la couleur des Negres dont la peau est toujours nue, n'est due qu'à la différente température de leurs brûlans climats ? car

ils ont huit mois entiers de sécheresse continuelle, un ciel toujours net, sans pluie, sans tempête, sans orage, une chaleur extrême, un serein abondant. Leurs alimens & les exhalaisons de leur sol peuvent aussi concourir à produire un tel phénomene physique. Dans un Européen ou un Blanc, la lymphe est blanche, excepté quand elle est mêlée de bile; car elle donne à la peau un teint jaune. Mais dans un Negre, selon quelques-uns, où la lymphe & la bile sont noires, le teint de cet individu doit être de la même couleur; cependant d'habiles Anatomistes soutiennent que le sang des Negres, leur lymphe, leur chyle & les autres humeurs, même leurs yeux, leurs dents, leurs os, l'intérieur de leurs levres, &c. n'ont pas une couleur différente des nôtres. Il est donc inconteſtable que la race des hommes blancs & la race des hommes noirs ne sont pas deux especes différentes, puisque le fruit de leurs alliances conserve la vertu reproductrice, à la couleur près.

Les Négrillons nouveaux nés, ressemblent en tout aux Blancs, à l'exception d'un filet ou cercle brun ou noir qui borde l'extrémité des ongles, & d'une petite tache noire au bout du scrotum ou au bout du gland. Ces marques sont un signe certain que l'enfant sera noir; & les peres Negres qui suspectent la fidélité de leurs femmes, n'ont pas besoin d'autres preuves pour abandonner les enfans, comme ne leur appartenant pas, dès qu'ils naissent sans cette marque noire. Cette tache est grise chez les Indiens, & d'un rouge pâle chez les Mulâtres. Le corps des Négrillons est blanc les huit premiers jours: leur peau commence par brunir, & devient enfin noire.

Quelques Anatomistes modernes & très-célebres, en cherchant la cause de cette noirceur, ont trouvé que le tissu de la *membrane réticulaire* de la peau des Negres étoit effectivement noir comme de l'encre, & que c'étoit cette couleur muqueuse qui paroissoit au travers de l'épiderme blanchâtre qui est fort déliée & transparente. Voyez *Mém. de l'Acad. des Sciences, part. 30, art. 13, ann. 1702.* Voyez aussi le *Traité de la couleur de la peau humaine*, par M. LE CAT, où il dit

que c'eſt dans le ſyſtême nerveux & dans ſes appartenances qu'il faut chercher la fabrique des couleurs qui teignent la peau des animaux, & en particulier de l'éthiops animal, qui donne la couleur au Negre. Ajoutons à cela que la ſubſtance médullaire de leur cerveau eſt communément bleuâtre.

Pluſieurs Auteurs rapportent quantité d'autres faits auſſi ſinguliers, où il s'agit de différens hommes nés blancs en Europe, & devenus noirs en Europe. De nos jours une pareille métamorphoſe de blanc en noir, & de noir en blanc, ſe renouvelle annuellement dans la perſonne d'une Dame de diſtinction très-reſpectable, fort aimable, d'un beau teint & d'une peau fort blanche: dès qu'elle eſt enceinte, elle commence à brunir, & vers la fin de ſa groſſeſſe elle devient une véritable Négreſſe. Après ſes couches la couleur noire diſparoît peu-à-peu, ſa premiere blancheur lui revient, & ſon fruit n'a aucune teinte de noir. L'on compte auſſi des Negres nés en Guinée, & devenus également, & pour toujours, blancs en Afrique. On a reçu tout récemment de Surinam la relation d'un Negre d'Angola parfaitement blanc à la peau & aux cheveux, quoiqu'il fût né d'un pere & d'une mere des plus noirs. Ses yeux ſont toujours tremblotans, & ne diſtinguent bien les objets que dans l'obſcurité.

Table des mélanges pour devenir blanc ou noir.

1°. Un Blanc avec une Négreſſe, ou un Negre avec une Blanche, produiſent un *mulâtre*, moitié blanc & moitié noir.

2°. Un Blanc avec une Mulâtre, ou un Negre avec une Mulâtre produiſent un *Quarteron*, trois quarts blanc & un quart noir, ou trois quarts noir & un quart blanc.

3°. Un Blanc avec une Quarteronne, ou un Negre avec une Quarteronne produiſent un *Ochavon*, ſept huitiemes blanc & un huitieme noir, ou ſept huitiemes noir & un huitieme blanc.

4°. Un Blanc avec une Ochavonne, ou un Noir avec une Ochavonne produiſent l'un tout *blanc*, l'autre tout *noir*.

Telle eſt la marche des influences & des cauſes phyſiques de la dégradation ou du retour de la couleur dans l'eſpece humaine. L'on ſent bien que les mélanges d'un Mulâtre avec une Quarteronne ou avec une Ochavonne, produiront d'autres couleurs qui approcheront du blanc ou du noir, en proportion de la progreſſion ci-deſſus établie.

Nous avons dit d'après pluſieurs Obſervateurs, aux articles HOMME, ANE &c. que la cauſe qui maintient & perpétue l'eſpece, procede de celui qui dans l'acte de la génération a montré le plus de vigueur & de force; & c'eſt ordinairement le pere. Une jeune Négreſſe de Virginie, après avoir accouché la premiere fois d'un enfant noir, accoucha la ſeconde de deux jumeaux; l'un, qui étoit garçon, ſe trouva noir; & l'autre, qui étoit fille, ſe trouva mulâtre. Le garçon conſervoit en croiſſant ſes cheveux courts, naturellement friſés & reſſemblans à de la laine: par d'autres marques encore il montroit qu'il étoit un vrai Negre, & ſemblable en tout au pere noir qui l'avoit fait naître. La fille au contraire étoit aſſez blanche, avoit des yeux bleus, des cheveux noirs, longs & non friſés naturellement: elle reſſembloit beaucoup à l'Inſpecteur de la plantation, *Thomas Plum*, que le mari Negre ſavoit habiter avec ſa femme, & dont il étoit jaloux. Enfin pour la troiſieme fois cette Négreſſe accoucha de trois enfans dont deux étoient mulâtres, & l'autre abſolument Negre. Cet effet doit-il être attribué à une pure imagination? Le Phyſicien n'admet point une explication auſſi charitable: il la rejette comme abſurde & contraire en tout point aux lois de la nature. Il faut donc admettre pour l'explication du troiſieme accouchement, le concours de deux peres de race différente, & alors une ſuperfétation. Voyez le ſavant *Diſcours de M.* Alſtroëmer dans le *Journal d'Hiſtoire Naturelle de M. l'Abbé* Roſier.

Ainſi l'on voit que la blancheur ou la noirceur ne ſont qu'une variété accidentelle dans les climats chauds, qui ſe confirme ou s'efface par une ſuite de générations ſous des climats étrangers. De même la couleur noire naturellement inhérente dans la plupart des climats à

diverſes ſortes de brutes, s'oblitere ou ſe change ſous des zones oppoſées. C'eſt ainſi que le merle, le corbeau, l'ours ſont noirs chez nous, & gris ou blancs dans le Nord. Ces variétés deviennent héréditaires dans le mariage des mêmes eſpeces & dans les mêmes climats. Nous le répétons encore, la cauſe de la couleur noire ſous la zone torride eſt extrinſeque. Nous devons regarder les Blancs comme la tige de tous les hommes. *Adam*, *Eve* & leurs deſcendans juſqu'à l'époque du déluge univerſel furent blancs: dans cette premiere durée du monde aucun peuple noir n'a paru ſur la face de la terre: les régions de la Zone Torride avoient été inconnues aux hommes juſqu'alors. On peut conſulter les Hiſtoriens ſacrés & profanes: on y verra que Noé, ſes trois fils & leurs femmes reſpectives qui furent ſauvés de l'arche, partagerent tout l'ancien continent, & l'Afrique alors y fut compriſe. Ce ne fut qu'après la confuſion des Langues à la Tour de Babel, que les enfans de Noé ſe diviſerent. Celui qui entra en Afrique, y multiplia: ſes deſcendans pénétrerent peu-à-peu juſqu'aux extrémités de cette preſqu'île. Les premiers de ces habitans Africains étoient blancs d'abord, & ils y devinrent un peu baſanés: leurs enfans offrirent aux yeux des teintes plus foncées, preſque mulâtres: d'autres générations ſucceſſives parurent par la ſuite des temps parfaitement maures: ceux qui furent forcés de s'étendre vers les Tropiques, devinrent bientôt demi-noirs: enfin ceux qui furent ſous l'Équateur, dans la Zone Torride, recevant les impreſſions du climat & des ardeurs du ſoleil, parurent après quelques générations d'un noir parfait. Il a fallu ſans doute un temps aſſez conſidérable pour opérer inſenſiblement & degré par degré cette métamorphoſe. Ceux des Iſmaélites, des Sarraſins, des Maures, des Arabes qui envahirent l'Afrique Occidentale y devinrent noirs auſſi après quelques générations, tandis que ceux de ces mêmes peuples qui envahirent l'Eſpagne, ne changerent pas de couleur, qui étoit blanchâtre chez les uns, baſanée ou jaune chez les autres. Qu'on obſerve philoſophiquement & avec attention deux Negres, l'un de race ancienne & l'autre de race moderne;

l'on reconnoîtra que les parties de la peau qui ne ſont que peu ou point expoſées aux rayons du ſoleil, ſont peu ou point colorées, ou au moins nuancées de blanc, ſavoir les aiſſelles, le dedans des mains, l'entre-deux des doigts, le deſſous du menton & ſur-tout des pieds, l'entre-deux des cuiſſes, le bas ventre, tandis que la tête, le deſſus des bras, le dos, le ventre & les épaules, découvertes ſelon l'habillement du pays, car c'eſt leur peau qui leur ſert de vêtement, ſont plus noirs. Les femmes du pays qui blanchiſſent, & qui par conſéquent ont ſouvent les mains dans l'eau, les ont preſque blanches. Ceux qui ont reçu des bleſſures ou ont été brûlés, ou couverts des puſtules de la petite vérole ſur quelques parties du corps, ont ces parties brûlées ou cicatriſées, blanches ou de couleur baſanée. Celui qui ſe noie, garde après ſa mort la pâleur que la frayeur & le ſaiſiſſement lui avoient cauſée. Les Negres qui ſont fort âgés n'ont pas la teinte noire ſi foncée ni ſi brillante.

C'eſt ſur les côtes occidentales de l'Afrique, notamment de la Guinée & d'Angole, que les Negres vendent aux Européens non-ſeulement les Eſclaves Negres qu'ils ont pris en temps de guerre, mais encore leurs propres enfans. Souvent une mere Négreſſe livre ſa fille à un étranger pour une ſomme de *cauris*, qui ſert de monnoie en ce pays, & dont elle ſe fait des bracelets ou des colliers propres à relever la noirceur de ſon teint; ſouvent des garçons, auſſi dénaturés que la Négreſſe, tâchent de ſurprendre & de garoter leur pere pour le vendre également au marché, ſoit pour quelques ſerpes, ſoit pour quelques bouteilles d'eau-de-vie. Le ſpectacle d'un tel marché fait frémir la nature; & ſi quelques Africains, brigands & idolâtres, ont aſſez de cruauté pour faire un commerce d'hommes, comment des Chrétiens de l'Europe peuvent-ils regarder cette contrée comme le terme de leur voyage, & être très-empreſſés à ſe trouver à l'enchere de cette abominable vente? Cet uſage, dit-on, ne choque point aujourd'hui, parce que les préjugés de la naiſſance & de l'éducation, & le beſoin d'hommes pour cultiver nos Colonies, nous accoutument à ce négoce inconnu

à nos peres. Quel affreux syſtême ! Nous conviendrons cependant que les François, dont l'inclination eſt naturellement compatiſſante, ſe refuſent à de certaines perquiſitions qui choquent la bienſéance & font ſouffrir l'humanité. Lorſqu'il s'agit d'examiner un Negre eſclave, ils s'aſſurent particuliérement de ſon âge, de ſon tempérament & de ſon caractere. Les Portugais, les Anglois, les Hollandois & les autres Nations qui ont des établiſſemens dans les Indes Occidentales, tiennent à cet égard une conduite moins timide & qui les rend moins dupes dans leur achat; ils viſitent toutes les parties du corps des Noirs, & n'oublient aucune attitude dont ils ſont ſuſceptibles; ils les remuent avec violence pour découvrir ſi l'intérieur répond à ce qui paroît; ils les font courir, crier, ſauter, &c. ils ne dédaignent pas de leur lécher la peau pour découvrir par le goût de la ſueur s'ils n'ont point contracté certaines maladies (car les Negres ne ſe plaignent jamais: la peur des ſorciers & des eſprits qu'ils appellent *zambis* leur feroit braver la mort), & ſi le poil du menton n'eſt pas d'une force à indiquer un âge plus avancé que la déclaration qu'on leur en a faite. Ces eſclaves ne ſont pas toujours enchaînés; on ſe contente de leur paſſer au bras une eſpece de menote à laquelle une piece de bois eſt attachée: c'eſt la marque de leur eſclavage qui devient héréditaire dans la poſtérité de ces humains; preuve nouvelle de l'inhumanité des Blancs. Nous avons un Édit donné à Verſailles au mois de Mars 1724, appelé communément le *Code noir*, & qui ſert de Réglement pour l'adminiſtration de la juſtice, police, diſcipline & le commerce des Eſclaves Negres, &c.

NEGRE. C'eſt une ſorte de poiſſon de l'Amérique, qui eſt tout noir, & qui a la figure d'une tanche.

Selon quelques Auteurs, il y a des poiſſons negres, dont la chair eſt d'un très-bon goût, & fort nourriſſante, ſur-tout en Amérique; & d'autres qui peſent juſqu'à cent vingt livres, & qui ſont tellement venimeux, qu'ils donnent tout-à-coup la mort à ceux qui en mangent.

NEGRES-CARTES. Dans le Commerce on donne ce nom à des émeraudes brutes de la premiere couleur; elles ſont eſtimées. *Voyez* ÉMERAUDE.

NÉGRILLON,

NÉGRILLON, *Négrite* & *Négresse*. Voyez à l'article NEGRE.

NEGRO. C'eſt une eſpece de cigogne de la Guiane ; ſon bec eſt large de deux pouces, & long d'onze pouces. Les yeux & le bec ſont noirs. La mâchoire ſupérieure eſt plus épaiſſe que l'inférieure & un peu courbe par la pointe.

NEGUNDO. C'eſt un arbre des Indes Orientales & particuliérement du Malabar, qui eſt du genre du *vitex* ſelon les Modernes : on en diſtingue deux eſpeces : l'une eſt appelée *mâle*, & l'autre *femelle*. Le mâle eſt grand comme un amandier ; ſes feuilles reſſemblent à celles du ſureau ; elles ſont dentelées, lanugineuſes & velues comme celles de la ſauge. La femelle eſt appelée par les Portugais ; *norchila* ; par les Canarins ; *niergundi* ; en Malagate, *ſambali* ; & en Malabar, *noche*. Cet arbre femelle croît à la même hauteur que le mâle ; mais ſes feuilles ſont plus larges, plus arrondies, non découpées ; & ſemblables à celles du peuplier blanc. L'une & l'autre eſpece, dit *Lémery*, ſont appelées, par les Arabes, par les Perſes, & par les habitans de Décan, *bache* ; & par les Turcs, *ayt*. Leurs feuilles ont l'odeur & le goût de la ſauge, mais un peu plus âcres & ameres. Vers le lever du ſoleil, il paroît ſur ces feuilles une certaine liqueur blanche, qui en eſt ſortie la nuit. Leurs fleurs reſſemblent aſſez à celles du romarin, & leurs fruits au poivre noir. Les feuilles, les fleurs & les fruits étant écraſés, cuits dans de l'eau, & fricaſſés dans de l'huile, ſoulagent quantité de douleurs, ſur-tout celles des jointures : ce remede eſt auſſi vulnéraire & cicatriſant. Les femmes du pays font une décoction de toutes ces mêmes parties de l'arbre, dont elles boivent & ſe lavent le corps ; dans l'idée que cette liqueur aide à la conception ; tandis que les feuilles ſeules étant mâchées, donnent une bonne haleine & répriment, dit-on, les ardeurs de Vénus.

NÉIGE ; *nix*. Eſpece de météore, que l'on peut regarder comme des parcelles de nuages condenſées, concretes & glacées par le froid dans la moyenne région de l'air. Elle tombe ſur la terre en petits flocons blancs, fort rares, très-légers, & qui ſont d'au-

tant plus menus, que le temps eſt plus froid. Ainſi la neige, dont les différences d'avec la grêle ſont viſibles & connues de tout le monde, n'eſt auſſi que de l'eau qui s'eſt glacée dans l'air. Lorſque les molécules aqueuſes qui ſe ſont élevées dans l'atmoſphere en forme de vapeurs, retombent en bruine ou en pluie, il arrive aſſez ſouvent que le froid eſt aſſez conſidérable pour les geler : elles ſe changent alors en neige ou en grêle ; en neige ſi la congélation les ſaiſit avant qu'elles ſe ſoient réunies en groſſes gouttes ; en grêle ſi les particules d'eau ont le temps de ſe joindre avant que d'être priſes par la gelée. *Voyez* GRÊLE.

La neige tombe plus ſouvent la nuit que le jour, elle eſt plus fréquente dans les pays Septentrionaux que dans les tempérés. Elle eſt en rayons criſtallins plus ou moins épais, paralleles, durs, pointus & hériſſés ; le nombre des rayons n'eſt pas toujours déterminé, ni leur forme ; c'eſt ce qu'on peut reconnoître en recevant de la neige ſur une toile cirée, & en l'examinant dans un lieu frais ; alors on verra des criſtaux en flocons, velus, en étoile, en roue. Chaque flocon eſt ſouvent compoſé, comme d'autant de petites branches garnies de feuilles & de fleurs légeres ; c'eſt un amas de petites lames glacées, confuſément couchées les unes ſur les autres, qui obſervent cependant un ordre aſſez régulier (celui de la glace), par rapport à l'arrangement de leurs parties. En effet, la tendance des molécules de l'eau à s'unir en gelant ſous des angles de ſoixante degrés, ſe fait remarquer dans la ſtructure des particules de la neige. Ce ſont des étoiles communément à ſix rayons, ſimples ou branchues, ces derniers compoſés d'un filet principal, & de filets latéraux attachés au premier ſous un angle de ſoixante degrés. Il en eſt de plus compoſés encore, mais on y voit preſque toujours le même arrangement : cette ſtructure réguliere ne peut ſe bien obſerver que dans la neige qui tombe par un froid vif ; tout eſt plus confus dans celle qui tombe en gros flocons par un temps moins froid. *Voyez les Elémens Phyſiques de Muſchenbroech. Tab. 24.*

Il ne tombe qu'une eſpece de neige à la fois, ſoit

en différens jours, soit à différentes heures d'un même jour. Tout prouve au Physicien que la congélation a beaucoup de rapport avec la cristallisation.

La neige est très-froide au toucher, ainsi que la glace; quelques Physiciens & Astronomes attribuent cette propriété au nitre aérien, dont l'existence est peut-être une chimère. Ces effets du prétendu nitre aérien, sont, selon M. *Bourgeois*, uniquement produits par l'acide universel répandu dans l'atmosphere: seul il contribue, dit-il, à la production de la neige, de la glace, & à leur fraîcheur, de même qu'à celle de l'atmosphere: mêlé & combiné dans la terre avec les terres absorbantes & les stériles, il forme, selon lui, un corps savonneux qui constitue la vraie nourriture des plantes, & qui contribue au progrès de la végétation. Car ni le nitre, ni les autres sels n'entrent pas dans le suc nourricier des plantes, & ne sont pas propres à les nourrir & à leur donner l'accroissement, ainsi que le célebre *Wallerius* l'a démontré dans ses *Elémens d'Agriculture physique & chimique*, *pag. 134*, *&c.* imprimés à Yverdon, 1767. Il est constant que la neige contient beaucoup d'air, qu'elle contribue à la fertilité de bien des terres, & à l'accroissement d'un grand nombre de végétaux: car l'on a observé que les années où il tombe une grande quantité de neige ne sont jamais stériles; & que les montagnes que ce météore recouvre perpétuellement, sont chargées en leur base, sur leur adossement & dans les prairies, de plantes les mieux nourries & les plus vertes; mais il faut pour cela que la neige se fonde lentement, car autrement elle pourriroit & détruiroit l'organisation des végétaux; rien n'est sur-tout plus pernicieux aux arbres & aux plantes qu'une neige qui, séjournant sur la terre, se fond en partie pendant le jour pour se geler de nouveau la nuit suivante. La neige qui couvre pendant plus des deux tiers de l'année presque tout le pays qu'habitent les Lapons, les oblige à se pratiquer des habitations souterraines, pour se préserver du froid excessif qu'on y éprouve. On lit dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences quelques expériences de M. *Guettard*, qui tendent à prouver qu'il fait moins froid sous la neige, qu'à l'air

extérieur, & que plus le monceau de neige eſt épais ; plus le thermometre qu'on plonge dans le bas de cette maſſe, ſe tient au-deſſus de zéro : c'eſt auſſi ce que les perdrix ſemblent avoir appris de la nature. Ces oiſeaux ſe cachent en hiver ſous la neige, & on les y chaſſe au moyen de chiens dreſſés à cet effet. On voit que les hommes eux-mêmes, lorſqu'ils ſont pris de la nuit en voyageant, ſe forment des cabanes de neige, où ils paſſent les nuits les plus froides, ſans avoir rien à craindre de la rigueur de ce froid.

La neige ſurvenant en gros flocons après quelques jours de forte gelée, on obſerve que le froid, quoique toujours voiſin de la congélation, diminue ſenſiblement & ſouvent le dégel ſuccede. Il tonne rarement lorſqu'il neige ; nous en avons cependant pluſieurs exemples ; 1°. Le premier Janvier 1715, il éclaira & tonna à Montpellier dans le temps même qu'il neigeoit. 2°. Dans le dernier ſiecle il y eut à Senlis, à Châlons & dans les Villes voiſines, un orage des plus violens au milieu de l'hiver : la foudre tomba en pluſieurs endroits & fit d'effroyables ravages, pendant une neige fort groſſe & fort épaiſſe.

La neige eſt compreſſible, plus rare, plus légere que la glace, & plus ſujette à l'évaporation : en ſe réſolvant en liqueur, elle diminue conſidérablement de volume. Comme cette eau concrete ſe fond aiſément, elle offre un moyen plus commode que la glace pour rafraîchir le vin en été : on s'en ſert ſur-tout dans les pays chauds & dans les plaines ; c'eſt ce qui ſe pratique à Rome. Elle ſe conſerve auſſi-bien que la glace dans les glacieres ; mais il faut pour cela la ramaſſer par pelotons, la battre & la bien preſſer, afin qu'il n'y ait point de vide. Dans les grands froids, on y jette de l'eau qui en remplit les intervalles en ſe gelant auſſitôt. On ramaſſe plus facilement la neige dans les prairies & ſur les gazons, que par-tout ailleurs. Les neiges qui couvrent le ſommet des hautes montagnes influent beaucoup ſur la conſtitution de l'atmoſphere qui les environne, elles le refroidiſſent : c'eſt la raiſon pour laquelle des vents qui regnent dans certains pays ſont plus froids ou moins chauds qu'ils ne devroient être

par leur situation sur notre globe. C'est à la fonte des neiges congelées sur le sommet des montagnes, que nous devons communément le phénomene des *fontaines intermittentes :* voyez au mot FONTAINE. Sa fonte trop subite cause souvent des inondations considérables.

A l'égard des taches rouges disperſées çà & là & empreintes sur la neige, que le peuple prévenu & superstitieux regarde comme dues à des gouttes d'une pluie de sang, qui a plus d'une fois jeté la terreur & la consternation dans les esprits : un Gentilhomme du haut Vivarais a reconnu que ce phénomene étoit dû à une cause très-simple, très-naturelle. Se promenant dans le mois de Décembre 1773 dans les allées de son jardin, il y vit de la neige couverte de taches rouges, principalement pendant les jours que la terre étoit plus humide : le 7 Janvier 1774 ces taches y étoient en plus grand nombre, & toutes d'un rouge très-beau, vif, d'une forme semblable à des gouttes de sang qui y seroient tombées & congelées, en un mot pénétrant à quelques lignes au-dessous de la surface de la neige : en examinant de près ces taches, il les reconnut pour être des excrémens de petits oiseaux ; ces excrémens tenoient leur couleur de la *morelle à grappes* ou *raisin d'Amérique*, plante dont il y avoit plusieurs pieds dans son jardin, couverts de leurs fruits & dont le suc est rouge. Plusieurs de ces fruits exprimés sur la neige par notre Observateur donnerent une couleur égale & uniforme. Voilà donc le dénouement du prodige. *Voyez* PUCE DE NEIGE.

Autant l'eau de neige est salutaire aux végétaux & aux opérations de quelques arts, autant elle est, dit-on, nuisible en boisson, sur-tout dans le Tirol, dans le Valais qui fait partie de la Suisse, où nous avons vu que ceux qui en font usage, sont en effet attaqués de goîtres & d'enflure de gorge ; peut-être que les alimens solides & la nature de l'air y contribuent autant & plus que la neige, car M. *Bourgeois* a observé que parmi les habitans de plusieurs villages & hameaux situés sur les montagnes en Suisse, & qui n'ont souvent pendant tout l'hiver que de l'eau de neige pour toute boisson, on n'y trouve personne attaqué ni de goître, ni d'en-

flure de gorge. Nous remarquerons encore ici que la neige appliquée à l'extérieur eſt un ſpécifique que le peuple du Nord emploie, d'après un très-ancien uſage de leur pays, pour rappeller la chaleur & la vie dans les membres gelés; c'eſt communément ſous forme de friction que la neige s'emploie dans ces cas. La neige eſt encore un moyen aſſuré pour conſerver du gibier pendant plus de deux mois; les Danois, &c. en font venir ainſi d'Iſlande & de Laponie, qui quoique mort depuis plus de quatre mois, n'en eſt pas moins bon à manger; il ſuffit de le dégeler par degrés inſenſibles dans des eaux de plus en moins froides.

On appelle en Suiſſe LAUVINE ou LAVANCHE, *labina*, une quantité de neige qui ſe pelote en roulant du haut en bas des Alpes. M. *Altmann*, d'après qui nous avons donné la deſcription des *glaciers* ſi merveilleux & ſi terribles de la Suiſſe, diſtingue deux eſpeces de *lauvines*; celles qu'on appelle *venteuſes*, ſont ordinairement accompagnées d'un grand vent qu'elles augmentent encore par leur chute, au point qu'il briſe les arbres, qu'il étouffe les hommes & les animaux, & qu'il renverſe les maiſons. La rapidité ſurprenante avec laquelle ces lauvines roulent juſqu'au bas des vallons où elles ſe trouvent comme inſérées ou encaiſſées dans les enfoncemens & cavités, met les Voyageurs dans le plus grand danger; cependant comme elles ont peu d'épaiſſeur, on n'eſt pas toujours étouffé; en quoi elles ſont beaucoup moins dangereuſes que la ſeconde eſpece que l'on appelle *lauvines foncieres*, parce qu'elles détruiſent juſqu'au fond tout ce qu'elles rencontrent. Formées par une neige beaucoup plus compacte, elles ſont infiniment plus peſantes: elles roulent par conſéquent avec moins de vîteſſe que les premieres, mais elles emportent avec elles & les arbres & les pierres & les morceaux de roc qu'elles trouvent dans la direction de leur action. Comme leur chute cauſe dans les montagnes & les vallons un tremblement accompagné d'un bruit quelquefois égal à celui du tonnerre, elles donnent ordinairement au Voyageur averti, le temps de ſe ſauver par la fuite.

Les *lauvines* ſont excitées par l'agitation de l'air, &

par tout ce qui peut contribuer à faire gliſſer la neige, ſur-tout celle qui eſt tombée récemment aux ſommets des montagnes. Une très-petite pelote s'accroit ſi fort en tombant, qu'avant que d'arriver au vallon, elle peut acquérir la groſſeur d'une maiſon, quelquefois celle d'une colline, & couvrir enſuite pluſieurs arpens de terre. On penſe bien que les habitans des Alpes n'ont pas négligé les moyens de ſe garantir de ces ravages. Ils évitent de bâtir au pied d'une montagne qui s'élève rapidement. Ils conſtruiſent leurs maiſons derriere quelque petite colline, capable d'arrêter, ou de rompre la force des *lauvines*. Pour paſſer la montagne de Gothard, on traverſe la vallée d'Urſeren; & l'on voit au-deſſus d'un Village, un bois qui forme un triangle, dans lequel il eſt défendu, ſous des peines fort rigoureuſes, de couper des arbres, parce qu'ils mettent ce Village à l'abri des *lauvines*. En pluſieurs endroits où elles ſont à craindre, on a bâti des murs triangulaires, dont l'angle aigu eſt tourné vers le côté le plus dangereux de la montagne. Quant aux Voyageurs, on leur recommande en Suiſſe, de prendre avec eux des Guides, qui connoiſſent les endroits les plus redoutables, de faire leur voyage ſans bruit, & de ne pas même parler haut. Enfin, pour derniere ſureté, on tire au milieu des vallons quelques coups de piſtolets, qu'on croit capables de mettre en mouvement les pelotes qui pourroient être ſur le point de tomber. Dans les paſſages étroits on pouſſe en hiver & au printems la précaution juſqu'à boucher les ſonnettes & les grelots des chevaux & des mulets, afin que leur ſon n'excite point la chute de quelque *lauvine*. En pluſieurs endroits, ſur-tout dans le pays des Griſons, on voit au pied des montagnes des voûtes mâçonnées, & des mines pratiquées dans le roc, où l'on peut en appercevant une *lauvine* en mouvement, ſe retirer, & la laiſſer paſſer par-deſſus. On avertit encore les Voyageurs de ne pas regarder long-temps les *lauvines*, quand même leur direction ne paroîtroit pas dangereuſe, parce qu'elles cauſent un vent ſi violent, que les hommes & les animaux en ſont étouffés. Quelquefois les lavanches ſont réduites en pouſſiere à l'inſtant de leur

chute, & cette pouſſiere glacée ſe répand à une aſſez grande diſtance & élévation. C'eſt un ſpectacle des plus beaux & des plus terribles qu'on puiſſe voir : il faut en avoir été témoin pour s'en former une idée préciſe : *voyez* GLACIERS. M. *Mikheli* dit que toutes les montagnes de la Suiſſe, que la neige couvre toujours, ont au moins 1500 toiſes de hauteur: en effet celles dont le ſommet ne s'éleve pas autant, ne conſervent guere leur neige, & l'on prétend que la Zone vaporeuſe n'excédant pas trois mille ſix cens toiſes d'élévation, il n'eſt plus poſſible de trouver de neige au-deſſus de cette hauteur; au reſte l'élévation de la région de l'air où il gele continuellement, n'eſt pas la même ſur toute la terre. A l'Equateur elle eſt de 2440 toiſes, & deſcend par degrés de là vers les Poles.

On ſera peut-être bien aiſe de ſavoir comment on voyage en Laponie, où le terrain eſt toujours couvert de neige. Dès le commencement de l'hiver on marque avec des branches de ſapin les chemins qui doivent conduire aux lieux fréquentés. A peine les voitures (qui ſont des traîneaux & de petits bateaux) ont foulé la premiere neige qui couvre ces chemins & ont commencé à les creuſer, que de nouvelle neige que le vent répand de tous côtés les releve, & les tient de niveau avec le reſte de la campagne, ou du lac, ou du fleuve. Les voitures qui paſſent enſuite refoulent de nouveau cette neige, que d'autre neige vient bientôt recouvrir; & ces chemins creuſés alternativement par les voitures, & recouverts par le vent qui y met par-tout la neige de niveau, quoiqu'ils ne paroiſſent pas plus élevés que le reſte du terrain, ſont cependant des eſpeces de chauſſées ou des ponts formés de neige foulée: mais ſi on s'égare à droite ou à gauche, on tombe dans des abîmes de neige. On eſt donc fort attentif à ne pas ſortir de ces chemins; & d'ordinaire ils ſont creuſés vers le milieu d'une eſpece de ſillon, formé par tous les traîneaux qui y paſſent, & qui ſont traînés par des *rhennes* : voyez ce mot. Mais dans le fond des forêts, dans les lieux qui ne ſont pas fréquentés, il n'y a point de tels chemins; les Finnois & les Lapons ne ſe retrouvent alors que par quelques marques faites aux

arbres. Les rhennes eux-mêmes enfoncent quelquefois jusqu'aux cornes dans la neige ; & si dans ces lieux on étoit surpris par quelqu'un de ces orages pendant lesquels la neige tombe dans une si grande abondance, & est jetée de tous côtés par le vent avec tant de fureur, qu'on ne peut voir à deux pas de soi, il seroit impossible de reconnoître aucun chemin, & l'on périroit infailliblement, sur-tout si l'on ne s'étoit pas muni de tentes pour parer une partie de l'orage. On observa en 1729 sur les frontieres de Suede & de Norwege près du village de Villaras, qu'il y tomba une si affreuse quantité de neige, que 40 maisons en furent couvertes, & que tous ceux qui étoient dedans en furent étouffés. (On trouve aussi dans le *Journal Etranger 1757*, la relation d'une famille ensevelie sous la neige pendant six semaines.) S'il arrive qu'on veuille franchir une montagne fort élevée, remplie de rochers qu'une quantité prodigieuse de neige cache, & dont elle recouvre les cavités dans lesquelles on peut être abîmé, on ne croira guere possible d'y monter : il y a cependant deux manieres de le faire ; l'une en glissant sur deux planches étroites, longues de huit pieds, dont les habitans se servent pour ne pas enfoncer dans la neige, (maniere qui a besoin d'un long exercice) ; l'autre en se confiant aux rhennes qui peuvent faire un pareil voyage, & dont la maniere de marcher mérite d'être connue : *voyez au mot* RHENNE. On lit dans la nouvelle Histoire de Kamtschatka, que les neiges sont très-abondantes dans la presqu'île de Lopatka ; elles ont presque la solidité de la glace : de sorte qu'elles réfléchissent les rayons du soleil, & avec tant de force qu'il est impossible d'en soutenir l'éclat. Les habitans portent ordinairement dans le printems des couvertures percées de petits trous ou des réseaux de crins noirs, afin de briser une partie des rayons ; mais malgré ces précautions, ils ont la peau basanée comme les Indiens ; la plupart ont les yeux affoiblis & malades, & un grand nombre même perdent la vue.

NEMOTELE, *nemotelus*, genre d'insecte ailé, de la classe des *dipteres*, dont les antennes grenues sont terminées par une pointe, & placées sur la gaîne de

la trompe comme dans les charançons ; ſa bouche eſt un bec aigu : les articles ou grains des antennes ſont ronds, courts, menus & au nombre de cinq, mais terminés par une ſixieme piece longue & filiforme. Les *nemoteles* ne reſſemblent aux mouches que par leur port extérieur ; on en diſtingue de pluſieurs ſortes, on les trouve ſur les fleurs.

NÉNUPHAR, *nymphæa*. Plante aquatique, dont on diſtingue deux eſpeces ; l'une eſt à fleur blanche, & eſt préférée à l'autre, dont la fleur eſt jaune.

1°. Le NÉNUPHAR BLANC, ou BLANC D'EAU, ou LYS D'ÉTANG, ou VOLET, ou PLATEAU A FLEUR BLANCHE, *nymphæa alba*. Cette plante qui eſt fort en uſage en Médecine, ne ſe cultive point dans les jardins ; elle croît naturellement dans les marais, dans les eaux croupiſſantes, ou dans les ruiſſeaux qui coulent lentement, dans les étangs & les grandes pieces d'eau, même dans les rivieres ſur les bords, où elle eſt aſſez agréable à voir. Sa racine eſt vivace, longue, groſſe comme le bras, garnie de plaques brunes ou noires, en forme de nœuds ſur ſon écorce, blanche en dedans, charnue, fongueuſe, chargée de ſuc viſqueux, attachée au fond de l'eau dans la terre par pluſieurs fibres : elle pouſſe des feuilles grandes, larges, arrondies, épaiſſes, charnues, cuiraſſées, nageantes à la ſurface de l'eau, veineuſes, échancrées en fer à cheval, vertes-blanchâtres en deſſus, & vertes-brunâtres en deſſous, ſoutenues par des queues longues, groſſes comme le petit doigt, rougeâtres, tendres & fongueuſes. Ses fleurs qui paroiſſent depuis le mois de Mai juſqu'en automne, ſont grandes, groſſes, larges quand elles ſont épanouies ; elles ont pluſieurs feuilles diſpoſées en roſe, blanches comme celles du lys, preſque inodores, contenues dans un calice, ordinairement à cinq feuilles blanchâtres, d'autres fois à quatre feuilles. A ces fleurs ſuccede un fruit rond, reſſemblant à une tête de pavot, partagé en pluſieurs loges, qui contiennent des ſemences oblongues, noirâtres & luiſantes. Cette plante eſt toute d'uſage ; elle paroît être la même que l'*aguape* du Bréſil : ſes feuilles qui nagent ſur l'eau & ſes belles fleurs en forme de volant, ornent magnifi-

quement un canal pendant l'été ; au printems lorſque ſes feuilles paroiſſent ſur l'eau, elles indiquent qu'il eſt temps de ſortir les plantes de l'orangerie, & qu'il n'y a plus de gelées à craindre.

2°. Le NÉNUPHAR A FLEUR JAUNE, ou JAUNET D'EAU, ou PLATEAU A FLEUR JAUNE, *nymphæa lutea*. Sa feuille eſt un peu oblongue, ſa fleur eſt jaune, plus courte que le calice, qui eſt à cinq feuilles ; ſon fruit eſt de figure conique ; ſa racine eſt verte en dehors. Il croît aux mêmes lieux, & ſert quelquefois aux mêmes uſages que le précédent, notamment à Paris & en Angleterre, où le nénuphar blanc eſt plus rare.

On emploie ordinairement la racine de nénuphar dans les tiſanes rafraîchiſſantes qui conviennent dans les inflammations des reins & de la veſſie, dans les fievres ardentes, les inſomnies, enfin dans tous les cas où il eſt néceſſaire de tempérer l'impétuoſité du ſang & des eſprits vitaux. M. *Bourgeois* dit, que cette racine en tiſane tempéroit & adouciſſoit l'ardeur de l'urine dans les gonorrhées virulentes. Dans les boutiques on tient une eau diſtillée, une conſerve, un miel, un ſirop & une huile, le tout préparé de ſes fleurs. On donne communément le ſirop de nénuphar pour ralentir le déſir du coït.

NÉPENTHES. Eſpece de philtre dont Hélene ſe ſervoit, ſuivant *Homere*, & qui vraiſemblablement n'étoit que l'opium. Conſultez l'*Hiſtoire de la Médecine* par M. *le Clerc*, pag. 73.

NÉRÉIDES, ſont, ainſi que les Syrenes, de prétendus monſtres marins. *Voyez au mot* HOMME MARIN. On donne auſſi le nom de *néréide* à l'animal du *tubipore*.

M. *Pallas*, dans ſes *Mélanges zoologiques*, traite des *néréides* & les diviſe en deux genres ; ſavoir, les *néréides errantes*, & les *néréides tubicoles*. Les premieres ſont des *animaux mous* qui rampent & nagent parmi les fucus & les autres plantes marines. Elles s'attachent auſſi quelquefois aux rochers, ſe cachent dans le fond de la mer, ou dans les bois pourris qu'on y jette.

Les *néréides tubicoles* ont beaucoup de rapport avec les *vers à tuyaux* ou *vers tubicoles* : elles ſont cachées dans une eſpece de petit tube, qu'elles forment de dif-

férentes matieres. On divise les *néréides tubicoles* en *néréides cylindriques*, & en *néréides aplaties*.

En général, les néréides ont le corps mince, souvent très-long, linéaire, devenant plus petit vers la tête qui est ornée de franges. Le corps est divisé en plusieurs anneaux, & on remarque sur chaque segment ou anneau une espece de pied. Selon notre Auteur, les néréides peuvent comme les *lombrics* ou vers de terre, s'étendre, se contracter, se glisser facilement dans les interstices ou fentes les plus étroites. Elles different de certaines *aphrodites*, en ce qu'elles sont privées d'ouies. *Voyez* APHRODITE.

NERF. Les Anatomistes donnent ce nom à des corps ronds, blancs & longs qui tirent leur origine ou du cerveau ou du cervelet : *voyez à l'article* HOMME. Dans le commerce on donne le nom de *nerf de bœuf* à la partie génitale seche de cet animal : les Selliers le réduisent en maniere de filasse longue de huit à dix pouces par le moyen de grosses cardes de fer, & l'emploient pour nerver avec de la colle forte les arçons des selles & les panneaux des chaises & carrosses.

NERIETTE ANTONINE. C'est le nom d'une plante dont les fleurs rouges produisent un bel effet en été dans les parterres des curieux. Ses semences aigretées, soyeuses, font de bonne ouate. On a essayé de les filer en Suede.

NÉRITE. Coquillage univalve, operculé, & que plusieurs Naturalistes mettent dans la famille des limaçons à bouche demi-ronde ou ceintrée. Il y a des nérites qui ont des dents blanches, d'autres qui les ont rougeâtres, telle que la *quenotte-saignante ;* d'autres nérites sont ombiliquées, telle que la *grive*. Comme le noyau des nérites n'est point du tout apparent à leur ouverture, ces coquilles ne peuvent pas avoir de bec. Les tours de spirales sont fort peu sensibles au dehors & en très-petit nombre, souvent la pointe n'en sort que peu ou point. M. *Adanson* fait un genre de la nérite, il la range à la fin des coquillages operculés, & la rapproche plus que tout autre des bivalves, comme étant le coquillage qui a le plus de rapport avec eux : mais l'animal est, dit-il, fort différent de celui des bi-

valves. Les nérites sont ou marines, ou fluviatiles. Celles-ci ne sont point hermaphrodites comme les limas, les buccins & les planorbes; les unes sont mâles & les autres femelles. Elles bouchent leurs coquilles d'une espece d'opercule empreinte de spirales. Il n'y a qu'une espece de nérite fluviatile qui soit vivipare: les petits sortent tout vivans avec leurs coquilles du corps de la mere. On distingue sur-tout l'espece appelée *porte-plumet*: voyez ce mot. Les nérites de riviere que les enfans ramassent dans le sable, sont mortes & toutes bariolées de rose ou de lignes noires. L'espece qui nous vient du Mississipi & connue sous le nom d'*idole*, est verte noirâtre, ventrue, ombiliquée, à stries inégales en forme de rides. Lorsque ces sortes de coquilles sont devenues fossiles, on les nomme *néritites*. On n'en trouve point de terrestres vivantes.

NEROLI. Nom que les Parfumeurs donnent à l'huile essentielle d'orange. *Voyez* ORANGER.

NERPRUN, NOIRPRUN ou BOURG-ÉPINE; *rhamnus catharticus*. Il y a plusieurs especes de nerpruns: celui qu'on nomme simplement *nerprun purgatif ordinaire*, *rhamnus catharticus*, qui s'éleve en arbrisseau & quelquefois en arbre: le *petit nerprun purgatif*, ou *graine d'Avignon*, qui donne cette graine qu'on emploie dans la teinture; & d'autres à *feuilles longuettes*, à *fleurs vertes* & *baies noires*.

Les *nerpruns* ont des fleurs petites, de couleur herbeuse ou jaunâtre, qui naissent comme par paquets le long des branches, en forme de petits entonnoirs, à pavillon recoupé en quatre parties, rabattues le plus souvent sur les côtés, avec autant d'étamines. Aux fleurs succedent des baies qui contiennent plusieurs semences aplaties d'un côté & bombées de l'autre: (le nerprun ordinaire a, dit M. *Haller*, les fleurs mâles sur une plante, & le fruit sur une autre: le nerprun de Baviere a les étamines réunies au fruit:) les feuilles des nerpruns sont assez petites, entieres, ordinairement brillantes, finement dentelées; souvent elles sont opposées sur les branches, & quelquefois elles sont alternes. Ces arbrisseaux se plaisent dans les haies, dans les bois, dans les endroits humides; ils peuvent

être placés dans les boſquets d'été, & encore mieux dans les remiſes ; car les oiſeaux ſe nourriſſent de leur fruit, quoiqu'il ſoit purgatif. On en fait faire des paliſſades & des boules dans les parterres.

On prépare avec les baies du nerprun une pâte dure qu'on appelle communément *vert de veſſie*. Pour la faire, on écraſe ces baies quand elles ſont noires & bien mûres ; on exprime le ſuc, qui eſt viſqueux & noir ; on le met évaporer à petit feu juſqu'en conſiſtance de miel, en y ajoutant un peu d'alun de roche pour rendre la matiere plus haute en couleur & plus belle. On la met dans des veſſies que l'on ſuſpend dans un lieu chaud, & on l'y laiſſe durcir pour la garder. Cette ſubſtance donne un beau vert, dont les Peintres & les Teinturiers font uſage ſous le nom de *vert de veſſie*, ainſi nommé, parce que cette matiere verte a été durcie dans des veſſies.

On prétend que préparée en divers temps elle donne différentes couleurs : avant la maturité des baies, une couleur jaune ou ſafranée ; lorſqu'elles ſont mûres, un beau vert ; enfin encore plus tard, vers la S. Martin, une couleur d'écarlate utile pour teindre les cuirs & pour enluminer les cartes à jouer. On prépare avec les baies de nerprun un extrait purgatif ; il eſt peu d'uſage en Médecine. Le ſirop qu'on prépare avec le ſuc de ces baies lorſqu'elles ſont mûres, eſt très-uſité dans toutes les eſpeces d'hydropiſies ; il purge abondamment les ſéroſités par les ſelles, & diſſipe l'enflure : on le donne à la doſe de deux onces. Ce remede eſt très-doux & ſans danger : c'étoit, dit M. *Bourgeois*, le grand remede du célebre *Sydenham*.

On peut greffer des ceriſiers & des pruniers ſur le nerprun, & avoir par ce moyen des ceriſes & des prunes purgatives ; mais ces eſpeces de fruits occaſionnent ſouvent des ſuperpurgations & des vomiſſemens énormes. Les feuilles de cet arbriſſeau paſſent pour être déterſives.

Les fruits du petit nerprun, *lycium gallicum*, étant cueillis verts ſe nomment *graine d'Avignon*, ou *grainette*, ou *graine jaune*, & fourniſſent une belle teinture jaune dont on fait un grand uſage pour teindre les

étoffes. Les Peintres à l'huile & en miniature se servent aussi de ces baies, dont on a incorporé la teinture dans une matiere terreuse qui est ordinairement la base de l'alun, pour en faire ce qu'on appelle *stil de grain*. Les Teinturiers, & sur-tout les Corroyeurs, se servent de la grainette pour teindre en jaune, en y joignant de l'alun par parties égales. Cette espece de nerprun croît en abondance dans les lieux rudes & terreux, aux environs d'Avignon & dans le Comtat Venaissin. On en trouve aussi en Dauphiné, en Languedoc & en Provence, &c. C'est un arbrisseau épineux dont les racines sont jaunes & ligneuses, les rameaux longs de deux à trois pieds, couverts d'une écorce grisâtre.

NEVROPTERE. *Voyez à l'article* INSECTE.

NEZ COUPÉ, *staphilodendron*, est selon quelques Auteurs le faux-pistachier, ou une espece de pistachier sauvage, dont le fruit est vésiculaire & nauséabonde: mais en considérant tous ses caracteres on trouve qu'il n'a presque aucun rapport avec le pistachier. *Voyez ce mot & celui de* FAUX-PISTACHIER.

NGO-KIOO. *Voyez à l'article* ANE.

NHAMDUI. Espece d'araignée venimeuse du Bresil: son corps est long d'un pouce & demi, garni sur le dos d'une forme de bouclier triangulaire très-luisant, orné aux côtés de six cônes pointus, blancs avec des taches rouges: elle a huit jambes longues comme le doigt; sa partie antérieure est de couleur jaune ou rouge brune; une singularité remarquable, c'est que la postérieure est luisante & argentée, & qu'elle représente un visage d'homme comme s'il y avoit été peint. Cet insecte file de la toile comme les autres araignées. Dans le pays on porte cet animal en amulette; on l'attache au cou dans le temps de l'accès de la fievre quarte.

NHANDIROBA ou NOIX DE SERPENT. *Voyez* AHOUAI & AVILA.

NICKEL. Il est mention dans le *Tom. XIII. des Mém. de l'Acad. Roy. de Suede, ann. 1751*, d'une nouvelle substance minérale trouvée dans la mine de cobalt de Fœrila en Helsingie, & qui ressemble beaucoup à

la substance que les Mineurs appellent *kupfernichel* : voyez ce mot. Son tissu est grainu, elle est solide & brillante quand on la casse. Lorsqu'elle a été long-temps exposée à l'air, elle se décompose & se couvre d'un enduit vert qui se dissout dans l'eau ; & dont on peut retirer par l'évaporation &c. des cristaux verts qui se forment en prismes quadrangulaires. Ce sel fondu avec le flux noir donne un régule qui ressemble au bismuth, & qui se dissout dans l'eau forte, dans l'eau régale & dans l'esprit de sel. Ce qui est encore singulier, c'est que la mine elle-même, lorsqu'on la calcine, répand une fumée d'abord sulphureuse ; ensuite d'un blanc jaunâtre, d'une odeur désagréable, comme arsenicale. Si on laisse cette mine exposée à une chaleur plus vive, il s'y forme des rameaux métalliques qui deviennent d'un vert clair & sonnant : à mesure qu'on a tenté quelques expériences, on a découvert dans cette substance, du fer & du cobalt ; mais il paroît par un nouveau travail du même Auteur, inséré dans le *XVI Tom. des Savans de Suede*, *ann. 1754*, que le nouveau demi-métal se trouve en plus grande quantité dans le *kupfernichel* que dans aucune autre substance minérale, & M. *Cronstedt* penche à croire que le *nickel* n'est autre chose qu'un alliage des substances métalliques ou semi-métalliques déjà connues, & non un cobalt imparfait. On trouve aussi du *nickel* dans la mine de Kuhschacht à Freyberg en Saxe, il n'entre en fusion qu'après avoir parfaitement rougi.

M. *Baumé* regarde le *nickel* comme un cobalt dans un état particulier & dépouillé de la substance qui fournit du bleu par la vitrification. *Voyez la* Chimie expérimentale *de M.* Baumé, *Tome II. p. 299*, *&c.*

NICOTIANE, ou TABAC, *nicotiana*. Plante très usitée, dont on distingue trois especes principales : savoir, le *grand tabac*, le *moyen* & le *petit*.

1°. La NICOTIANE A LARGE FEUILLE, *nicotiana major latifolia*. La racine de cette plante, qui est le grand & le vrai tabac mâle, est blanche, fibreuse, d'un goût fort âcre. Elle pousse une tige à la hauteur de cinq ou six pieds, grosse comme le pouce, ronde, velue, remplie de moëlle blanche : ses feuilles sont amples,

amples, sans queue, alternes, velues, nerveuses, de couleur verte pâle, un peu jaunâtres, glutineuses au toucher, d'un goût âcre; elles teignent la salive; elles sont attachées à la tige par de larges appendices. Le haut de la tige se divise en plusieurs rejetons, qui soutiennent des fleurs faites en godets, découpées en cinq parties, de couleur purpurine: à ces fleurs succedent des fruits membraneux, oblongs, partagés en deux loges, contenant beaucoup de semences petites, rougeâtres, & très abondantes en huile. Toute la plante a une odeur forte, ainsi que la suivante. C'est une plante d'été chez nous; cependant elle endure quelquefois un hiver modéré dans nos jardins: elle fleurit, comme les autres nicotianes, en Juillet & Août dans notre pays, & y est ordinairement annuelle; au lieu que dans le Brésil, où la terre est bonne & l'air toujours tempéré, elle fleurit continuellement, & vit dix ou douze ans. Sa graine se peut conserver dix années en sa fécondité, & ses feuilles près de cinq avec toute leur force.

2°. La NICOTIANE A FEUILLE ÉTROITE, ou le TABAC DE VIRGINIE, ou le PETUN DES AMAZONES, *nicotiana major angustifolia.* Elle ne differe de la précédente que par ses feuilles, qui sont plus étroites, plus pointues, & attachées à leur tige par des queues assez longues.

3°. La NICOTIANE A FEUILLE RONDE, ou PETITE NICOTIANE, ou TABAC FEMELLE, ou FAUX TABAC, ou TABAC DU MEXIQUE; *nicotiana minor fœmina.* Sa racine est quelquefois simple & grosse comme le petit doigt; d'autres fois elle est divisée en plusieurs fibres tendres, blanchâtres & rampantes. Elle pousse une tige à la hauteur d'un à deux pieds, ronde, dure, velue, grosse comme le doigt, rameuse, glutineuse au toucher. Ses feuilles sont espacées & alternes, oblongues, grasses, de couleur verte-brunâtre, & attachées à des queues courtes. Ses fleurs, ses fruits & ses semences sont semblables à celles des especes précédentes; mais ses fleurs sont jaunes-verdâtres; il leur succede des capsules arrondies, qui dans la maturité s'ouvrent en deux parties, remplies d'un nombre in-

fini de menues semences d'un jaune tanné & d'un goût âcre.

Cette plante, ainsi que les précédentes especes, nous vient originairement d'Amérique; elle est annuelle: par la culture elle s'est comme naturalisée dans toute l'Europe; car dès qu'une fois elle a été transplantée dans un jardin, elle y repullule tous les ans avec abondance, & commence à paroître au mois de Mai: au reste elle se renouvelle aisément de graine. *Clusius* dit que ce tabac femelle est bon à la plupart des maladies auxquelles sert le véritable petun, mais qu'il est beaucoup plus foible; aussi a-t-il peu d'odeur en comparaison des autres. Cette espece de nicotiane est selon M. *Bourgeois* un excellent vulnéraire: elle déterge & cicatrise les plaies les plus opiniâtres, & même les ulceres d'un mauvais caractere: elle guérit en peu de temps les contusions: pendant l'été on applique les feuilles vertes sur la partie malade, & on les change matin & soir. On en conserve pour l'hiver dans de l'eau-de-vie foible, dont on fait le même usage.

Les Continuateurs de la *Matiere Médicale de M. Géoffroy* disent qu'en Espagne & en Portugal le tabac demeure toujours vert comme le citronnier; mais dans les pays froids il périt aux premieres gelées, & l'hiver on ne le peut conserver que très-difficilement dans les serres, en pot ou en caisse. En Amérique il vient très-haut, sur-tout le mâle, & son odeur est très-pénétrante: l'on emploie indifféremment les feuilles des deux premieres especes pour faire le tabac en corde, à mâcher & en poudre, dont l'usage est si commun. C'est en Août & en Septembre qu'on ramasse les feuilles des plantes dont on a coupé les sommités des tiges pour les empêcher de fleurir. C'est moins par la diversité des feuilles de nicotiane, que par la préparation qu'on leur fait subir (en y mêlant du sirop de sucre ou de l'eau de pruneau, ou de l'eau de bois de violette ou de bois de rose) qu'on parvient à produire de la différence dans les sortes de tabac, connues sous l'épithete de *scaferlati du Levant*, de *canasse*, d'*andouille de St. Vincent* ou *cigale d'Amérique*, de *rollé de Montauban*, de *briquet du Brésil*, &c. La nature du climat, le temps de la

récolte, l'espece de lessive dont on arrose les feuilles, le mélange du tabac d'un pays avec celui d'un autre, tout contribue à lui donner une certaine couleur, saveur & odeur. Celui de la Havanne & de Seville, vulgairement appellé *tabac d'Espagne*, est préparé sans aucune drogue odoriférante; on le colore avec le *rubrica*. Le *tabac de Macouba* a naturellement l'odeur de la rose: il est d'une couleur très-foncée, il tire son nom d'un canton situé dans la partie du Nord de la Martinique, où des habitans le cultivent.

Lorsqu'on veut cultiver du tabac, ce doit être dans une terre grasse & humide, exposée au midi, labourée & engraissée avec du fumier consommé: on le seme en France à la fin de Mars; les Indiens & les Espagnols le sement en automne ou en Août au plutôt. On fait un petit trou en terre de la longueur du doigt, on y jette dix à douze graines de tabac, & on recouvre le trou; lorsqu'il est levé, on doit arroser la plante pendant le temps sec, & la couvrir avec des paillassons dans le grand froid. Comme chaque grain pousse une tige, on doit séparer les racines: lorsque les tiges sont hautes d'environ trois pieds, on coupe le sommet avant la floraison, afin qu'elles se fortifient, & l'on arrache celles qui sont piquées de vers, ou qui veulent pourrir. On connoît que les feuilles sont mûres quand elles se détachent facilement de la plante, qu'elles se cassent, & que froissées elles exhalent déjà une odeur pénétrante: on doit alors cueillir les plus belles, les enfiler par la tête, en faire des paquets & les mettre sécher dans un grenier. On laisse la tige en terre pour donner le temps aux autres feuilles de mûrir.

On a donné à la nicotiane bien des noms différens. Dans les Indes Occidentales, son pays natal, elle a toujours porté celui de *petun*, sur-tout au Brésil & dans la Floride, & elle le garde encore aujourd'hui dans l'un & l'autre monde. Les Espagnols qui la connurent premiérement à Tabaco, île de la mer du Mexique, lui donnerent le nom de *tabac*, du lieu où ils l'avoient trouvée, & ce nom a prévalu sur tous les autres. On l'a appelé *nicotiane*, du nom de M. *Nicot*, Ambassadeur de France à la Cour de Portugal en 1560, qui en ayant eu

connoissance par un Marchand Flamand, la présenta au Grand-Prieur à son arrivée à Lisbonne, & puis à son retour en France à la Reine Catherine de Médicis; de sorte qu'elle fut nommée *nicotiane*, *herbe du Grand-Prieur* ou *herbe de la Reine*. Le Cardinal de Sainte-Croix, Nonce en Portugal, & Nicolas Ternabon, Légat en France, l'ayant les premiers introduite en Italie, donnerent aussi leurs noms au tabac: quelques-uns l'ont appelé la *bugloſe* ou la *panacée antarctique*, d'autres l'*herbe sainte* ou *sacrée*, & propre à tous maux, apparemment à cause de ses vertus miraculeuses. Il y a eu des Botanistes qui, à raison de sa seule vertu narcotique, semblable à celle de la jusquiame, l'ont nommée *jusquiame du Pérou*. Thevet a disputé à Nicot la gloire d'avoir donné le tabac à la France; & c'est sans contestation que François Drack, fameux Capitaine Anglois, qui conquit la Virginie, en enrichit son pays. Les trois especes de tabac sont d'usage, mais on se sert plus communément du mâle, tant intérieurement qu'extérieurement.

La Nature n'a jamais rien produit en végétaux dont l'usage se soit étendu si universellement & si rapidement. Le tabac n'étoit autrefois qu'une simple production sauvage d'un petit canton de l'Amérique; mais depuis que les Européens ont contracté la furieuse habitude d'en prendre, soit râpé en poudre, par le nez, soit en feuilles au moyen d'une pipe, ou en masticatoire, l'on en a prodigieusement étendu la culture. Les lieux les plus renommés où cette plante croît, sont Vérine, le Brésil, Bornéo, la Virginie, le Mexique, l'Italie, l'Espagne, la Hollande & l'Angleterre; car le tabac vient par-tout & se vend très-cher, quoiqu'il coûte fort peu. Il est à présent défendu d'en cultiver presque par toute la France: ailleurs on ne le cultive guere que pour avoir ses feuilles. Quel que soit l'intérêt de cette défense, il est certain que le tabac d'Amérique est préférable à celui de l'Europe, & qu'il est d'un produit considérable pour les Souverains. L'on ne nous apporte point de tabac de l'Asie, & notamment de la Chine où l'on en cultive & consomme beaucoup. Le tabac de ce pays seroit-il moins bon que celui d'Amérique?

Le tabac a eu ſes Antagoniſtes ainſi que ſes Panégyriſtes. Amurat IV, Empereur des Turcs, le Czar & le Roi de Perſe en défendirent l'uſage à leurs ſujets ſous peine de la vie ou d'avoir le nez coupé. Jacques Stuart, Roi d'Angleterre, & Simon Paulli ont fait un traité ſur le mauvais uſage du tabac. On trouve une bulle d'Urbain VIII, par laquelle il excommunie ceux qui prennent du tabac dans les Egliſes. Le P. *Labat* dit que le petun fut comme une pomme de diſcorde, qui alluma une guerre très-vive entre les Savans, & qu'en 1699 M. *Fagon*, premier Médecin du Roi, n'ayant pu ſe trouver à une theſe de Médecine contre le tabac, à laquelle il devoit préſider, en chargea un autre Médecin, dont le nez ne fut pas d'accord avec la langue; car on remarqua que pendant tout le temps que dura l'acte, il eut la tabatiere à la main, & ne ceſſa pas un moment de prendre du tabac.

Nous ne nous arrêterons point ſur l'uſage du tabac en poudre, pris par le nez autant par plaiſir ou par uſage que pour la néceſſité. Perſonne n'ignore qu'il excite l'éternuement, & procure une abondante évacuation de ſéroſité, *mucus narium*, ſur-tout à ceux qui n'en ont pas contracté l'habitude. L'excès ou l'abus du tabac en poudre ou en feuilles n'eſt pas moins dangereux qu'un uſage réglé en peut être utile. Le mouvement convulſif que le tabac excite dans les nerfs, quoiqu'irrégulier, peut être bon à quelque choſe, ne fît-il que nous délivrer d'une humeur ſuperflue, alors il eſt un remede: mais y a-t-il apparence que pour être en ſanté il faille avoir toujours le remede à la main, & qu'on puiſſe regarder comme un régime utile d'être à tout moment en convulſions?

Toutes les eſpeces de tabac purgent par haut & par bas avec violence. Pris intérieurement en ſubſtance il convient dans l'apoplexie & la léthargie, même contre l'épilepſie: mais on ne peut trop en redouter les effets; il faut une main habile & prudente pour diriger un tel remede, car le caractere âcre & cauſtique de cette plante s'eſt décelé plus d'une fois, même envers ceux qui le prennent en fumée pour la premiere fois; ils deviennent ivres, & s'ils ne rejetoient pas la fumée,

ils tomberoient dans un triste état. Combien de malades, tombés dans des assoupissemens léthargiques, n'ont recouvert le sentiment & la connoissance que pour mieux sentir d'autres convulsions accompagnées de vomissemens, de sueurs froides, d'un pouls foible & frémissant, & d'autres accidens plus funestes? S'il faut être sur ses gardes quand on emploie ce remede, même dans les affections soporeuses, que doit-on penser de ses effets, quand en bonne santé on en fait un usage continuel, souvent immodéré & toujours sans correctif? Le meilleur bien qu'il en arrive est de faire couler les catarres, la migraine, &c. comme le font moins dangereusement la poudre de bétoine, de muguet, &c. mais le plus petit mal qu'il puisse produire est, dit-on, de dessécher le cerveau, d'amaigrir, d'affoiblir la mémoire & de détruire, sinon entiérement, au moins en partie la finesse de l'odorat. Heureux, mille fois heureux les Savans qui s'abstiennent de l'usage du tabac! On lit dans un des *Journaux d'Allemagne*, *ann. 1730*, *page 179*, des exemples de vertiges & de cécité, même de paralysie, occasionnés par l'usage immodéré du tabac. *Jean Bauhin* vante la nicotiane pour détruire comme par enchantement toute espece de vermine qui désole les hommes & les animaux. En Italie on se sert de sa semence pour appaiser le priapisme: c'est de-là qu'on a donné à la troisieme espece de tabac le nom de *priapée*. Enfin nous concluons que l'usage du tabac peut convenir en fumée pour le mal de dents, pour rendre les soldats & les matelots moins sensibles à la disette des vivres, qui n'est que trop fréquente dans les armées ou vaisseaux, & les préserver des attaques du scorbut. (M. *Bourgeois* dit que le tabac d'Espagne appliqué sur les gencives attaquées du scorbut & saignantes, les guérit entiérement & raffermit les dents branlantes). Mais nous répétons qu'il en faut prendre peu à la fois & rarement, afin de s'y accoutumer par degrés, & que cependant il faut tâcher de ne s'en pas faire un besoin en tout temps. La fumée de l'espece de tabac que les Hollandois appellent *canasser* (*canasse*), introduite par l'anus dans les intestins au moyen d'une machine faite exprès, & dont on peut

voir la figure & la description dans la Chirurgie d'*Heister*, est un grand remede dans le *miserére*, surtout celui qui a pour cause une hernie avec étranglement du boyau, qui intercepte totalement le passage du canal intestinal. Cette fumée introduite dans l'anus & la trachée-artere est aussi très-utile pour rappeler à la vie les noyés. On estime la cendre de tabac très-bonne pour blanchir les dents. En Europe, en Turquie, en Perse & même en Chine on se sert de la pipe pour fumer: mais les Caraïbes des Iles Antilles ont une autre façon très-singuliere, & qui nuit beaucoup à la force de l'odorat & de la vue. Ils enveloppent des brins de tabac dans certaines écorces d'arbre très-unies, flexibles & minces comme du papier; ils en forment un rouleau, l'allument, en attirent la fumée dans leur bouche, serrent les levres, & d'un mouvement de langue contre le palais font passer la fumée par les narines: dans les deux presqu'îles de l'Inde & dans les îles de l'Océan oriental presque tous les peuples idolâtres fument des *chirontes* ou petits rouleaux de feuilles de tabac appelés *cigales* en Amérique. Les Mahométans du Mogol & de l'Inde fument avec un gargoulis double, dont la construction est aussi bizarre que dispendieuse; l'un sert à recevoir la fumée à travers de l'eau, & l'autre à contenir le tabac & le charbon allumé. Cette fumée de tabac est très-douce & beaucoup plus agréable. Ils y mêlent quelquefois des feuilles de bangue qu'ils nomment *ganja* & qu'ils aiment beaucoup. *Voyez* BANGUE.

Le tabac infusé dans l'urine d'homme est très-efficace, dit M. *Bourgeois*, pour détruire toute espece de vermine, soit celle des enfans, soit celle des brutes. Les Maréchaux & les Vachers de la Suisse s'en servent fréquemment pour détruire les poux qui attaquent les jeunes poulains & les veaux. Ce remede est aussi très-bon pour détruire les fourmis & les fourmillieres. *Lisez l'article* FOURMI, où est décrite la maniere d'en faire usage contre ces insectes.

NICTALOPE. *Voyez l'article* ESCARBOT COMMUN.

NID D'OISEAU, *nidus avis*, est une plante qui croît dans les bois, communément aux pieds des sa-

pins : sa racine est composée de grosses fibres, fragiles, pleines de suc, entremêlées de maniere qu'elles ne représentent pas mal un nid d'oiseau : elle pousse deux ou trois tiges hautes d'un pied ou environ, revêtues de feuilles creusées, luisantes & cannelées, ayant la figure d'un cœur : ses fleurs sont rangées aux sommets des tiges, comme dans l'orchis, composées chacune de six feuilles pâles ; à ces fleurs succede un fruit formé en lanterne, à trois côtes arrondies, & qui renferme des semences semblables à de la sciure de bois. On a donné aussi le nom de nid d'oiseau à une espece de carotte.

Toute cette plante a un goût amer, âpre : elle est détersive, résolutive & vulnéraire appliquée extérieurement.

NID D'OISEAU. Nom que l'on donne à un petit réduit composé de diverses matieres où l'oiseau pond, couve & éleve ses petits. *Voyez l'article* OISEAU. On donne le nom d'*aire* au nid ou à l'endroit qu'habitent les grands oiseaux de proie, tels que l'*aigle*, le *faucon*, l'*autour*, &c. *voyez ces mots.*

Il y a peu de nids dont la Médecine fasse usage, excepté celui d'*hirondelles*. Voyez ce mot, & celui dont nous avons parlé sous le nom d'ALCION.

A l'égard des nids d'oiseaux pétrifiés avec les œufs de ces animaux, rien n'est plus faux que leur existence ; à moins qu'on ne regarde comme pétrifiés les nids & les œufs que l'on met dans la fontaine de Carlsbad en Boheme, & qui en peu de temps se trouvent incrustés de façon à faire croire qu'ils seroient véritablement changés en pierres.

NIDS DE DRUSEN. *Voyez à l'article* FILONS.

NIEKE CORONDE. C'est la fausse cannelle du Ceylan.

NIELLE, *nigella*. Plante dont M. *de Tournefort* distingue douze especes tant sauvages que cultivées ; nous n'en citerons que trois.

1°. La NIELLE DES CHAMPS OU LA NIELLE SAUVAGE OU BATARDE, la BARBUE OU POIVRETTE COMMUNE, *nigella sylvestris aut arvensis cornuta*, est une plante que l'on trouve en France & en Allemagne dans

les blés, sur-tout après la moisson. Sa racine est fibreuse, petite, blanchâtre : elle pousse une tige, tantôt simple & tantôt rameuse, grêle, cannelée & haute d'un pied ; ses feuilles qui ressemblent assez à celles de l'aneth, sont découpées en petits filamens alternes : ses fleurs qui paroissent vers la fin de l'été, sont comme étoilées, composées de cinq feuilles, bleuâtres, grandes & agréables ; il leur succede des fruits membraneux, terminés par cinq cornets, qui au sommet s'écartent les uns des autres, mais qui sont unis ensemble depuis le milieu jusqu'en bas, partagés ainsi dans leur longueur par autant de loges qui renferment plusieurs semences noires. Cette plante a la même propriété en Médecine que la suivante.

2°. La NIELLE ROMAINE ou NIELLE DES JARDINS ou NIELLE CULTIVÉE ET DOMESTIQUE ou CUMIN-NOIR ou le FAUX CUMIN, *nigella romana, flore minore simplici, candido.* Cette plante que l'on cultive dans les jardins où elle vient aisément, ressemble à la précédente ; ses fleurs sont d'un blanc pâle, ses semences sont noires ou jaunes & anguleuses, d'une odeur aromatique & d'un goût piquant. Quelques-uns l'ont déjà employée dans les cuisines aux mêmes usages du poivre. La meilleure nous vient d'Italie.

3°. La NIELLE DE CANDIE ou DU LEVANT, *nigella Cretica*, est une espece de nielle plus petite que les précédentes, & qui se distingue encore par ses fleurs bleuâtres & par l'odeur de sa graine, que l'on prendroit pour du cumin, tant elle est forte : elle a les mêmes propriétés des autres nielles : on la cultive dans quelques campagnes en terre grasse : elle fleurit dès le mois de Juin.

La semence de nielle, qui de toutes les parties de la plante, est la seule dont nous nous servions en ce pays-ci, doit être bien desséchée avant qu'on en fasse usage ; car elle contient une humidité qui, selon *Tragus*, est fort pernicieuse : son infusion est apéritive & rétablit les reglés ; elle convient aussi dans la colique venteuse : cette même infusion remédie parfaitement au rhume de cerveau & à l'enchifrenement : pour cela

on tire cette liqueur par le nez, ayant soin auparavant de s'emplir la bouche d'eau, parce que sans cela ce qu'on attire par le nez passeroit dans la bouche & dans le gosier : on tire beaucoup d'huile essentielle de la nielle, qui est excellente pour résister au mauvais air & tuer les vers. M. *Cartheuser* dit aussi en avoir retiré par expression, & l'appelle *unguineuse*.

NIELLE DES BLÉS, FAUSSE NIELLE ou NIELLE BATARDE, *nigellastrum*. Espece de lychnis que M. *Linnæus* appelle *agrostemma*. Cette plante naît dans les champs, & se trouve par-tout dans les blés : sa racine est petite, mais sa tige est haute de trois pieds, velue, genouillée, creuse & rameuse ; ses feuilles qui sont opposées deux à deux, sont étroites, longues, pointues, & embrassent la tige par une large base, revêtues de longs poils blanchâtres : ses fleurs qui paroissent depuis Mai jusqu'en Juillet, sont purpurines, quelquefois blanchâtres, à cinq pétales, échancrées, contenues dans un calice d'une seule piece divisée en cinq lanieres oblongues qui dépassent la fleur. A ces fleurs succedent des capsules séminales, oblongues, à-peu-près de la figure d'un gland : dans la maturité elles s'ouvrent en cinq parties & contiennent plusieurs semences noirâtres, rudes & assez inodores. Cette plante est annuelle comme la nielle commune : elle convient dans la curation des ulceres, des fistules, & pour arrêter les hémorragies. *Sennert* a passé dans le Danemarck pour un magicien, pour avoir guéri, comme par miracle, de telles maladies. La façon de s'en servir est de tenir sous la langue un petit morceau de cette racine nouvellement tirée de terre.

M. *Sarcey de Sutieres*, membre de la Société d'Agriculture de Paris, prétend que la graine de la nielle des blés produit une farine plus blanche & plus légere que celle de froment, & qu'on peut faire une poudre à poudrer supérieure en qualité, en un mot qu'un arpent de terre ensemencé de cette graine produiroit autant de farine que trois arpens en blé. Cette culture peut donc être avantageuse : elle ménageroit le blé qu'on emploie à faire la poudre.

On donne aussi le nom de nielle à une maladie qui

attaque certains végétaux : *voyez ce que nous en avons dit au mot* ARBRE *& notamment à l'article* BLÉ.

NIGUAS. *Voyez* NINGAS.

NIHILUM ALBUM ou POMPHOLIX ou TUTHIE BLANCHE. *Voyez* ZINC.

NIMBO, *nimbo folio & fructu oleæ, aut arbor Indica fraxino similis, oleæ fructu; seu azedarach floribus albis semper virens.* Arbre des Indes Orientales, nommé *bépole* en Malabar. Cet arbre est vert toute l'année, & ressemble assez au frêne; ses fleurs sont petites, blanches, composées de cinq pétales; leur odeur est semblable à celle du triolet odorant; aux fleurs succede un fruit jaunâtre de la forme d'une petite olive; ses feuilles sont vertes, amères au goût, dentelées aux bords, & estimées. Trempées dans le suc de limon & exprimées, elles donnent une liqueur réputée un grand vulnéraire: prise intérieurement c'est un spécifique contre les vers. On tire de son fruit par expression une huile bonne pour les piqûres & contractions des nerfs.

NINGAS ou NIGUAS ou NIGUE. C'est une sorte de vermine des Indes, fort incommode pour les hommes: elle se cache dans la poussiere, & saute à la maniere des puces: elle se fourre entre cuir & chair dans les orteils de ceux qui marchent pieds nus, elle y laisse des œufs en si grande abondance, qu'on a de la peine à les détruire, à moins que ce ne soit par un cautere, ou en coupant les chairs où elle s'est nichée: cette vermine est presque la même que le *tous* du Brésil & la *chique* des Antilles. *Voyez ces mots.*

Lesser, dans sa *Théologie des Insectes*, dit que c'est par le moyen des ningas que les Anatomistes ont eu occasion de revenir d'une erreur générale. On croyoit autrefois que le sang prenoit son cours par les extrémités des arteres; mais cet insecte, dit *Lesser*, nous a appris le contraire.

Il paroîtroit, d'après les observations de M. l'Abbé *Chappe* dans son *Voyage de la Californie*, que ces insectes qui sont si incommodes à la Vera-Cruz & dans le Mexique, ne sont pas les mêmes que les chiques des Antilles, quoiqu'ils s'introduisent de même dans la peau & y multiplient. Ce qui le fait croire à M. l'Abbé

Roxier, c'eſt qu'au Mexique les Indiens n'y connoiſſent point pour remede l'infuſion du tabac, remede ſi ſimple, & que la plaie qu'y font les niguas devient, dit-on, mortelle ſi on y laiſſe couler de l'eau. Le premier ſoin après avoir arraché la nigua, eſt de boucher avec du ſuif le trou qu'elle a fait en s'enfonçant dans la chair.

NINTIPOLONGA, eſt un magnifique ſerpent des Indes Orientales, dont la morſure cauſe un ſommeil mortel. Il n'eſt pas rare dans l'île de Ceylan; ſa couleur eſt brune tirant ſur le noir, il eſt tiqueté ou marbré de fleurs blanches; ſes yeux qui ſont grands & bleus brillent beaucoup; l'ouverture de ſa gueule qui eſt garnie de dents courbées & aiguës, eſt munie dans ſon contour d'écailles épaiſſes; ſa queue va en diminuant & finit en pointe. *Theſ. Seb. Tab. 37.*

NIN ZIN ou NISI ou NINDSIN. *Voyez ſon hiſtoire à la ſuite du mot* GENS-ENG.

NIRUALA. C'eſt un arbre de pluſieurs pays des Indes, ſur-tout du Malabar, dont les feuilles diſtillent un ſuc qui, reçu dans un linge qu'on applique ſur les aines, provoque fort promptement l'urine.

NITRE ou SALPÊTRE, *nitrum*, eſt un ſel à qui la criſtalliſation donne une figure priſmatique, hexangulaire avec une petite pointe aiguë; il eſt d'une ſaveur fraîche, ſalée & amere. Le nitre eſt en partie fixe, & en partie volatil: il fuſe ſur les charbons ardens: il entre en fuſion au feu; mêlé avec de la poudre de charbon, il détonne.

Bien des Naturaliſtes regardent l'origine du nitre comme due au regne minéral. La plupart des Chimiſtes, & notamment *Glauber*, diſent que ce ſel appartient au regne végétal, & qu'il eſt uniquement l'ouvrage de la végétation. Quelques modernes d'entr'eux le donnent au regne animal. Le célebre *Stahl* a donné une ſavante théorie ſur la génération de ce ſel qu'il attribue à la putréfaction des corps. Quoi qu'il en ſoit de ces diverſes opinions, il eſt conſtant qu'on trouve du nitre tout formé dans quantité d'endroits où l'air a un libre cours; tantôt il eſt attaché contre des murailles dont le ciment n'eſt pas ſec: alors il eſt fort impur; mais il s'y reproduit toujours tant que le mur eſt humide & voiſin des

latrines ou des habitations d'animaux quelconques: on l'en détache avec des balais, c'eſt ce qu'on appelle *nitre* ou *ſalpêtre de houſſage* : tantôt, mais plus rarement, le nitre ſe rencontre ſur certaines roches déſertes dans les Indes. On en a trouvé dans une mine de charbon près celle de Tutweiler, dont la montagne brûle toujours, & dans une eſpece de granite deſtructible de Finlande. Ainſi l'on trouve du nitre dans les pierres, près de la ſuperficie de la terre; dans les végétaux, ſur-tout dans les borraginées; dans les plantes ameres, telles que la fumeterre, le creſſon de fontaine, l'héliotropium. *Rauvolf* dit que les Mahométans tirent un nitre des feuilles & des rameaux du ſaule incinérés: d'autres retirent du ſalpêtre de la terre où les animaux vont uriner.

La terre nitreuſe, celle qu'on dit être la ſeule matrice propre à produire du nitre, & qui l'a déjà produit, & qui eſt abſolument néceſſaire pour en produire, doit être viſqueuſe & alkaline: c'eſt une telle terre qui coopere ſi merveilleuſement à l'amélioration ou fécondité des végétaux. M. *Godefroi Pietsch*, qui a remporté le prix de l'Académie de Berlin en 1749, par un Mémoire ſur le ſalpêtre, eſt parvenu à faire du nitre même avec du vitriol, (on dit auſſi du vinaigre), de l'urine putréfiée & de la chaux: *voyez* auſſi quelques détails ſur les *nitriaires* artificielles *à l'art.* SALPÊTRE.

Tout le ſel de pierre, autrement dit le ſalpêtre du commerce qui ſe fait à Paris, ſe retire des platras qui proviennent de la démolition des vieux bâtimens, ſur-tout des caves, &c. On leſſive en grand ces matériaux, & on fournit à la liqueur une baſe alkaline: puis par la voie de l'épuration, enſuite de l'évaporation graduée, on parvient à en obtenir des criſtaux plus ou moins tranſparens, &c. *Voyez* pour ce procédé le *Dictionnaire de Chimie.*

Le nitre entre dans la compoſition de la poudre détonnante & de celle à canon, dans les flux employés par les Artiſtes pour fondre quantité de métaux: le nitre eſt la baſe de l'eau-forte, de l'eau-régale: on s'en ſert auſſi pour préparer des glaces, & pout ſaler les viandes & quelques poiſſons, ce qui donne à leur chair

une couleur rouge. En Médecine ce sel est d'un usage très-étendu & très-fréquent. Il calme l'effervescence du sang & tempere l'ardeur de toutes les especes de fievres, même les ardeurs d'urine. On en fait des tablettes très-efficaces dans les maux de gorge inflammatoires. Le nitre est la base de la *poudre antispasmodique* ou tempérante de *Stahl*. On en fait le cristal-minéral ou sel de prunelle, dont les propriétés sont les mêmes que celles du nitre.

NIVA-TOKA, est le sureau commun du Japon. Sa moelle sert dans ce pays de meche pour les chandelles.

NIVEAU D'EAU DOUCE. *Voyez* MARTEAU INSECTE.

NIVEROLLE. C'est le *pinçon de neige*, *fringilla nivalis*. Voyez PINÇON.

NLANNETONS. Nom que l'on donne à des vers noctiluques du Royaume de Siam. Ils sont d'un vert doré extrêmement beau. *Voyez* VER LUISANT.

NOERZA. Espece de fouine de la grandeur de la marte; son poil approche, par la couleur, de celui d'une loutre; cet animal se cache dans les endroits les plus épais des bois, & il exhale une très-mauvaise odeur. *Agricola* dit que le noerza habite les vastes & sombres forêts de la Souabe du côté de la Vistule.

NŒUD, *Voyez à l'article* PLANTE.

NOIR. Cette couleur qui est opposée au blanc, en ce qu'elle est la plus obscure de toutes, est connue sous différentes épithetes & formée de diverses matieres. Il y a les *noirs* d'ivoire & d'os calcinés dans un vase couvert. Le *noir* d'Allemagne qui est fait avec la lie de vin, les noyaux de pêche, l'ivoire & l'os, le tout brûlé & calciné, ensuite lavé & porphyrisé. Le *noir* de charbon. Le *noir* des Corroyeurs, c'est une espece d'encre. Le *noir* d'Espagne, il se fait de liege brûlé. Le *noir* de fumée, il est produit par des résines brûlées. Le *noir* de terre, est une espece de charbon fossile tendre & gras au toucher. Dans nos Colonies on désigne sous le nom de *Noirs* les Negres. *Voyez l'article* NEGRE.

NOIRPRUN. *Voyez* NERPRUN.

NOISETIER. *Voyez* COUDRIER.

NOIX. *Voyez* NOYER.

NOIX D'ACAJOU. *Voyez* ACAJOU.

NOIX D'AREQUE. *Voyez à l'article* CACHOU.

NOIX DES BARBADES. *Voyez* RICIN.

NOIX DE BEN. *Voyez* BEN.

NOIX DE BENGALE. *Voyez au mot* MYROBOLANS.

NOIX DE BICUIBA. C'eſt une eſpece de fruit des Indes qui brûle comme du linge imbibé de poix. A meſure qu'il brûle, il en ſort une huile, avec laquelle M. *Jean Verdois*, Conſul de la Nation Françoiſe, atteſte avoir guéri pluſieurs cancers & certaines eſpeces de coliques. On lit dans l'*Hiſtoire de l'Académie des Sciences année 1710, pag. 16*, que M. *de la Mare*, Officier de Marine, ayant apporté de ce fruit des Indes, fit l'épreuve d'en tirer l'huile en le brûlant, chez M. *Boudin*, alors premier Médecin de feue Madame la Dauphine.

NOIX DE COCO. *Voyez* COCO.

NOIX DE COURBARI. *Voyez* COURBARIL.

NOIX DE CYPRE ou CHYPRE. *Voyez* CYPRÈS.

NOIX DE GALLE, *galla*. Eſpece de coque végétale que l'on trouve en maniere d'excroiſſance ſur les chênes du Levant, laquelle eſt occaſionnée par la piqûre d'une ſorte d'inſecte qui y dépoſe ſes œufs, &c. Ces galles, qui ſont aſtringentes, varient pour la groſſeur, la couleur, le poids, la figure & leur ſuperficie qui eſt unie ou raboteuſe. Si l'on ouvre les noix de galles encore récentes, on trouve à leur centre une ou pluſieurs larves & nymphes logées en autant de différentes cellules. Si les noix de galles ſont vieilles, elles ſont perforées chacune d'un trou rond que le vermiſſeau métamorphoſé en mouche, a fait pour ſe procurer une iſſue & s'envoler. Les noix de galles nous viennent d'Alep, de Tripoli & de Mozal. On préfere celles qui ſont épineuſes, noires, dures & peſantes, aux blanches, légeres, peu dures & rougeâtres qui viennent dans nos climats & qu'on appelle *caſſenoles*; elles donnent à la ſolution de vitriol martial une couleur violette &

noire. La noix de galle réduite en poudre eſt comme la pierre de touche pour s'aſſurer de la qualité martiale des eaux. On les eſtime fébrifuges & propres à reſſerrer & fortifier les parties qui ſont trop relâchées ; mais M. *Bourgeois* prétend qu'on n'en doit faire uſage qu'extérieurement ; elles arrêtent les accès ſans évacuer la matiere morbifique, & produiſent des maladies & des accidens beaucoup plus dangereux que la fievre : elles ſont la baſe de l'encre ; elles ſervent auſſi aux Foulons, aux Tanneurs, aux Chapeliers, aux Teinturiers, &c. *Voyez à l'article* CHÊNE *& le mot* GALLES. *Voyez auſſi* BAISONGE *à l'article* PUCERON.

NOIX DE GIROFLE ou DE MADAGASCAR. *Voyez* CANNELLE GIROFLÉE.

NOIX IGASUR ou FEVE DE SAINT IGNACE. *Voyez à la ſuite du mot* NOIX VOMIQUE.

NOIX D'INDE. On donne ce nom tantôt au fruit du *cacaotier*, & tantôt à celui du *cocotier*. Voyez ces mots.

NOIX MÉDICINALE ou COCOS DES MALDIVES. *Voyez* COCOS.

NOIX DU MÉDICINIER D'ESPAGNE. *Voyez* RICIN.

NOIX MÉTHEL ou DATURA. *Voyez à l'article* POMME ÉPINEUSE.

NOIX DES MOLUQUES. C'eſt la *noix vomique*. *Voyez ci-après.*

NOIX MUSCADE. *Voyez au mot* MUSCADE.

NOIX NARCOTIQUE, *nux inſana*, eſt un fruit des Indes, gros comme nos petites prunes, rond, couvert d'une écorce rude, rougeâtre, contenant un noyau membraneux, noir & marqué d'une grande tache blanche, entouré d'une pulpe noire, ſemblable à celle de la prune ſauvage : ce noyau renferme une amande griſâtre. Ce fruit croît à un arbre grand comme un ceriſier, & porte des feuilles longues & étroites comme celles du pêcher.

La noix narcotique cauſe un aſſez mauvais effet à ceux qui en mangent, car elle produit des vertiges au cerveau & un délire qui dure quelquefois deux ou trois jours, ou bien elle donne un cours de ventre : on peut l'employer

l'employer extérieurement dans les onguens anodins, pour calmer les douleurs.

NOIX PACARIE. *Voyez aux articles* NOYER & PACANE.

NOIX PÉTRIFIÉES. Il y a quelques années qu'en creusant des anciens puits de salines abandonnés depuis cent cinquante ans à Lons-le-Saunier en Franche-Comté, on trouva à environ trente toises de profondeur des noix pétrifiées, très-singulieres en ce qu'il n'y a que l'amande qui soit pétrifiée, tandis que l'extérieur ou la partie ligneuse & le zest même, n'ont point changé de nature. *Voyez Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de Paris, ann. 1742, pag. 33 & 34.*

NOIX DE PISTACHE. *Voyez au mot* PISTACHIER.

NOIX DU RICIN INDIEN. *Voyez* RICIN.

NOIX DE SERPENT ou NOIX NHANDIROBA. *Voyez* AHOUAI & AVILA.

NOIX DE TERRE. *Voyez* TERRE-NOIX.

NOIX VOMIQUE, *nux vomica aut malus Malabarica fructu corticoso, amaricante, semine plano, compresso.* C'est une petite amande plate, de la forme d'un bouton, d'une substance dure comme de la corne, de couleur grise, un peu lanugineuse, remarquable par une espece de nombril qui est au centre. Ces amandes se trouvent au nombre de quinze dans un fruit rond, qui croît sur un arbre très-gros (son tronc ayant dix pieds de contour), lequel naît au Malabar & à la côte de Coromandel, & qui porte des fleurs d'une seule piece, en entonnoir. On soupçonne que cet arbre est le même que celui qui donne le *bois de couleuvre:* voyez ce mot. Mais ce sont, selon M. *Linnæus*, deux especes du genre qu'il nomme *strychnos.*

Les noix vomiques, ainsi que tous les médicamens amers, secouent violemment les nerfs sensibles de l'estomac des animaux, & les font périr. La noix vomique est un poison pour les quadrupedes & les oiseaux, ainsi que pour l'homme, dont une très-petite dose bouleverse l'estomac & occasionne des mouvemens convulsifs & de terribles angoisses. Diverses expériences faites sur des chiens, prouvent que ce poison produit le même phénomene dans les autres animaux, c'est-à-

dire des mouvemens convulsifs, l'épilepsie & la mort. La dissection des animaux, à qui on en avoit fait manger, a appris qu'il n'agit point par voie de coagulation dans le sang ou dans le suc nerveux, car il n'a paru aucun engorgement semblable à ceux qu'occasionnent les poisons coagulans; tel que l'on dit qu'en produit la ciguë d'eau. Ce poison ne corrode point les membranes de l'estomac, mais il irrite les fibres nerveuses, dont il détruit le mouvement uniforme & oscillatoire. Dès que le suc stomacal a commencé à dissoudre la noix vomique, les effets du poison commencent à se faire sentir; c'est au bout d'un quart d'heure ou d'une demi-heure.

Tout prouve que la noix vomique est très-dangereuse, quoique quelques-uns osent assurer qu'elle n'est funeste qu'aux bêtes & point aux hommes; son usage doit donc être absolument banni, à moins qu'on n'en fasse usage à l'extérieur, la poudre de ces noix étant résolutive. On lit dans l'*Encyclopédie*, *Vol. IV, p. 251, col. 2*, qu'on peut sauver la vie des oiseaux qui auroient avalé de ce poison, en leur faisant boire de l'eau par force, & qu'on sauve pareillement le chien en lui faisant avaler du vinaigre.

L'on croit, mais à tort, que la noix igasur des Philippines, autrement dite *feve de S. Ignace*, est aussi une espece de noix vomique. L'igasur, si connu chez les Indiens sous le nom de *mananaag* & *cathologan*, & chez les Espagnols sous celui de *pépita de Bisayas*; est un noyau arrondi, inégal, comme noueux, très dur, d'une substance comme de corne, semblable à l'hermodacte, d'une saveur de graine de citron, mais très amere, d'une couleur blanche-verdâtre, qui devient brune en vieillissant. La plante qui donne l'igasur, s'appelle *cantara* ou *catalongay*, elle est très rampante; son tronc est ligneux, lisse, poreux, de la grosseur du bras; ses feuilles ressemblent à celles du malabathrum, sa fleur à celle du grenadier, & il lui succede un fruit gros comme un melon, couvert d'une peau fort mince & d'une autre substance dure, comme pierreuse; l'intérieur de ce fruit est rempli d'une chair un peu amere, jaune & molle, dans laquelle sont renfermés

communément vingt-quatre noyaux gros, mais qui diminuent beaucoup en se séchant.

Ce sont les Jésuites Portugais Missionnaires, qui nous ont apporté depuis peu ces fruits, qui étoient inconnus jusqu'alors. Le P. *George Camelli*, l'un d'entr'eux, raconte des choses surprenantes du cas que les Indiens en font. Le commun du peuple, dit il, donne indifféremment la noix igasur pour guérir généralement tous les maux du corps humain, sans avoir aucun égard au temps, à la maladie, à l'âge, ou même à la dose; & même plusieurs la portent suspendue au cou, & ils croient que par le moyen de cette amulette, ils sont à l'abri & exempts de tout poison, de la peste, de la contagion, des enchantemens magiques, des philtres, & spécialement du *sopto*, ou de cette espece de poison que l'on dit qui tue en le respirant seulement, &, ce qui est bien plus, du démon même. Cependant notre Missionnaire dit qu'il ne faut pas prendre ce remede témérairement, parce qu'il produit des mouvemens convulsifs, entr'autres le ris sardonique & le spasme dans les Espagnols, au lieu qu'il n'en excite aucun dans les Indiens: en général ses vertus semblent différer peu de celles de la noix vomique, mais ces amandes n'ont aucune ressemblance entre elles; au reste ce remede, dit M. *Haller*, n'a pas pu prendre en Europe.

NOIX VOMIQUE FOSSILE, c'est la *pierre lenticulaire*. Voyez ce mot.

NOKTHO. Les Siamois donnent ce nom à un oiseau appellé *grand gosier* en Afrique par tous les Voyageurs, & en Amérique *pélican*, ou *onocrotale* par les Naturalistes: *voyez* PÉLICAN.

NOMBRIL, ou OMBILIC, *umbilicus*, est le nœud formé de la peau & de la réunion des vaisseaux ombilicaux, au milieu du ventre, & que l'on coupe à l'enfant aussitôt qu'il est né. Chez les hommes le *nombril* est apparent & bien marqué, au lieu que dans la plupart des brutes il est presque insensible & souvent entiérement obliteré; les singes n'ont même qu'une espece de callosité ou de dureté à la place du nombril. Il est probable que les hommes n'auroient pas le nombril plus apparent s'il avoit été lié & coupé à fleur du ventre,

après la naissance de l'enfant. *Voyez à l'art.* HOMME. Le nombril est sujet, particulièrement aux femmes, à la tumeur que les Médecins nomment *exomphale.*

NOMBRIL MARIN, *umbilicus marinus*, est un limaçon ombiliqué : *voyez* au mot LIMAÇON DE MER.

Les Naturalistes donnent aussi le nom de *nombril marin* aux opercules des coquillages marins & operculés.

NOMBRIL DE VÉNUS, *umbilicus Veneris.* Plante autrement connue sous le nom de *cotyledon*, & dont on distingue deux especes principales que nous allons décrire.

1°. Le GRAND COTYLEDON ou NOMBRIL DE VÉNUS, ou ESCUDES ou ESCUELLES COMMUNES, *cotyledon major.* Cette plante, qui croît naturellement dans les rochers & les vieux murs des édifices, aux lieux pierreux & chauds, est assez commune dans plusieurs Provinces de France ; elle ne s'éleve pas si aisément dans les jardins. Sa racine est tubéreuse, charnue, blanche, fibreuse en dessous ; elle pousse des feuilles rondes, épaisses, grasses, pleines de suc, creusées en bassin comme un nombril, attachées par des queues longues, verdâtres, d'un goût visqueux & insipide ; d'entre lesquelles s'éleve une tige menue, haute d'environ un demi pied, qui se divise en plusieurs rameaux revêtus de petites fleurs en cloches, de couleur blanchâtre ou tirant sur le purpurin : ces fleurs sont remplacées par des fruits à plusieurs gaînes membraneuses, qui renferment des semences fort menues. Cette plante commence à paroître vers l'automne ; elle conserve ses feuilles pendant l'hiver, elle fleurit en Avril & Mai, alors ses feuilles se flétrissent.

2°. Le COTYLEDON ou NOMBRIL DE VENUS A FLEUR JAUNE, *cotyledon flore luteo :* sa racine est longue, vivace & rampante ; ses feuilles sont plus épaisses que les précédentes, & crenelées en leurs bords ; la tige est rougeâtre, les fleurs jaunes & disposées en épi : à ces fleurs succedent cinq capsules oblongues, verdâtres, remplies de graines très-menues & rougeâtres. Cette plante vient ordinairement de Portugal ; on la cultive dans les jardins curieux, où elle n'est pas diffi-

cile à conserver, mais elle périt comme la précédente espece.

Les feuilles du cotyledon ont un goût visqueux & aqueux; elles sont rafraîchissantes, & produisent, ainsi que la joubarbe, de très-bons effets dans les inflammations externes, sur les brûlures & les hémorroïdes.

NONNATA. *Voyez* APHIE.

NONNETTE. *Voyez au mot* MÉSANGE.

NOPAL. *Voyez* OPUNTIA.

NORD-CAPER, est une petite espece de baleine, qui se pêche sur les côtes de Norwege & d'Islande: c'est la baleine glaciale de *Klein*. Voyez au mot BALEINE.

NORRKA. Les Naturalistes Suédois donnent ce nom à une pierre de roche composée, comme granitense, où le mica abonde; nous en avons qui contiennent aussi du talc.

NOSTOCH. Espece de fucus terrestre. *Voyez à l'article* MOUSSE.

NOTOPEDE. *Voyez* TAUPIN.

NOYAUX, *nuclei aut metroliti*. Communément on donne ce nom aux empreintes intérieures & solides des coquillages: la matiere qui compose ces noyaux varie beaucoup: elle provient ordinairement des mêmes couches qui forment les lits des pierres où ces fossiles étoient enfermés; elle s'est insinuée sous la forme d'une vase liquide dans la cavité de la coquille, & s'est endurcie & moulée à mesure que l'eau s'en retiroit: il n'est pas toujours possible de bien déterminer à quelle sorte de coquille tel noyau peut se rapporter, cette empreinte ne pouvant porter le caractere que la plupart des coquilles ont extérieurement, & qui souvent en fait la différence spécifique.

On dit aussi noyaux d'amande, de pêche, de cerise, de prune, d'abricot, &c. Le *noyau*, *osseulum*, est la partie dure des fruits qui contient un corps tendre & bon à manger, auquel on a donné le nom d'amande.

Enfin on appelle noyau la partie la plus dure qui se trouve au centre de certains cailloux.

NOYER, *nux juglans*. Le noyer est un arbre qui devient très-beau, agréable par son feuillage, & qui

est d'une très-grande utilité, tant par ses fruits que par son bois.

Il y a plusieurs especes de noyers qui different soit par leurs fruits, soit par leurs feuilles. On distingue le noyer ordinaire, dit aussi *noyer royal :* le noyer à gros fruit, dit *noix de jauge ;* ses noix sont extrêmement grosses, mais elles ne sont jamais bien pleines, & ont peu de saveur : il y a une espece de noyer à fruit tendre ; un autre à feuilles découpées : le noyer qui donne ses fruits deux fois l'année : le noyer de la Louisiane, dont le fruit a la figure d'une noix muscade, & que l'on nomme *pacane ;* & quelques autres especes du Canada ; même celle d'Europe qu'on nomme en France *noyer de la S. Jean*, & que *Carlowiz* & *Valvassor* ont décrit ne fructifier qu'à la S. Jean ; c'est le *nux fructu serotino* des Auteurs.

Comme les noyers se multiplient de semence, il se forme beaucoup de variétés dans ces arbres.

Les noyers portent sur les mêmes pieds des fleurs mâles & des fleurs femelles. Les fleurs mâles forment des chatons ; cette poussiere fécondante des chatons passe pour être bonne dans la dysenterie. Les fleurs femelles sont assemblées deux ou trois ensemble. Aux fleurs succedent les fruits, qui sont couverts d'une écorce charnue, verte, acerbe & un peu amere, que l'on nomme *brou de noix*, qui recouvre une écale ou coque ligneuse qui renferme une amande divisée en quatre lobes. Presque tous les noyers ont les feuilles conjuguées & attachées sur une côte terminée par une feuille impaire ; elles ont une bonne odeur.

Les noyers se plaisent le long des chemins, dans les vignes, le long des terres labourées, sur les collines & dans les gorges des montagnes à l'exposition du Nord & du Levant. Leurs racines pénetrent dans du tuf, dans de la craie, lieux où aucun arbre ne jetteroit des racines, si on en excepte la vigne. On doit avoir soin de labourer la terre au pied des noyers réunis en quinconce, si on ne veut point les voir périr. On prétend que les cendres sont le meilleur & le seul engrais qui convienne aux noyers. Il faut cependant avertir les Economes rustiques qu'on ne doit point

planter de noyers dans les vignes, ni dans les terres labourées, leur ombrage leur est pernicieux; les graines ne mûrissent point sous leur ombre: ajoutons que les racines des noyers s'étendant à plus de six toises dans les terrains cultivés & fumés, elles dérobent la nourriture aux ceps de la vigne, qui languit & ne produit rien.

Les noyers ne se multiplient ordinairement que par semences ou noix, quoique quelques personnes disent avoir réussi avec succès à les greffer. Cet arbre commence à donner quelques fruits au bout de sept ans de semence, & il est à sa perfection lorsqu'il est âgé d'environ soixante ans. Si l'on fait une incision à son tronc, il en sort une liqueur abondante qui peut servir de boisson.

Les noix different par la grosseur, la figure, la dureté & le goût: il y en a une espece dont l'amande est amere. Les noix sont très-bonnes à manger quand elles approchent de leur maturité, on les nomme alors *cerneaux*. Les noix que l'on garde pour l'hiver, acquierent un peu d'âcreté ou de rancidité en séchant; mais en les mettant tremper quelques jours dans l'eau, l'amande se gonfle, on peut la dépouiller de sa peau, & alors elle est assez douce. On confit les noix vertes, soit avec leur brou, soit sans brou. On fait avec les noix seches & pelées une espece de conserve brûlée assez agréable, que l'on nomme *nouga*. On emploie les noix vertes pour faire un ratafia de santé très-stomachique. Pour cela on les dépouille de leur brou & on les grille au sucre. Quelquefois on fait infuser les noix vertes entieres dans de l'eau-de-vie & du sucre; c'est encore un ratafia très-usité & connu sous le nom de *brou de noix*. Les noix vertes n'ont d'autre emploi médicinal que d'être un des ingrédiens de l'eau appelée *l'eau de trois noix*. M. *Baron* dans ses Notes sur *Lémery*, prétend qu'au lieu de noix il vaudroit mieux n'employer que des fleurs de noyer, & ne les distiller qu'une fois.

Le plus grand usage que l'on fait des noix seches & pilées sous la meule, est d'en retirer par expression une premiere huile, que quelques personnes préferent

au beurre & à l'huile d'olive, pour faire des fritures : cette huile en vieillissant acquiert de la vertu ; elle devient propre à entrer dans plusieurs emplâtres, dans les cataplasmes contre l'esquinancie, dans les lavemens adoucissans. On prend ensuite la pâte qui reste après avoir exprimé cette huile, on la met dans de grandes chaudieres de fer sur un feu lent ; lorsque cette pâte est brûlante, on la met aussi-tôt dans des toiles & on la porte au pressoir ; par ce moyen on en retire une seconde huile, qui a une odeur désagréable, mais qui est bonne à brûler, pour faire du savon, & excellente pour les grosses peintures, sur-tout quand on a soin de la mêler avec de la litharge : cette huile a la propriété de faire sécher plus promptement les couleurs. L'huile de noix mêlée avec de l'essence de térébenthine est propre à faire un vernis gras, qui est assez beau & qu'on peut appliquer sur les ouvrages de menuiserie.

La décoction des feuilles de noyer dans de l'eau simple, déterge les ulceres, sur-tout en y ajoutant un peu de sucre. Elle est très-efficace (sans sucre) pour détruire les fourmis qui gâtent les arbres & les prairies. *Voyez la maniere d'en faire usage à l'article* FOURMI. On prétend qu'un cheval qui a été bouchonné ou épongé avec la décoction de feuilles de noyer, n'est point tourmenté de mouches pendant la journée, parce que cette amertume empêche les mouches de s'y attacher. On a dit que l'ombre de cet arbre étoit fatale aux animaux ; l'expérience, dit-on, fait voir que le mal de tête survient à quelques personnes qui se couchent sous les noyers pour s'y reposer & y dormir ; ce qui n'est pas causé par l'ombre, mais par les exhalaisons qui sortent de ses feuilles, & qui sont contraires à quelques cerveaux. Si cette ombre pouvoit causer quelque incommodité, cela pourroit peut-être arriver à des personnes qui, par la suite d'un exercice violent ayant extrêmement chaud, se mettroient sous son feuillage, & dont la transpiration se trouveroit arrêtée par la trop grande fraîcheur de la place.

On fait usage en médecine de toutes les parties du noyer. Cet arbre est très-précieux pour les Arts. Les Teinturiers en emploient les racines, l'écorce, sur-

tout celle des racines, les feuilles & le brou pour faire des teintures en fauve ou de couleur de café ou de noisette très-solides ; les étoffes même que l'on teint avec ces substances, n'ont pas besoin d'être alunées. La décoction du brou de noix est spécifique contre les punaises & le venin des animaux ; les coquilles & les zestes de ce fruit sont sudorifiques & utiles aux personnes qui ont une constipation de ventre habituelle ; les noix confites sont fort prolifiques & corrigent la mauvaise haleine ; elles sont estimées pour fortifier l'estomac & arrêter les vomissemens qui viennent de la foiblesse de ce viscere. Les Menuisiers & les Tourneurs font avec le brou pourri dans l'eau une teinture qui donne aux bois blancs une belle couleur de noyer. Le bois de noyer est liant, assez plein, facile à travailler ; on en fabrique les meilleurs sabots. Il est recherché par les Sculpteurs, les Ebénistes, les Armuriers, les Tourneurs, &c. & c'est un des meilleurs bois de l'Europe pour faire toutes sortes de meubles, il n'est pas sujet à la vermoulure. M. *Bourgeois* dit que c'est surtout de la racine de noyer que les Ebénistes & les Tabletiers se servent pour faire de beaux meubles de chambre, comme tables, commodes, tablettes, armoires. On scie ces racines en travers & en lames minces d'un quart de pouce, pour en faire des placages qui représentent le marbre & toute sorte de ramages. Ces racines sont si fort recherchées en Angleterre où les noyers sont rares, qu'on en transporte par eau depuis la Suisse.

Les noyers de la Virginie & ceux de la Louisiane, dit M. *Duhamel*, ont leur bois plus coloré que le nôtre ; il est quelquefois presque noir, mais ses pores sont fort larges : ce sont de fort beaux arbres ; leurs feuilles sont très-longues, & quelquefois chargées d'onze folioles. Mais le fruit des noix noires n'est bon qu'en cerneaux, parce qu'étant mûres, les cloisons intérieures sont trop dures ; cependant les Naturels du pays en font une espece de pain : voici leur méthode. Ils écrasent les noix avec des maillets, & ils lavent cette pâte dans quantité d'eau : le bois surnage avec une portion d'huile, à mesure qu'ils remuent la pâte avec les mains,

& il se précipite au fond une espece de farine : c'est celle dont ils font usage. Il n'y a que la *noix pacarie* ou de pacane qui soit fort bonne, non-seulement parce que son écorce n'est pas fort dure, mais encore parce que son amande participe un peu du goût de la noisette. En Canada il y a une espece de noyer qui fournit, quoiqu'en petite quantité, une liqueur aussi épaisse & aussi sucrée qu'un sirop ; mais cette liqueur est moins agréable que celle de l'érable.

Il croît sur le tronc du noyer un champignon ou une substance spongieuse, de la consistance du cuir, dont les Anciens se servoient comme de cautere : ils l'appliquoient d'un bout sur la peau & mettoient le feu à l'autre bout, & le laissoient ainsi brûler jusqu'à ce qu'il fût réduit en cendres. Les Turcs employoient de la même maniere le sarment de vigne, &c.

NUAGES ou NUÉES, *nubes*. Un amas de vapeurs humides qui sont suspendues dans l'air supérieur, ou qui sont mues par le vent, produit les nuages : ainsi les nuées sont formées par l'évaporation des eaux, tant stagnantes que coulantes, & notamment par celles de la mer. Elles ne se forment point lorsqu'il pleut ; au contraire, elles se détruisent ; mais dès qu'il fait beau temps, c'est-à-dire quand la lumiere du soleil, qui doit éclairer notre atmosphere, n'est point affoiblie par l'interposition des nuages, alors l'évaporation des eaux a lieu, & ces vapeurs humides montent avec la fumée des cheminées en colonnes, en trompes, &c. jusques dans une certaine région de l'air, dont elles égalent la pesanteur, & où elles paroissent flotter & nager sous la forme de nuages d'abord légers, ensuite plus épais, enfin noirâtres : c'est alors qu'ils absorbent la lumiere, obscurcissent l'air d'autant plus, qu'ils sont plus amassés & arrêtés ensemble ; mais dans tous les temps, ils sont le jouet des vents qui agitent l'air ; ils leur font prendre différentes formes & en augmentent la grandeur, c'est-à-dire la longueur & le diametre, les dispersent de telle maniere qu'ils disparoissent entiérement. Le vent fait quelquefois avancer les nuées avec tant de rapidité, qu'elles font deux à trois lieues en une heure. C'est quand les nuages sont trop épais, ou que

la colonne d'air qui les soutient est trop foulée, qu'il tonne, ou qu'il fait une violente tempête de vents, que le cours, l'amas, le choc & la séparation des nuages a lieu, & qu'ils se résolvent en gouttes plus ou moins grosses, ce qui produit les différentes *pluies*. Voyez ce mot, celui de MER, & celui des EAUX DU CIEL, à l'article EAUX.

Il y a des nuages qui paroissent rouges au lever & au coucher du soleil, & d'autres qui se trouvent plus proche de l'horizon paroissent violets & deviennent bientôt après de couleur bleue. Ces couleurs dépendent de la lumiere qui pénetre dans les globules de vapeur transparente, & qui venant à réfléchir, sort par un autre côté & se sépare en ses couleurs, dont le rouge vient d'abord frapper notre vue, ensuite la violette, puis la bleue, suivant la différente hauteur du soleil. Ces couleurs se forment à-peu-près de la même maniere que celle de l'arc-en-ciel. *Voyez ce mot.*

Tous les Voyageurs Physiciens s'apperçoivent facilement de la formation des nuages; il suffit de contempler dans un lointain le lieu où se rendent les brouillards des rivieres, de la mer, & les vapeurs qui sortent des cheminées d'une grande Ville. Dans les pays de montagnes, on voit les nuages se former, comme si les montagnes rendoient de la fumée. Ces nuages naissent, montent, se réunissent, s'étendent & occupent bientôt tout l'horizon. On a éprouvé mille fois que les nuages, même les plus épais que l'on a vu du pied des montagnes s'accrocher au sommet, & que l'on a ensuite traversés pour arriver au haut, ne sont que des brouillards semblables à ceux qui s'abaissent de temps en temps sur les plaines. On voit quelquefois des nuages qui sont suspendus les uns au-dessus des autres, & qui paroissent fort distincts & très-éloignés les uns des autres, ce qui dépend sur-tout de la différence de leur pesanteur spécifique qui les tient en équilibre avec un air plus ou moins dense. Ces différens nuages plus ou moins élevés, prennent souvent différentes routes, sans se mêler ensemble; ils sont aussi de différentes figures, & quand ceux de même élévation se réunissent, c'est toujours par leurs bases qu'ils se confondent.

Selon l'élévation ou la région qu'habitent les nuages, l'eau qui en distille est souvent congelée avant que de parvenir sur notre sol. *Voyez aux mots* GRÊLE & NEIGE. Au reste les nuages, d'où tombe la grêle, ne sont jamais plus élevés, dit *Kepler*, que d'un quart de mille, c'est-à-dire, cinq mille pieds du Rhin. *Fromond*, dans sa Météorologie, prétend qu'un nuage de pluie est rarement placé plus haut qu'à cinq cents pas ou à deux mille cinq cents pieds de la terre. Ceux qui sont blanchâtres, peu opaques, & qui réfléchissent encore la lumiere du soleil, sont élevés d'environ demi-lieue : ainsi l'usage des nuages est, 1°. de soutenir & de contenir la matiere dont la pluie est formée ; 2°. de défendre la terre contre la trop grande & trop longue ardeur du soleil qui la pourroit dessécher. 3°. Enfin d'être une des principales causes des vents libres qui soufflent de toutes parts, & sont d'une très-grande utilité.

NUIT, *nox*. Nom donné à cet état de ténebres opposé à la clarté, à la lumiere du jour, qui ne commence qu'à la fin du crépuscule, & qui dure tant que le soleil est sous l'horizon. *Voyez* JOUR. Sous l'Equateur les nuits sont égales au jour ; sous le Pôle la nuit dure la moitié de l'année. Le jour des équinoxes, les nuits sont égales aux jours dans tous les climats de la terre. Dans l'hémisphere Septentrional que nous habitons, les nuits sont plus grandes que les jours, depuis l'équinoxe d'automne jusqu'à celui du printems ; & les nuits sont plus courtes que les jours, depuis l'équinoxe du printems jusqu'à celui d'automne. Les plus grandes nuits de l'hémisphere Septentrional arrivent au solstice d'hiver, & les plus courtes au solstice d'été ; c'est le contraire dans l'hémisphere Méridional.

NUMISMALES. On donne ce nom aux pierres *frumentaires* ou *nummulaires*, & notamment aux *pierres lenticulaires*. Voyez ce mot & l'article PIERRES NUMISMALES.

NUMMULAIRE, ou MONNOYERE, ou HERBE AUX ECUS, ou HERBE A CENT MAUX, *nummularia aut centi-morbia, aut lysimachia, humi fusa, folio rotundiore, flore luteo*, Tournefort. C'est une plante qui croît très-communément à la campagne dans des lieux

humides, le long des fossés & des chemins, & proche des ruisseaux. Sa racine est traçante, menue : elle pousse plusieurs tiges longues, grêles, anguleuses, rampantes à terre, portant des feuilles opposées deux à deux, larges d'un doigt, arrondies & un peu crêpées, vertes, jaunâtres, d'un goût fort astringent. Ses fleurs sortent pendant l'été des aisselles des feuilles : elles sont grandes, jaunes, formées en rosette : il leur succede de petits fruits sphériques, qui contiennent des semences fort menues. Cette plante est du genre des *lysimachies*. Voyez CHASSEBOSSE.

La nummulaire s'étend plus ou moins en grandeur, suivant les terres où elle naît ; celle qui se trouve dans les jardins est plus grande que celle des champs. On doute que cette plante fasse aucun mal aux moutons, comme le prétendent quelques Payſans : elle est astringente, anti-scorbutique, vulnéraire, excellente pour arrêter toutes sortes de flux, & pour consolider les plaies & les ulceres du poumon.

NUTATION. En Botanique c'est la direction de la plante du côté du soleil : *voyez cette espece de mouvement à l'article* PLANTE : La *nutation* en Astronomie se dit d'une espece de mouvement qu'on observe dans l'axe de la terre, en vertu duquel il s'incline tantôt plus, tantôt moins à l'écliptique. La nutation de l'axe de la terre vient de la figure de cette planete qui n'est pas parfaitement sphérique & sur laquelle l'action du soleil, & notamment de la lune est un peu différente, selon les situations où ces deux astres sont par rapport à nous, c'est-à-dire que la force de cette action ne passe pas toujours exactement par le centre de gravité de la terre, & par conséquent elle doit produire dans son axe un petit mouvement de rotation. *Voy.* TERRE.

NYCTANTES. Cette nouvelle plante Indienne présentée à la Société Royale de Londres par M. *Jonas Berguès*, Médecin Suédois & Membre de cette Société, porte ses branches penchées, opposées, rondes ; les inférieures sont unies, les supérieures sont velues, rameuses, & les rejetons que la tige pousse sont opposés. Les feuilles sont opposées, en forme de cœur alongé, terminées en pointe, grandes de deux pouces,

aiguës, entieres, unies de tous les côtés, nerveuses; ayant le bord un peu ondulé & d'un beau vert. Les feuilles inférieures sont plus petites, & celles qui sont tout-à-fait au bas sont en forme de cœur ovale & petites. Les fleurs sont rassemblées au nombre de cinq ou six, disposées en ombelles, ou plutôt en corymbe, & elles ont un pédicule fort court. Le calice ou périanthe est d'une seule piece, tubulé, à six ou sept divisions dans sa partie supérieure: ces divisions sont en forme d'alênes & velues; la corolle est monopétale, le tube cylindrique, cannelé, long d'un pouce & renflé dans le haut; le limbe est plane, séparé en huit ou neuf divisions qui sont ovales, oblongues & aiguës; les étamines au nombre de deux sont fort courtes, leur sommet ou anthere est linéaire, obtus, sillonné de part & d'autre, caché dans le tube de la corolle. Le germe est de forme ronde, tronqué, émoussé, poli, & le stile est en forme de fils de la longueur des étamines, le stigmate est gros & fendu en deux.

NYMPHE & CHRYSALIDE, AURÉLIE, FEVE & NÉCYDALE, sont des termes dont les anciens Naturalistes se sont servis indifféremment pour désigner la forme & l'état mitoyen, par lequel les chenilles, les mouches, & le plus grand nombre des insectes, passent en sortant de l'état de chenille ou de ver, pour parvenir à celui de mouche ou de papillon; c'est cet état, qu'en matiere de ver à soie, on exprime par le mot de *feve;* mais aujourd'hui le sens en est fixe, comme nous le verrons à la fin de cet article.

La Nature, si féconde & si variée dans ses œuvres, n'observe point les mêmes lois dans la naissance des insectes, que dans celle des grands animaux. Les grands animaux naissent, ou d'un œuf couvé dans le ventre de la mere, si nous nous en rapportons au sentiment d'un grand nombre d'Anatomistes, ou d'un œuf couvé hors de son ventre; ce qui fait nommer les premiers *vivipares*, & les autres *ovipares*. *Voyez ces mots.* Dans l'un & l'autre cas, ils sortent de l'œuf tout parfaits: ils n'ont plus besoin que de croître. La nature paroît avoir fait de plus grands préparatifs pour les insectes: elle les fait passer (du moins le plus grand nombre des

insectes ailés que nous connoissons) par plusieurs états, avant de les amener à leur perfection ; elle les fait être successivement trois especes d'animaux, qui paroissent à l'extérieur n'avoir nul rapport l'un à l'autre. Prenons l'exemple du papillon. Il est d'abord contenu dans un œuf ; mais que sort-il de cet œuf ? Ce n'est point un papillon ; c'est un insecte que l'on appelle *larve* ou *chenille*, qui rampe, qui broute l'herbe, qui a de fortes mâchoires, un prodigieux estomac, grand nombre de jambes, qui file & fait une coque avec beaucoup d'art. Après un certain nombre de jours marqués par la Nature, ce prétendu ver jeune, devient malade, mue ou change de forme, & devient ce qu'on appelle *feve*, ou *chrysalide* & *nymphe* dans d'autres insectes. L'animal ne prend cette forme qu'après s'être défait de sa peau, de ses jambes, de l'enveloppe extérieure de sa tête, de son crâne & de ses mâchoires, de sa filiere, de son prodigieux estomac, & d'une partie de ses poumons. En quittant cet état de chenille, & les parties qui lui étoient propres, il reparoit couvert d'une membrane dure & ferme, qui l'enveloppe de toutes parts, sans lui laisser la liberté d'aucun de ses membres ; ainsi empaqueté & emmailloté, il passe un temps assez notable, les uns plus, les autres moins, quelques-uns jusqu'à plus d'un an, sans prendre aucun aliment, & la plupart dans une inaction totale. Pendant cette espece de léthargie, il se fait une transpiration insensible des humeurs superflues, qui fait prendre de la solidité aux parties intérieures de la chrysalide ; & enfin, de ce corps mitoyen entre un animal vivant & un animal mort, il en sort un animal qui n'a plus rien de la forme du premier. Le premier rampoit ; celui-ci vole : le premier broutoit l'herbe, & se traînoit lourdement sur la terre ; celui-ci plus agile, vole lestement, n'habite plus que la région de l'air, ne vit que de miel, de rosée, & du suc qu'il pompe dans les glandes nectariferes des fleurs. La larve avoit des mâchoires pour hacher ; le papillon n'a plus qu'une trompe pour sucer ; & ne rend pas d'excréments sensibles : la larve ignoroit parfaitement les plaisirs de l'amour, elle n'avoit aucune connoissance de son sexe ; le papillon semble

n'avoir plus d'autres penſées, & n'être né que pour perpétuer ſon eſpece. Ce changement eſt le dernier que l'inſecte éprouve.

Les anciens Philoſophes ont raiſonné beaucoup ſur ces changemens, & ſouvent aſſez mal : les uns ont pris ces changemens pour des métamorphoſes complettes ; les autres ont regardé l'état de *feve* ou *chryſalide*, comme une véritable mort ; & le retour de l'animal en papillon, comme une réſurrection parfaite. Rien de plus contraire à la vérité & même à la raiſon, que ces divers ſentiments. Le ver à ſoie, dans quelque temps qu'on le prenne, ſoit chenille, ſoit feve, ſoit papillon, n'a jamais ceſſé de vivre, ni d'être le même animal ; la ſeule différence qu'on peut remarquer dans ſes différents états, eſt qu'il avoit, étant chenille, des parties qui devoient être inutiles au papillon : elles ſe ſont deſſéchées & détruites, lorſque le ver a pris la forme de feve ou chryſalide. D'autres parties néceſſaires au papillon, comme les ailes, la trompe, les parties de la génération étant inutiles au ver, n'ont commencé à ſe développer que lorſque le temps d'en faire uſage s'eſt approché. Cette merveille, que la Nature opere dans les inſectes, arrive auſſi en nous. Combien de parties deviennent inutiles à un enfant qui vient de naître ? Le *thymus*, le *trou ovale*, le *cordon ombilical*, & bien d'autres, s'anéantiſſent après la naiſſance ; d'autres, qui étoient inconnues à la premiere enfance, ſe développent avec l'âge. Cet échange de parties ſe fait en bien plus grand nombre, & dans un temps plus court dans les inſectes, ce qui le rend plus remarquable : c'eſt auſſi ce qui a donné lieu à quelques Auteurs de regarder le ver à ſoie comme un animal différent de ſon papillon, de penſer que le papillon eſt un fœtus nourri & élevé dans le corps du ver. Il eſt aiſé de démontrer le contraire. Un fœtus peut périr dans le ventre de la mere, ſans qu'il en arrive d'accident à la mere, parce que le fœtus & la mere ſont deux animaux complets, qui ont ſéparément les parties néceſſaires à la vie. Il n'en eſt pas de même du ver à ſoie & du papillon. Que l'on ouvre un ver à ſoie, lorſqu'il eſt dans l'état de ver, on lui trouvera diſtinctement un cœur

ou

ou une longue artere qui en fait l'office, une moelle épiniere, un cerveau, un grand nombre de muscles, & des ouvertures qui tiennent lieu de poumon. Que l'on ouvre un semblable animal étant chrysalide, étant papillon, on retrouvera toujours ces mêmes parties. Ces parties essentielles à la vie & au mouvement, sont uniques dans le ver à soie, qui paroît successivement sous trois formes différentes, quoiqu'il ne soit toujours que le même animal, puisque les parties qui constituent la vie sont toujours les mêmes.

A tout instant l'Histoire Naturelle nous présente de semblables merveilles, qui toutes réfléchissent la puissance du Créateur. La chrysalide, ainsi nommée à cause de sa couleur d'or, ou feve à cause de sa forme, sont deux termes sous lesquels est connu l'état d'un ver qui, après avoir quitté sa peau de larve, paroît enveloppé d'une membrane nouvelle ordinairement lissée & quelquefois velue, qui se desseche, devient solide & forme une espece de boîte angulaire ou arrondie, dans laquelle il est incrusté; le ver à soie & toutes les chenilles se mettent en *chrysalides*. On ne connoît point de coques angulaires qui ne donnent des papillons diurnes; & on en connoît peu d'arrondies qui ne produisent des *phalenes*. *Voyez ce mot & l'article* PAPILLON. On appelle *nymphe* l'état des insectes qui s'enveloppent d'une membrane transparente, très-fine, flexible & qui laisse voir la figure du futur insecte toute formée. Toutes les mouches passent par cet état, où elles ne laissent pas d'aller & venir quelquefois, & de prendre de la nourriture. Parmi les chrysalides ou feves celles qui n'ont point de mouvement progressif, sont autant de coques soyeuses ou nues, cachées sous des feuilles ou dans des creux d'arbres, ou dans des trous en terre; parmi celles-ci quelques-unes ressemblent à de petits lingots d'or. Ce sont les véritables aurélies, sur-tout les insectes, tels que les larves des cousins, des tipules, &c. qui naissent dans l'eau.

M. *de Réaumur* a cherché d'où pouvoit venir aux chrysalides cet or qui les couvre quelquefois avec profusion; & il a découvert qu'une peau brune très-fine couvre une autre peau lisse, polie, d'un blanc très-

clair ; la couleur de cette derniere peau mêlée à celle de la peau supérieure, nous fait voir de l'or où il n'y en a pas : c'est ainsi encore que les écailles de plusieurs poissons paroissent dorées. C'est un effet produit par la réflexion de la lumiere. Ainsi la différence entre les *feves*, les *nymphes*, les *chrysalides* ou *aurélies*, consiste dans leur forme, dans la transparence du voile qui les couvre ou son opacité, dans leur inaction ou leur mouvement. La pellicule membraneuse qui les couvre est une toile derriere laquelle l'insecte rampant change d'habit. La toile se brise. L'acteur paroît avec un appareil éclatant, & vient jouer un nouveau rôle sur le théâtre de l'Univers. Il faut observer que la plupart des chrysalides, nymphes, &c. résistent aux vapeurs les plus pernicieuses ; celle du soufre ne les détruit pas absolument : la privation de l'air par le moyen de la machine pneumatique sembleroit indiquer qu'elles n'ont pas besoin de respirer ; mais si on les plonge dans l'huile d'olive elles périssent, signe certain du besoin de l'air.

Pour avoir une idée plus complette de la vie & des mœurs des insectes, *voyez les articl.* INSECTE & CHRYSALIDE.

Nymphe, selon M. *Pluche*, signifie *jeune mariée*, parce que c'est dans cet état que l'insecte prend ses plus beaux atours, & la derniere forme sous laquelle il doit paroître pour multiplier son espece par la génération.

NYMPHES. En Anatomie le mot *nymphes*, *nymphæ*, signifie deux especes de crêtes spongieuses, sensibles au toucher, d'un rouge vermeil & fermes dans les jeunes filles, une de chaque côté, qui descendent en grossissant jusques vers le milieu de la vulve. Elles ne sont ni de même longueur dans tous les sujets, ni toujours de même grosseur l'une que l'autre : elles s'alongent tellement dans quelques femmes, sur-tout en Afrique, qu'on est obligé de les couper, autrement elles incommoderoient en s'asseyant, en marchant, & même dans l'acte vénérien. L'excision des nymphes a lieu en Orient sous le nom de circoncision. *Voyez au mot* HOMME.

O.

OAILLE. *Voyez à l'article* PHOLADE.

OBIER ou AUBIER ou OPIER, *opulus*. C'eſt un arbriſſeau qui ſe trouve en Europe & dans l'Amérique Septentrionale, & dont il y a pluſieurs eſpeces: l'une aſſez jolie, qui croît dans les haies; & l'autre que l'on cultive dans les jardins. Les rameaux de la premiere eſpece ſont fragiles, & remplis d'une moelle blanche comme le ſureau. Ses feuilles ſont découpées en trois lobes. Ses fleurs ſont blanches, odorantes, diſpoſées en parafol; mais de deux ſortes. Celles de la circonférence ſont plus grandes que les autres: elles ſont découpées en roſettes à cinq quartiers inégaux, & ſont ſtériles; les fleurs plus petites, qui ſont au centre, ſont en godets, découpées auſſi en cinq quartiers, & contenant le même nombre d'étamines. Celles-ci ſont hermaphrodites: on voit ſuccéder à ces fleurs des baies molles, aſſez ſemblables à celles du ſureau, mais plus grandes & rouges. Elles ſont vomitives & purgatives; ſouvent cet obier s'appelle le *ſureau d'eau*. L'obier du Canada eſt le *pemina*.

L'arbriſſeau que l'on cultive pour faire des boſquets, &c. ne differe du précédent que par ſes fleurs, qui étant blanches ou quelquefois purpurines & ramaſſées en un globe épais, font un coup d'œil charmant: toutes les fleurs en ſont ſtériles. On donne à cet arbriſſeau divers noms, tels que ceux de *roſe-gueldre* ou *pelote de neige*, (c'eſt l'obier à fleurs doubles) ou *pain blanc* ou *caillebote*. Cet arbriſſeau s'éleve à douze ou quinze pieds, & ſe multiplie facilement par marcottes ou par drageons enracinés. Il ſe plaît de préférence dans les lieux humides & gras: il fleurit en Mai; ſes fruits mûriſſent à la fin de Septembre, mais ils ne ſont bons qu'après l'hiver. Ils reſtent long-temps ſur l'arbre après la chute des feuilles. Les oiſeaux ſont fort friands des baies de l'obier; ainſi il eſt propre à être planté dans les remiſes: on met ſes fleurs dans les appartemens pour le

plaisir de la vue & de l'odorat. La rose-gueldre dont les fleurs sont ramassées en rond, produit un effet des plus agréables dans les parterres.

OBIER ou AUBIER, est la couche ligneuse qui se trouve immédiatement sous l'écorce du tronc des arbres. *Voyez au mot* ARBRE.

OBLETIA. M. *le Monnier* a appelé ainsi un genre de plante, du nom de M. *Oblet* Botaniste François qui a enrichi le *Jardin Royal des Plantes* d'une quantité de semences qu'il a rapportées de Cayenne & de l'Ile de France. On a démontré cette année (1771) dans le Jardin Royal une plante de ce genre sous la dénomination de *Verbenna Americana tubo floris longissimo*. Le Professeur en a reçu la graine, il y a trois ans, de l'Amérique Septentrionale, dans des terres de *miclos*.

L'*obletia* est une plante vivace qui se conserve ici l'hiver dans l'orangerie; elle réunit à la beauté l'avantage d'être en fleur une très-grande partie de l'année. La fleur est de couleur pourpre, & à quatre étamines: les semences sont brunes, les feuilles sont en forme de cœur & opposées; la tige qui est haute de deux ou trois pieds, est rougeâtre, quadrangulaire, très-velue: la racine est blanchâtre, fibreuse & chevelue.

OBSIDIENNE. *Voyez* PIERRE OBSIDIENNE.

OCÉAN. C'est cette immense étendue de mer qui embrasse les grands continens du globe que nous habitons. L'océan ne comprend pas en général toutes les mers, comme toutes celles qui sont resserrées & enfermées dans de certains espaces de terres. *Voyez au mot* MER.

OCELOT. Animal du nouveau monde, d'un naturel féroce & carnassier, & qui ressemble assez pour la figure au *jaguar* & au *couguar*. Voyez ces mots. Le mâle, dans cette espece de quadrupede, est de tous les animaux tigrés celui dont la robe est la plus belle & la plus élégamment variée. On y voit beaucoup de fleurs & d'ornemens qui manquent à celle de la femelle, dont les couleurs sont en général moins vives. On a vu en 1764 deux de ces jeunes animaux à Paris, à la foire S. Ovide: ils avoient été apportés des terres voisines de Carthagene. A trois mois ces ingrats furent déjà

assez forts & assez cruels pour tuer & sucer une chienne qu'on leur avoit donnée pour nourrice; ils lui déchirerent la tête, & sucerent jusqu'à la derniere goutte de sang.

Ces animaux arrivés à leur grandeur naturelle, peuvent avoir deux pieds & demi de haut, sur quatre pieds de longueur: ils sont plus altérés de sang qu'avides de chair, c'est pourquoi ils font beaucoup de meurtres pour se rassasier ou étancher leur soif ardente. Ils grimpent sur les arbres, d'où ils épient les animaux & fondent sur eux; ils sont cependant timides; & lorsqu'ils sont poursuivis par des chiens, ils se sauvent en grimpant promptement aux arbres les plus voisins.

Parmi ces animaux le mâle prend sur la femelle un empire bien décidé; il n'a aucun égard pour elle; celle-ci tremblante n'ose point toucher à ce qu'on leur donne à manger, que le mâle, brute & sauvage, ne soit tout-à-fait repu & ait rassasié son appétit vorace: elle attend même patiemment que le mâle daigne lui jeter quelques morceaux dont il ne se soucie plus. Je suis humilié de connoître des hommes qui ont les mœurs de l'ocelot....

OCHRE, *ochrus folio integro capreolos emittente.* Plante qui croît dans les champs des pays chauds, entre les blés. Sa racine est fibreuse, & pousse des tiges qui ne ressemblent pas mal à celles de la gesse. Ses feuilles sont oblongues, les unes simples, les autres composées d'autres feuilles rangées par paires, & terminées par des vrilles. De l'aisselle des feuilles naissent des fleurs légumineuses, blanches & succédées de fruits en gousses ou cosses, lesquelles contiennent cinq ou six graines arrondies, de couleur d'ochre obscure. Cette plante est estimée résolutive.

OCHRES, *ochræ, terræ metallicæ*, sont des terres plus ou moins mélangées, grasses, pesantes, qui ont de la saveur & une couleur dont l'intensité s'augmente par l'action du feu; quelquefois, mais rarement, elles y entrent en fusion, & donnent un culot demi-métallique ou métallique: propriétés qui font regarder les ochres comme terres métalliques. Effectivement on en tire facilement le métal en y joignant une matiere

inflammable qui lui rend le phlogistique qu'il avoit perdu.

Wallerius dit qu'il n'y a que les métaux qui peuvent être dissous par l'eau qui donnent des ochres chacun selon leur espece ; c'est par la même raison, dit-il, qu'il y a différens vitriols.

L'ochre n'est point un métal proprement dit, mais une décomposition, une terre métallique, qui se sépare du vitriol après qu'il a été dissous dans l'eau, & se précipite : elle est d'une consistance terreuse, & l'origine en est probablement dûe à la décomposition des pyrites sulfureuses, martiales, &c. d'autant plus que quantité d'ochres de Suede en sont encore chargées. Parmi les ochres, il y en a d'une consistance pulvérulente ; & d'autres qui sont par croûtes, placées dans la terre, les unes au dessus des autres : on les reconnoît par la couleur qu'elles tiennent des métaux dont elles sont formées ; par leur poids qui surpasse celui des terres ordinaires, & par leur réduction. On trouve les ochres dans la plupart des sources minérales : ce sont ces substances qui en alterent la transparence, & qui ensuite se déposent au fond des couloirs ou des bassins sous la forme d'une rouille. On rencontre encore l'ochre dans les terres bolaires & dans quelques marnes. Voici les différentes sortes d'ochres.

L'*ochre de zinc*, est une *terre calaminaire*, qui contient du *zinc*, & communément du *fer*. Voyez *les mots* ZINC & PIERRE CALAMINAIRE.

L'*ochre de cuivre*, est un cuivre dissous & précipité dans l'intérieur de la terre. Selon le degré de couleur de cette substance, on lui donne différens noms : celle qu'on appelle *vert de montagne*, *terre verte*, *terre de vérone* ou *ochre verte*, est ou en poussiere, ou en morceaux solides de couleur verte brunâtre, grasse au toucher comme de la glaise, & contenant très peu de terre métallique. La *terre* ou *cendre bleue de montagne* est aussi une ochre de cuivre : elle se trouve en Auvergne en petits grains poreux & friables. La *terre mêlée de bleu & de vert* participe du fer & du cuivre, & a pour matrice ordinaire une terre argileuse, mêlée d'un gubr de craie. L'ardoise ou la pierre schisteuse, qui est de-

venue une mine de cuivre, telle que celle qu'on trouve en Allemagne, doit ce métal à la décompoſition d'un vitriol de cuivre.

L'*ochre de fer* eſt effectivement une terre ferrugineuſe, précipitée, qui n'eſt minéraliſée, ni par le ſoufre, ni par l'arſenic; & qui de jaune ou de brune qu'elle eſt ordinairement, devient rouge au feu, comme l'argile à brique; enfin, qui peut, à l'aide d'un phlogiſtique, produire une petite quantité de fer caſſant à chaud.

L'*ochre jaune* eſt d'une conſiſtance peu ferme, friable: elle a la propriété de tacher les mains. Il s'en trouve des minieres dans le Berry, dont les lits ou couches ont depuis cinquante juſqu'à cent & deux cents pieds de profondeur, & de l'épaiſſeur de quatre juſqu'à huit pouces: au deſſus eſt un lit de ſablon blanc, au deſſous une couche de terre argileuſe, d'un jaune plus ou moins foncé; on l'appelle dans le commerce *terre jaune*, *jaune de montagne* & *ochre jaune*; on s'en ſert en peinture.

On trouve auſſi dans les boutiques, ſous le nom de *terre* ou *jaune de Naples*, *giallolino*, une autre ſubſtance peſante, quoique poreuſe, également utile en peinture. On eſt encore incertain ſi ſon origine eſt dûe aux volcans, ou ſi c'eſt un tuf ochreux, jaunâtre, formé, ſoit par précipitation, ſoit par dépôt; ou ſi c'eſt une préparation de l'art, au moyen de l'antimoine.

L'*ochre brune* n'eſt que le jaune de montagne altéré par une couleur étrangere: elle reſſemble tantôt à l'*ochre de rue des Peintres*, laquelle n'eſt que la terre jaune calcinée ou colorée en jaune ſafrané; & tantôt à la *terre cimolée* ou *moulard des Couteliers*. Voyez *ces mots*.

L'*ochre rouge naturelle* ou *rouge de montagne*, eſt d'une couleur plus ou moins foncée, & acquiert encore de l'intenſité au feu: elle eſt friable; on l'emploie, ainſi que le *jaune de montagne*, dans la groſſe peinture à l'huile, & en détrempe pour mettre les planchers en couleur. On nomme *rouge d'Inde* ou *d'Eſpagne*, l'*ochre de Murcie*, eſpece de *rubrique*: il eſt ſec, peu dur: on s'en ſervoit autrefois pour rougir les talons des

ſouliers ; c'eſt le *brun rouge*, dont les Frotteurs ſe ſervent en France. On en envoie une autre eſpece d'Angleterre, qui a été plus calcinée par la nature ou par l'art ; les Ouvriers l'appellent *potée de montagne*, ou *rouge-brun* ou *biauty* : on s'en ſert aux mêmes uſages que les précédentes, & pour polir les glaces.

Lorſque ces ſortes d'ochres font effervescence avec les acides, elles décelent alors un mélange de craie. La connoiſſance des terres avec leſquelles les ochres ſont mêlées, eſt très-importante.

La *terre d'Ombre*, *terra Umbria*, eſt très-connue par ſon uſage pour les couleurs : elle eſt moins une ſorte d'ochre brunâtre qu'une terre bitumineuſe, ſubtile, légere, abondante en glaiſe & en matiere inflammable qui exhale une odeur fétide de charbon de terre : elle devient blanche par la calcination ; on l'appelle quelquefois *brun de montagne* ou *ochre brune* : celle de Nocera en Ombrie, pays d'Italie, eſt préférée à celle de Salberg en Suede, & à celle des Cevennes en Languedoc.

La *terre de Cologne* eſt d'un brun noirâtre, graſſe au toucher, en poudre ou en maſſe, s'imbibant difficilement d'eau, répandant une odeur bitumineuſe, bien plus fétide & plus déſagréable que la *terre d'Ombre*. On la nomme *terre de Cologne*, parce qu'elle nous vient des environs de cette ville : on en trouve auſſi dans une tourbiere du Duché de Berg. En Saxe on s'en ſert en teinture ; & dans la plupart des pays elle eſt utile en peinture. Ces deux dernieres terres ſont très-bitumineuſes, & contiennent très-peu de terre métallique. On pourroit les ranger dans la claſſe des terres minérales & inflammables. Combien de végétaux qui, en ſe décompoſant, ſe trouvent minéraliſés par certaines eaux, & n'offrent plus qu'une ſubſtance friable & ſemblable à la terre de Cologne, ou à la terre d'Ombre : on rencontre auſſi dans quelques terrains tourbeux & marécageux des couches pénétrées d'un ſuc bitumineux, & qui reſſemblent abſolument à la terre de Cologne qui ſeroit d'un beau brun & en maſſes.

Enfin, on trouve ſouvent dans la deuxieme couche de la terre d'étang ou de prairie un tuf d'ochre diſpoſé

par lits : ailleurs on rencontre des ochres qui contiennent du charbon, de l'alun, &c. *Gmélin*, dans la *Relation de son voyage en Sibérie*, *Vol. II*, *p. 59*, dit avoir trouvé une ochre de plomb mêlée avec de l'argent & de l'or : on doit encore regarder le crayon rouge ou *sanguine des Peintres*, & quantité de mines limoneuses comme une sorte d'ochre de fer.

Divers Minéralogistes regardent aussi les guhrs des métaux comme des especes d'ochres : mais on n'a que trois sortes d'ochres qui proviennent des métaux dont on a des vitriols connus ; c'est-à-dire, formées de la décomposition des métaux qui se vitriolisent ; savoir, du *zinc*, du *cuivre* & du *fer*. Selon la nature de la décomposition, de la précipitation & des mélanges accidentels, ces terres paroissent sous différentes couleurs. En général, les ochres sont astringentes & dessicatives.

OCOCOLIN. Les Mexicains donnent ce nom à une espece de pic & à une perdrix de montagne de leur pays.

Le *pic ococolin* est d'un plumage magnifique, d'un noir d'ébene, varié çà & là d'un bleu céleste & éclatant ; le bout de ses plumes est coloré du même bleu ; sa gorge est d'un pourpre très-vif ; son ventre & ses cuisses sont d'un bleu mourant : on l'apporte du Mexique & des forêts de Tetzcocanara au Brésil.

La *perdrix ococolin* habite les montagnes du Mexique : elle est de la taille de notre corbeau, & porte sur la tête une longue & belle crête ; son bec est rougeâtre ; ses yeux sont brillants & défendus par des paupieres d'un rouge de sang ; le plumage du corps est d'un brillant d'or mêlé de bleu & de vert : les ailes sont peintes d'un pourpre clair, le bout des grosses plumes est noirâtre, ses pieds sont courts, gros, & ses doigts garnis de forts ongles. La perdrix ococolin nous paroit être une espece de *faisan*. Voyez ce mot.

L'*ococolin* d'Europe est notre *perdrix de montagne*. Voyez ce mot.

OCOSOL ou OCOSCOL. *Voyez à l'article* STYRAX.

OCOZOALT, c'eſt une eſpece de ſerpent à ſonnettes, qui ſe trouve au Mexique dans la Province de Tlaſcala, & dont la morſure eſt mortelle : il a autant de ſonnettes au bout de la queue qu'il a d'années ; il les fait mouvoir violemment & ſonner fort : il a deux dents courbées dans la mâchoire ſupérieure qui communiquent ſon venin : ceux qui ſont bleſſés de ce ſerpent, meurent en vingt-quatre heures avec de grandes douleurs : tout leur corps ſe fend, dit-on, en petites crevaſſes : les Sauvages mangent ſa chair, & les Médecins ſe ſervent de ſes dents & de ſa graiſſe. *Voyez l'article* SERPENT A SONNETTES *& le mot* BOICININGUA.

ODONTOPÊTRES, ou ODONTOLITES, ou OPHIODONTES. Voyez *Gloſſopétres.*

ŒDICNEMON. Nom que l'on donne quelquefois au *courlis de rocher*, & d'autres fois à l'*outarde*. Voyez ces mots.

ŒIL, *oculus*, eſt un des organes les plus admirables que les animaux aient reçu de la Nature : ſa propriété eſt de faire diſtinguer les différens objets qui ſe préſentent à la vue : l'œil dans les divers animaux varie, ou pour la figure, ou pour les propriétés mécaniques. *Voyez* ce que nous en avons dit entr'autres aux mots ARAIGNÉE, ŒIL A RÉSEAU à l'article INSECTE, & celui du CHAT : *voyez* auſſi l'article des SENS, qui eſt vers la fin du mot HOMME de ce Dictionnaire : nous y avons parlé de la vue & des appartenances anatomiques de l'œil ; organe qu'on peut regarder comme le miroir de l'ame, puiſque les paſſions ſe peignent d'ordinaire dans cet organe nerveux, voiſin du cerveau & abondant en eſprits, qui ne peuvent manquer d'y exprimer les états divers qui les agitent.

ŒIL DE BŒUF ou FAUSSE CAMOMILLE, *buphtalmum vulgare*, eſt une plante qui croît dans les champs, aux bords des chemins, dans les ſentiers & dans les ravines, en Allemagne, en Italie, en Provence, &c. Sa racine eſt dure, ligneuſe & vivace : elle pouſſe des tiges hautes d'un pied & demi, grêles, un peu velues : ſes feuilles ſont découpées comme par paires, dentelées aux bords & lanugineuſes : ſes fleurs ſont jaunes & radiées comme celles de la camomille,

reſſemblantes à l'œil d'un bœuf : il leur ſuccede vers la fin de l'été des ſemences menues & anguleuſes. Cette plante eſt déterſive, vulnéraire & réſolutive : on la cultive dans les parterres, parce qu'elle produit beaucoup de fleurs, qui, quoique inodores, ſont aſſez agréables à la vue. *Jean Bauhin* dit que ſes fleurs ont toutes les facultés de la camomille odorante, & qu'on peut l'employer en place des ſommités d'abſinthe. Il y a quelques cantons d'Allemagne où les Payſannes en ramaſſent les fleurs aux mois de Juin & de Juillet; elles les ſechent & les gardent pour le beſoin ; elles en frottent même leurs lits au lieu de ſafran. On eſtime beaucoup dans le Nord la teinture jaune qu'on tire des fleurs de cette plante.

ŒIL DE BŒUF. On donne auſſi ce nom à un oiſeau d'Afrique, qui ſe trouve à Sierra Leona & au Cap de Bonne-Eſpérance ; on l'appelle auſſi *élanceur :* ces noms lui conviennent, 1°. à cauſe de ſes mouchetures blanches, cerclées de noir, & qui ont l'apparence d'autant d'yeux; 2°. à cauſe de la légéreté avec laquelle il s'élance pour fuir ou pour attaquer ce qui le bleſſe.

ŒIL DE BŒUF. *Voyez à l'article* VENTS.

ŒIL DE BOUC. On donne ce nom à une eſpece de *pyretre*, de *marguerite* & au *lépas :* voyez ces mots.

ŒIL DE BOURIQUE. Les François donnent ce nom au fruit d'un phaſéole ſauvage qui croît à la Martinique.

ŒIL DE CHAT ou BONDUC. *Voyez* POIS DE TERRE.

ŒIL DE CHAT, *oculus cati*, eſt une eſpece d'agate dont la pâte eſt très-fine, tranſparente, dure, d'un gris de paille, ou jaune, ou verdâtre ; des accidens heureux lui donnent des taches qui ont quelque reſſemblance avec l'œil d'un chat, & les Lapidaires les taillent fort adroitement. L'œil de chat quand il eſt parfait doit avoir un point dans le milieu, d'où partent en rayonnant ou chatoyant des traces & des cercles, rarement de couleur roſe, mais verdâtres, très-vifs, couleur de poireau, comme entre-mêlés de taches dorées, & dont l'enſemble rend aſſez bien le brillant de l'œil d'un chat. Cette pierre, qui eſt ſuſceptible d'un

beau poli, produit un effet assez agréable quand on l'expose entre la lumiere & l'œil. L'œil de chat est très-rare & très-estimé quand il est dans sa perfection: l'on en voit un dans le cabinet du Grand Duc de Toscane, qui est plus gros que le pouce.

ŒIL DE CHRIST. *Voyez à l'article* ASTER.

ŒIL DU MONDE, ou CHATOYANTE DES LAPIDAIRES, *oculus mundi aut lapis mutabilis Gemmariorum.* Cette pierre à peine demi-transparente est un caillou naturel, très-rare; peu de Naturalistes en ont parlé. *Cnoeffel* l'a nommée *pierre caméleon; Hill* l'a rangée dans le genre des pierres hydrophanes. Elle est grise, roussâtre, ou cendrée, & entrecoupée de veines jaunâtres: elle est assez dure, cependant peu pesante, un peu poreuse, reçoit bien le poli, & réfléchit fortement les rayons de la lumiere; de façon qu'étant exposée au soleil, elle reluit & en réfléchit continuellement l'image avec un éclat qui fait plaisir, effet que l'on appelle *chatoyant:* voyez CHATOYANTE.

L'espece de pierre chatoyante la plus rare se reconnoît par la propriété de paroître en quelque sorte opaque à l'air, c'est-à-dire étant seche, & de s'éclaircir étant plongée dans l'eau, mais de reprendre peu-à-peu son premier état au sortir de l'eau & à mesure qu'elle se seche. Ce phénomene seroit-il dû à des particules d'eau limpides qui s'insinuant dans les petits pores de la pierre, en rempliſſent les espaces, & se réfléchissent elles-mêmes? M. le Docteur *Maty* nous a fait voir cette expérience sur une telle pierre qui est au *Musæum* de Londres; M. *Vosmaër*, Directeur des Cabinets du Stathouder, nous en a montré une qui a la même propriété. L'une & l'autre ressemblent à une petite lentille, un peu laiteuse au centre. Nous avons répété les expériences connues sur cette pierre, & nous avons en effet observé avec admiration qu'en la plongeant dans de l'eau, elle y devenoit peu-à-peu transparente & changeoit de couleur. Il n'est pas nécessaire de la mouiller entiérement, la moitié ou même une moindre partie de son épaisseur suffit. Quand on veut qu'elle redevienne plus promptement opaque, ou dans son premier état, il faut l'essuyer au sortir de l'eau,

& en l'examinant ainſi, on voit bientôt naître un point blanc & opaque au centre; ce point s'augmente peu-à-peu, il s'étend & l'opacité augmente auſſi peu-à-peu, & paſſe de ſa ſurface au milieu & juſqu'au fond de l'épaiſſeur de la pierre. Plus la pierre a été deſſéchée, & moins promptement la tranſparence aura lieu; ſi elle a été mouillée depuis peu de jours, elle change ſur le champ par l'immerſion, & augmente un peu en peſanteur. Cette augmentation de poids réel prouve évidemment qu'elle abſorbe une quantité de liqueur qui lui eſt néceſſaire pour devenir tranſparente. En général, ſon retour à l'opacité commence plutôt & s'acheve plus lentement que le paſſage à la tranſparence, ſur-tout ſi on a employé l'eau chaude & pure. Les acides n'ont point de priſe ſur cette pierre. Les liqueurs éthérées ne changent pas ſenſiblement ſa couleur & ſes effets. L'huile de tartre l'éclaircit, & ſemble détruire la mutabilité de cette pierre. On peut conſulter les *Obſervations de M.* Van Winperſe *ſur la pierre chatoyante.*

Cette chatoyante nous vient, ainſi que l'œil-de-chat, de l'Arabie & de l'Egypte: on en trouve auſſi en Chine.

ŒIL-DE-PAON. Nom donné à un beau papillon de jour provenant d'une chenille épineuſe, à fond noir, piqué d'un peu de blanc, qui ſe nourrit de feuilles d'orties. Ce papillon *œil-de-paon* eſt connu de tous les Curieux d'inſectes: mais il ne faut pas le confondre avec le *paon de nuit*, qui eſt une belle eſpece de phalene dont la chenille ſe plaît ſur l'abricotier, le pêcher, le prunier & autres arbres fruitiers. La chenille du *petit paon* ſe trouve ſur la ronce & le roſier. *Voyez* CHENILLE A TUBERCULES & CHENILLE ÉPINEUSE.

ŒIL-DE-SERPENT, en Italien *occhio di ſerpe.* Les Joailliers donnent quelquefois ce nom à la *crapaudine* ou *buſonite*, laquelle n'eſt que la dent molaire, de forme hémiſphérique ou oblongue, ſoit de la dorade, ſoit du grondeur. D'autres fois ils appellent ainſi les taches cerclées d'une ſorte d'agate, connue ſous le nom d'*onix*, que l'on taille de façon à repréſenter un œil. *Voyez les mots* CRAPAUDINE & ONIX.

ŒILLET, *caryophyllus major hortensis*. C'eſt une plante que l'on éleve dans les jardins, à cauſe de la beauté de ſes fleurs, de leur douce odeur, & de ſa taille légere. Sa racine eſt ſimple & fibreuſe : ſes tiges ſont nombreuſes, liſſes, cylindriques, hautes d'une coudée, genouillées, noueuſes & branchues : ſes feuilles naiſſent de chaque nœud deux à deux ; elles ſont longues, étroites, dures, épaiſſes & verdâtres. Les fleurs naiſſent aux ſommets des tiges ; elles ſont à pluſieurs feuilles diſpoſées en rond, légérement dentelées, ſouvent de différentes couleurs, & d'une odeur douce de clou de girofle. Le calice eſt d'une ſeule piece en tube découpé à ſon extrémité en cinq dents, & garni à ſa baſe de deux paires d'écailles ; ce qui fait, dit M. *Deleuze*, le principal caractere de ce genre. Le piſtil des fleurs devient dans la ſuite un fruit arrondi, rempli de ſemences aplaties, comme feuillées & noires.

Qualités des Œillets.

Il y a un grand nombre de ces fleurs qui forment un genre de plante. M. *de Tournefort* en diſtingue quatre-vingt-neuf eſpeces qui different par la grandeur, la couleur & le nombre des pétales. Toutes ces variétés viennent de la différente culture, & font regarder l'œillet comme la premiere des fleurs. Les noms que les Fleuriſtes donnent aux œillets, ſont nombreux, & dépendent de la fantaiſie des Amateurs, qui les appellent, par exemple, le *Duc de Candale*, le *Grand-Céſar*, le *Grand-Cyrus*, la *Beauté triomphante* : ce dernier eſt un œillet d'un rouge de ſang ſur un blanc de lait, &c. Les œillets qu'on diſtingue communément ſont les *violets*, les *rouges*, les *incarnats*, les couleurs de *roſe*, les *piquetés* & les *œillets tricolors*. L'œillet de la Chine eſt décrit par *Tournefort* dans les *Mémoires de l'Académie Royale des Sciences*, *ann.* 1701, *Caryophillus Sinenſis*, *ſupinus*, *leucoii folio*, *flore vario aut pleno*. Les œillets les plus eſtimés aujourd'hui par les Fleuriſtes, ſont, dit M. *Bourgeois*, les œillets jaunes piquetés de cramoiſi ; mais ſur-tout les *œillets d'un jaune citron* de trois pouces de large, ſans mouchetures, & qui ne

crevent point. Ces œillets n'étoient point connus dans la Suisse il y a vingt ans, ils y sont venus d'Hollande; ce sont des œillets de graine que le hazard a produit. On a encore une nouvelle espece d'œillet, qu'on appelle *œillets de plume*, parce qu'ils ressemblent parfaitement à ces œillets artificiels qu'on fait de plumes d'oiseaux à Venise : le cœur de cette fleur est d'un cramoisi foncé, & les feuilles du tour sont d'un blanc de neige : on les estime sur-tout parce qu'ils fleurissent un mois avant les autres especes ; mais ils sont fort délicats & périssent souvent en hiver par l'humidité & la gelée. *Bradley* & *Miller* ont trouvé qu'on pouvoit assez commodément diviser le genre des œillets en cinq ordres, qu'ils distinguent par les noms d'*œillets piquetés*, de *dames-peintes*, de *bizarres*, d'*étincelans* & de *flambés*. Les piquetés ont le fond blanc & sont tachetés de rouge; les dames-peintes ont les pétales blancs en dessous & tachetés de rouge en dessus. Les bizarres sont rayés & diversifiés de quatre couleurs. Les étincelans ne sont que de deux couleurs, mais toujours par raies. Enfin les flambés ont un fond rouge, toujours rayé de noir ou de brun très-foncé : aujourd'hui nos Auteurs y ajouteroient les *œillets jaunes* & les *œillets de plume*.

Un œillet pour être parfait doit avoir les panaches bien opposés à la couleur dominante, & nullement confondus avec elle. Ces panaches doivent s'étendre sans interruption, depuis la racine des feuilles jusqu'à leur extrémité. Les gros panaches, par quart ou par moitié, sont plus beaux que les petits. Un bel œillet doit avoir trois pouces de large, & neuf ou dix de tour: ceux qui en ont quatorze sont trop sujets à crever. L'œillet doit se terminer en formant une houpe ronde ; il ne doit pas avoir une trop grande quantité de mouchetures, ni de dentelles, qui le brouillent & le hérissent, & les feuilles ne doivent point s'alonger en pointe.

Culture des Œillets.

On les peut élever de graines, de marcottes & d'œilletons : mais on les multiplie plus souvent par les marcottes que l'on sépare des pieds, que par la graine:

car les fleurs qui viennent sur les pieds élevés de graine, deviennent sauvages, & donnent des fleurs communément plus petites, variées, mais toujours moins odorantes & simples, quoique la semence ait été tirée d'œillets à fleur double.

La terre qu'on donne aux œillets, doit être réglée sur l'espece dont ils sont : les *violets*, les *pourpres*, les *rouges*, les *piquetés*, demandent une terre composée d'un tiers de sable noir, qui se trouve sur le bord des eaux ; l'autre tiers, moitié de terreau de cheval & moitié de terreau de vache, bien pourris, & un tiers de terre douce & moelleuse, le tout mêlé, passé à la claie & au crible quand on veut les emporter : les *incarnats* veulent une terre composée moitié de terreau bien pourri, moitié de sable noir ou de terre taupiniere. La marcotte des œillets dure depuis le 20 Juillet jusqu'au mois d'Août : elle se fait au milieu du nœud, près de la racine. Dans l'hiver il faut les garantir du froid, au moyen des paillassons ou de la serre; arroser au besoin, & les éloigner des murailles, afin que l'air circule autour d'eux également. Il faut encore ménager les feuilles, soutenir les tiges avec des baguettes, & les y attacher avec des fils ; ôter les nœuds du dard & du pied, afin que le maître bouton réussisse ; faire la guerre aux poux verts, aux pucerons, aux chenilles, & particuliérement aux perce-oreilles, qui ruinent cette fleur. Les soins de la culture relevent beaucoup la beauté & les graces que les œillets ont reçu de la nature. On récolte la graine à la fin de Septembre, & on la seme à la fin de Mars. On peut consulter *Bradley* & *Miller* sur la culture des œillets.

Propriétés des Œillets.

L'odeur des œillets est subtile, pénétrante & d'une odeur de girofle très-agréable : on les recommande, sur-tout ceux dont la couleur est d'un beau rouge pourpré, dans toutes les maladies de la tête & du cœur, mais sur-tout dans les maladies malignes & pestilentielles. Quelques-uns vantent le suc de cette plante entiere comme propre à résister au venin. On prépare dans

dans les boutiques un sirop, *sirupus de tunica*, une conserve, un vinaigre, une poudre & une eau distillée d'œillets : l'eau excite les sueurs ; le vinaigre d'œillets rouges a une saveur & une odeur agréables. Dans les temps de peste, on en imbibe des linges qu'on flaire, & dont on frotte les tempes : on en prend aussi deux cuillerées le matin. La conserve & le sirop d'œillet sont estimés en Médecine comme de grands cordiaux : on fait aussi un ratafiat d'œillet domestique très-agréable avec l'eau-de-vie, le sucre & un peu de cannelle.

ŒILLET-DE-DIEU ou PASSE-FLEUR, *lychnis*. Plante dont on distingue deux especes principales ; l'une cultivée & l'autre sauvage.

1°. La PASSE-FLEUR CULTIVÉE, *lychnis vulgaris*. On cultive cette plante dans les jardins : sa racine est fibreuse, & pousse des tiges hautes d'un pied & demi, droites, rameuses & cotonnées : ses feuilles sont longues de trois ou quatre doigts, larges d'un doigt, pointues, lanugineuses & molles : ses fleurs sont composées de cinq feuilles disposées en œillet, garnies vers leur centre de deux ou trois pointes qui, jointes à celles des autres feuilles, forment une couronne au milieu de cette fleur : sa couleur est variée quelquefois d'un rouge enflammé, d'autres fois d'un rouge clair ou incarnat, ou blanche. A cette fleur passée succede un fruit de figure conique qui s'ouvre par la pointe, & prend souvent la figure d'un pot : il contient deux semences arrondies.

2°. La PASSE-FLEUR SAUVAGE, *lychnis sylvestris, alba simplex*. Lémery dit que sa racine est longue de trois pieds, grosse quelquefois comme le poignet, blanche, fendue, & plongée profondément en terre, d'un goût âcre & amer. Les autres parties de la plante ressemblent assez à celles de l'espece précédente : elle croît dans les champs proche des haies.

Le suc de ces plantes aspiré par les narines excite l'éternument : leurs semences prises au poids de deux scrupules dans du vin, conviennent pour la piqûre du scorpion. La graine de *lychnis*, suivant *Dioscoride*, étoit autrefois en usage contre les morsures venimeuses des

ſerpens ; aujourd'hui on ne la voit guere recherchée que par les moineaux, & ſurtout par les chardonnerets.

ŒILLET FRANGÉ ou la MIGNARDISE, *dioſanthos*, eſt une eſpece d'œillet ſauvage ſimple, dont les fleurs ſont petites & découpées comme la barbe d'une plume, de couleur blanche ou incarnate ; & comme elle repréſente par la fineſſe de ſes découpures les franges ou effilures du linge qu'on porte dans le deuil, on l'a nommée effilée : ſes fleurs ſont propres à réſiſter au venin.

ŒILLET-D'INDE, *tagetes*. Plante de genre & de claſſe entiérement différens de l'œillet, & dont on diſtingue deux eſpeces principales.

1°. Le GRAND ŒILLET D'INDE, *Caryophyllus Indicus major*. Sa racine eſt fort fibreuſe ; elle pouſſe une tige haute d'environ trois pieds, groſſe comme le pouce, nouée, rameuſe, pleine de moelle : ſes feuilles reſſemblent à celles de la tanaiſie ; leurs bords ſont tiquetés de points tranſparens qui ſont des glandes véſiculaires : ſes fleurs naiſſent ſeules aux ſommets, belles, garnies, radiées, rondes & quelquefois groſſes comme le poing : elles ſont, dit M. *Deleuze*, compoſées d'un diſque de fleurons & d'un petit nombre de demi-fleurons portés ſur un placenta ras, & ſoutenus par un calice d'une ſeule piece en godet à cinq pointes. A ces fleurs ſuccedent des ſemences rondes, couronnées de pointes inégales & noirâtres.

2°. Le PETIT ŒILLET D'INDE, *caryophyllus Indicus minor*. Sa racine eſt courte & fibrée ; elle jette des tiges hautes d'un pied, moelleuſes : elle reſſemble pour le reſte à l'eſpece précédente.

On cultive les œillets d'Inde dans les jardins, à cauſe de la beauté de leur fleur. On diſtingue pluſieurs variétés du grand œillet d'Inde ; il y en a dont les fleurs ſont d'un jaune pâle ou de ſoufre, d'autres de couleur orangée : il y en a même à fleurs blanches ; toutes ces variétés ſont ou ſimples ou doubles, & elles ont une odeur peu agréable ; elles commencent à s'épanouir vers le mois de Juillet, & durent juſqu'aux gelées. Le grand œillet d'Inde vient originairement du Mexique : nous l'avons naturaliſé dans ce Royaume. Dès le mois

de Mai le petit œillet d'Inde commence à donner des fleurs jaunes veloutées, mêlées de roux & de couleur safranée; ces fleurs durent pendant tout l'été, & leur odeur n'eſt pas plus agréable que celle du grand œillet d'Inde.

Les Fleuriſtes cultivent depuis peu une nouvelle eſpece d'œillet d'Inde dont l'odeur eſt agréable.

L'œillet d'Inde ſe multiplie de graine; on la ſeme ſur une couche tempérée, & on la tranſplante quand elle a acquis un peu de force, elle ſe plaît dans preſque tous les terrains; quand on veut la conſerver pour l'hiver, il faut l'abriter de la gelée. Les Auteurs ſont peu d'accord ſur les vertus médicinales de cette eſpece d'œillet. *Hermandez*, dans ſon Hiſtoire des Plantes du Mexique, dit que le ſuc ou la décoction des feuilles provoque l'urine, la ſemence, les menſtrues & les ſueurs. *Dodonée* au contraire prétend que l'œillet d'Inde eſt un poiſon: il en cite pluſieurs exemples. En attendant que cette conteſtation ſoit décidée, il vaut mieux ne point mâcher ni avaler les feuilles de cette plante qui, employée extérieurement, eſt bonne pour déterger & pour réſoudre.

ŒILLET DE MER. Eſpece d'*aſtroïte* ou de production à polypier. Ce corps marin & organiſé eſt creuſé par des ſillons ondoyans ou feuilletés, & a en général la figure d'un œillet qui ſeroit comprimé & épanoui. *Voyez* MADRÉPORE.

ŒILLETON. *Voyez à l'article* PLANTE. Quand on détache avec la main les œilletons de l'œillet & de l'oreille d'ours, & qu'on les replante dans les pots, cela s'appelle *œilletonner*.

ŒNANTHE ou FILIPENDULE AQUATIQUE ou PERSIL DE MARAIS, *œnanthe*, plante dont on diſtingue deux eſpeces principales qu'il faut bien ſe garder de confondre enſemble.

1°. L'ŒNANTHE A FEUILLE D'ACHE, *œnanthe apii folio*. Ses racines ſont des eſpeces de navets noirs en dehors, blancs en dedans, ſuſpendus par des fibres longues, s'étendant plus en large qu'elles ne pénetrent avant dans la terre: elles ont un goût de panais. Ses feuilles ſont d'abord larges, répandues à terre, & ſem-

blables à celles du persil; ensuite elles prennent la forme de celles de la queue de pourceau. Il s'éleve d'entre elles plusieurs tiges hautes de deux pieds, rameuses, cannelées: ses fleurs qui paroissent pendant l'été, sont disposées en ombelles, composées chacune de cinq feuilles rangées en fleur de lys, de couleur blanche tirant sur le purpurin. Elles sont succédées par des semences jointes deux à deux, oblongues & cannelées. M. *Deleuze* observe que les fleurs de la circonférence de l'ombelle sont stériles: chaque graine est à cinq angles, couronnée d'un petit calice à cinq pointes, & du pistil. Les ombelles particulieres sont garnies à leur base d'une fraise de feuilles. Cette plante croît aux lieux marécageux: on la cultive aussi dans les jardins des Curieux. Sa racine qui ressemble un peu à celle de la filipendule, est apéritive, dissipe les vents & appaise les douleurs des hémorroïdes.

2°. L'ŒNANTHE A FEUILLE DE CERFEUIL, *œnanthe chærophylli foliis aut cicutæ facie, succo viroso, croceo*. Cette plante qui ne croît guere que dans les pays froids & septentrionaux, le long des ruisseaux en Angleterre, en Irlande & en Hollande, a beaucoup de rapport & de ressemblance avec la ciguë, même pour les propriétés. Ses racines sont des navets, comme celles de l'asphodele, blancs, attachés immédiatement à leur tête, sans aucunes fibres, remplis du même suc que la plante. Il sort de la racine plusieurs tiges hautes d'environ trois pieds, éparses, rondes, rameuses, portant des feuilles assez semblables à celles du cerfeuil, vertes brunâtres, d'un goût âcre & dégoûtant, remplies d'abord d'un suc laiteux, mais qui jaunit ensuite & devient virulent, puant, venimeux & ulcérant. Ses fleurs sont disposées en ombelles comme celles de la ciguë, composées de plusieurs feuilles rangées en rose ou en fleur de lys: elles sont succédées par de petits fruits, composées de deux semences oblongues & cannelées.

Cette espece d'œnanthe, appelée dans le pays de Galles *racine à cinq doigts*, & dans la Province de Cumberland, *langue morte*, est un poison corrosif, dangereux. Il cause dans le ventricule une ardeur très-douloureuse; il trouble la vue & l'esprit, resserre les

mâchoires, excite des hoquets & des efforts inutiles de vomir, des hémorragies par les oreilles, une tenſion conſidérable vers la région de l'eſtomac, & il en cautériſe la tunique nerveuſe. Les antidotes ou remedes à ce poiſon conſiſtent à boire beaucoup d'huile, de graiſſe ou de beurre fondu, de lait, & d'autres liqueurs onctueuſes qui puiſſent adoucir le ſuc rongeant de cette plante, & l'évacuer par haut & par bas. La ſaignée eſt encore utile en pareil cas. Dix-ſept priſonniers François dans la guerre de 1744 eurent la liberté de ſe promener à Pembroke & aux environs; ayant rencontré une grande quantité de cette plante forte, qu'ils prirent pour du céleri ſauvage, la cueillirent avec les racines, la laverent & en mangerent ſur le champ & en petite quantité la racine avec du pain & du beurre; deux en moururent, & les autres éprouverent une partie des ſymptomes annoncés ci-deſſus. M. *Haller* dit que c'eſt de l'œnanthe dont parle *Stalpaart wan der Wiel*, & que M. *Méad* a pris pour de la ciguë aquatique de *Wepfer*. C'eſt la même plante encore qui a été funeſte à quelques ſoldats François en Corſe, & qui pourroit bien être l'*herbe ſardoa* des Anciens.

Des Naturaliſtes ont auſſi donné le nom d'*œnanthe* à pluſieurs oiſeaux, tels que le *cul blanc*, le *traquet*, &c. *Voyez ces mots.*

ŒSIPE ou SUINT. *Voyez au mot* LAINE.

ŒSTRE, *œſtrus*. Genre d'inſecte diptere, c'eſt-à-dire à deux ailes, dont les antennes ſétacées, courtes & fort petites, naiſſent d'une groſſe baſe qui repréſente un bouton rond. Au lieu de bouche ce petit animal a trois points enfoncés qui lui ſervent probablement de ſuçoirs pour tirer quelque peu de nourriture liquide. Peut-être que l'œſtre devenu inſecte parfait, n'a plus beſoin de nourriture; cette propriété lui ſeroit commune avec pluſieurs autres inſectes.

Les larves de l'œſtre reſſemblent à des eſpeces de vers courts. On remarque à leur partie poſtérieure deux grands ſtigmates. Ces larves varient de figure ſuivant les différens endroits où elles vivent; on les

rencontre tantôt dans le fondement des chevaux, tantôt dans les cavités du nez des bœufs & des moutons, quelquefois sous la peau des bœufs. *Voyez à l'article* VERS DES TUMEURS DES BÊTES A CORNES, *& à l'article* TAON. A l'égard de l'œstre aquatique; *voyez* MOUCHE A CORSELET ARMÉ. *Voyez aussi* MOUCHES DES INTESTINS DES CHEVAUX, MOUCHE DE LA GORGE DU CERF, MOUCHE DU NEZ DES MOUTONS.

ŒUF, *ovum.* Ce nom se donne à la substance que pondent les femelles des oiseaux, des poissons, des lézards, de la plupart des serpens & des insectes; l'on dit ordinairement œuf de poule, œuf de tortue, œuf de carpe, œuf de fourmi, œuf de serpent, œuf de crocodile &c. Tous les animaux ovipares produisent une substance semblable; mais les uns couvent leurs œufs fécondés dans le sein de la mere, & les font éclore par la chaleur de l'incubation; tels sont les oiseaux: d'autres les déposent au fond des eaux pour être ensuite vivifiés par les mâles & perfectionnés dans ce même élément; tels sont les poissons proprement dits: d'autres enfin mettent bas leurs œufs, fécondés dans le sein de la mere, dans un lieu, où quand ils viennent à éclore par la chaleur de l'atmosphere, ils trouvent à se nourrir: tels sont la plupart des insectes qui naissent reptiles, & finissent par être volatiles; tels sont encore les lézards, les tortues & la plupart des serpens. On appelle ovaire, la partie de la femelle dans laquelle l'œuf se forme. Tous les animaux ovipares peuvent pondre, ou frayer & couver (un œuf proprement dit est ce total de quoi l'animal se forme;) mais ces œufs ne produiront rien s'ils ne sont fécondés par l'approche plus ou moins immédiate du mâle. C'est ainsi que la poulette met bas communément des œufs stériles; souvent des poulettes en font de petits qui n'ont point de jaune, & que le vulgaire superstitieux ou ignorant amateur du merveilleux & par préjugé d'éducation, attribue faussement au coq. Ces œufs se nomment *œufs blancs;* étant couvés ils ne produisent rien. *Voyez à l'article* COQ *l'extrait d'un Mémoire de M. de la Peyronie imprimé dans l'Histoire de l'Académie des Sciences, année 1710*, sous le titre d'*Observations sur les œufs de*

poule sans jaune, que l'on appelle vulgairement œufs de coq.

Il y a des poules qui pondent quelquefois des œufs sans écaille ou coque ; cela leur vient probablement, ou d'une maladie, ou par une grande fécondité, ou d'être trop grasses; il en est peut-être de même pour les gros œufs qui ont deux blancs & deux jaunes, *ova gemellifica*. On a cependant observé qu'ils sont ordinairement le fruit des poules jeunes, vigoureuses & lascives. Les jaunes sont toujours nus dans l'ovaire & dans les trompes, le blanc & la coque ne se forment jamais que dans la matrice ; de pareils œufs jumeaux & formés sont distincts & séparés dans l'ovaire, & dans le conduit des œufs ; mais parvenus à l'utérus, ils commencent par jaunir & sont ensuite enveloppés par le blanc & par la même coque. En pourroit-on dire autant de ces œufs qui contiennent un autre œuf, *ovum in ovo*, ayant également sa coque ? On nomme les œufs sans coque ou simplement recouverts d'une membrane, *œufs hardés ;* (on tenteroit inutilement de faire couver un tel œuf) & *œuf nain*, *ovum centeninum*, le petit & dernier œuf que la poule pond de la saison : il est aussi sans jaune. M. *Wolff* a montré aux Membres de l'Académie des Sciences de Pétersbourg un œuf simple, contenant dans un seul blanc & un seul jaune deux embryons développés par six jours d'incubation ; ce phénomene mérite une place parmi les faits les plus rares.

Pour compléter l'histoire de l'œuf, *voyez l'article* INSECTE, *celui de* POISSON *& celui d'*OISEAU. On verra dans ce dernier ce que contient l'œuf, & la maniere dont le petit s'y forme & en sort. Quelques Auteurs, & même le plus grand nombre des Modernes, pensent que tous les animaux & les hommes même sont produits *ab ovo*. Ce que les Anciens appelloient *testicules* chez les femmes, porte aujourd'hui le nom d'*ovaire*. On trouve les ovaires dans les filles, & divers Auteurs citent des femmes accouchées d'une quantité d'œufs plus ou moins considérable ; chacun de ces œufs est ordinairement de la grosseur d'un pois, il est fécondé, organisé & animé lorsqu'il est encore dans la femme. *Voyez l'article* HOMME.

Nous invitons instamment nos Lecteurs à consulter les *Considérations sur les corps organisés* & la *Contemplation de la Nature*, ils y trouveront l'esquisse la plus sublime, la plus profonde sur la maniere dont on peut concevoir la nutrition & l'accroissement des germes avant la fécondation dans l'hypothese de l'emboîtement. Ces Ouvrages savans & immortels du célebre M. *Bonnet* de Geneve, sont aujourd'hui dans les mains de tout le monde, & exigent des plus savans Physiciens, Naturalistes, Philosophes, &c. la plus grande attention & les méditations les plus profondes: je ne peux trop le dire, ces ouvrages font honneur au génie de M. *Bonnet:* s'ils effrayent l'imagination, ils élevent l'ame, étendent la pensée, offrent & crayonnent à l'entendement des vues vastes & de hautes idées de la puissance & de l'intelligence de l'Auteur qui a présidé à la construction des êtres organisés: en un mot ces ouvrages ne sont point susceptibles d'extrait. Parmi les poissons, il y en a dont les œufs sont venimeux, ou du moins qui purgent violemment: tels sont ceux du brochet, du barbeau, &c. Chez les oiseaux les œufs des premieres pontes sont moins gros que ceux de la seconde & de la troisieme.

On appelle *œufs frais*, ceux qui sont récemment pondus, & même tous ceux qui n'ont point encore perdu cette partie qu'on nomme le *lait* & qu'on trouve d'abord en les ouvrant, quand ils ne sont point trop cuits. Non seulement c'est une chose curieuse de conserver frais par leurs qualités des œufs qui sont vieux par le temps; mais il y a un avantage réel à se procurer toujours en bon état un aliment qui devient souvent équivoque quand il est gardé. Dans les voyages de mer, & dans les saisons où les poules ne pondent que très-rarement, c'est une véritable ressource qu'une provision d'œufs qui sont aussi bons que s'ils étoient nouvellement pondus. On sait que l'œuf exposé à l'air s'y corrompt par le laps du temps. Sous la machine pneumatique il se conserve sans se gâter. D'après ces principes connus, feu M. *de Réaumur* nous a offert un moyen fort simple, facile & très-sûr: il a conseillé de boucher les pores de la coquille de l'œuf avec un enduit

indissoluble à l'eau, tel que deux ou trois couches de vernis le plus commun, ou une légere couverture de graisse de mouton, ou d'huile, ou de cire liquéfiée. On a l'expérience qu'un œuf ainsi préparé & gardé six mois, fait encore le lait, & n'a pas le moindre mauvais goût. Cependant quand on veut les conserver plus surement & plus long-temps, il faut choisir des œufs qui n'ayent point été fécondés, autrement le germe étouffé sous le vernis ne manquera pas d'en corrompre une partie. Ces œufs vernis n'ont pas seulement l'avantage de se conserver bons, pour être mangés comme frais; ils ont encore celui de pouvoir être couvés en toute sureté, pourvu qu'on n'attende pas au-delà de six semaines; en pareil cas l'on ôte le vernis qui est sur la coque de l'œuf fécondé: ceci nous offre encore un moyen d'élever des oiseaux étrangers qu'on ne peut transporter vivans qu'avec beaucoup d'embarras, & qui pour l'ordinaire ne s'accouplent point hors de leur pays. Ces différentes manieres d'interdire la transpiration & l'accès de l'air extérieur dans les œufs & dans tous les corps que l'on veut préserver de corruption ou d'altération, expliquent en même temps la cause qui auroit fait conserver pendant trois cents ans trois œufs dans un mur d'Eglise dans le Milanez, & qu'on a trouvés après ce temps très-bons. En effet, un de ces œufs ouvert à l'instant n'avoit rien perdu de sa fraîcheur, odeur & saveur. Les deux autres ouverts huit jours après, commençoient à se gâter. Les Payfans se contentent de conserver leurs œufs dans de la sciure de bois, du son, de la cendre bien pressée dans un tonneau. Ils savent aussi que tout œuf vieux offre une cavité intérieure quand il est cuit, & que ce vide est la mesure de la quantité du liquide qui a transpiré au travers de la coque; ainsi un œuf frais doit être plein, ce qu'on reconnoît en le plaçant entre une lumiere & l'œil. Un œuf cuit pour être salutaire, doit être ni glaireux, ni dur, mais d'une substance molle & humide, comme le dit par ce vers, l'Ecole de Salerne:

Si sumas ovum, molle sit atque novum.

M. *Bourgeois* rapporte un fait singulier par rapport à

la conservation des œufs de poule, & dont il est difficile de donner une raison physique satisfaisante : c'est que les œufs pondus pendant le courant du mois d'Août, se conservent beaucoup mieux & ne se corrompent pas comme ceux pondus dans les autres mois de l'année : cependant de tous les mois c'est celui d'Août où les substances animales & même les végétales tendent plutôt & plus facilement à la corruption. Les Paysannes de la Suisse conservent presque tous leurs œufs du mois d'Août, pour les vendre pendant l'hiver dans les foires & les marchés, parce qu'ils sont beaucoup plus rares & plus chers. Quoique ces œufs ne soient pas aussi bons que les œufs frais, il est cependant rare qu'on en trouve de corrompus, & qu'on ne puisse employer aux usages de la cuisine.

Entre les animaux ovipares, il y en a qui, au sortir de l'œuf, se trouvent sous leur forme parfaite : ils ne la quitteront plus tant qu'ils vivront : tels sont la plupart des poissons & des amphibies cuirassés, les limaçons qui sortent de l'œuf avec une petite maison sur le dos, les araignées qui changent de peau, ainsi que les crustacées & les amphibies ; d'autres passent par différens états, tels que les insectes qui se métamorphosent ; la grenouille qui a d'abord une queue sans pieds, & & ensuite des pieds sans queue. Les oiseaux sortent de l'œuf avec une sorte de duvet, mais bientôt ils acquierent des plumes qui les garantissent du froid, de l'humidité, & leur servent à voler. Consultez le *Nouvel Art de faire éclore en toutes saisons des œufs d'oiseaux domestiques*, à la suite de l'article COQ.

Les œufs different entr'eux par le volume, par la dureté de la coque & la marbrure de cette enveloppe, dont le fond de la couleur est ou blanc, ou d'un bleu verdâtre, les taches sont ou noirâtres ou roussâtres : ils different aussi par la forme & par le goût de leur substance intérieure. Les œufs de serpent sont ronds, ceux d'autruche sont oblongs, également gros ou pyramidaux par les extrémités : ceux de poule ont un bout plus conique que l'autre ; enfin il y en a de longs & ronds comme un cylindre. Certains œufs d'insectes sont aigretés, ou bien ornés d'une espece de couronne

de poils. Ceux des poissons se couvrent d'une espece de blanc, *albumen*, pour les garantir de l'eau lorsqu'ils sont hors du corps de la mere.

ŒUF COQUILLE. On donne ce nom à un testacée du genre des porcelaines : ceux qui sont épais ont la levre extérieure renflée & dentée, & le dedans orangé. Ceux qui sont minces & fragiles, sont *papyracés*.

ŒUF MARIN. Nom donné par quelques-uns à une espece particuliere d'oursin, *brissus*. Voyez à l'article OURSIN.

ŒUF DE SERPENT ou ŒUF DES DRUIDES. La superstition de ces Prêtres Gaulois les portoit à dire que les œufs de serpent étoient formés de la propre bave de ces animaux. *Voyez à l'article* SERPENT. *Boëce de Boot* a donné le nom d'*œuf de serpent*, ou d'*œuf de mer* à des *échinites* ou oursins pétrifiés. *Voyez* OURSIN.

ŒUFS DE MER, *carnumi*. Voyez MICROSCOME.

ŒUFS DE PIERRE ou PIERRE OVAIRE. Nom que l'on donne à une pierre composée de petits grains gros comme des têtes d'épingles. *Voyez* CENCHRITES, MÉCONITES & PISOLITES, *& sur tout le mot* OOLITHES.

Il y a des Auteurs qui ont aussi donné le nom d'*œufs de pierre* à un oursin fossile. *Voyez* ÉCHINITES.

ŒUFS DE VACHE & DE CHAMOIS. *Voyez* ÉGAGROPILE.

OFFE, est une espece de jonc qu'on apporte d'Alicante en Espagne, & qu'on emploie beaucoup dans nos provinces méridionales, sur-tout à faire des filets pour la pêche. *Voyez à l'article* JONC.

OIE. *Voyez* OYE.

OIGNON ou OGNON, *cepa*, est une plante potagere, bulbifere, & généralement connue : son nom est commun à la plante & au fruit ; sa racine est bulbeuse, de différentes couleurs & figures, suivant l'espece. L'oignon est rempli d'un suc subtil & très-âcre, qui pique les yeux & les fait pleurer ; ses feuilles sont fistuleuses : cette plante ne fleurit qu'à la seconde année ; elle porte à son sommet une tête de la grosseur

du poing, composée de fleurs en lis: à ces fleurs succedent des fruits arrondis, partagés en trois loges qui contiennent la graine.

Outre les treize especes d'oignons que compte M. *de Tournefort*, il s'y trouve encore d'autres variétés en couleur, en grosseur, en forme, que produit l'art de la culture. L'espece la plus commune dans nos jardins est l'oignon blanc ou rouge, *cepa vulgaris, floribus & tunicis candidis vel purpurascentibus.* L'oignon blanc d'Espagne est l'*oignon doux* par excellence, *cepa Africana maxima bulbâ lignariâ dulci.* L'oignon de Strasbourg est plus amer & se conserve plus longtemps: mais aucun oignon d'Europe n'approche de la douceur, du goût agréable & du parfum léger des oignons d'Egypte.

Tout le monde sait les usages des oignons; les blancs sont plus doux & plus estimés que les rouges. Leurs vertus pour la santé sont très-remarquables: ils sont pectoraux & apéritifs, & souverains dans plusieurs maladies. Dans la derniere peste de Marseille, on s'en est servi avec le plus grand succès pour guérir les pestiférés: on donnoit au malade le suc exprimé d'un oignon dont on avoit ôté le cœur, à la place duquel on substituoit un peu de thériaque, & qu'on faisoit cuire ensuite au four: le malade qui l'avoit mangé, suoit abondamment & étoit guéri; on appliquoit aussi sur le bubon un semblable oignon. (M. *Bourgeois* craint qu'un tel remede n'augmente la fonte, la dissolution & la putréfaction des humeurs qu'on doit, dit-il, plutôt chercher à prévenir. C'est dans cette vue que les bons Praticiens modernes se servent presque uniquement des acides minéraux & végétaux, & du quinquina dans les fievres malignes & pestilentielles.) On prétend qu'un oignon pelé, assaisonné de miel & de sel, est un souverain remede pour la morsure des chiens enragés: son jus exprimé, dont on imbibe un peu de coton, mis dans les oreilles, en arrête les bruissemens ou tintemens. L'oignon cru ou cuit sous la cendre, & même dans les alimens, est, selon M. *Bourgeois*, un excellent remede contre l'hydropisie: il ouvre les obstructions, il rétablit la circulation de la lymphe arrê-

tée dans le tissu cellulaire, & procure une copieuse évacuation par les urines. Il produit presque le même effet que l'oignon de scille, qui est si utile dans cette maladie.

La CIBOULE, *cepa fissilis*, a à-peu-près les mêmes qualités & propriétés que l'*échalote*, voyez ce mot: elle en differe par la grandeur, mais elle lui ressemble par la fleur: on peut substituer l'un au défaut de l'autre: ils demandent tous les deux la même culture. On coupe les feuilles de la ciboule menu & on les mêle crues dans la salade & dans les viandes salées pour leur donner du haut goût: mais ces feuilles se digerent difficilement; elles rendent l'haleine mauvaise & produisent des rapports désagréables.

Les oignons ne viennent que de graine; ils aiment une terre bien ammeublie, mais plutôt maigre que grasse, & même un peu sablonneuse: si on les plante dans une terre bien fumée & humide, ils poussent, dit M. *Bourgeois*, beaucoup en feuilles, & la racine ou la bulbe reste petite. Selon cet Observateur, pour avoir de beaux & gros oignons, il ne faut point mettre de fumier dans la couche où on les plante, mais il faut la couvrir avec de la fiente de poulailler. Lorsqu'ils sont devenus grands & qu'ils ne profitent plus, on en foule les montans avec le pied, afin qu'ils deviennent plus beaux. Voyez le *Journal Economique*, *Janv. 1758.*

Les Fleuristes donnent le nom de *caïeux* (*soboles*) à de petits oignons de fleurs, qui naissent autour des gros, & qui se conservent long-temps hors de terre pour y être repiqués quand on veut; ils se fortifient quand ils restent trois ans de suite en terre, & ils portent dans l'année qu'on les replante. Lorsque l'on tire les oignons tous les ans, les *caïeux* ne sont point assez forts; il faut les mettre dans une planche en pépiniere, dont on leve de temps en temps des oignons qui sont en état de fleurir. Les *caïeux* dans les anemones changent de nom, ils s'appellent *pattes:* dans les renoncules ce sont des *griffes*. Les *caïeux* conservent seuls les plus belles especes de fleurs, sans dégénérer. *Voyez à l'article* FLEURS.

OIGNON MARIN ou DE SCILLE. *Voyez* SCILLE.

OIGNON MUSQUÉ, *muscari*, est une plante que l'on cultive dans les jardins des Fleuristes : l'on en distingue plusieurs especes, qui different par la couleur de leurs fleurs, ou par la largeur de leurs feuilles, ou parce qu'elles sont sauvages. M. *de Tournefort* a fait une différence de ce genre de plante d'avec la jacinthe, par la fleur, qui dans le muscari est un grelot, c'est-à-dire, une cloche rétrécie par l'ouverture, au lieu que celle de la jacinthe est fort évasée. La racine de l'oignon musqué est une grosse bulbe, couverte de plusieurs tuniques, d'un goût amer, garni en dessous de quelques fibres longues & grosses ; cette racine est vomitive : elle pousse cinq à six feuilles cannelées & couchées à terre ; il sort d'entr'elles une grosse tige, haute d'un demi pied, revêtue, dans le milieu de sa longueur, de fleurs en grelots, crenelées, d'un vert bleuâtre, ou purpurines d'abord, ensuite jaunâtres & aromatiques, comme musquées : à ces fleurs succedent des fruits triangulaires, qui renferment, dans trois loges, des semences grosses comme des orobes, rondes & noires. *Voyez* MOUSSE GRECQUE.

OISEAU, *avis*, est un animal bipede, couvert de plumes, qui a des ailes & un bec de substance de corne &c. Sa femelle est ovipare : ses plumes sont renversées en arriere, & couchées les unes sur les autres dans un ordre régulier : son corps n'est ni extrêmement massif, ni également épais par-tout, mais bien disposé pour le vol, aigu par devant, grossissant peu-à-peu ; par-là il est plus propre à fendre l'air. Tous les oiseaux viennent d'œufs : leur maniere de vivre, la variété de leurs couleurs suivant les saisons, leur chant, leurs différentes figures & grandeurs, tout mérite l'attention du Philosophe, & pique la curiosité de l'homme qui cherche à s'instruire. Nous en tracerons quelques esquisses dans le tableau racourci que nous nous proposons d'en donner ici d'après les Naturalistes qui en ont traité.

Tous ceux qui, depuis *Aristote* & *Pline* jusqu'à MM. *Linnæus*, *Klein* & *Brisson*, ont écrit sur la na-

ture des oiseaux, les ont divisés en *terrestres* & en *aquatiques*, puis en *oiseaux domestiques*, en *passagers*, en *oiseaux des bois*, *oiseaux de riviere*, *oiseaux de nuit*, & en *oiseaux de proie*. Ils ont marqué, dans les différentes classes qu'ils en ont faites, ce qui les distingue les uns des autres, soit par les plumes, le bec, les ongles, soit par la tête, le cou, les ailes, les cuisses, les jambes & les pieds.

On peut réduire les oiseaux à six ordres principaux.

1°. Ceux du *genre corbin*, c'est-à-dire, qui ont le bec courbé, fort, & les ongles crochus; tels sont les oiseaux de proie qui sont carnivores, c'est-à-dire, qui vivent de rapine ou de chair, qui tiennent leur proie dans une patte, & qui la déchirent & la mangent étant appuyés sur une jambe, comme les aigles, le faucon, les chat-huants, le duc, le milan, le lanier, le hobereau, le condor, le vautour, l'épervier, le coucou, même les perroquets & les pies-grieches, &c. cependant ceux-ci vivent plus communément de fruit que de chair. Nous disons que le bec des oiseaux de proie est assez fort pour dépecer les chairs; les serres ne sont pas moins propres à déchirer & à porter la proie; leurs cuisses sont très robustes, ils ont une vue perçante & subtile pour épier de loin. On distingue ces oiseaux en *diurnes* ou *oiseaux de jour*, & en *nocturnes* ou *oiseaux de nuit*. On connoît les oiseaux de rapine, sur-tout les diurnes, par leur tête & leur cou court, par leur bec & leurs ongles crochus, par leur langue large, épaisse & charnue comme celle de l'homme. Les *oiseaux de proie nocturnes*, qui ne volent que la nuit pour butiner, ont la tête grosse & faite à-peu-près comme celle des chats; tels sont les hiboux cornus ou chat-huants, la fresaie, le faucon de nuit, la chevêche, &c. Les oiseaux de nuit ont les doigts irréguliers, car le dernier n'est pas, à proprement parler, un doigt de devant, il est placé de côté & peut se tourner en arriere; ces oiseaux l'alongent pour prendre leur proie, c'est ce qui fait que la plupart des oiseaux de nuit semblent avoir deux doigts devant & deux derriere: ces oiseaux ont une membrane calleuse que les Naturalistes nomment *céra*, & qui fait le tour de la base du bec,

Presque tous ces oiseaux vivent solitaires, ne s'attroupent point, multiplient peu, & ne produisent guere que deux petits à la fois; ils sont très-garnis de plumes, & vivent plus long-temps que les autres especes d'oiseaux : comme les repas de ces oiseaux ne sont pas toujours assurés, la nature leur a donné la faculté de souffrir long-temps la faim. Dans ce genre d'oiseaux, les femelles sont plus grandes que les mâles, d'un plus beau plumage, plus fortes, plus courageuses, & plus féroces, parce qu'elles ont seules soin de leurs petits; les mâles étant d'un tiers moins grands sont appellés *Tiercelets*, *tercellini*, *quasi tertiarii*. Ces oiseaux sont non-seulement les tyrans des airs, ils chassent aussi dans les plaines. On divise les *oiseaux de rapine diurnes* en grands & en petits : les grands sont les aigles & les vautours; leur caractere est si féroce, si indomptable, qu'on ne peut les dresser pour la fauconnerie. Les petits oiseaux de proie diurnes, sont encore considérés comme poltrons, tels que le milan, ou comme courageux & de haut vol, tels que l'autour, l'épervier, le gerfaut & l'émerillon; ceux de bas vol, sont le faucon, le lanier, le hobereau & le sacre. Voyez, pour l'histoire & la maniere de dresser ces oiseaux à la chasse du vol, *au mot* FAUCON.

Le second ordre comprend les *oiseaux à bec de pic*, tels que les corbeaux, les corneilles, les pies, les pics, le geai, la huppe, le loriot, l'étourneau, les merles &c. Quelques-uns de cette famille ont le bec un peu oblong, fort & gros; on les appelle *demi-oiseaux de proie*, ou *demi-rapaces*. Ces oiseaux fréquentent indifféremment les pâtis, les guérets, les taillis, de même que les prairies & les rivages : ils vivent de fourmis, de moucherons, de fruits & de graines.

Le troisieme ordre contient les *oiseaux* qui fréquentent les bords des eaux douces, les lieux marécageux, & les rivages de la mer, qui volent autour de cet élément pour y trouver du poisson dont ils font leur nourriture, & qui cependant ne nagent pas; ils ont les pieds fendus (*fissipedes*), les jambes & les cuisses fort longues (*imantopedes*), un bec long & pointu (*scolopaces*); ils n'ont point de plumes au dessous des genoux;

noux, afin d'entrer plus facilement dans les eaux bourbeuſes; tels ſont les hérons, la grue, le flamand, le butor, la cigogne, le courlis &c. Quelques-uns de cette famille ſont haut-montés ſur leurs jambes & ont le bec court, comme le vanneau, le chevalier, le pluvier, &c. Souvent ces oiſeaux ſe tiennent ſuſpendus en l'air ſur les eaux, & guettent d'en haut ſi par hazard quelque poiſſon remonte vers la ſurface des eaux, & quand ils en apperçoivent, ils ſe plongent ſur le champ avec une rapidité étonnante, & il eſt rare qu'ils manquent leur proie.

Le quatrieme ordre renferme les *oiſeaux aquatiques* par excellence, c'eſt-à-dire, qui marchent ſur terre & nagent dans l'eau; tels ſont le pélican, la palette, le cygne, les oies, les eſpeces de canards, le morillon, la macreuſe, le cormoran, &c. en un mot tous les oiſeaux dont les doigts des pieds ſont unis par une toile membraneuſe, ou même qui peuvent nager ſans être abſolument palmés, comme la foulque. Pluſieurs d'entre ces oiſeaux, qui ne ſe nourriſſent que de poiſſon, ont le bec dentelé, crochu à ſon extrémité: ils ſont la plupart *podicipedes*, c'eſt-à-dire, qu'ils marchent en ſe tenant preſque droits ſur leurs pieds comme l'homme; ils paroiſſent boiter, & ont preſque tous les jambes courtes, les cuiſſes couvertes de plumes à la jointure, les orteils de derriere courts, le croupion moins élevé que les autres oiſeaux, le bec terminé par une appendice qui pend en deſſous.

On comprend dans le cinquieme ordre, les *oiſeaux* qui n'ont point d'habitation fixe, & qui fréquentent rarement les rivages, les prairies, les hautes futaies; ils vont indifféremment dans les taillis, les guérets, les buiſſons & les haies, où ils ſe nourriſſent d'inſectes, de graines, de baies, &c. tels ſont les pigeons, la tourterelle, les eſpeces de pinçons, l'alouette, le chardonneret, le verdier, le ſerin, l'ortolan, la linotte, la bergeronnete, les bruants, la fauvette, le roitelet, les hirondelles, le tarin; & tous ces petits oiſeaux, dont le bec eſt aſſez droit, quelquefois courbé, plus ou moins long, qui ont les jambes courtes, les ailes fort étendues, un vol fort & rapide, & une

queue longue. Ceux qui ont le bec grêle, foible & pointu, vivent d'insectes; ceux qui vivent de graines, d'herbes épineuses, l'ont fort court & propre à broyer.

Le sixieme & dernier ordre renferme les *oiseaux* du genre des poules; tels que le paon, le coq d'Inde, le coq privé & celui de bruyeres, le faisan, la perdrix, la gélinote, &c. ces oiseaux ont le bec assez court, un peu recourbé, le corps gras, pesant & la chair blanche, des ailes courtes, concaves, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas voler fort haut ni long-temps; leurs pieds sont, ainsi que ceux de la premiere famille, garnis d'une peau: ils se retirent dans les lieux secs, & vivent d'herbes, quelquefois d'insectes: ils font leur nid à terre; leurs petits, qui sont couverts de duvet, suivent la mere, courant çà & là, & ramassent ce qu'ils peuvent avec leur petit bec.

On pourroit encore faire un genre d'oiseaux terrestres, qui ont le bec droit & les ongles moins crochus que les oiseaux de proie; ce sont ceux qui sont d'une énorme grandeur, & qui ont des ailes peu propres à voler; comme l'autruche, l'émeu ou le casoar & le dodo. L'autruche d'Afrique n'a que deux doigts par-devant, & point sur le derriere: l'autruche d'Amérique en a trois, point par derriere: le casoar, la canne-petiere, l'outarde &c. fournissent la même remarque.

Quiconque voudroit adopter une méthode facile, pourroit prendre la suivante, qui est de M. *Klein*, elle consiste à ne considérer les oiseaux que par leurs pieds; alors on en feroit huit familles. La premiere comprendroit ceux qui n'ont que deux doigts aux pieds sur le devant, & point par derriere; telle est l'autruche. Dans la deuxieme on rangeroit ceux qui en ont trois par-devant & point par derriere; tels sont l'émeu, l'outarde, la pie de mer, le pluvier vert, le vanneau, l'autruche d'Amérique. Dans la troisieme les oiseaux qui ont quatre doigts, dont deux sont dirigés en avant, & les deux autres en arriere; tels que le perroquet, le coucou, la pie, &c. Dans la quatrieme les oiseaux à quatre doigts, trois devant & un derriere; tels que les oiseaux chantans, les rossignols, les alouettes, les

colibris, même les aigles, les vautours, les faucons, les oiseaux de nuit, les corneilles, les grues, les cigognes. Dans la cinquieme les oiseaux palmipedes, à quatre doigts aux pieds, trois devant & un derriere; tels que le canard & le plongeon. Dans la sixieme les oiseaux palmipedes, à quatre doigts en avant, tels que le cormoran, l'onocrotale, &c. qui ont tous les doigts unis par la membrane du pied. Dans la septieme les palmipedes à trois doigts en avant, tels que le pinguin: enfin dans la huitieme les oiseaux dactilobes, à quatre doigts frangés de chaque côté, c'est-à-dire bordés par une membrane, & dont plusieurs ont trois doigts devant & un derriere, tels que le colimbe & les foulques. En réfléchissant sur cette distribution synoptique, on y trouve quelque confusion: on voit dans la quatrieme famille l'aigle, le colibri, le coq & la grue: on pourroit, en se servant des caracteres généraux dont il est fait mention ci-dessus, étendre les subdivisions au nombre de vingt-six ordres, ainsi que l'a fait M. *Allamand* d'après M. *Brisson;* alors on auroit:

Premier Ordre.

Le *genre du pigeon*, qui contient quarante-quatre especes & un grand nombre de variétés: les *tourterelles* appartiennent à ce genre.

Second Ordre.

Il est divisé en deux sections:

La premiere est composée

Du *genre du dindon*, & comprend deux especes & deux variétés.

——— Du *genre du coq & de la poule*, & comprend six especes & quelques variétés.

——— Du *genre de la pintade.*

La deuxieme section est composée

Du *genre de la gélinote*, & comprend douze especes. Le *coq de bruyeres* appartient à ce genre.

——— Du *genre de la perdrix*, & comprend vingt-une especes & quelques variétés. Le *francolin* & la *caille* appartiennent à ce genre.

——— Du *genre du faiſan & du paon*, & comprend dix-huit eſpeces & quelques variétés. Les *hoccos* appartiennent à ce genre d'oiſeaux.

Troisieme Ordre.

Il eſt diviſé en deux ſections:

La premiere eſt compoſée

Du *genre de l'épervier*, & comprend trente-neuf eſpeces & quelques variétés. L'*autour*, le *faucon*, le *lanier*, le *gerfault*, le *ſacre*, le *hobereau*, l'*émérillon*, le *buſard*, le *milan* appartiennent à ce genre.

——— Du *genre de l'aigle*, & comprend quinze eſpeces.

——— Du *genre du vautour*, & comprend quatorze eſpeces.

La ſeconde ſection eſt compoſée

Du *genre du hibou*, & comprend neuf eſpeces & quelques variétés. Les *ducs* appartiennent à ce genre.

——— Du *genre du chat-huant*, & comprend onze eſpeces. La *hulote* & la *chouette* appartiennent à ce genre.

Quatrieme Ordre.

Il eſt diviſé en deux ſections:

La premiere eſt compoſée

Du *genre du coracias*, & comprend deux eſpeces.

——— Du *genre du corbeau*, & comprend onze eſpeces & quelques variétés. La *corneille* & le *choucas* ſont de ce genre.

——— Du *genre de la pie*, & comprend ſix eſpeces & une variété.

——— Du *genre du geai*, & comprend quatre eſpeces & une variété.

——— Du *genre du caſſe-noix*, & comprend une eſpece.

La deuxieme ſection du quatrieme ordre eſt compoſée

Du *genre du rollier*, & comprend dix eſpeces.

——— Du *genre du troupiale*, & comprend trente-deux especes. Le *cassique*, le *baltimore* & le *carouge* sont de ce genre.

——— Du *genre de l'oiseau de paradis*, & comprend deux especes.

CINQUIEME ORDRE.

Il est divisé en deux sections:

La premiere est composée

Du *genre de la pie-grieche*, & comprend vingt-six especes & une variété. L'*écorcheur* est de ce genre.

——— Du *genre de la grive*, & comprend soixante-six especes & quelques variétés. Le *mauvis*, la *litorne*, la *rousserole*, le *merle*, le *moqueur*, le *mainate*, le *loriot*, le *jaseur* sont de ce genre.

——— Du *genre du cotinga*, & comprend dix especes.

La deuxieme section du cinquieme ordre est composée

Du *genre du gobe-mouche*, & comprend trente-huit especes. Le *tyran* est de ce genre.

SIXIEME ORDRE.

Il est divisé en deux sections:

La premiere est composée

Du *genre du pique-bœuf*, & comprend une espece.

La seconde section est composée

Du *genre de l'étourneau*, & comprend quatre especes & quelques variétés.

SEPTIEME ORDRE.

Il est divisé en deux sections:

La premiere est composée

Du *genre de la huppe*, & comprend une espece.

La seconde section est composée

Du *genre du promérops*, & comprend cinq especes.

Huitieme Ordre.

Il eſt compoſé

Du *genre du tete-chevre*, & comprend ſept eſpeces.

——— Du *genre de l'hirondelle*, & comprend dix-huit eſpeces & une variété. Le *martinet* eſt de ce genre.

Neuvieme Ordre.

Il eſt diviſé en trois ſections:

La premiere eſt compoſée

Du *genre du tangara*, & comprend trente-quatre eſpeces. L'*eſclave*, l'*évêque* & le *cardinal* ſont de ce genre.

——— Du *genre du chardonneret*, & comprend ſept eſpeces & un plus grand nombre de variétés. Le *tarin* eſt de ce genre.

——— Du *genre du moineau*, & comprend ſoixante & quatorze eſpeces & quelques variétés. La *veuve*, quelques *cardinaux* étrangers, la *linotte*, le *pinçon*, le *ſerin*, le *verdier*, le *bengali*, le *ſenegali*, le *maia*, le *grenadin* ſont de ce genre.

——— Du *genre du gros-bec*, & comprend vingt eſpeces, parmi leſquelles ſe trouve le *cardinal huppé*.

——— Du *genre du bruant*, & comprend quinze eſpeces & quelques variétés. L'*ortolan*, le *proyer* appartiennent à ce genre.

La ſeconde ſection eſt compoſée

Du *genre du coliou*, & comprend deux eſpeces.

——— Du *genre du bouvreuil*, & comprend dix eſpeces & deux variétés.

La troiſieme ſection eſt compoſée

Du *genre du bec croiſé*, & comprend une eſpece.

Dixieme Ordre.

Il eſt diviſé en deux ſections:

La premiere eſt compoſée

Du *genre de l'alouette*, & comprend treize especes & trois variétés. Le *cujelier*, la *fârlouse*, la *calandre* sont de ce genre.

—— Du *genre du bec-figue*, & comprend quatre-vingt-deux especes & quelques variétés. La *fauvette*, le *rossignol*, le *rouge-queue*, la *gorge-bleue*, la *rouge-gorge*, le *roitelet*, le *traquet*, le *cul-blanc*, la *lavandiere*, la *bergeronnette*, le *chantre*, le *figuier*, le *pipit* sont de ce genre.

La deuxieme section est composée

Du *genre de la mésange*, & comprend dix-huit especes. Le *pou* ou *soulci* appartient à ce genre.

Onzieme Ordre.

Il est composé

Du *genre du torchepot*, & comprend cinq especes & deux variétés.

Douzieme Ordre.

Il est divisé en deux sections:

La premiere est composée

Du *genre du grimpereau*, & comprend trente-trois especes & une variété. Le *sucrier* appartient à ce genre.

—— Du *genre du colibri*, & comprend seize especes.

La deuxieme section est composée

Du *genre de l'oiseau mouche*, & comprend vingt especes.

Treizieme Ordre.

Il est divisé en cinq sections:

La premiere est composée

Du *genre du torcol*, & comprend une espece & une variété.

—— Du *genre du pic*, & comprend trente-deux especes.

La deuxieme section est composée

Du *genre du jacamar*, & comprend deux especes.

La troiſieme ſection eſt compoſée
Du *genre du barbu*, & comprend cinq eſpeces.
——— Du *genre du coucou*, & comprend vingt-huit eſpeces & une variété.
La quatrieme ſection eſt compoſée
Du *genre du couroucou*, & comprend ſept eſpeces.
——— Du *genre du bout-de-petun*, & comprend deux eſpeces.
——— Du *genre du perroquet*, & comprend quatre-vingt dix-ſept eſpeces & deux variétés. Les *arras* ou les *macaos*, les *kakatous*, les *lorys*, les *perruches* ſont de ce genre.
La cinquieme ſection eſt compoſée
Du *genre du toucan*, & comprend douze eſpeces.

QUATORZIEME ORDRE.

Il eſt diviſé en cinq ſections :
La premiere eſt compoſée
Du *genre du coq-de-roche*, & comprend une eſpece.
——— Du *genre du manakin*, & comprend treize eſpeces.
La deuxieme ſection eſt compoſée
Du *genre du momot*, & comprend deux eſpeces.
La troiſieme ſection eſt compoſée
Du *genre du martin-pêcheur*, & comprend vingt-ſix eſpeces.
——— Du *genre du todier*, & comprend trois eſpeces.
La quatrieme ſection eſt compoſée
Du *genre du guêpier*, & comprend treize eſpeces.
La cinquieme ſection eſt compoſée
Du *genre du calao*, & comprend ſix eſpeces.

QUINZIEME ORDRE.

Il eſt diviſé en trois ſections :
La premiere eſt compoſée

Du *genre de l'autruche*, & comprend une espece.

La deuxieme section est composée
Du *genre du thouyou*, & comprend une espece.

——— Du *genre du casoar*, & comprend une espece.

La troisieme section est composée
Du *genre du dronte*, & comprend une espece.

Seizieme Ordre.

Il est divisé en trois sections:

La premiere est composée
Du *genre de l'outarde*, & comprend trois especes. La *canne petiere* est de ce genre.

La deuxieme section est composée
Du *genre de l'échasse*, & comprend deux especes.

——— Du *genre de l'huîtrier*, & comprend une espece.

La troisieme section est composée
Du *genre du pluvier*, & comprend seize especes. Le *courlis de terre* est de ce genre.

Dix-septieme Ordre.

Il est divisé en douze sections:

La premiere est composée
Du *genre du vanneau*, & comprend huit especes.

——— Du *genre du jacana*, & comprend cinq especes. Le *chirurgien* est de ce genre.

La deuxieme section est composée
Du *genre du coulon-chaud*, & comprend deux especes.

La troisieme section est composée
Du *genre de la perdrix de mer*, & comprend quatre especes.

La quatrieme section est composée
Du *genre du râle*, & comprend dix especes.

La cinquieme section est composée
Du *genre du bécasseau*, & comprend vingt-

une eſpeces & une variété. La *guignette*, le *combattant*, le *chevalier*, l'*alouette de mer*, la *maubeche*, le *merle*, la *grive d'eau* & le *canut* ſont de ce genre.

——— Du *genre de la barge*, & comprend huit eſpeces.

——— Du *genre de la bécaſſe*, & comprend ſix eſpeces & une variété.

La ſixieme ſection eſt compoſée

Du *genre du courlis*, & comprend quatorze eſpeces & une variété. L'*ibis* eſt de ce genre.

La ſeptieme ſection eſt compoſée

Du *genre de la ſpatule*, & comprend trois eſpeces.

La huitieme ſection eſt compoſée

Du *genre de la cigogne*, & comprend douze eſpeces. La *grue* appartient à ce genre, ainſi que la *demoiſelle de Numidie*.

——— Du *genre du héron*, & comprend quarante-ſept eſpeces. Le *butor*, l'*aigrette*, le *crabier*, le *bihoreau* ſont de ce genre.

——— Du *genre de l'ombrette*, & comprend une eſpece.

La neuvieme ſection eſt compoſée

Du *genre de la cuilliere*, & comprend deux eſpeces & une variété.

La dixieme ſection eſt compoſée

Du *genre de l'oiſeau royal*, & comprend une eſpece.

La onzieme ſection eſt compoſée

Du *genre du cariama*, & comprend une eſpece.

——— Du *genre du kamichy*, & comprend une eſpece.

La douzieme ſection eſt compoſée

Du *genre de la poule-ſultane*, & comprend dix eſpeces & une variété.

DIX-HUITIEME ORDRE.

Il eſt diviſé en deux ſections:

La premiere eſt compoſée

Du *genre de la poule d'eau*, & comprend trois especes.

La deuxieme section est composée

Du *genre du phalarope*, & comprend quatre especes.

——— Du *genre de la foulque*, & comprend trois especes.

Dix-neuvieme Ordre.

Il est composé

Du *genre du grébe*, & comprend onze especes & une variété.

Vingtieme Ordre.

Il est divisé en deux sections:

La premiere est composée

Du *genre du guillemot*, & comprend quatre especes.

La deuxieme section est composée

Du *genre du macareux*, & comprend une espece.

——— Du *genre du pingoin* ou *penguin*, & comprend trois especes.

Vingt-unieme Ordre.

Il est divisé en deux sections:

La premiere est composée

Du *genre du manchot*, & comprend deux especes.

——— Du *genre du gorfou*, & comprend une espece.

La deuxieme section est composée

Du *genre du plongeon*, & comprend six especes.

Vingt-deuxieme Ordre.

Il est composé

Du *genre de l'albatros*, & comprend une espece.

VINGT-TROISIEME ORDRE.

Il eſt diviſé en deux ſections:
La premiere eſt compoſée
Du *genre du puffin*, & comprend quatre eſpeces.
——— Du *genre du pétrel*, & comprend trois eſpeces.
——— Du *genre du ſtercoraire*, & comprend trois eſpeces.
——— Du *genre de goëland*, & comprend quinze eſpeces. Les *mouettes* ſont de ce genre.
La deuxieme ſection eſt compoſée
Du *genre de l'hirondelle de mer*, & comprend ſept eſpeces.
——— Du *genre du bec-en-ciſeaux*, & comprend une eſpece.

VINGT-QUATRIEME ORDRE.

Il eſt diviſé en deux ſections:
La premiere eſt compoſée
Du *genre du harle*, & comprend huit eſpeces.
La deuxieme ſection eſt compoſée
Du *genre de l'oie*, & comprend ſeize eſpeces & une variété. Le *cygne* eſt de ce genre, ainſi que l'*éderdon*.
——— Du *genre du canard*, & comprend quarante-deux eſpeces & pluſieurs variétés. La *tadorne*, le *morillon*, la *macreuſe*, la *ſarcelle* ſont de ce genre.

VINGT-CINQUIEME ORDRE.

Il eſt diviſé en deux ſections:
La premiere eſt compoſée
Du *genre de l'anhinga*, & comprend une eſpece.
——— Du *genre du paille-en-cul*, & comprend trois eſpeces.
La deuxieme ſection eſt compoſée
Du *genre du fou*, & comprend ſept eſpeces. L'*oie de Soland*, l'oiſeau *frégate* ſont de ce genre.

——— Du *genre du cormoran*, & comprend deux especes.

——— Du *genre du pélican*, & comprend trois especes & une variété.

VINGT-SIXIEME ORDRE.

Il est divisé en deux sections:

La premiere est composée

Du *genre du flamand*, & comprend une espece.

La deuxieme section est composée

Du *genre de l'avocette*, & comprend une espece.

——— Du *genre du coureur*, & comprend une espece.

Amours des oiseaux, leurs nids, leur accouplement, leur ponte, leur habitation, leurs émigrations, leur vol, leur durée, leur marche, leur chant, leur plumage, &c.

Le printems paroît être la saison déterminée pour les amours des oiseaux; c'est alors que les testicules des mâles commencent à s'enfler considérablement, & qu'ils désirent tous perpétuer leur espece. Entre les oiseaux l'on en voit qui sont plus portés à l'amour que les autres, même des mâles plus lubriques que des femelles, & des femelles plus amoureuses que les mâles. Pour ce vœu de la Nature, on voit ces animaux briller non-seulement par la beauté de leur plumage, mais encore l'amour les fait chanter presque tout le jour; alors leur voix est plus forte. Les mâles paroissent se disputer à qui chantera le plus mélodieusement & le plus long-temps, comme on le remarque dans les rossignols, dans les fauvettes, & même dans les coqs, qui s'animent à la vue de leurs rivaux. La tourterelle a un chant plaintif, attendrissant. Chaque oiseau a son chant & son cri particulier, par lequel on le peut distinguer. Ils s'entendent les uns les autres, & se répondent constamment; & comme dans ces animaux les mâles (sans en excepter aucun) chantent mieux que les femelles, celles-ci semblent donner la préférence à ceux

qui dans leur espece les charment le plus, & méritent mieux de jouir de leurs faveurs. Nous exposerons dans la suite de cet article plusieurs détails sur la voix des oiseaux.

Tous les mâles qui, selon *Redi*, ont deux verges, & qui sont ou crêtés, ou éperonnés, ou barbus, ne cochent pas leurs femelles de la même maniere : les uns la tiennent contre terre, les autres tout de bout. Il semble que la plupart des oiseaux ne fassent que comprimer fortement la femelle, comme le coq, les moineaux, les pigeons, &c. dont la verge est fort courte; d'autres à la vérité, comme l'autruche, le canard, l'oie, &c. ont un membre d'une grosseur considérable, & l'intromission n'est pas équivoque dans ces especes. L'accouplement étant passé, la plupart se tiennent compagnie pendant tout le reste de l'année jusqu'au retour du printems. Voyez les *Exercitations de* Harvey *sur la génération.*

On cite plusieurs observations qui tendent à prouver que la morsure des oiseaux, excités par un certain degré de colere, notamment dans la saison qu'ils sont animés de la passion de l'amour, étoit venimeuse, & même mortelle, sans en excepter ceux des oiseaux dont le bec paroît le moins propre à mordre, tels que les canards. Consultez la *Nature considérée*, &c. *p. 246, 15 Novembre 1774.*

Les femelles des oiseaux pondent les œufs : elles les couvent constamment de leur propre chaleur jusqu'à ce que le petit vienne à éclore. Cette action de couver s'appelle *incubation.*

La poule, qui est un trésor pour l'homme, pond presque tous les jours en certaines saisons; d'autres oiseaux pondent indifféremment toute l'année, d'autres une fois l'an. La quantité des œufs est en quelque sorte déterminée à chaque espece; car si l'on en casse, ou qu'on leur en retire quelques-uns, ils en font bien-tôt un pareil nombre pour compléter la couvée; c'est surtout ce qu'on remarque dans les canards, les hirondelles & les moineaux. Qu'on ne touche point aux œufs des poules, on remarquera qu'elles cesseront de pondre & se mettront à couver aussi-tôt qu'elles en

auront quatorze ou quinze : au contraire qu'on leur ôte tous les jours leurs œufs, elles continueront de pondre jusqu'à ce qu'elles en ayent produit quatre ou cinq fois autant. Ceci démontre que si les oiseaux n'ont pas une connoissance exacte du nombre de leurs œufs, ils ne laissent pas de distinguer un grand nombre d'avec un petit. Il est heureux que les oiseaux les moins nuisibles & les meilleurs à manger de tous les animaux, sont ceux qui se multiplient le plus. Au reste, on a remarqué que ceux de ces animaux qui nourrissent leurs petits, n'en ont ordinairement qu'un petit nombre; ceux au contraire dont les petits mangent seuls dès qu'ils voient le jour, en ont jusqu'à dix-huit, & quelquefois plus. Mais quel soin ne prennent-ils pas de leurs œufs ! l'on ne peut qu'être enchanté du mécanisme même de l'œuf, de la naissance & de l'éducation des petits. Commençons par examiner les nids.

Les oiseaux construisent leurs nids & les façonnent avec un art admirable ; les uns les font sous l'herbe à plate terre, les autres au haut des arbres, ou les suspendent à des branches ; d'autres dans des arbrisseaux ; d'autres dans des creux d'arbres; d'autres dans la terre ; d'autres dans des roseaux; d'autres dans des fentes de rochers ; enfin, en quelqu'endroit qu'ils les logent, c'est toujours sous quelque abri, soit sous des herbes, ou sous une grosse branche, ou sous des feuilles doublées.

On ne peut trop admirer, dit M. *Pluche*, la parfaite ressemblance qui se trouve entre les nids des oiseaux d'une espece & ceux d'une autre ; chaque famille en effet les construit avec la même matiere & de la même façon ; l'industrie, la propreté & la précaution y regnent par-tout. Supposons dans un seul endroit un amas de brins de bois sec, des écorces, des feuilles seches, du foin, de la paille, de la mousse, de la bourre, du crin, du coton, de la laine, de la soie, des toiles d'araignées, des plumes, & quantité d'autres menues provisions, on verra nos habitans de l'air venir en faire emplette à cette foire. Celui-ci a besoin d'un brin de mousse ; celui-là demande une plume ; il faut à cet

autre un fétu, à un autre de la laine : il y a quelquefois de grandes querelles, alors chacun tire de son côté, & emporte au nid ce qu'il peut. Les dehors du nid sont des matieres grossieres pour servir de fondement : on y emploie les épines, les joncs, le gros foin, & la mousse la plus épaisse : sur cette premiere assise encore informe, ils étendent, entrelacent & plient en rond des matériaux plus délicats, & disposés de maniere à fermer l'entrée aux vents & aux insectes. Comme chaque espece a son goût ou une façon pour se meubler, ils ne manquent point de tapisser le dedans de petites plumes, ou de l'étoffer avec de la laine, des duvets, trésor & luxe de leur nid, mais nécessaires, de peur que leurs œufs ne se froissent ou ne se cassent, & pour entretenir une chaleur autour d'eux & de leurs petits.

L'étendue du nid est proportionnée au nombre des enfans qui doivent naître, & jamais la ponte n'en prévient la structure. Les outils des oiseaux sont leur bec ; avec un tel instrument ils fabriquent des ouvrages où l'on trouve la propreté du Vannier, & l'industrie du Maçon : il y en a dont toutes les pieces sont proprement attachées & liées avec un fil que l'oiseau se fait avec de la bourre, du chanvre, du crin & des toiles d'araignées ; telle est la *mésange*. Voyez ce mot.

Les loriots, dont le mâle & la femelle se recherchent presqu'à leur arrivée dans nos climats, font leurs nids sur des arbres élevés, quoique souvent à une hauteur fort médiocre ; ils les façonnent avec une singuliere industrie ; ils les attachent ordinairement à la bifurcation d'une petite branche & ils les enlacent autour des deux rameaux qui forment cette bifurcation ; de longs brins de paille ou de chanvre, dont les uns allant droit d'un rameau à l'autre, forment le bord du nid par devant, & les autres pénétrant dans le tissu du nid ou passant par dessous & revenant se rouler sur le rameau opposé, donnent la solidité à l'ouvrage. Ces longs brins de chanvre ou de paille qui prennent le nid par dessous en sont l'enveloppe extérieure ; le matelas intérieur destiné à recevoir les œufs, est un tissu de petites tiges de gramens, dont les épis sont ramenés sur la partie convexe, & paroissent si peu dans la partie concave,

cave, qu'on a pris plus d'une fois ces tiges pour des fibres de racines : enfin entre le matelas intérieur & l'enveloppe extérieure il y a une quantité considérable de mousse, de lichen & d'autres matieres semblables qui servent, pour ainsi dire, d'ouate intermédiaire & rendent le nid plus impénétrable au dehors, & tout à la fois plus mollet au dedans. Ce nid étant ainsi préparé, la femelle y dépose quatre ou cinq œufs, dont le fond blanc sale est semé de quelques petites taches bien tranchées, d'un brun presque noir, & plus fréquentes sur le gros bout que par tout ailleurs : elle les couve avec assiduité l'espace d'environ trois semaines, qui est le terme de l'incubation de cet oiseau.

D'autres oiseaux ; comme le merle & la huppe, enduisent l'intérieur du nid d'une petite couche de mortier, qui colle & maintient tout ce qui est dessous, & qui, à l'aide d'un peu de bourre ou de mousse qu'ils y attachent quand il est encore frais, forment par dedans une muraille ou un appartement meublé, d'une propreté parfaite. D'autres enfin, comme l'hirondelle, font un nid sans bois, sans foin, sans liens; ils gâchent la poussiere avec l'eau qu'ils ont prise en volant à la superficie de l'eau, & construisent un logement d'une structure tout-à-fait singuliere.

C'est ainsi que les oiseaux fabriquent pour leurs petits une habitation solide, & qu'ils ne la bâtissent pas indifféremment en toutes sortes d'endroits, mais toujours dans un lieu où ils puissent être tranquilles, & à l'abri de leurs ennemis. Tous couvent leurs œufs nuit & jour avec tant de patience, qu'ils aiment mieux souffrir la faim que de les exposer en allant chercher leur nourriture. L'oiseau, cet animal si agile, si inquiet, si volage, oublie en ce moment son naturel, pour se fixer sur ses œufs pendant le temps nécessaire. Les oiseaux les plus timides & les plus foibles montrent du courage & de la force lorsqu'il s'agit de sauver leurs œufs, même des œufs stériles, ou des œufs qui ne viennent pas d'eux, & ce qui est encore plus étrange des œufs simulés. L'ardeur que les poules ont pour couver est très-grande ; lorsque ce feu les anime, on les entend glousser, on les voit s'agiter, abaisser leurs

ailes, hériſſer leurs plumes & chercher par-tout des œufs qu'elles puiſſent couver. Mais paſſons à l'hiſtoire de l'œuf.

Les *œufs* des oiſeaux different par la couleur de leur robe & par la groſſeur; tous ont une coque ou écorce aſſez dure, blanche, fragile, calcaire, & en dedans une membrane qui enveloppe tout l'œuf. Prenons pour exemple l'œuf d'une poule, où les parties ſont plus ſenſibles : on y diſtingue facilement le jaune, *vitellum*, qui eſt au cœur; le premier blanc, *albumen*, qui environne le jaune; un ſecond blanc dans lequel la maſſe du milieu nage, les ligamens qui ſoutiennent le jaune vers le centre de l'œuf, les membranes qui enveloppent l'une le jaune, l'autre le premier blanc, & une troiſieme & une quatrieme qui environnent le tout; enfin la coque qui ſert de défenſe à tout le reſte. Tout ce qui eſt intérieur eſt façonné le premier; la coque ſe forme la derniere, & ſe durcit d'un jour à l'autre : l'uſage de cette croûte eſt double; 1°. elle met la mere en état de ſe délivrer de l'œuf ſans l'écraſer; 2°. elle met le petit à couvert de tout accident, juſqu'à ce qu'il ſoit formé & en état de ſortir. On peut dire de même que l'œuf tient lieu aux petits oiſeaux de la mamelle & du lait qui nourrit les petits des autres animaux, parce que le poulet qui eſt dans l'œuf, ſe nourrit d'abord du blanc de l'œuf, & enſuite du jaune lorſqu'il eſt un peu fortifié, & que ſes parties commencent à s'affermir. C'eſt ſur la membrane qui environne le jaune que ſe trouve la *cicatricule*, *cicatricula*, ou petite tache blanche, qui eſt ſeule le véritable germe, *ſtamen*, où réſide le poulet en petit. Il a dès-lors tous ſes organes, (dit M. *Pluche* d'après *Villhughbi & Malpighi*) mais aplatis, repliés & enveloppés dans un point; dès que la moindre portion de l'eſprit vital qui eſt deſtiné à l'animer, a paſſé au travers des enveloppes juſqu'au cœur, alors le poulet vit & tout commence à ſe mouvoir en lui. Il y a, pour ainſi dire, une ſorte de rapports généraux pour la maniere dont l'eſprit vivifiant ſe gliſſe par les pores des membranes de l'oiſeau encore dans ſon œuf, & du fœtus dans la matrice; il en eſt à-peu-près de même

pour la maniere dont le poulet reçoit des sucs nutritifs. Tous ces petits canaux auparavant aplatis, se gonflent; tout prend nourriture, & le poulet commence à croître.

Il est presque impossible de démêler dans les liqueurs qui l'environnent la nature des progrès & des changemens qui lui arrivent de jour en jour pendant le temps de l'incubation jusqu'à ce qu'il perce son écaille. M. *Pluche* fait encore observer ici une précaution aussi sensible qu'admirable, qu'on remarque dans la situation de la *cicatricule* où le poulet se forme. Cette petite tache ronde, *chalasa*, qui est sur l'enveloppe du jaune, se trouve toujours placée presque au centre de l'œuf & vers le haut du côté de la mere, pour en recevoir la chaleur dont il a besoin. De quelque maniere qu'on remue l'œuf, le petit n'est jamais renversé: le jaune est soutenu par deux ligamens qu'on trouve toujours à l'ouverture de l'œuf, & qui s'attachent de part & d'autre à la membrane commune qui est collée sur la coque. Si on tiroit une ligne d'un ligament à l'autre, elle ne passeroit pas juste par le milieu du jaune, mais au dessus du centre, & couperoit le jaune en deux portions inégales; en sorte que la moindre partie du jaune où le germe est posé, demeure nécessairement élevée vers le ventre de l'oiseau qui couve l'œuf; & que l'autre partie étant plus grosse & plus pesante, descend toujours vers le bas autant que les liens le permettent. Si l'œuf se déplace, le petit n'en souffre point, & il jouit, quoi qu'il arrive, de la chaleur qui met tout en action chez lui, & qui perfectionne peu à-peu le développement de ses parties. Ne pouvant plus glisser en bas, il se nourrit à l'aise, d'abord de ce blanc liquide & délicat qui est à portée de lui; ensuite il tire sa vie & son accroissement du jaune, qui est une nourriture plus forte. Lorsque son bec est durci & qu'il a presque rempli toute la capacité de sa maison, il se met en devoir de rompre la coque; il fait déjà entendre distinctement sa voix avant que sa coque soit fêlée, ce qui prouve la pénétrabilité de l'air à travers les pores de la coque: enfin il en sort ayant le ventre rempli de ce jaune qui lui tient lieu de

nourriture encore quelque temps jusqu'à ce qu'il puisse s'affermir sur ses pattes, & aller chercher lui-même à vivre; (chez la plupart des oiseaux ce sont le pere & la mere qui lui en viennent apporter.) On prétend avoir observé qu'en général les petits oiseaux ne voient que le septieme jour qu'ils sont éclos; mais ils entendent aussi-tôt l'*appel* ou *cri* du pere ou de la mere qui leur annoncent la nourriture. *Voyez* la maniere dont les poulets s'y prennent pour sortir de l'œuf, à la suite de l'article COQ: *voyez aussi le mot* ŒUF.

Le corbeau & les corneilles mâles, dans le temps de la couvée, apportent à manger à leurs femelles. Avec quel art les oiseaux mâles partagent & adoucissent la peine de leurs fidelles compagnes! l'un réitere ses voyages sans se rebuter, & met dans le bec de la femelle, la mangeaille toute préparée; un autre accompagne ces petits services de son ramage; par-tout l'on voit l'inquiétude officieuse du mari, & l'assiduité pénible de la mere.

Les pigeons, les moineaux, & plusieurs autres oiseaux, qui ne s'accouplent point indifféremment, & font comme un ménage à part de mâle à femelle, couvent tour à tour; mais parmi les autres, on ne voit pas que les mâles prennent le moindre soin de leurs petits, puisque même ils abandonnent leur femelle. On remarque que la plupart des canards, quand ils sont obligés de quitter leurs œufs pour aller chercher à manger, s'arrachent une bonne quantité de plumes pour les couvrir & les garantir du froid. Quel soin, quelle sollicitude pour pourvoir à la nourriture de leurs petits nouvellement éclos, jusqu'à ce qu'ils ayent assez de force pour voler & pour aller chercher eux-mêmes leur pâture!

Non-seulement le pigeon mâle couve les œufs & travaille à la construction du nid comme la femelle, mais les petits pigeons ne pourroient pas digérer des graines dures, si le pere & la mere ne les avaloient auparavant pour les ramollir dans leur gosier; ensuite de quoi, ils les dégorgent dans le bec des pigeonneaux.

Le hibou fait son nid sur le haut de quelque montagne escarpée, dans l'endroit qui est le plus exposé aux

ardeurs du soleil, afin que les cadavres qu'il y apporte, se changent par la chaleur en une espece de bouillie propre à nourrir ses petits.

Le coucou pond ses œufs dans le nid des autres oiseaux: il laisse à ceux-ci le soin de les couver & de les faire éclore. Mais quelle étrange surprise pour la mere, qui croit trouver de l'affection dans le nouveau né! A peine celui-ci a-t-il quelques jours, qu'il dévore les petits de l'oiseau dont le nid lui a servi de berceau, & souvent, comme carnivore, il extermine & mange sa prétendue mere. *Voyez à l'article* COUCOU.

Tous les oiseaux (excepté le coucou) sont très-attachés à leurs petits: ils sentent alors ce que c'est que d'être chargé de famille; il faut trouver à vivre pour six ou dix au lieu de deux. Dans le temps que les petits grandissent, le rossignol & la fauvette suspendent leurs concerts accoutumés; le besoin les fait aller en quête dès le soleil levant: de retour, ils distribuent la nourriture aux petits avec beaucoup d'égalité. Au devoir de nourrice succede celui de sentinelle, & l'amitié change les humeurs, en corrigeant les défauts; c'est ainsi qu'une poule gourmande & insatiable n'a plus rien à elle quand elle a des petits. Cette mere, naturellement timide, ne savoit que fuir auparavant: à la tête d'une troupe de poussins, c'est une héroïne qui affronte tous les dangers pour la défense de ses petits. Cette conduite est égale au désir qu'elle a de pondre & de couver.

La poule d'Inde, suivie de sa petite famille, a l'art de pousser un cri lugubre qui oblige tous ses enfans à se tapir sous les buissons, & de contrefaire les morts. Ce cri annonce qu'il y a dans l'air un oiseau de proie prêt à fondre sur eux; l'oiseau de proie disparoit-il, l'alarme cesse, & la mere de famille pousse un autre cri qui retire les petits de la consternation. A mesure que l'on étudie de plus en plus la Nature, son mécanisme, son art, ses ressources, la multiplicité de ses moyens dans l'exécution, ses désordres mêmes apparens, tout nous étonne, tout nous surprend. On peut consulter l'article PERDRIX.

Lorsque les petits loriots sont éclos, la mere les défend contre leurs ennemis & même contre l'homme,

avec plus d'intrépidité qu'on en attendroit d'un si petit oiseau : on a vu le pere & la mere s'élancer courageusement sur ceux qui leur enlevoient leur couvée, & ce qui est encore plus rare, on a vu la mere prise avec le nid, continuer de couver en cage & mourir sur ses œufs.

Les perdrix blanches habitent les Alpes, où elles se nourrissent de semences du bouleau nain ; & afin qu'elles fussent plus en état de courir parmi les neiges, la nature leur a donné des pattes couvertes de plumes ; semblablement à nos perdrix grises, elles s'apparient le mâle avec la femelle, & s'aident mutuellement pour élever leurs petits.

Le pélican habite dans les déserts arides ; & comme il fait son nid dans les lieux fort éloignés de la mer, & qu'il lui faut aller chercher bien loin la provision de l'eau qui lui est nécessaire, tant pour lui que pour ses petits, la Nature l'a pourvu d'un instrument propre à cet usage : il porte sous la gorge une espece de sac assez ample & profond : il le remplit d'une quantité d'eau, qui lui est suffisante pour s'abreuver pendant plusieurs jours.

Les oies, les canards & les plongeons, qui vivent dans l'eau, y trouvent à se nourrir d'insectes aquatiques, de petits poissons, d'œufs de poissons, &c. La forme de leur bec, de leur cou, de leurs pattes & de leurs plumes, répond admirablement bien à l'instinct & au genre de vie qui leur sont propres. La même remarque peut se faire dans toutes les autres especes d'oiseaux.

Les canards & tous les oiseaux qui comme eux ont les doigts des pieds réunis par une membrane, qui dans nos climats se reposent pendant la nuit sur la terre, ceux qui vivent au bord des eaux & qui ne se perchent point en Europe, passent toute la nuit sur des branches d'arbres à la Guiane : ils auroient couru trop de périls sur une terre couverte de reptiles dangereux par leur nombre & par leur force, la nécessité leur a appris à triompher de leur forme & des obstacles qu'elle a dû leur causer. Ainsi le mécanisme & la disposition des organes, ne déterminent pas seuls les actions des animaux. L'instinct, une main invisible, ou une prévoyan-

ce bienfaisante, en reglent & en dirigent les mouvemens.

Un oiseau palmé de Norwege (espece de *mouette* ou plutôt de *stercoraire* qui est le *strund-jager* de Ray) a une façon de vivre tout-à-fait particuliere. Comme il n'a pas la même facilité que les autres oiseaux aquatiques de plonger dans l'eau pour prendre des poissons, il se nourrit aux dépens des mauves, qui, se voyant poursuivies, rejettent une partie de leur proie dont il fait son repas. Comme les poissons se tiennent en automne au fond de l'eau, une espece de plongeon, qui a la facilité de s'y enfoncer encore plus avant que les mauves, fournit aussi de quoi vivre à cet oiseau.

La nourriture la plus ordinaire des petits oiseaux est le *polygone vulgaire* (renouée), plante fort commune, qui se trouve par-tout jusques dans les grands chemins, & qui après la moisson est très-abondante dans les champs. Les semences, dont elle est toute chargée, tombent à terre, & sont recueillies durant toute l'année par les oiseaux qui portent le nom de *granivore*.

Les gros *oiseaux de rapine* vivent de petits quadrupedes & de divers petits oiseaux. Ceux d'entr'eux qui sont foibles & plus lâches que les autres, se contentent des cadavres que le hasard leur fait trouver. Dans tous les animaux qui passent l'hiver sans prendre de nourriture, on observe que le mouvement péristaltique des intestins est suspendu, ce qui fait que pendant ce temps-là ils ne sont nullement pressés de la faim: telle est l'expérience qu'en a fait *Lister*. Leur sang ne se coagule point dans la palette, comme celui des autres animaux, & en est par là plus propre à entretenir la circulation.

Les *coqs de bruyere* se creusent souvent des retraites sous la neige, où ils se promenent pendant l'hiver, mais ils muent en été; de sorte que ne pouvant plus voler au mois d'Août, ils sont contraints de courir à travers les bois pour chercher leur nourriture, qu'ils trouvent néanmoins sans peine, parce que le fruit de l'*airelle*, qui est alors en sa maturité, leur fournit abondamment de quoi manger. Les petits, au contraire, ne muent point au commencement de l'été, parce que

n'étant pas encore en état de bien courir, ils ont besoin de leurs ailes pour s'éloigner en cas de péril.

Les autres oiseaux qui se nourrissent d'insectes, vont vivre chaque année sous un climat plus tempéré, tandis que toutes les terres situées plus près du Nord, où ils ont passé l'été fort agréablement, sont couvertes de neiges & de glaçons. Rien de plus singulier que la maniere dont voyagent les oiseaux de passage. Le jour du départ est marqué pour chaque espece; ils s'assemblent par troupes: la résolution étant prise & annoncée à chacun d'eux, ils se mettent en route, & maintiennent une sorte de discipline; nuls traîneurs, aucuns déserteurs: sans boussole & sans carte, mais par l'instinct des besoins, ils suivent invariablement la route qui conduit au lieu où ils se proposent d'arriver (*a*).

Le degré de froid ou de chaud qui regne dans l'atmosphere, accélere ou retarde les émigrations des oiseaux de passage; il y apparemment un rapport secret entre la température qui convient à la constitution de certaines especes, & celle qui est nécessaire pour la production des alimens dont elles se nourrissent. Les vents paroissent avoir aussi une grande influence sur les voyages des oiseaux: l'histoire de ces émigrations est essentiellement liée aux observations météorologiques, & les suppose. Quoi qu'il en soit, ces émigrations régulieres sur notre hémisphere, par diverses sortes d'oiseaux, sont très-avantageuses à plusieurs Nations différentes, qui profitent de la visite de ces nouveaux habitans. Ces oiseaux sont nommés *passagers*, & presque tous retournent par bandes chacun dans leurs climats à jour marqué: il en reste cependant beaucoup, qui ne sortent point du pays où ils sont nés. Le Moteur de la nature a donné à ceux-ci l'instinct puissant de trouver constamment la nourriture annuelle dans leur pays na-

(*a*) On prétend que la peste peut quelquefois être apportée par les oiseaux; voici les observations sur lesquelles on se fonde. Dans la derniere peste de Marseille les oiseaux quitterent le pays & n'y revinrent qu'après qu'elle fut entiérement dissipée. On se rappelle qu'elle fut apportée, il y a quelques années, en Italie par une corneille. Comme cet oiseau y est très-rare, il fut ramassé avec empressement par plusieurs personnes. De vingt-sept qui composoient la compagnie & qui toucherent l'oiseau fatal, il en mourut seize.

tal. On observera que ceux des oiseaux qui ne font pas de transmigrations ont le bec fort & mangent de tout, tandis que ceux qui ne vivent que d'insectes ailés ont le bec foible ; ceux-ci sont donc obligés pour vivre de passer en d'autres contrées.

Les *grives*, les *étourneaux*, les *pinçons* & les *cailles*, forment autant de caravanes emplumées, qui nous quittent dans l'automne ; & pour nous dédommager en quelque sorte de leur absence, le froid nous amene les bécasses, les bécassines, & toutes sortes d'oiseaux aquatiques. (M. *Bourgeois* observe ici que le passage & le séjour des différens oiseaux varient dans chaque pays, suivant la nature du climat. En Suisse, dit-il, les grives à pieds noirs n'arrivent qu'à l'entrée de l'hiver, & elles y restent pour l'ordinaire jusqu'au printems : les bécasses & les bécassines font leur passage au printems & en automne : on n'en voit point en cette contrée pendant l'hiver, ni pendant l'été.)

L'*étourneau*, dit M. *Linnæus*, ne trouvant plus en Suede, sur la fin de l'été, une aussi grande quantité de vermisseaux qu'auparavant, descend chaque année dans la Scandinavie, l'Allemagne & le Danemarck.

Quelque répandu que soit le *loriot*, il y a des pays qu'il semble éviter ; on ne le trouve ni en Suede, ni en Angleterre, ni dans les montagnes de Bugey, ni même à la hauteur de Nantua, quoiqu'il se montre réguliérement en Suisse deux fois l'année. C'est vers la fin du printems que les loriots arrivent dans nos climats. Dès que les petits sont élevés, la famille se met en marche pour voyager ; c'est ordinairement vers la fin d'Août ou le commencement de Septembre : ils ne se réunissent jamais en troupes nombreuses, ils ne restent pas même assemblés en famille ; car on n'en trouve guere plus de deux ou trois ensemble : quoiqu'ils volent peu légérement & en battant des ailes, comme le merle, il est probable qu'ils vont passer leur quartier d'hiver en Afrique, car on les voit passer à Malthe dans le mois de Septembre & repasser au printems. Arrivés dans nos climats, ils font la guerre aux insectes, & vivent de scarabées, de chenilles & de vermisseaux ; mais leur nourriture de choix, celle dont ils sont

le plus avides, ce sont les cerises, les figues, les baies de sorbier, les pois, &c. Les loriots ne sont point faciles à élever ni à apprivoiser; on les prend à la pipée, à l'abreuvoir, & avec diverses sortes de filets.

Quand l'automne répand dans nos climats les derniers rayons qui annoncent les approches de l'hiver, alors les insectes commencent à disparoître, les hirondelles planent dans l'air, volent en rasant les eaux, s'assemblent & se rejoignent pour se transporter dans des climats plus chauds où elles trouvent un asile & des vivres. *Voyez* HIRONDELLE. De même les femelles des *pinçons* passent en grandes troupes par la Hollande aux environs de la Saint Michel, se joignent aux nôtres, & vont habiter tous les hivers les pays Méridionaux.

Les *oiseaux aquatiques* quittent les régions du Nord avant que les eaux soient glacées, & se retirent l'hiver dans celles du Midi. On voit aussi de ces oiseaux à qui les besoins font braver l'intempérie des saisons les plus opposées: c'est ainsi que tout Paris a vu en Août 1765, des légions de cigognes qui voloient sur deux couches au-dessus l'une de l'autre; l'inférieure étoit si basse qu'on auroit pu en prendre à la main; les unes se répandirent dans les environs de cette ville, les autres se percherent sur les toits des édifices les plus élevés de la Capitale: ces oiseaux accoutumés à vivre dans des pays aquatiques & froids (la Hollande & l'Allemagne), sembloient venir par la route d'Espagne pour gagner les endroits du Nord où ils trouvent de quoi vivre facilement & en abondance.

Autrefois lorsque ces passages extraordinaires de cigognes arrivoient, on les regardoit comme un présage de grands malheurs; mais aujourd'hui que l'on connoît la cause de ces effets naturels, l'on n'en est point effrayé; l'oiseau quitte les pays qu'il habite quand la nourriture nécessaire y manque, la nature le presse d'en chercher ailleurs.

Les *grues* quittent pendant l'hiver les régions Septentrionales, pour voler vers les campagnes du Midi: on les voit passer par troupes de cinquante, de soixante & de cent; la nuit elles s'abattent sur la terre

pour prendre de la nourriture, & après l'hiver elles retournent à leur premiere demeure où regne un froid plus supportable : elles s'élevent toujours en troupe & forment un vol figuré.

On voit en automne, sur les marais de Pologne, une multitude innombrable de *canards*, d'*oies* & de *cygnes*, qui par différentes rivieres vont se rendre au Pont-Euxin, dont l'eau salée ne se gêle point, & qui reviennent au retour du printems, vers les marais Septentrionaux, pour y pondre leurs œufs, parce que dans ces régions, sur-tout dans la Laponie, ils trouvent une grande quantité de moucherons.

La *bécasse* reste dans les vallons & les bois en Angleterre & en France pendant la saison des frimats, & en sort aux approches du printems, après que le mâle s'est appareillé avec sa femelle ; ensuite elle remonte sur les montagnes.

Dans ces plages où l'Océan Septentrional bouillonne en de vastes tourbillons autour des îles éloignées, tristes & solitaires de Thulé, ainsi qu'aux lieux où les flots Atlantiques se brisent contre les orageuses Orcades, l'air est comme obscurci au printems par l'arrivée d'une multitude d'oiseaux aquatiques qui viennent y aborder ; la rive retentit du bruit sauvage que produit l'ensemble de leurs cris. Le canard à duvet repaire aussi dans les creux des rochers éboulés dans les eaux.

Le *canard d'Islande* passe en Suede au mois d'Avril, & continue sa course jusqu'à la mer blanche. L'oiseau nommé *bec recourbé*, se retire en Italie tous les ans chaque automne. Le *colymbe* passe tous les étés, ainsi que tous les automnes, en Allemagne. La *grive* remplit les forêts de Suede au printems, & les quitte en hiver pour passer en France & ailleurs. Le *moineau de neige* (emberiza) abandonne les Alpes pendant tout l'hiver & passe en Allemagne & en Suede. La *mauve*, pendant l'hiver, voyage en Espagne, en Italie & en France. L'*hirondelle* poursuit les différentes especes d'insectes qui voltigent dans l'air. Le *pic*, pour se nourrir, tire avec sa langue les insectes qui se tiennent cachés dans l'écorce des arbres. Les *corbeaux* vivent de cadavres, & suivent quelquefois les armées. Qui peut ra-

conter combien de ces nations volantes vont & viennent sans cesse ? Combien de nuages ailés s'élevent au-dessus des nuages de l'air dans toutes les saisons ?

Les *oiseaux* évitent les ruses de leurs ennemis par le vol qui leur est particulier, & par ce moyen ils échappent même souvent aux oiseaux de proie ; car si le pigeon, par exemple, voloit de la même maniere que l'épervier, il ne pourroit presque jamais éviter ses griffes.

Les *cigognes* & les *faucons* sont des bêtes de rapine très nécessaires pour empêcher la trop grande multiplication des autres especes. Ces oiseaux, au rapport de *Bélon*, nétoient l'Egypte d'une multitude infinie de grenouilles, dont tout le pays est couvert après les inondations du Nil. Ils détruisent aussi les rats qui infestent la Palestine.

Les oiseaux (dit M. *Clayton*, *dans les Transact. Philosoph.*) qui ont le bec plat, & qui cherchent leur nourriture en tâtonnant, ou en fouillant dans la terre, ont trois paires de nerfs qui s'étendent jusques dans leur bec : c'est par ces nerfs qu'ils distinguent avec tant de sagacité & d'exactitude, ce qui est propre à leur servir de nourriture d'avec ce qu'ils doivent rejeter ; choix qu'ils font uniquement par le goût, sans qu'ils voient les aliments : ces nerfs paroissent avec plus d'évidence dans le bec & dans la tête du canard, aussi n'y a-t-il pas d'oiseau qui fouille autant pour trouver sa nourriture. On trouve aussi deux de ces nerfs dans la partie supérieure du bec de la corneille, du grôle, & probablement les autres oiseaux à bec rond ont ce même avantage. Par-tout on voit que le Créateur a donné aux brutes une espece d'instinct qui leur fait rejeter ce qui leur est nuisible : cet instinct l'emporte souvent sur notre raison par l'abus que les hommes en font.

La nature a aussi placé sous le gosier de ces animaux une poche qu'on nomme le *jabot*, où ils mettent leur mangeaille en réserve : la liqueur où elle nage dans ce jabot, aide à en faire la premiere digestion ; le gésier, cette poche musculeuse où il n'entre que très-peu de nourriture à la fois, fait le reste, souvent à l'aide de quelques petits graviers & de cailloux raboteux que

l'oiseau avale pour mieux briser sa nourriture, & peut-être pour tenir les passages libres. Ainsi l'on voit que dans les oiseaux la digestion se fait par voie de dissolution & de trituration : par dissolution dans ceux qui ont, comme la buse, un estomac membraneux, & par trituration dans les oiseaux qui ont un gésier. M. de *Réaumur*, qui avoit étudié la Gastrologie des oiseaux, fit avaler à des dindons de petites boules de verre, pour prouver cette derniere propriété de digérer ; ce qui lui réussit assez bien. Au reste le gésier des oiseaux est très-robuste, très-compacte, & a une faculté de trituration bien étonnante. L'intérieur de cette poche est rempli de rugosités & de plis très-compactes. Voyez *l'Hist. de l'Académ. des Scienc. ann. 1752.* En un mot, il résulte des expériences de M. de *Réaumur*, dont on peut voir aussi le détail dans le *Journal des Savans* de Juin & Juillet 1763 ; il résulte, dis-je, que dans les oiseaux de proie la digestion paroit se faire uniquement par l'action d'un suc dissolvant, sans indice de trituration : cette derniere action est au contraire très-marquée & paroit le principal moyen de digestion dans les oiseaux de l'ordre des poules, des pigeons, & généralement dans les granivores.

Il n'en est pas, dit *Bélon*, des oiseaux comme des animaux terrestres, qui dans chaque espece sont ou plus grands ou plus petits, suivant les régions qu'ils habitent. Les oiseaux sauvages, suivant l'espece dont ils sont, conservent assez constamment par-tout leur grandeur, leur forme, leur couleur, leur nature : un coq vivant en Afrique, est semblable au coq qui vit en Asie & en Europe. Tous les oiseaux, excepté ceux qui ne sortent que la nuit, ont la tête petite à proportion de la grosseur du corps. Ils ont aussi le corps plus court, plus large, & plus épais que les animaux quadrupedes ; l'oiseau mouche est le pygmée des oiseaux connus, & l'autruche & le condor en sont les géants.

Les oiseaux ont des yeux & des paupieres, comme les autres animaux ; mais les yeux des oiseaux comme ceux des poissons ont moins de convexité que ceux des quadrupedes : ils couvrent leurs yeux d'une membrane qui sort du grand angle de l'œil, & qui recouvre l'œil

en tout ou en partie au gré de l'oiseau, quoique les paupieres restent ouvertes. Cette membrane se trouve aussi dans plusieurs quadrupedes, elle sert à nétoyer la surface de l'œil. Les oiseaux voient tous fort clair, mais les uns plus que les autres; les uns voient pendant le jour, & les autres pendant la nuit. Les oiseaux de proie ont les yeux ombrés. Aucun oiseau n'a de cils, ni de sourcils, du moins qui portent du poil autour des yeux, comme chez les quadrupedes : il est vrai cependant qu'il y en a, tels que les faisans, qui ont quelque chose d'approchant. L'on a toujours cru que la paupiere supérieure des oiseaux ne se baissoit point, excepté celle de l'autruche, & qu'il n'y avoit que la paupiere inférieure qui s'élevoit sur l'œil; cela est vrai dans le coq-dinde, le coq domestique, la poule, l'oie, le canard, le moineau & le merle; mais le pigeon, la tourterelle, le serin & toutes les especes de hiboux ont la paupiere supérieure mobile; elle se baisse & va trouver la paupiere inférieure. C'est le contraire quand ces oiseaux sont morts. Il convient d'exposer tous les détails connus sur cet article. En voici le sommaire : nous disons que les yeux des oiseaux sont dans quelques parties, organisés différemment de ceux de l'homme & des animaux quadrupedes, qu'outre les deux paupieres supérieure & inférieure, les oiseaux en ont encore une troisieme nommée paupiere interne; *membrana nictitoria aut nictitans*; elle se retire & se plisse en forme de croissant dans le grand coin de l'œil, ses cillements fréquents & rapides s'exécutent par une mécanique musculaire très-curieuse. La paupiere supérieure est presque entiérement immobile, mais l'inférieure est capable de fermer l'œil en s'élevant vers la supérieure, ce qui n'arrive que lorsque l'animal dort, ou lorsqu'il ne vit plus; ces deux paupieres ont chacune un point lacrimal, & n'ont point de rebords cartilagineux; la cornée transparente est environnée d'un cercle osseux, composé de quinze pieces, plus ou moins, posées les unes sur les autres en recouvrement, comme les tuiles ou les ardoises d'un toit; le cristallin est plus dur que celui de l'homme, mais moins dur que celui des quadrupedes & des poissons, & sa plus

grande courbure eſt en arriere; enfin il ſort du nerf optique, entre la rétine & la choroïde, une membrane noire de figure rhomboïde & compoſée de fibres paralleles, laquelle traverſe l'humeur vitrée, & va s'attacher quelquefois immédiatement par ſon angle antérieur, quelquefois par un filet qui part de cet angle, à la capſule du criſtallin; c'eſt à cette membrane ſubtile, tranſparente, que MM. les Anatomiſtes de l'Académie des Sciences ont donné le nom de *bourſe*; ſon uſage eſt, ſelon M. *Petit*, d'abſorber les rayons de lumiere qui partent des objets qui ſont à côté de la tête, & qui entrent directement dans les yeux: l'organe de la vue chez les oiſeaux, comme on le voit, eſt plus compoſé que dans les quadrupedes, auſſi les oiſeaux l'emportent-ils par ce ſens ſur les autres animaux. Les oiſeaux ont ſur le bec deux trous qui leur ſervent pour l'odorat. Ils ont un bec ſans dents; mais il y a quelques oiſeaux de riviere, qui ont le bec dentelé & ſouvent crochu, d'autres voûté & tranchant, d'autres droit & rond, d'autres long & pointu, &c. *Voyez à l'article* BEC.

Les oreilles des oiſeaux n'ont point de conque à l'extérieur, & dans la plupart le conduit auditif eſt ſans aucun couvercle, mais il y en a dans les oiſeaux de proie nocturnes, & dans quelques-uns des diurnes. Voyez la *Théolog. Phyſiq.* de *Derham*.

Non ſeulement les oiſeaux different par le bec, mais encore par la langue: les uns l'ont courte, les autres large; d'autres déliée & la plupart dure: il y en a qui ont la queue longue, d'autres courte, & d'autres qui n'en ont point du tout; tous ont les plumes fendues & attachées à la peau. La racine en eſt creuſe: outre ces plumes, ils ont encore une eſpece de poil, ou une eſpece de duvet.

Les oiſeaux qui ont les pattes longues ont auſſi le cou long, autrement ils ne pourroient prendre leur aliment ſur la terre; mais tous ceux dont le cou eſt long n'ont pas les pattes longues, tel eſt le cygne. Ceux qui n'ont point de doigt en arriere ne ſe trouvent jamais ſur les arbres. Avec quel artifice les palmipedes replient leurs orteils & leurs pieds, quand ils tirent à

eux leurs jambes, ou qu'ils les étendent pour nager; ils élargissent & ouvrent tout le pied quand ils pressent l'eau, ou quand ils veulent aller en avant. Les jambes sont pliées dans tous les oiseaux, afin qu'ils puissent se percher, jucher & se reposer plus facilement. Cette duplicature leur aide encore à prendre l'essor pour voler.

En général les oiseaux vivent long-temps; cependant on a remarqué que ceux qu'on détenoit en cage, & même qu'on apprivoisoit, n'avoient pas une vie de si longue durée, que quand ils ne sont point esclaves. Les uns vivent deux ans, d'autres dix: on prétend qu'il y en a qui vivent cinquante, & même plus; tels sont les oiseaux de proie, le perroquet, dont le cours de la vie ne paroît pas réglé: au reste les femelles de ce genre d'animaux vivent plus long-temps que les mâles. Ceux qui ont les ongles droits & qui fréquentent les rivieres, se lavent en tout temps dans l'eau: ceux qui ne volent pas fort haut, comme les poules, aiment à se vautrer dans la poussiere. On voit qu'un oiseau est malade quand son plumage est hérissé & mal en ordre; cette maladie est souvent indépendante de la mue qu'éprouvent tous ces animaux. La *mue* consiste dans leur changement de plumes, ce qui arrive une fois chaque année: c'est pour eux un temps critique & qui leur est souvent mortel. Cette mue se fait quand les tuyaux des plumes cessent de prendre de la nourriture & se dessechent; alors les sucs nourriciers qu'elles ne s'approprient plus, sont portés au germe de la plume nouvelle qui croît & force l'ancienne plume au bout de laquelle il est, de lui laisser la place & de tomber. Jamais les oiseaux ne pondent dans cet état maladif, & il arrive quelquefois que la couleur du plumage souffre dans la muë des changemens. Cette singularité dépendroit-elle de l'âge, des passions, ou de la nourriture de l'oiseau? On peut consulter un Mémoire intitulé, *Parallele de la nourriture des plumes, & de celle des dents*, par M. *Rostan*.

On connoît les oiseaux à la différence de leur vol & de leur marcher: plusieurs d'entr'eux marchent toujours pas à pas comme le paon; d'autres ne peuvent aller qu'en sautant, comme la pie; d'autres en courant, comme

comme la perdrix; d'autres en jetant leur pas en avant; quelques-uns ne pouvant marcher sur terre, ne cessent de voler, ou s'arrêtent bien peu.

Les oiseaux qui ont de grandes ailes, ainsi que ceux qui ont des ongles crochus, tels que les oiseaux de proie, ne marchent que difficilement. Il y en a qui pressent leurs ailes en volant, après avoir frappé l'air seulement d'un seul coup; d'autres ne peuvent voler qu'ils ne remuent souvent les ailes; d'autres s'élancent par reprises, ou avancent par bonds; d'autres semblent se glisser dans l'air, ou le fendre d'une course égale. Ceux-ci vont toujours terre à terre; ceux-là s'élevent jusqu'aux nues; d'autres ne s'élevent de terre qu'en jetant un grand cri avant de partir; d'autres ne font aucun bruit. Les uns s'élevent tout droit de terre; d'autres ne peuvent s'élever sans prendre leur course; d'autres partent du sommet de quelques hauteurs; d'autres enfin savent diversifier leur vol: ils montent en ligne oblique ou circulaire, ou paroissent se laisser tomber & se relever tout d'un coup, se suspendre & demeurer comme immobiles, planer ensuite, s'écarter à droite, à gauche, rebrousser chemin, &c.

La tête de l'oiseau, & surtout le bec, est fait pour se frayer un chemin commode au travers de l'air: la situation du poumon, la disposition de la poitrine & de ses os rangés en forme de quille, tout sert à contrebalancer sa tête & son cou; sa queue lui tient lieu de gouvernail, tandis qu'il rame avec ses ailes. Mais ce gouvernail ne sert pas seulement à maintenir l'équilibre du vol, il sert aussi à hausser, baisser, tourner où l'oiseau veut; car la queue ne se porte pas plutôt vers un côté, que la tête se porte d'un autre. Les oiseaux qui ont la queue courte & les pattes longues étendent les pieds en arriere lorsqu'ils volent. Si la queue est grande, l'oiseau approche ses pieds de son corps en volant ou les laisse pendans: l'oiseau qui a peu ou point de queue comme le colymbe, vole difficilement & a le corps presque droit en l'air. Les grandes plumes de la queue sont toujours en nombre pair.

Que l'art brille dans la construction générale des ailes & dans chacune de leurs parties! Elles ont été placées

par la Nature dans le centre de gravité, l'endroit le plus propre à tenir le corps de l'animal volant dans un exact équilibre au milieu d'un fluide auſſi ſubtil que l'air. Quant à ceux qui nagent & qui volent, leurs ailes, pour cet effet, ſont attachées au corps hors du centre de gravité; & pour ceux qui ſe plongent plus ſouvent qu'ils ne volent, leurs jambes ſont plus reculées vers le derriere, & leurs ailes plus avancées vers le devant du corps.

Quelle légéreté dans ces ailes, & en même temps quelle force! Le tuyau de chaque plume eſt creux; roide, léger, & cependant très fort; les barbes des plumes ſont rangées de chaque côté, & compoſées de filets artiſtement travaillés: elles ſont creuſées & bordées de petites plumes qui s'engrenent les unes dans les autres. Les grandes plumes des ailes ſont recouvertes, à leur origine, d'autres petites plumes en deſſus & en deſſous. C'eſt par cet arrangement mécanique, que les ailes peuvent frapper l'air qui eſt ſi fluide, & ſervir à l'oiſeau de point d'appui continuel pour s'élever à ſon gré & pour mieux aider à ſon mouvement progreſſif dans l'air.

Quel appareil d'os très forts, mais ſur-tout légers, de jointures qui s'ouvrent, ſe ferment, ou ſe meuvent de tel côté que l'occaſion le demande, ſoit pour étendre les ailes, ſoit pour les reſſerrer vers le corps! De quel uſage ne ſont point les plumes de la queue, pour conduire l'oiſeau dans ſon vol, ou lorſqu'il veut s'abaiſſer! La force des muſcles pectoraux eſt ſur-tout remarquable, parce qu'ils ſont plus forts & plus robuſtes à proportion dans les oiſeaux, que dans l'homme & dans les autres animaux qui n'ont point été faits pour voler.

Indépendamment de tous les autres obſtacles qui s'oppoſent à l'art extravagant qu'ont cherché les hommes de voler, les muſcles des bras ne ſeroient point aſſez forts; les jambes y ſeroient plus propres. Mais il faut reléguer cette entrepriſe avec celle de produire le mouvement perpétuel, de trouver un remede univerſel, & autres ſemblables, qui ſont plutôt voir la foibleſſe que la force de l'eſprit humain.

Quand on considere un oiseau qui vole, rien de plus naturel aux yeux de l'habitude, rien de si étonnant aux yeux de la raison. Cette masse qui s'éleve dans l'air, malgré le poids de cet air qui gravite sur tous les corps, est emportée, non par une force étrangere, mais par un mouvement qui lui est propre, & qui s'y soutient long-temps avec vigueur & avec grace. Les gros & grands oiseaux ont l'art de s'enfler, & d'avoir toujours des provisions d'air en volant. A volonté ils rendent leur corps plus ou moins léger dans leur vol, ou plus gros lorsqu'ils nagent, ou plus pesant & moins gros lorsqu'ils plongent.

Quoique tous les oiseaux ayent des ailes, il y en a qui ne peuvent pas voler; tels sont l'autruche, l'émeu, le pingouin, qui n'étendent & n'agitent leurs ailes que pour accélérer leur course. On ne jouit point de cet aspect varié lorsque les oiseaux sont détenus en cage, pas même dans une grande voliere. Leur génie est flétri par la captivité: les visites fréquentes interrompent également ces petits prisonniers; ce n'est qu'après un certain temps qu'on y peut voir leurs caresses, leurs querelles & leurs ménages. La nouvelle nourriture qu'on leur donne, & qui ne consiste pas en vers, en chenilles, en mouches, en especes de graines particulieres, dont ils savent tous se traiter chacun suivant leur appétit dans chaque saison, ne leur fait pas moins regretter la solitude & la liberté; en un mot, ils agissent moins librement, & on reconnoît moins la diversité de leurs caracteres & de leurs travaux. Ajoutons que la domesticité ou l'esclavage produit les grandes variétés dans les individus de la même espece d'oiseau. Tout au contraire des oiseaux sauvages. C'est cet état d'esclavage qui les rend dociles à la voix; ils apprennent à chanter, à siffler un air, à prononcer quelques mots. A cet égard ils sont au dessus des animaux quadrupedes, quoique leur cerveau ne paroisse pas plus adapté à l'imagination & à la mémoire. La langue des oiseaux mérite plus notre attention par ses variétés, la forme, la structure, les attaches & les muscles: nous en citerons des preuves ci-après.

Des Voyageurs ont dit que les oiseaux des Indes,

ſur-tout dans le pays de Juda, ſurpaſſent pour le plumage & pour le chant ceux d'Europe. C'eſt à tort; le concert que les oiſeaux forment dans les bois de l'Europe eſt ſupérieur à celui qu'on entend dans les autres parties du monde, & il nous ſemble que pour la beauté même du plumage, nous n'avons rien à déſirer dans nos oiſeaux Européens; car ſans parler du paon, qui eſt ſans contredit le phœnix des oiſeaux, ni de nos autres volailles domeſtiques, n'avons-nous pas le faiſan, la perdrix rouge, les canards, l'outarde, le francolin, les eſpeces de geais, la huppe, le loriot, l'étourneau, le pluvier doré, le vanneau, la pie, les pics, le bouvreuil, le chardonneret, le martinet pêcheur, & pluſieurs autres? Quant à la différence des plumes, il eſt aiſé de s'en convaincre en jetant les yeux ſur les plumes de l'*autruche*, du *paon*, de l'*aigle*, du *cygne*, du *perroquet*, de la *chouette*, du *pingouin*, de l'*oiſeau de paradis*, du *caſoar*, enfin de toutes les eſpeces d'oiſeaux que nous connoiſſons.

Les plumes varient ſuivant l'âge de l'oiſeau. Les jeunes loriots mâles reſſemblent aſſez aux femelles pour le plumage lorſqu'ils ſont jeunes; dans le premier temps ils ſont mouchetés encore plus que les femelles, ils le ſont même ſur la partie ſupérieure du corps; mais dès le mois d'Août le jaune commence déjà à paroître ſous le corps, ils ont auſſi un cri différent de celui des vieux; ceux-ci diſent *yo*, *yo*, *yo*, qu'ils font ſuivre quelquefois d'une ſorte de miaulement comme celui des chats.

Les plumes du côté du corps ſont garnies d'un duvet mou, chaud: *voyez* DUVET. Du côté de l'air elles ſont garnies d'un double rang de barbes plus longues d'un côté que de l'autre. Ces barbes de largeur inégale, ſont une enfilade de petites lames minces & plates, couchées & ſerrées dans un alignement auſſi juſte, que ſi on avoit taillé les extrémités avec des ciſeaux. Les plumes, ſur-tout celles de l'aile, ſont outre cela diſpoſées de façon que le rang des petites barbes de l'une ſe gliſſe, joue & ſe découvre plus ou moins entre les grandes barbes de l'autre plume qui eſt au deſſus: un nouveau rang de moindres plumes, ſert de couver-

ture aux tuyaux des groſſes : l'air ne peut paſſer nulle part, & par-là, comme nous l'avons dit plus haut, l'impulſion des plumes ſur ce fluide devient très-forte & très-agiſſante : on nomme les plumes de l'aile le *pennage*. Mais comme cette économie ſi néceſſaire pourroit ſouvent être altérée par la pluie, les oiſeaux ont auſſi un moyen de les en préſerver, au moyen d'une bourſe pleine d'un ſuc huileux, faite comme un mamelon, lequel compoſe preſque tout le croupion : ce mamelon a pluſieurs ouvertures ; & lorſque l'oiſeau ſent ſes plumes deſſéchées, gâtées, entr'ouvertes ou prêtes à ſe mouiller, il preſſe ou tiraille ce mamelon avec ſon bec : il en exprime une humeur graſſe qui eſt en réſerve dans deux glandes, & faiſant gliſſer ſucceſſivement la plupart de ſes plumes par ſon bec, il les paſſe à l'huile ; l'onction de cette matiere viſqueuſe les luſtre, les raffermit auſſi & remplit tous les vides ; après quoi l'eau ne fait plus que couler ſur l'oiſeau. La poule de nos baſſes-cours eſt moins fournie de cette liqueur que les oiſeaux qui vivent au grand air, d'où il arrive qu'une poule mouillée eſt un oiſeau ſingulier à voir : au contraire, les cygnes, les oies, les canards, les macreuſes, & tous les animaux deſtinés à vivre ſur l'eau, ont la plume enduite d'huile dès leur naiſſance ; d'ailleurs leur réſervoir graiſſeux eſt abondant, & une de leurs plus grandes occupations eſt de paſſer leurs plumes à l'huile continuellement.

Les anciens ont appellé *pulvérateurs* les oiſeaux qui ont l'inſtinct de gratter la terre, (ces oiſeaux ſont frugivores, granivores) d'élever la pouſſiere avec leurs ailes, & en ſe poudrant, pour ainſi dire, avec cette pouſſiere, de ſe délivrer de la piqûre des inſectes qui les tourmentent, de même que les oiſeaux aquatiques s'en délivrent en arroſant leurs plumes avec de l'eau.

La plupart des oiſeaux cachent leur tête ſous leur aile pendant leur ſommeil ; la plupart auſſi ne ſe tiennent que ſur un pied pendant qu'ils dorment, ils approchent l'autre de leur corps pour le réchauffer.

Les jambes & les pieds ſont dénués de plumes dans la plupart des oiſeaux, quelques-uns n'en ont point ſur la tête, tels ſont le coq d'Inde, l'émeu ; mais il n'y a

peut-être que l'autruche qui n'ait pas le corps entier couvert de plumes.

Il y a des oiseaux qui sont toujours attroupés plusieurs ensemble, soit qu'ils volent, soit qu'ils restent en repos; tels que les pigeons: d'autres vont deux à deux, le mâle & la femelle dans la saison de leurs amours, de la ponte & de l'accroissement de leurs petits, qui est infiniment plus prompt que chez les quadrupedes.

Il y a des oiseaux qui chantent, d'autres ne chantent pas; tels que les oiseaux de proie, & plusieurs femelles de divers oiseaux. C'est lorsque le temps est serein qu'on entend ces animaux chanter dans les bois. La saison du printemps ramene les amours que le triste hiver a fait fuir; c'est aussi la saison des mélodieux concerts des oiseaux: ils sont alors, & sur-tout la nuit, l'agrément des bois. L'un chante à minuit & au point du jour, l'autre à l'aurore & à midi, un autre au soleil couchant, &c. tels sont le coq, l'oie, les sarcelles, l'alouette, le vanneau, le courlis, le pluvier, la grue, le rossignol, la perdrix, & plusieurs autres qui servent d'horloge aux Payſans.

On trouve dans le LXIII vol. part. II. *des Transact. Philosoph.* des expériences & observations sur le chant des oiseaux, par M. *Daniel Barrington*, Vice-Président de la Société de Londres: en voici le précis. Ce Physicien dit, que pour se faire mieux entendre de ses Lecteurs, il a été obligé de créer, pour ainsi dire, des mots; à la vérité la disette de mots pour exprimer les différens sons ou notes des oiseaux, a forcé *Belon* à dire de la grue, du rossignol, de l'oison, qu'ils chantent. Ceci ne donne aucune idée du chant de ces bipedes. Le P. *Kircher* a rapporté dans sa *Musurgia* quelques traits du chant du rossignol, du coucou & de la caille, & il les a désignés par des notes de musique; mais ces exemples prouvent seulement que le chant de certains oiseaux renferme des notes qui correspondent aux intervalles de notre octave. M. *Barrington* dit que le premier accent ou son du jeune oiseau, tant mâle que femelle, est 1°. le *piaulement*; il s'en sert pour demander sa nourriture à sa mere. Ce premier son

qui est si différent dans tous les oiseaux, qu'il fait distinguer leurs especes sans les voir, est foible, très-plaintif, & diminue à mesure que l'oiseau prend de l'accroissement. A-t-il acquis sa force, sa grandeur, ces différens sons changent absolument. Le jeune rossignol a un piaulement rauque & désagréable. Le piaulement est formé d'un son simple, répété dans des intervalles très-courts. 2°. Le son que l'oiseau rend un mois après sa naissance, est l'*appel*: dans le plus grand nombre c'est la répétition d'une même note que l'oiseau, tant mâle que femelle, conserve toute sa vie; à moins qu'ils n'ayent été enlevés de leur nid le deuxieme ou troisieme jour après leur naissance, pour entendre l'appel d'un autre oiseau au moment de la becquée. 3°. Les Oiseleurs appellent *flutoyer*, *siffler*, *gazouiller*, le chant qui se développe ensuite dans les jeunes oiseaux.

On peut comparer les efforts que les jeunes oiseaux font pour chanter à ceux d'un enfant qui tâche de bégayer; ce n'est pas le seul trait de comparaison dans la gradation des sons: on a entendu plusieurs fois des oiseaux qui n'avoient guere qu'un mois, préluder ou commencer à siffler. Il paroît que ce premier essai ne contient pas les principes du ramage dont l'oiseau doit par la suite affecter si agréablement nos oreilles: quelles peuvent être les vues de cet essai? Suivons l'oiseau dans ses différens âges. Dans le temps que ce jeune musicien bipede s'exerce ainsi à former son gosier, s'il saisit quelque passage agréable, il répete souvent & conserve ce ton. S'il prend un ton faux, peu concordant avec celui qu'il semble chercher, assez souvent il l'abandonne, semblable à nos Chanteurs qui haussent la voix lorsqu'ils se souviennent de quelques parties d'un air, qu'ils peuvent exécuter avec précision; & d'autres fois glissent légérement par dessus les tons dont ils ne se sont pas tout-à-fait rendus les maîtres, ou comme si ce passage ne leur faisoit pas plaisir, ou peut-être dans la crainte de se compromettre: l'oiseau paroît en faire autant. L'oiseau détenu en cage s'exerce ordinairement à siffler pendant plus des deux tiers de l'année: quand il est sûr,

pour ainſi dire, de ſes notes & en état d'exécuter toutes les parties de ſon chant naturel, ou d'un air qu'on lui a appris au moyen d'une ſerinette, il ne varie plus dans ſa mélodie; il s'exerce à les chanter de ſuite, & en lie les différens paſſages ſans ſe repoſer.

M. *Barrington* dit, qu'il paroît que le chant des oiſeaux n'eſt qu'une ſucceſſion de trois notes différentes ou d'un plus grand nombre continuées de ſuite dans un intervalle qui correſpond à une croche de muſique de quatre noires, ou bien l'eſpace de quatre ſecondes. Ceci étant, on doit en exclure l'*appel* du coucou & le glouſſement de la poule, qui ne conſiſtent qu'en deux notes. Il y a plus, on a obſervé que la poule qui couve, répete ſouvent la même note à des intervalles très-courts, & finit ſur une ſixieme qu'elle fait extrêmement longue; c'eſt un *appel varié*. On doit encore diſtinguer de ce qu'on appelle *ramage* ces courts éclats de voix que les oiſeaux font entendre quand ils s'efforcent de le diſputer à d'autres par le chant, & qu'ils forment comme une eſpece de concours vocal: alors leur chant ne ſe continue pas quatre ſecondes.

Tout ce que nous venons de dire, ne peut guere s'appliquer qu'aux oiſeaux qui ont reçu une éducation ſuivie. Les notes ne ſont pas plus innées dans les oiſeaux que le langage dans l'homme: elles dépendent donc du maître qui les éleve. Ajoutons qu'il faut que leurs organes ſoient tels qu'ils puiſſent imiter les ſons qu'ils doivent entendre ſouvent. Les linots mâles en état de voler, que l'on diſtingue dès leur bas âge des femelles par une blancheur qui s'étend dans toute la longueur du fanon de la plume, (dans la femelle elle ne va qu'à moitié); ces ſortes d'oiſeaux, dis-je, offrent une grande docilité & un talent ſingulier pour l'imitation du chant: dans la plupart des autres oiſeaux qui ont un chant décidé, on ne diſtingue pas auſſi ſurement le mâle de la femelle. Il eſt auſſi rare d'entendre les femelles d'oiſeaux chanter comme les mâles, qu'il eſt extraordinaire d'entendre les poules chanter comme les coqs. L'on préſume auſſi que les perroquets & les pies qui apprennent ſi difficilement à parler, ſont des femelles de leur eſpece. M. *Barrington* dit qu'il

avoit trois especes d'alouettes qui étoient séparées, & qui chantoient parfaitement bien; l'une étoit l'*alouette des champs*, l'autre celle *des bois*, & la troisieme l'*alouette mésange*. Il plaça avec chacune de ces alouettes de jeunes linots qui imiterent bientôt chacun le chant de leur maître de musique: quand le chant de ces écoliers fut entiérement fixé, on les plaça avec d'autres jeunes linots, dont ils devinrent à leur tour les maîtres de musique, & tous ces linots oublierent absolument les notes & tout le mode de leur chant, pour conserver constamment celui de l'alouette. Un jeune linot d'Europe fut élevé dans une cage où étoit un *vengolina* d'Afrique, qui est un beau chanteur: le petit Européen parvint à imiter l'Africain avec une si grande perfection, que quand ils chantoient ensemble, il étoit impossible de les distinguer l'un de l'autre: un chardonneret chantoit uniquement l'appel du roitelet, parce qu'il n'avoit jamais entendu d'autre accent. Tous ces faits prouvent assez que les oiseaux n'ont point d'idées innées des notes qu'on suppose particulieres à chaque espece. Si dans l'état de vie sauvage ils apprennent & gardent tous constamment le même chant, c'est parce que les jeunes oiseaux n'ont donné leur attention qu'au chant du pere, qui néglige lui-même les notes de tous les autres oiseaux qui chantent dans les environs; son génie & ses besoins lui font chercher & trouver la nourriture qui lui convient: dans une cage ce génie se flétrit par la captivité, il s'attache à son pourvoyeur, qui le caresse, qui le siffle, & il en retient des sons, des parties d'airs ou des airs entiers; & nous le répétons, s'il n'a été mis en cage qu'un mois après sa naissance, il n'oubliera point l'*appel* de son espece. On voit dans des volieres des serins avec des oiseaux d'especes différentes, chacun ne chante que le ramage de son pere. Les moineaux qui nichent dans les maisons, n'ont jamais que le piaulement de leur espece, tant qu'ils restent sauvages: leur chant devient mixte ou composé, si après leur naissance on les met avec un linot, un chardonneret, un rossignol, une gorge-rouge. Il y a aussi de jeunes oiseaux qui, n'ayant pas entendu l'appel de leur pere, paroissent

plus enclins étant dans une voliere à retenir les sons de certains oiseaux que d'autres: on en voit qui aiment assez le *roulis* du rouge-gorge.

Les oiseaux dans l'état de vie sauvage ne chantent ordinairement que pendant deux mois & demi de l'année, ou tant que la pâture est abondante, encore les seuls mâles de quelques especes jouissent de ce précieux avantage, (car il y a beaucoup d'oiseaux qui ne chantent aucunement). M. *Barrington* croit que cette propriété ou avantage du chant dépend de la force des muscles du larynx, qui est supérieure dans les mâles. Des observations anatomiques démontrent qu'il n'y a aucune différence sexuelle à cet égard dans les oiseaux qui ne chantent point. Mais pourquoi ne chantent-ils pas, notamment les gros oiseaux? Notre Physicien prétend que si ces gros bipedes étoient doués de cette faculté, la plénitude de leur voix, jointe au volume de leur corps, tout les décéleroit à leurs ennemis; & que la Nature n'a pas permis aux oiseaux femelles de chanter, parce que ce talent seroit pour eux un talent funeste & pernicieux dans le temps de l'incubation: ainsi ce qui est un défaut physique est compensé par un bien moral. On dit qu'il y a plusieurs oiseaux qui chantent & qui cherchent à récréer leurs femelles pendant cette pénible fonction. Notre Observateur paroît nier ce fait.

Voyons maintenant en quoi le chant des oiseaux ressemble aux intervalles de notre musique, qui ne sont jamais ou rarement moindres d'une demi-note. *Ligon* dit que le chant de la grive est composé de quarts de notes, qui par progression montent successivement les uns au-dessus des autres. Le chant d'un petit nombre d'oiseaux offre des passages qui correspondent aux intervalles de la game de notre musique; l'appel du coucou en est un exemple bien frappant & bien connu; mais la plus grande partie du ramage des petits oiseaux ne peut guere s'exprimer en caracteres de Musique, parce qu'il est trop rapide, & que l'on ne connoît presque pas le point où l'oiseau doit s'arrêter: sa voix ordinairement perçante qui se fait entendre de fort loin, s'éleve à un degré beaucoup plus haut que les notes les

plus aiguës de nos instrumens, & les intervalles des octaves si élevées, d'ailleurs si courts, si délicats, sont plus difficiles à saisir que ceux des bas, & plus encore que ceux des octaves qui gardent le milieu. Aussi parmi les hommes qui ont voulu chanter comme les oiseaux, il y en a peu qui aient pu imiter le ramage de quelques-uns, tels que le *rossignol*, l'*alouette*, le *merle*, la *perdrix*: encore mettent-ils dans leur bouche une espece d'appeau. Si quelques serins &c. détenus en cage sifflent des airs connus, avec de plus longs intervalles, ce sifflement n'est, comme nous l'avons dit, que la répétition de la leçon qu'on leur a donnée depuis l'instant qu'on les a pris dans le nid. Si on entend chanter une douzaine d'oiseaux d'especes différentes, rassemblés dans un même lieu, l'oreille n'est frappée d'aucune dissonance désagréable: le chant des oiseaux n'est cependant pas toujours à la même élévation, ou chanteroient-ils tous d'après la même game? M. *Barrington* le présume d'après le tableau suivant, qui a été fait ou remarqué au moyen d'une harpe. *F naturel de l'alouette des bois; A naturel dans un coq ordinaire; C naturel dans l'oiseau moqueur mâle; B bas dans un très-gros coq; C tombant communément en A dans le coucou; A dans les grives; D dans quelques chouettes; B bas dans d'autres; G sur un rossignol qui étoit détenu en cage.* Voilà six notes; il ne manque plus que *E* pour compléter la game: au reste ces six notes suffisent en supposant que les oiseaux chantent sur la clef de *F* avec une tierce aiguë, ou sur la clef de *G* dans une tierce basse: ceci étant, *Lucrece* a eu raison de dire que les oiseaux nous ont enseigné la Musique.

Parmi les oiseaux chanteurs & éduqués, il y en a qui imitent non-seulement les mêmes notes, les mêmes tons, mais ils articulent encore des mots & même de petites phrases qu'on leur répete souvent. Les Grecs & les Romains se sont beaucoup occupés de cet art. On a observé que quand les oiseaux entrent dans la saison où ils chantent, leur bec change sensiblement & par degrés de couleur. On assure que le coq ne chante jamais tant qu'il a la tête bien rouge. Le pinçon & le linot ont d'abord leur bec d'un bleu foncé, &

il pâlit de nouveau quand la saison du chant est passée. Ce changement paroît être plutôt un symptome qu'une cause du chant des oiseaux. Il n'en est pas de même des oiseaux châtrés, ils ne chantent pas, l'éducation ne donne pas de nouveaux organes à l'oiseau ; mais dans l'étendue de sa voix il est le maître de l'imitation. Le perroquet articule les mots plus distinctement qu'aucun autre oiseau. Il est aussi plus familier, & ses manieres supposent aussi plus de mémoire. A l'égard des différences qu'on remarque dans le chant des oiseaux d'une même espece, quelques-uns les comparent aux différens dialectes de chaque Province. Cette différence d'unité de voix n'est-elle pas due au rétrécissement du larynx, ou à son alongement dans d'autres. M. *Barrington*, d'après ses Observations sur le chant des oiseaux, a fait une Table qui sert à comparer le mérite du chant de quelques oiseaux, tels que le *rossignol*, l'*alouette des champs*, celle des *bois*, l'*alouette-mésange*, le *linot*, le *chardonneret*, le *pinçon*, le *verdier*, la *tête-rousse*, la *grive*, le *merle*, la *gorge-rouge*, le *roitelet*, le *moineau de marais*, la *tête-noire*, ou *rossignol moqueur*, ou *polyglotte*. Dans cette Table qui est en colonnes, on y trouve des degrés de perfection, comparés pour la mélodie du ton, l'élévation des notes, les notes plaintives, le période ou longueur du ramage & pour l'exécution. On y trouve que le rossignol a le plus grand nombre de ces degrés, excepté par l'élévation des notes, l'alouette des champs le surpasse en cela. Nous osons nous flatter que notre Lecteur ne désapprouvera pas la longueur de cette digression sur le chant des oiseaux. Cet extrait offre trop de singularités, & il convenoit d'en faire mention.

On donne le nom de VOLIERE, *aviaria*, à l'endroit où l'on tient des oiseaux enfermés. Les Grecs & les Latins ont aussi tiré la dénomination de chaque espece d'oiseau de la nourriture qu'il prend. C'est ainsi que les Grecs ont nommé *sarcophages*, & les Latins *carnivores*, ceux qui vivent de chair. On nomme les oiseaux de proie *rapaces* ; & *demi-rapaces* ceux qui, comme les corbeaux, n'ont pas le bec crochu. On appelle *entomophages* ou *insectivores*, les mangeurs d'in-

sectes ; *acantophages*, ceux qui ne vivent que de chardons ; *carpophages* ou *frugivores*, les mangeurs de fruits ; *graminivores*, les mangeurs de plantules ; *granivores*, les mangeurs de graines ; *piscivores*, ceux qui ne vivent que de poisson ; *panphages*, ceux qui vivent également de toutes choses ; *scolopaces*, ceux qui ont le bec long & effilé ; *macropteres*, ceux qui ont les ailes longues ; *imantopedes*, ceux qui ont les cuisses & les jambes longues ; *palmipedes*, ceux qui ont les doigts des pieds unis par une membrane afin de nager ; *fissipedes*, ceux qui ont les doigts détachés ; *diurnes*, ceux qui volent & butinent le jour ; & *nocturnes*, ceux qui, comme la chouette, ne sortent que la nuit. On appelle OISEAUX DE PASSAGE, *passeres*, ceux qui ne restent qu'un certain temps de l'année dans un pays, &c.

Quant à la chasse du vol, *voyez ce que nous en avons dit au mot* FAUCON pour les oiseaux de proie. Les oiseaux de nuit sont universellement haïs ; & dès qu'on en a découvert quelqu'un, il se fait une conjuration générale contre ce malheureux oiseau : petits & grands, tous l'environnent avec grand bruit, quoiqu'il soit rare qu'il en soit attaqué aussi impunément qu'il en est insulté. A quels dangers ne s'exposent pas certains hommes dans la chasse aux oiseaux, qu'on pratique parmi les rochers de la Norwege ? Pour les oiseaux de jour, de plaine, des bois, &c. ils se prennent ou au fusil ou à la piste, aux filets ou à la traînasse, ou aux gluaux, & par quantité de méthodes différentes, dont nous avons fait mention dans l'histoire particuliere des oiseaux. Au reste nous parlerons ci-après des moyens de se procurer les oiseaux pour être conservés dans les Cabinets des Curieux. Nous avons parlé aussi des diverses qualités de leur chair, qui est plus ou moins délicate. Celle des oiseaux de proie est maigre, & n'est pas bonne à manger ; celle des oiseaux de riviere est ordinairement fibreuse, & plus difficile à digérer que celle des oiseaux terrestres.

En général, les oiseaux qui se nourrissent de grains, d'herbes & de fruits, fournissent un meilleur suc & plus facile à digérer, que ceux qui se nourrissent d'insectes, de viandes ou de poisson. La chair des premiers n'est

ni trop terreſtre ni trop aqueuſe. Au reſte les ſaveurs ſont analogues aux goûts des différentes Nations : c'eſt ainſi que l'autruche eſt un régal chez les Africains, comme l'eſt le poulet parmi nous. Les oiſeaux les plus en uſage ſur les tables en Europe, ſont le courlis, la poule d'eau, le cul-blanc, la poule d'Inde, l'ortolan, la caille, le pluvier, la bécaſſe, le faiſan, la poule privée, les pigeons & les mauviettes. Les Payſans mangent volontiers le paon, la corneille, la pie, le geai, & tous les autres petits oiſeaux. Dans tous ces animaux les os ſont ſi vides & ſi minces, qu'ils n'ajoutent preſque rien au poids des chairs.

Nous ne parlons point ici de l'utilité des diverſes plumes des oiſeaux, ni des combats de ces animaux ; nous en avons fait mention à chacun de leurs articles. Il nous ſuffira de dire que c'eſt avec les plumes de l'autruche qu'on orne quelquefois la tête des Rois, des Héros, & aujourd'hui celle des Dames ; les plumes du coq ſervent auſſi à faire des panaches ; l'édredon, qui eſt une eſpece de duvet, eſt employé dans les couvre-pieds ; les groſſes plumes de cygne, &c. ſervent à écrire. Les Vénitiens & les Napolitains ſavent mieux que toute autre Nation colorer les plumes du ventre du cygne, &c. pour l'uſage des fleurs artificielles. Le caractere belliqueux des oiſeaux ſe reconnoît dans le coq, dans les oiſeaux de proie, &c. Il eſt encore d'uſage en Angleterre & en quelques lieux de l'Italie, de faire battre enſemble les coqs, les cailles, &c. chacun ſelon ſon eſpece. C'eſt un ſpectacle pour tout le Peuple, & ſouvent pour bien des Grands, *voyez aux mots* COQ, CAILLES, &c. Il y a beaucoup d'oiſeaux qui n'ont point de noms particuliers : tels ſont ceux dont nous ferons mention ci-après. Ils ont conſervé le nom général d'oiſeau, avec une épithete qui ſert à les déſigner.

Par cet expoſé des oiſeaux, on voit qu'il y en a peu qui ne nous ſoient utiles. Les plus redoutables mangent les charognes qui nous infecteroient ; & s'ils font quelquefois main baſſe ſur nos volailles, combien d'autres oiſeaux nous délivrent de cette immenſe quantité d'inſectes, dont la multiplicité eſt un fléau ? D'autres

nous amusent par leur ramage, ou nous servent de nourriture. En Europe on récompense ceux qui tuent le laemmer-geyer : *voyez* CONDOR ; au lieu que dans le pays de Benin, les habitans respectent un animal semblable, qu'ils appellent *oiseau noir :* il est même défendu sous peine de mort de lui faire le moindre mal. Il y a des Ministres établis pour servir ces oiseaux & pour leur porter de la nourriture dans un endroit des montagnes qui leur est particuliérement consacré.

Maniere de se procurer les différentes especes d'oiseaux, de les préparer & de les envoyer des pays que parcourent les Voyageurs.

Nous avons donné à l'article *Histoire Naturelle*, une esquisse du spectacle enchanteur qu'offre aux regards des Curieux une belle collection d'oiseaux : c'est sans contredit, après celle des papillons, la partie la plus brillante, la plus apparente & celle qui séduit le plus généralement l'homme le plus indifférent. La maniere de se procurer les différentes especes d'oiseaux, &c. a été exposée avec clarté & précision dans un Mémoire instructif qu'a donné sur cet objet M. le Docteur *Mauduit* de Paris, dont le Cabinet en ce genre d'animaux & en insectes, prouve le goût & les connoissances, &c. Voici le sommaire de ce Mémoire circonstancié.

On prend les oiseaux au *piege*, au *filet*, aux *lacets*, à la *pipée*, par la *chasse du vol*, ou on les tue avec l'*arc* ou le *fusil*. On ne prend que les oiseaux de proie au piege, & cette méthode a par rapport à l'usage que l'on veut faire de ces animaux de grands inconvéniens. Les pieges brisent les os, délabrent les parties engagées, & ne donnent pas toujours la mort aux animaux, on est obligé de les étouffer ou de leur introduire dans le cervelet une épingle proportionnée au volume de la tête de l'oiseau ; dans cette opération on doit avoir soin de ménager le bec & les plumes du cou. On ne prend au *filet* & avec les *lacets*, que les petits oiseaux, & on les a par ce moyen, en très-bon état. On fait la *pipée* par le moyen de petits bâtons enduits de glu (on les nomme *gluaux*) qui colant les

plumes les unes aux autres, ôtent aux oiseaux la faculté de voler : les oiseaux pris par cette méthode, ne peuvent guere servir à entrer ensuite dans une collection. La glu est une sorte de résine excessivement tenace, que l'eau ne dissout pas, & que l'esprit-de-vin n'enleve qu'imparfaitement : *voyez l'article* GLU. Les plumes qui en sont une fois imprégnées, le sont pour toujours. La chasse avec l'*arc* ou le *fusil*, est le moyen le plus facile pour abattre les oiseaux ; il est certain que par cette industrie traîtresse & meurtriere, le Chasseur exercé peut s'en procurer davantage. M. *Mauduit* dit qu'il préfere pour les oiseaux, ainsi que pour les quadrupedes, l'arc, quand on se trouve à portée d'en faire usage : le plomb du fusil les crible souvent de toutes parts.

On peut envoyer les oiseaux entiers, ou seulement leur peau, en les préparant de la même maniere que les animaux à quatre pattes ; *voyez ce qui est dit à ce sujet à la fin de l'article* QUADRUPEDES. La liqueur conservatrice est la même, & on doit prendre les mêmes précautions en arrangeant les oiseaux entiers dans les barriques. Si l'on a dessein de n'envoyer que des peaux, il faut écorcher les oiseaux ; en voici la pratique.

On pose sur le dos l'oiseau qu'on veut écorcher, on le doit étendre sur une table. Asseyez-vous devant, de maniere que la queue de l'oiseau soit de votre côté. Ecartez avec le manche d'un scalpel à droite & à gauche, les plumes qui couvrent la poitrine, vous verrez qu'il y a dans son milieu un espace dégarni de plumes ; faites sur cet endroit une incision longitudinale, commencez-la au haut du *brechet* (cartilage *xiphoïde*), & conduisez-la un peu au dessous de son extrémité. Prenez avec les doigts de la main gauche, ou saisissez avec une pince la peau d'un des côtés de l'incision, détachez cette peau d'avec les chairs, d'abord avec la lame d'un scalpel, ensuite avec le dos du même instrument, ou avec les doigts & même la main entiere, suivant la grosseur de l'animal ; soulevez la peau & la détachez des chairs le plus avant que vous pourrez, en enfonçant, & sur le côté & en haut vers le cou, & en bas vers l'anus. Faites ensuite la même opération de

l'autre

l'autre côté. Craignez-vous en enfonçant les doigts ou le manche du scalpel, de déchirer ou de percer la peau? Que les doigts de la main opposée répondent toujours en dehors à l'action du scalpel ou à celle des doigts au dessous de la peau. Le tact vous avertira de son état, de la force qu'elle a pour résister, & si l'effort que vous faites n'est pas au dessus de sa force résistante. Nous convenons qu'il faut ici & de l'adresse & de l'habitude.

La peau étant détachée des chairs aussi avant qu'elle peut l'être par cette pratique, alors saisissez le cou un peu au-dessus de son articulation avec le corps; tirez-le en dedans de la main droite, repoussez la peau de la main gauche, détachez-la du cou, & quand vous êtes parvenu à l'en séparer dans un point circulaire, coupez le cou avec de forts ciseaux, ou avec un couteau, suivant le volume de l'oiseau. Le cou étant séparé d'avec le corps, il faut opérer sur les ailes. Vous en retirez une en dedans, en la saisissant vers son moignon avec la main gauche, tandis que de la droite vous refoulez la peau en dehors, vous la détachez des chairs. Êtes-vous parvenu au pli de l'aile, alors vous coupez les chairs, & vous séparez les os dans l'articulation. Vous remettez la peau dans son état, & vous opérez de la même maniere sur l'autre aile. Quand toutes les deux sont dégagées & séparées d'avec le corps, vous passez aux cuisses, vous les dépouillez comme les ailes l'une après l'autre: lorsqu'opérant sur chaque cuisse en particulier, vous en avez retiré une en dedans, & vous l'avez dégagée de sa peau jusqu'au bas du pilon ou jusqu'au genou, alors vous séparez les os dans cet endroit, qui est celui où la cuisse s'articule avec la jambe. Le cou, les ailes, les cuisses, étant séparés d'avec le corps, vous en saisissez & soulevez la masse de la main gauche, tandis que de la droite vous déprimez, vous séparez la peau qui tient encore au dos. Bientôt elle n'adhere plus qu'au seul croupion. Quand il est à découvert, vous le coupez en dedans de la peau, un peu au dessous de l'endroit où il articule avec le corps. Celui-ci n'adhere plus par aucun point à la peau, vous l'enlevez & le mettez de côté. Vous

revenez au cou, vous en prenez le bout avec la main gauche ; de la droite vous doublez la peau en la retournant, vous tirez le cou à vous de la main gauche, & vous refoulez la peau de la droite. Le cou sort comme le corps d'une anguille qu'on écorche, ou comme le doigt d'un gant qu'on retourne. Parvenu à la tête vous vous arrêtez quand vous êtes vers son milieu ; vous détachez avec le tranchant du scalpel la langue sur les côtés sans la couper ; vous séparez le cou à sa jonction avec la tête, & avec le cou vous emportez la langue, l'œsophage ou le conduit des alimens, & la trachée artere ou le canal qui sert au passage de l'air pour la respiration. Il ne reste plus qu'à agrandir le trou qui se trouve naturellement derriere la tête, & par où passe la moelle épiniere. Ayant agrandi ce trou avec des ciseaux ou avec un foret, ou la pointe d'un couteau selon les circonstances, vous videz la cervelle, vous remettez ensuite la peau dans son état naturel, vous la rempliſſez de coton ou de mousse, ou d'une autre matiere analogue ; vous observez de mettre peu de coton dans le pli des ailes. La peau flasque en cet endroit peut vous tromper ; elle prête beaucoup, il faut remplir très-peu cette partie ; au contraire, il faut avoir soin de fourrer la peau qui enveloppoit les cuisses, & de les marquer. Votre opération étant finie, vous réuniſſez la peau par des points de suture ; vous remettez les ailes dans leur position, & vous les y assujettiſſez en entourant tout le corps d'un ruban ou d'une ficelle. Il reste encore les yeux qu'il faut enlever, en les arrachant avec un fer pointu & courbé, en prenant garde d'endommager les paupieres ; puis prenant un côté de la paupiere avec le bout d'une pince, le soulevant d'une main, vous introduiſez de l'autre main du coton pour en remplir la cavité. (Ceux qui voudroient conserver dans le pays natal, l'oiseau ainsi préparé, y mettroient des yeux d'émail de grandeur & de figure naturelles, on les introduit dans l'orbite en écartant les deux côtés des paupieres.) On peut encore exécuter autrement cette opération : en voici la maniere. Quand, redoublant la peau du cou, on est parvenu à la tête, on continue

de redoubler la peau jusqu'à ce qu'on découvre le globe des yeux. On le sépare de la membrane qui l'attache aux paupieres, avec la lame du scalpel; on remplit l'orbite ou la cavité de l'œil de coton qu'on foule bien & qu'on a roulé auparavant dans ses doigts pour le rendre plus dense; retirant ensuite la tête en dehors, les yeux se trouvent fermés comme ils doivent l'être. On présume bien qu'en écorchant les oiseaux, il faut avoir soin de n'en pas salir la peau, & y porter les mêmes attentions qu'en écorchant les quadrupedes: en un mot avoir près de soi du coton, & faire usage d'un mélange de poudre de chaux & d'alun, & suivre en tous points pour la préparation des peaux d'oiseaux le procédé indiqué pour celles des *quadrupedes*. Voyez ce mot.

M. *Mauduit* dit encore que quelque attention qu'on apporte à son opération en écorchant les oiseaux, leurs peaux se trouvent souvent salies par trois accidens différens; par la *vase* sur laquelle ils couchent; par le *sang* qui sort des plaies; par la *graisse*, qui au bout de quelque temps s'atténue, devient fluide & s'imbibe dans les plumes. La vase se nétoie aisément par le moyen de l'eau seule; le sang, quand il est une fois sec, s'enleve difficilement, l'eau pure ne le dissout que très-imparfaitement; les plumes en restent colorées, à moins qu'on ne se serve d'eau saturée de nitre; ce qui, poursuit le même Observateur, est peut-être la seule substance qui ait la propriété de rendre la partie rouge du sang desséchée, parfaitement miscible à l'eau, & par conséquent de fournir le moyen d'en nétoyer les parties qui en sont salies. On enleve la graisse en faisant usage d'une eau de lessive; on sait que c'est de l'eau chaude qui a filtré à travers des cendres de bois neuf. Ceci étant, il est probable qu'une petite dose de sel alkali fixe, dissoute dans l'eau, auroit la même propriété que la lessive.

Maintenant il convient d'exposer les observations & les notes que les Voyageurs devroient joindre aux oiseaux étrangers qu'ils envoient. Il importe sur-tout de savoir s'ils habitent dans le pays toute l'année, ou s'ils sont de passage: quand & par où ils arrivent; de

quel côté & en quelle saison ils se retirent ; d'où l'on croit qu'ils viennent, & où l'on pense qu'ils vont ; s'il y a des oiseaux qui ne paroissent qu'un moment & qui disparoissent pour long-temps ; s'ils sont rares ou communs ; quelle est leur nourriture ; comment ils se la procurent ; quelle différence il y a de la taille, du plumage entre le mâle & la femelle ; en quoi les couleurs des petits different des adultes ; si les oiseaux ne muent qu'une ou plusieurs fois l'année, & dans quelles saisons ; s'ils ne changent pas de couleurs plusieurs fois dans la même année, ce qui n'est pas très-rare parmi les oiseaux des climats qui sont entre les Tropiques ; s'ils pondent toute l'année, ou dans une saison seulement ; & quelle est cette saison ; combien la femelle fait de pontes ; combien d'œufs à chaque ponte ; quelle est la couleur des œufs ; de combien de temps est la durée de l'incubation ; comment & avec quelles substances la mere fait son nid, où elle le place ; si elle le construit seule, ou si le mâle l'aide dans cette opération ; s'il partage avec elle l'ennui de la couvée, & les fatigues de la nourriture des petits ; si ceux-ci vivent long-temps en société, & quand ils se séparent ; de quelle utilité sont les oiseaux, ou quel tort ils font ; comment on les chasse s'ils sont sauvages ; quels soins on en prend s'ils sont domestiques ; s'informer du nom qu'on leur donne dans les pays où on les trouve ; spécifier sur-tout la forme & la couleur des yeux, du bec & des pieds, leur couleur est très-sujette à changer ; en un mot parler de leurs cris, & les faire connoître autant qu'on le peut.

Maniere d'envoyer les œufs & les nids.

Les *œufs* & les *nids* sont des objets inséparables de l'Histoire Naturelle des oiseaux. Nous avons parlé de l'un & de l'autre dans la suite de l'article *Oiseau* : les *nids* sont ces réduits où l'oiseau pond ses œufs, couve & éleve ses petits : les nids sont plus ou moins grands, & construits quelquefois d'une maniere fort simple, d'autres offrent de l'élégance, beaucoup de soins dans l'art de les construire ; d'autres ont une forme très-sin-

guliere, quelquefois bizarre & méritent d'être connus, notamment ceux que l'on appelle *penſiles*, qui ſont fort longs, ſe balancent au gré des vents, n'étant attachés au bout d'une branche que par quelques liens fort déliés. On range les nids les uns à côté des autres; on choiſit ceux de la même élévation pour les arranger enſemble dans une même boîte, de maniere qu'ils y ſoient comprimés également & mollement. On a ſoin d'y attacher leur nom. Quant aux *œufs*, on diſtingue ceux qui ſont frais en les expoſant à la lumiere d'une bougie, alors ils offrent une ſorte de tranſparence; ceux qui ſont opaques indiquent qu'ils ont été couvés. On doit prendre garde à la fragilité de ces objets quand on veut les vider. Pour cela on les perce par les deux extrémités, on ſouffle par l'un des bouts, alors la ſubſtance liquide de l'œuf ſort par le trou oppoſé: on l'expoſe ainſi à l'air pendant quelques jours; il ſe deſſeche à l'intérieur: on écrit ſon nom ſur la coque; enſuite on les place dans des boîtes garnies de caſes matelaſſées de coton, les caſes ſont formées plusieurs à côté l'une de l'autre & maintenues par un châſſis ou par des traverſes de bois en ſautoir & bien aſſujetties. Ces ſautoirs qui doivent avoir une hauteur ſupérieure au diametre des œufs ſervent à les pincer pour être enlevés de la boîte à volonté: la boîte peut être profonde & contenir pluſieurs diviſions: on doit mettre les gros œufs au fond & garnir auſſi de coton le deſſus des œufs, de maniere que la boîte ſoit pleine.

OISEAU-ABEILLE ou SUCE-FLEUR. On l'appelle auſſi *bourdonneur*, ou *oiſeau murmure*: c'eſt ou le colibri ou l'oiſeau mouche. *Voyez à l'art.* COLIBRI.

OISEAU D'AFRIQUE ou POULE DE BARBARIE, *avis Afra. Voyez* PINTADE.

OISEAU ARCTIQUE. *Edwards* donne ce nom au *Stercoraire*. Voyez ce mot.

OISEAU DE COMBAT, ou PAON DE MER ou LE COMBATTANT, *avis pugnax*. Les Suédois, chez qui cet oiſeau de rivage eſt commun, le nomment *bruthane*. Ce volatile eſt du genre du bécaſſeau, & de la grandeur du chevalier: ſon bec & les plumes de ſon cou ſont longs. La bigarrure du plumage dans les mâles

eſt admirable ; il eſt toujours ſi varié en couleurs qu'on en trouve difficilement deux de pareils. Le devant de ſa tête eſt couvert d'une infinité de petites papilles couleur de chair ; il a le bec & les pieds rouges. Cet oiſeau porte ſon nom de ſa paſſion belliqueuſe. Les mâles aiment tant à ſe battre, ſur-tout lorſqu'ils ſont en amour, que quand deux ſe rencontrent, le duel s'engage & le combat ne ceſſe que par la mort du vaincu. Les oiſeleurs qui les guettent, tendent alors leurs pieges & les attrapent avant qu'ils ſoient ſur leurs gardes : lorſque ces oiſeaux commencent à muer, des enflures blanches s'élevent autour de leurs yeux & de leur tête ; quand on veut les élever & les engraiſſer, on les tient ſéparés ou enſemble dans un lieu clos & obſcur, on les nourrit avec de la mie de pain & du lait. Ils multiplient auſſi en été dans les marécages de Lincoln, en Angleterre.

OISEAU DU CADRAN SOLAIRE. *Voyez à l'art.* PIE.

OISEAU COURONNÉ DU MEXIQUE. *Voyez* OISEAU DE PLUMES DU MEXIQUE.

OISEAU DE FEU. *Voyez* FOULIMENE.

OISEAU FRÉGATE. *Voyez* FRÉGATE.

OISEAU GOITREUX. *Voyez* PÉLICAN.

OISEAU DES INDES. Cteſias, Ariſtote, Elien, Pauſanias & quelques autres ont donné ce nom par excellence au *Perroquet.*

OISEAU DE JUNON ou DE MÉDIE. *Voyez* PAON.

OISEAU DE JUPITER. C'eſt l'aigle. Quelquefois auſſi on donne ce nom au chardonneret.

OISEAU DE MER. *Voyez* PAILLE-EN-CUL.

OISEAU DE MONTAGNE. *Voyez à l'article* HOCOS.

OISEAU DE MORT. Le peuple donne ce nom au *papillon tête de mort* & à la *fréſaie.* Voyez ces mots.

OISEAU MOUCHE, *melliſuga.* Voyez à l'article COLIBRI.

OISEAU MURMURE. *Voyez* COLIBRI.

OISEAU DE NAZARETH. On a donné ce nom par corruption à un très-gros oiſeau trouvé dans

l'île de Nazare, & qui se voit aussi dans l'île Maurice, aujourd'hui l'île Françoise. Cet oiseau a du rapport avec le *dronte*, mais il en differe par plusieurs caracteres; il est plus gros qu'un cygne, au lieu de plumes il a tout le corps couvert d'un duvet noir, & cependant il n'est pas absolument sans plumes, car il en a de noires aux ailes, & de frisées sur le croupion, qui lui tiennent lieu de queue. Il a le bec gros, recourbé un peu par dessous, les jambes hautes couvertes d'écailles, trois doigts à chaque pied, le cri de l'oison, & sa chair est médiocrement bonne. La femelle ne pond qu'un œuf, & cet œuf est blanc & assez gros.

OISEAU DE NEIGE. Oiseau semblable à la linote. Son nom lui vient de ce qu'il ne se voit jamais que sur la neige glacée à Spitzberg. Cet oiseau est si familier qu'il se laisse prendre à la main, ce qui peut être produit par la faim qu'il éprouve dans ce climat glacé: sa chair est d'un assez bon goût.

OISEAU DE NERTE, ou CHACHA. *Voyez à l'art.* GRIVE.

OISEAU DE NUIT. *Voyez* au mot OISEAU.

OISEAU DE PARADIS ou MANUCODIATA, *avis paradisæa*, est un oiseau très beau à voir par la singularité, la forme & la situation de ses ailes, différentes de celles de tous les autres oiseaux; car des côtés de la poitrine sortent de très longues & nombreuses plumes qui passent de beaucoup la longueur de la queue, & qui sont très-larges; & du croupion de quelques-uns de ces oiseaux, sortent deux longs filets noirâtres non emplumés, mais bien plus longs que les plumes mêmes. La tête & les yeux sont petits à proportion du corps, le bec est effilé comme celui de la pie. Les Naturalistes & les voyageurs en distinguent de plusieurs especes. *Rai* dit que ce sont des oiseaux de proie de la petite espece. On a faussement cru qu'ils se nourrissent de l'air, qu'ils volent toujours sans relâche, & qu'ils sont sans pieds. Ils ne les perdent que par la vieillesse ou par la maladie. Ils ont quatre doigts à chaque pied, trois devant & un derriere, les ongles sont courbés & pointus. Ils font la chasse aux pigeons, aux verdiers & à d'autres petits oiseaux semblables, & se nourris-

sent comme les autres oiseaux de proie. Il est encore aussi faux qu'on n'en trouve que de morts. Ces oiseaux se perchent sur les arbres, & par rapport à leur vol prompt & rapide, semblable à celui des hirondelles, les Indiens les appellent *hirondelles de Ternate*, du lieu où il s'en trouve beaucoup. *Helbigius* dit qu'on ne rencontre ces oiseaux que dans les terres Australes Orientales.

Clusius fait deux genres de ces oiseaux de Paradis : M. *Brisson* n'en fait qu'un qui comprend la grande & la petite espece. Chaque espece a sa couleur différente. Les grands sont les plus beaux, & se trouvent ordinairement dans la principale des îles d'Arou : ils ont des filets au croupion. Les petits, qui sont moins beaux, se rencontrent dans les Iles nommées *Papua*, ou dans la nouvelle Guinée. Ils n'ont point de filets : ils sont blancs & jaunâtres.

Ces deux sortes d'oiseaux ont un Roi distingué par sa petitesse, & par un vol plus élevé que ceux de son espece. Son plumage est éclatant : il porte à sa petite queue deux filets deux fois aussi longs que le corps de l'oiseau, & qui lui sont communs à la vérité avec ses sujets, mais il n'y a que lui qui les ait ornés d'yeux à l'extrémité. Rien ne ressemble mieux aux crins d'une queue de cheval, dont les extrémités seroient terminées par une boucle de plumes frisées & colorées. La spirale de chaque filet tournée en dedans est beaucoup plus grosse que le filet, ce qui présente un coup d'œil très singulier.

Ces magnifiques oiseaux, si recherchés des Européens curieux, sont nommés, dit *Aldrovande*, par les habitans des Iles Moluques, *manucodiatæ*, c'est-à-dire, oiseaux de Dieu, parce qu'on prétend ignorer leur origine. L'oiseau de Paradis de la grande espece, est de la grandeur de la colombe : ses ailes sont rouges. *Helbigius* dit qu'ils sont presque neuf mois sans plumes, à cause des pluies & des tempêtes, & qu'à peine les voit-on une fois pendant tout ce temps : mais au commencement du mois d'Août, lorsqu'ils ont fait leurs petits, leurs plumes reviennent; pendant le mois de Septbre & d'Octobre, ils suivent en troupe fidelle & bien

disciplinée leur Roi, comme font en Europe les étourneaux. Amis entr'eux ils demeurent toujours immobiles sur l'arbre sur lequel ils se sont assemblés le soir, jusqu'à ce que le Roi passe, & emmene avec lui toute la troupe docile. Toutes leurs démarches sont réglées sur la sienne. Ils se nourrissent aussi de baies rouges qui croissent sur des arbres branchus & élevés. On construit sur les branches de ces arbres de petites cabanes percées de plusieurs trous, dans lesquelles un chasseur se cache avant l'arrivée des oiseaux; & de là on les tue, en leur lançant de petites fleches faites avec des roseaux. Si le Roi est percé d'une fleche, on tue assez ordinairement tous les autres qui restent; c'est ainsi qu'on se rend presque maître de la troupe entiere. Dès qu'ils sont tombés à terre, & qu'on les a ramassés, il y en a qui leur ouvrent le ventre avec un couteau, & ayant enlevé les entrailles avec une partie de la chair, ils introduisent dans la cavité un fer rouge, ensuite les font sécher à la cheminée, & les vendent à vil prix à des Marchands, sous le nom de *burang-haru*. Les Portugais appellent l'oiseau de Paradis *oiseau du soleil*.

Les Indiens de l'île de Papoë coupent les pieds & les ailes de l'oiseau de paradis noir, les étendent, les préparent & les sechent pour en faire des éventails ou des plumets, des panaches dont ils ornent leurs casques. Cet oiseau, quoique d'un plumage noirâtre, a aussi un éclat de pourpre, mêlé d'or très-brillant. Les plumes de la queue sont les plus variées de vert, de bleu & de rouge très-lustrés.

Le mélange des couleurs dans les oiseaux de paradis est infini; il n'est guere possible de déterminer la variété qui appartient à chaque espece, sans entrer dans une énumération plus ennuyeuse qu'utile. Nous nous contenterons donc de dire que toutes les plus belles couleurs principales s'y trouvent réunies, non pas généralement, mais par des nuances intermédiaires, dont le mélange & le lustre éclatant font de la plus grande beauté: il y a toujours au moins une couleur dominante; si c'est la rouge, elle est mélangée de vert, de bleu, de noir, de jaune pâle ou citron, de jaune doré, d'or, &c. Lorsque le dessus de la tête & du cou sont

jaunes, la gorge est verte, le dos châtain-rougeâtre, ainsi que les ailes. Les plumes qui servent à couvrir l'animal sont longues, pointues au bout, grises, blanches, jaunes & roussâtres: elles se réunissent & forment un faisceau de plumes, d'autant plus beau, que les plumes sont d'une grandeur différente.

On prétend que ceux qui ont le bec rouge, ainsi que les deux filets du croupion, sont les mâles: ce n'est encore qu'une conjecture.

OISEAU PEINT, *avis picta*. C'est le même oiseau que la poule de Barbarie. *Voyez* PINTADE.

OISEAU POURPRÉ. *Voyez* PORPHYRION.

OISEAU DE PLUMES DU MEXIQUE ou COURONNÉ. Les Ornithologistes ont donné ce nom à un *oiseau huppé* & couvert de plumes, qui pour la plupart égalent la beauté de celles du paon. Il est de la grandeur d'un pigeon; son bec est courbé & roussâtre, ainsi que ses pieds. Sa queue est garnie de plusieurs longues plumes d'un vert clair & couleur de paon, semblables pour la forme à des feuilles de glayeul; les autres qui sont couvertes, sont noires par-dessus & par-dessous, & ressemblent à celles du paon. Sa huppe ou crête qui se redresse & s'abaisse comme celle de notre huppe, est quelquefois fourchue & composée de plumes très-belles & luisantes: il a la poitrine & le bas du cou rouges, & le haut comme le paon, ainsi que le dos, le dessous des ailes & le dedans des cuisses. Les quatre premieres plumes des ailes sont rouges, longues & pointues; le reste du pennage est pourpre; les petites plumes des épaules sont vertes.

Cet oiseau vit dans la province de Tecolotlan vers Honduras: il aime à se promener au soleil, & ne peut être apprivoisé en cage: il se nourrit de vermisseaux & de certains fruits sauvages appelés *mazatli*: il éleve ses petits dans des trous qu'il fait aux arbres; il a le cri du perroquet, & chante le matin, à midi & le soir: il vole en troupes. Les plumes de ces oiseaux sont plus estimées que l'or: on en fait des aigrettes, &c. On tâche de les prendre vivans, pour avoir leurs plumes sans les tuer. La chasse de cet oiseau est royale comme celle de nos cerfs; aussi n'est-elle permise qu'aux riches

du pays : quand ils ont de ces oiseaux sur leurs terres, ils les regardent comme un bien qui doit passer à leurs héritiers.

OISEAU RHINOCÉROS. Espece de calao. *Voyez ce mot.*

OISEAU DE PROIE. *Voyez à l'art.* OISEAU.

OISEAU DE ROCHE, *avis charadrios sive hiaticula.* Oiseau de nuit qui fréquente le bord des eaux, il est de la grandeur du pluvier, & a le bec long & effilé, d'un jaune noirâtre ; le derriere de sa tête est cendré, & le menton a une couleur blanche ; le cou est cerclé de blanc & de noir ; le dos & les petites plumes des ailes ont une couleur cendrée ; la poitrine & le ventre sont blancs ; les pieds ont une couleur jaune-pâle, & les ongles sont noirs. On ne trouve point de doigt derriere. On voit beaucoup de ces oiseaux dans les montagnes de la Laponie & en Amérique.

OISEAU ROYAL. Nom que les habitans de Congo donnent au *héron* & au *butor.* A la Chine on donne le nom d'*oiseau royal* ou d'*oiseau du soleil* au *manucodiata* (oiseau de Paradis). M. *Perraut* croit au contraire, ainsi que nous, que la *grue baléarique* est le véritable oiseau royal. *Voyez ces mots.*

OISEAU DE SAINT-MARTIN. *Voyez* JEAN-LE-BLANC.

OISEAU DE SAINT-PIERRE. *Voyez* PETREL.

OISEAU DE SAUGE, *salicaria.* Cet oiseau qui fréquente les endroits humides entre les saules & les grandes sauges, a le bec délié, droit & d'un rouge sombre : ses mâchoires sont d'un blanc sale : son dos & ses ailes brunâtres : la poitrine & le ventre sont d'un blanc pâle & jaunâtre : tous les bords extérieurs des ailes sont d'un jaune pâle : les jambes & les pieds sont d'un jaune rougeâtre : la queue est composée de douze plumes brunes.

L'oiseau de sauge est la fauvette des roseaux, qui se nourrit de mouches & autres insectes qu'il trouve parmi les saules ; & pour les avoir à lui seul il en chasse tous les petits oiseaux.

OISEAU DE SCYTHIE. On a donné ce nom à une espece d'aigle dont la femelle fait, dit-on, éclore deux petits sans couver les œufs qu'elle a pondus: elle se contente de les mettre dans la peau d'un lievre ou dans celle d'un renard, & elle les porte ainsi enveloppés sur l'enfourchure des branches d'un arbre. Quand elle ne chasse point, elle reste perchée auprès du nid & fait sentinelle: malheur à celui qui alors grimpe sur l'arbre pour lui enlever ses petits, car elle les défend avec une vigueur extraordinaire.

OISEAU DU SOLEIL. *Voyez l'art.* OISEAU DE PARADIS.

OISEAU SORCIER ou DE MAUVAIS AUGURE. *Voyez* FRÉSAIE.

OISEAU TAILLEUR. Nom donné à un très-petit oiseau de l'île de Ceylan. Ce bipede vivant au milieu d'une troupe d'ennemis, tels que singes, serpens, &c. a reçu de la Nature un instinct très-singulier & plein d'industrie pour la conservation de sa postérité. Le rameau le plus flexible ne lui paroît pas un asile assez sûr contre ces brigands. Il prend une feuille morte, la coud à une feuille verte; son bec mince & délié est son aiguille; des fibres de duvet & des plumes lui servent de fil. Ceux qui visitent le curieux *Musæum* de Londres peuvent y observer plusieurs de ces nids.

OISEAU DE TEMPÊTE, *procellaria avis.* Nom donné à un oiseau gros à-peu-près comme un merle: son dos est noir au fond, mais le dessus de ses plumes est d'un beau bleu pourpré chatoyant: le cou est un peu verdâtre: sa tête entiérement bleue: les ailes & le croupion sont tiquetés de blanc. Les ailes sont fort longues à proportion de son corps. Il habite la surface de la mer & se nourrit de poisson: ses pieds n'ont point de talon, mais ses doigts sont palmés: il a le regard assuré, les jambes très-longues & sans plumes, son bec pointu, un peu arqué: cet oiseau se rencontre dans toutes les latitudes des mers un à un, excepté quand la tempête est prochaine; alors il s'éleve de dessus la surface de la mer, & en un instant il est à perte de vue, & traverse bientôt tout l'horizon visible pour aller chercher quelque abri & s'y mettre à

couvert. Mais si cet animal rencontre en pleine mer un vaisseau, il ne manque jamais, pour éviter la tempête qui s'avance dans les airs, de raser la surface de l'eau & de s'attacher au navire du côté opposé au vent: les Nautonniers, sur-tout ceux de la mer du Danemarck, accoutumés au phénomene de ces messagers, ne manquent pas de plier les voiles & de se préparer contre le gros temps qui menace, quoique la mer soit calme & qu'il ne regne point de vent. Le présage qu'il donne de la tempête, vient apparemment de ce qu'ayant les ailes fort grandes il ressent l'impression la plus légere qui arrive dans les airs. A cette premiere sensation, la Nature l'invite à chercher les îles & les vaisseaux pour se mettre à couvert du danger. *Voyez* PETREL.

OISEAU DES TERRES NEUVES. *Belon* donne ce nom au toucan vert du Brésil. *Voyez* TOUCAN.

OISEAU TROMPETTE. *Voyez* TROMPETTE.

OISEAU DU TROPIQUE. *Voy.* PAILLE-EN-CUL.

OISEAU VERT DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE. Il ressemble assez au perroquet; mais il n'en a pas toutes les manieres de faire. Il vole autour des arbres où les mouches ont fait des rayons de miel; il en est très-avide & en fait sa nourriture ordinaire. Quand les habitans du pays voient cet oiseau s'arrêter sur une branche, c'est pour eux un indice sûr de l'endroit où le miel est caché. Le plumage de cet oiseau est de la plus grande beauté.

Séba a donné la description d'un nombre infini d'oiseaux qui n'ont point de noms particuliers. *Voyez* l'Ouvrage de cet Auteur. La plupart se trouvent néanmoins décrits dans le corps de ce Dictionnaire, avec les noms adoptés par les nouveaux Voyageurs ou par les Naturalistes modernes.

OISEAUX DE PASSAGE. Ce sont ceux qui à certaines saisons réglées de l'année se retirent de certains pays, & dans d'autres saisons fixes y retournent en traversant de vastes contrées. *Voyez à l'art.* OISEAU.

OISEAU ou OISEAU TESTACÉE. Nom que l'on donne à une coquille bivalve du genre des moules: on l'appelle aussi *ailée* ou *hirondelle* ou la *mouchette*, parce

qu'au coin de sa coquille elle porte deux especes d'ailes qui augmentent sa largeur du double de sa longueur. M. *Adanson* la met dans le genre du *jambonneau*. Voyez ces mots.

OISON est le petit d'une *oie*. Voyez OIE.

OLAMPI. *Voyez* RÉSINE OLAMPI.

OLEB. Faux lin qu'on apporte d'Egypte, & qui est aussi bon que celui qu'on nomme *forcette*, mais d'une qualité inférieure à celui du *squinanti*, dont on fait dans le pays un très-grand commerce. Il ne faut pas confondre ce *squinanti* avec le *squenante* ou *jonc odorant* qui est une espece de *gramen*. Voyez SCHÉNANTE.

OLIBAN ou ENCENS, *olibanum aut thus*, est une substance résineuse, seche, dure, d'un jaune blanchâtre, à peine demi-transparente, en larmes grosses comme des noisettes, arrondies & oblongues, farineuses en dehors, brillantes en dedans, d'un goût âcre, amer, & d'une odeur pénétrante, s'enflammant facilement, exhalant une vapeur très-aromatique, & s'éteignant difficilement; quelquefois ces larmes ou gouttes d'encens sont accouplées, & ressemblent à des testicules ou à des mamelles; c'est de là que sont venues les distinctions ridicules d'encens mâle & d'encens femelle. On appelle *manne d'encens* les miettes ou les petites parties qui se sont formées par le frottement des morceaux, & l'on donne le nom de *suie d'encens* à cette *manne* brûlée de la maniere qu'on brûle l'arcançon ou la poix pour faire du noir de fumée.

L'encens a été connu dans tous les temps, de presque toutes les nations; & son usage a été très-fréquent & très-célebre dans les sacrifices, car autrefois on les faisoit avec de l'encens. On s'en servoit, comme l'on s'en sert à présent, pour parfumer les Temples d'une odeur agréable. Cette coutume a passé chez toutes les Nations & dans toutes les Religions pour le culte divin.

On prétend que cette résine est tirée par incision d'un petit arbre, dont les feuilles sont semblables à celles du lentisque, & qui croît abondamment dans la Terre-Sainte & dans la partie de l'Arabie, appelée *Saba*. On appelle cet arbre *arbor thurifera*; d'autres

disent que l'Ethiopie, dont quelques peuples s'appellent aussi *Sabéens*, produit également cette résine odoriférante, &c. On la trouve aussi dans le pays des Maures du côté d'Arguin. Nous ne sommes pas plus certains de l'arbre qui porte l'encens; on dit cependant que c'est un genevrier à fruit jaune; mais les Voyageurs s'accordent presque tous à dire, que les habitans de l'Arabie & du Levant observent des cérémonies superstitieuses dans la maniere de récolter cette résine.

M. l'Abbé *Demanet*, ci-devant Curé & Aumônier pour le Roi en Afrique, dit positivement dans le second volume de l'*Afrique Françoise*, p. 149, que l'arbre ou arbrisseau qui donne l'encens, est assez semblable au lentisque: ses branches sont nombreuses, assez déliées & flexibles; leur écorce est mince, fort adhérente & de couleur grise; ses feuilles sont longues, étroites, tendres, charnues, toujours vertes & par paires, mais les branches sont terminées par une seule feuille: le pédicule qui les soutient est rouge & assez fort. Ces feuilles ont une odeur forte, aromatique, & quand on les broie dans la main, elles rendent une liqueur onctueuse.

On recommande l'usage interne de l'oliban pour les maladies de la tête, de la poitrine, de la matrice, le flux de ventre, & pour le crachement de sang: on emploie l'encens extérieurement dans les fumigations de la tête, pour les catarrhes & les vertiges; dissous dans l'esprit de vin, il mondifie les plaies. Selon M. *Bourgeois*, on fait un emplâtre avec l'encens pulvérisé & la térébenthine, qu'on applique avec beaucoup de succès sur les entorses & foulures de nerfs, après avoir dissipé l'enflure & l'inflammation par le moyen des fomentations aromatiques.

Autrefois on avoit coutume d'apporter avec l'oliban l'écorce de l'arbre de l'encens, qui est astringente: on ne s'en sert plus aujourd'hui. On la distribuoit dans le commerce sous le nom de *narcaphte*, ou *thymiama*, ou *parfum*, ou d'*encens des Juifs*, parce que ce Peuple s'en servoit souvent dans ses Temples; quelquefois aussi c'étoit une masse seche, un peu résineuse, rougeâtre, en écorce, qui avoit l'odeur pénétrante du storax li-

quide, tiré par décoction des écorces de l'arbre appelé *rosa mallos*.

Oliban, selon *Lémery*, signifie *huile du Liban*, parce que cette résine découle aussi, dit-il, d'une espece d'arbre qui est au pied du Mont Liban. Tout l'encens du Commerce nous vient par la voie de Marseille: il en vient cependant aussi des Indes, sous le nom d'*encens de Moka*; ce sont les vaisseaux des Compagnies des Indes qui s'en chargent dans ce Port de l'Arabie. Cet encens est inférieur au précédent; on a donné le nom de *gros encens*, d'*encens commun* & de *galipot* à une autre résine, qui découle des pins de différentes contrées de l'Europe. *Voyez au mot* PIN.

OLIET. C'est le trefle sauvage jaune.

OLIVES. Nom que les Conchyliologistes donnent à un genre de coquillage marin, de la classe des univalves, dont M. *d'Argenville* compose la onzieme famille de coquilles appelées *cylindres* ou *rouleaux*, ou qu'il y joint, & que M. *Adanson* met dans le genre des *porcelaines*; voyez ces mots. En général, les coquilles appelées *olives* ont l'échancrure qu'on observe près de la culasse de tous les rouleaux, ce qui forme une spirale intérieurement; mais on distingue toujours le genre de l'olive de celui du rouleau. Les plus grosses olives sont celles de Panama; elles ont depuis un jusqu'à trois & quatre pouces de long.

Ces coquilles sont naturellement belles, brillantes & forment plus de variétés que d'especes. On distingue 1°. l'*olive verte* & *marbrée*; 2°. l'*olive de couleur d'agate* bariolée par le bas; 3°. le *cylindre* nommé *porphyre*; 4°. l'*olive noire* ou *moresque*; 5°. l'*olive jaune*; 6°. la *solitaire*; 7°. la *bariolée* & *fasciée* par le bas; 8°. l'*olive alphabet*; 9°. la *violette* de Panama; 10°. l'*olive blanche* marquée de lignes fauves; 11°. celle dont le sommet est couronné; 12°. la *chagrinée*, ponctuée de noir avec des taches jaunes; 13°. la *blanche* marbrée de taches brunes; 14°. l'*olive* faite en zigzags bruns sur une couleur jaune.

OLIVES PÉTRIFIÉES. Nom donné à des pointes d'oursin fossiles, appelées des Naturalistes *pierres judaïques*. Voyez ce mot.

OLIVIER;

OLIVIER, *olea*. L'olivier eſt un arbre fort utile, & la ſource de la richeſſe de quelques-unes de nos Provinces méridionales ; il croît abondamment en Provence, en Languedoc, en Italie, & auſſi en Eſpagne. On peut, moyennant quelques précautions, en élever dans nos jardins, ſur-tout en eſpaliers, mais ſeulement par curioſité ; ils ne nous y donnent du fruit que dans les années chaudes & ſeches.

On compte pluſieurs eſpeces d'oliviers, dont la plus grande partie ne ſont que des variétés : on les cultive toutes ; les unes, parce que leurs fruits ſont propres à être confits ; les autres parce qu'elles donnent l'huile la plus fine ; d'autres enfin, parce qu'elles fourniſſent une plus grande quantité de fruits. L'olivier à petits fruits ronds eſt celui qui donne les olives que l'on nomme *picholines*, ou *olives à la picholini*, & que l'on ſert ſur les tables, comme étant les meilleures & les plus agréables à manger ; les ſecondes en groſſeur, ſe nomment *amelodes*, on les mange auſſi, & bien des perſonnes les aiment autant en ſalade que les picholines : enfin, les plus groſſes viennent d'Eſpagne & de Verone, & ſont bonnes à tourner, c'eſt-à-dire, à être pelées ; on s'en ſert en cuiſine dans les ragoûts. Il y a beaucoup d'autres olives dont les différences ſe tirent de la figure, de la couleur, de la grandeur, du ſuc, de la variété des lieux, ou du nom de ceux qui ont inventé diverſes manieres de les préparer, mais qu'il ſeroit trop long de parcourir.

L'olivier devient plus ou moins beau, & plus ou moins gros, ſuivant la nature des ſols. Il croît aſſez volontiers dans toutes ſortes de terrains ; néanmoins les terres légeres & chaudes lui conviennent mieux ; dans les terres ſubſtantielles les arbres ſont plus beaux, plus gros, au lieu que dans les terres maigres le fruit eſt de meilleure qualité. Les feuilles des oliviers ſont entieres, non dentelées, unies, épaiſſes, dures & oppoſées deux à deux ſur les branches ; elles ne tombent point l'hiver ; il y en a de fort longues & d'autres très-courtes, ſuivant l'eſpece d'olivier. Les fleurs de ces arbres ſont de petits tuyaux très-courts, diviſés par le bord en quatre parties ovales ; aux

fleurs succedent les olives, qui sont des fruits charnus, ovales, plus ou moins alongés, & plus ou moins gros, suivant les especes; ils contiennent un noyau fort alongé, très-dur, qui renferme deux semences, mais dont il y en a toujours une qui avorte.

Les oliviers se multiplient aisément de drageons enracinés, & qui donnent du fruit au bout de huit ou dix ans, lorsqu'on a eu soin de les greffer. On greffe les especes d'oliviers qui donnent l'huile la plus fine, & ceux qui donnent la plus grande abondance de fruits, sur les especes médiocres & sur les mauvaises. Chaque espece d'olivier est désignée par des noms différens; ceux qui sont singuliérement estimés pour donner une huile fine, sont le *cormeau*, ainsi nommé en Languedoc, parce que ses fruits ressemblent à ceux du cormier; l'*ampoullau*, dont les fruits sont gros & arrondis; & le *moureau*, espece d'olivier précoce à fruit rond. Ces especes en Languedoc, & quelques autres en Provence, donnent l'huile la plus fine quand elles sont dans un terrain favorable. En général on distingue dix-neuf sortes d'oliviers: savoir, 1°. l'*olivier sauvage*, il vient naturellement sur les montagnes, son fruit est très-petit & peu nombreux; 2° l'*oliver* à petit fruit long, c'est l'*olive picholine*; 3°. l'*olivier* à petit fruit rond ou l'*aglaudan* ou la *caïanne*, il donne l'huile la plus fine; 4°. l'*olivier* à gros fruit long & à bosses ou la *laurine*; 5°. l'*olivier* à fruit de *corniau* ou de *cormeau*; 6°. l'*olivier ampoullau*; 7°. l'*olivier moureau*; 8°. l'*olivier d'Espagne* à très-gros fruit, il est très-amer; 9°. l'*olivier de Luques*, son fruit est odorant; 10°. l'*olivier sauvage d'Espagne*, la pointe de son fruit est tronquée; 11°. l'*olivier à feuilles de buis*, cette espece est fort robuste; 12°. le *grand olivier franc* ou l'*amelou*, son fruit est de la forme d'une amande; 13°. l'*olivier à fruit long*, d'un vert foncé; 14°. l'*olivier à fruit blanc*; 15°. l'*olivier royal* à gros fruit très-charnu; 16°. l'*olivier à fruit rond*, appelé le *verdale*; 17°. l'*olivier à fruit en grappes* ou le *bouteilleau*; 18°. l'*olivier à petit fruit rond*, panaché de rouge & de noir, ou le *pigau*; 19°. l'*olivier à petit fruit rond & noirâtre*, c'est le *salierne*. Les six especes d'olives qu'on connoît aujourd'hui en

Provence, proviennent du plant sauvage, nommé *péroulier*, du plant d'Aix, de celui d'Aiguieres, de Saurin, de Salon, & de celui qu'on nomme enfin d'Aglantau; elles ont pris différens noms dans plusieurs cantons de la Provence, ainsi qu'ils sont désignés ci-dessus.

On greffe les oliviers à la pousse lorsqu'ils sont en fleur: si on a tardé & que les arbres aient du fruit, on se contentera d'enlever au dessus de l'écusson le plus élevé un anneau d'écorce, de deux doigts de largeur: dans ce cas les branches ne périssent point dans cette premiere année, elles nourrissent le fruit, & on ne les retranche qu'au printems suivant. On a coutume de planter les oliviers en quinconce, & par rangées fort éloignées les unes des autres; entre ces rangées on plante de la vigne, ou on y seme du grain. On observe que les oliviers, ainsi que quantité d'autres arbres fruitiers, ne donnent abondamment du fruit que tous les deux ans. Tout l'art de la taille de ces arbres consiste à les décharger du trop de bois: on a observé en général, qu'un arbre trop chargé de bois ne donne point autant de fruit, ni si bien conditionné.

Lorsqu'on veut confire les olives, on les cueille avant leur maturité. L'art de les confire consiste à leur faire perdre leur amertume, à les conserver vertes, & à les imprégner d'une saumure de sel marin aromatisé, qui leur donne un goût agréable. On emploie pour cela différens moyens. On se servoit autrefois d'un mélange d'une livre de chaux vive, avec six livres de cendres de bois neuf tamisées. Mais depuis quelque temps, au lieu des cendres on n'emploie plus que la lessive; on prétend que les olives en sont plus agréables au goût & moins mal-faisantes: ces lessives servent à adoucir les olives. Quelques Provençaux retirent au bout d'un temps leurs olives de leur saumure: ils ôtent le noyau & mettent à sa place une câpre, & ils conservent ces olives dans d'excellente huile: ce fruit ainsi préparé excite beaucoup l'appétit en hiver. Quand les olives sont parfaitement mûres, elles sont molles & d'un rouge noir; on les mange alors sans préparation, en les assaisonnant seulement avec du poivre, du sel & de l'huile, car elles sont alors très-âcres.

L'huile eſt ſans contredit le revenu le plus certain qu'on puiſſe ſe promettre des oliviers; ſa bonté dépend de la nature du terrain où croiſſent ces arbres, de l'eſpece d'olive qu'on exprime, & des précautions qu'on prend pour la récolte, la détrition & l'expreſſion de ces fruits, & même de la ſéparation de la partie extractive. Les olives qui ne ſont pas mûres, laiſſent à l'huile une amertume inſupportable : ſi elles le ſont trop, l'huile prend un goût unguineux ; le véritable point de maturité eſt eſſentiel. Lorſqu'on eſt dans une poſition favorable, on s'attache à cultiver les eſpeces d'oliviers qui donnent des huiles fines ; autrement on cultive des eſpeces d'oliviers qui donnent beaucoup de fruit, & on en fait de l'huile pour les ſavonneries, ou pour les lampes. Vers les mois de Novembre & de Décembre, on fait la cueillette des olives ; le mieux eſt de les mettre auſſi-tôt dans des cabas, & de les exprimer tout de ſuite dans le preſſoir, afin d'en retirer une huile bien fine. Ceux qui ne ſont de l'huile que pour les ſavonneries, les laiſſent entaſſées pendant quelque temps dans leurs greniers : on les exprime enſuite, & de cette maniere on en retire une plus grande quantité d'huile. Ceux qui recueillent l'huile dont on fait uſage dans les aliments, les laiſſent auſſi quelquefois fermenter en tas, dans la vue de tirer une plus grande quantité d'huile, ce qui eſt cauſe que l'huile fine eſt toujours très-rare. On doit avoir ſoin de faire dépoſer l'huile pour l'avoir dans ſa pureté; l'huile produite par la chair ſeule des olives, a toute la perfection qu'on peut déſirer, & ſe conſerve pendant pluſieurs années, tandis que celle qu'on tire ſoit des amandes ſeules, ſoit du noyau, ſoit enfin de la totalité de l'olive broyée à l'ordinaire dans des moulins publics, eſt toujours plus ou moins défectueuſe, perd ſa limpidité au bout d'un certain temps, & devient très-ſujette à ſe rancir: on doit avoir l'attention de tenir l'huile dans des vaſes bien fermés. Le marc qui reſte, lorſqu'on a exprimé toute l'huile, eſt nommé *grignon*, & ne peut plus ſervir qu'à faire des mottes à brûler. On appelle, d'après les Anciens, la fece d'huile récente, *amurca ;* c'eſt un bon remede pour les rhumatiſmes : on

fait à Paris communément la cire à cirer les souliers avec la fece d'huile soutirée, & le noir de fumée.

L'huile d'olive entre dans quantité de baumes, d'onguents, d'emplâtres, & de linimens adouciſſans & relâchans : elle eſt émolliente, réſolutive ; elle adoucit les tranchées de la colique & les douleurs de la dyſſenterie ; c'eſt un des meilleurs remedes lorſqu'on a eu le malheur d'avaler des poiſons corroſifs, mais elle ne prévient pas les accidens funeſtes de la morſure de la vipere, comme pluſieurs lettres de Londres l'avoient annoncé en 1736. conſultez les *Mém. de l'Académie des Sciences, ann. 1737.* Elle eſt, dit M. *Bourgeois*, très efficace pour guérir les piqûres des guêpes, des abeilles, & d'autres inſectes. Il ſuffit d'appliquer auſſi-tôt ſur la piqûre une compreſſe imbibée d'huile, & l'on eſt guéri ſans qu'il ſurvienne aucune enflure ni inflammation.

Le baume Samaritain ou de l'Evangile, n'eſt compoſé que d'huile & de vin. L'huile *omphancine*, ſi célébrée des Auteurs, ſe tire des olives vertes : ce n'eſt, à proprement parler, qu'un ſuc viſqueux & brunâtre. Les Athletes, qui ſe préparoient à la lutte, s'oignoient le corps avec cette huile, enſuite ſe rouloient dans le ſable ; ce qui, mêlé avec les ſueurs du corps dans l'exercice, formoit les *ſtrigmenta*, qu'on faiſoit racler avec ces ſortes d'étrilles (*ſtrigilis*) dont Mercurial nous a donné la figure dans ſon *Traité de la Gymnaſtique* : ces raclures, ou plutôt ces ordures, étoient fort eſtimées pour pluſieurs maladies, pour détruire les condylomes, les rhagades, &c. Les Marchands de *ſtrigmenta* faiſoient d'aſſez gros bénéfices.

En Provence, les Payſannes ſe ſervent de l'eau des olives pour calmer les affections hyſtériques : elles en font auſſi avaler aux hommes qui ſont hypocondriaques.

L'huile d'olive ne vaut rien pour la peinture, parce qu'elle ne ſeche jamais parfaitement bien. Le bois d'olivier eſt très bien veiné, d'une odeur aſſez agréable ; il prend un beau poli : c'eſt ce qui le fait rechercher par les Ebéniſtes & les Tabletiers ; comme ce bois eſt réſineux, il eſt excellent à brûler.

Une grande sécheresse, ou des pluies abondantes occasionnent une perte considérable sur la récolte des olives. Ce fruit est très sujet à la piqûre d'un ver qui lui est particulier & qui l'endommage au point qu'après la récolte le produit en huile qu'on en tire est réduit à moitié. Voyez *Ver des olives.*

Le terrible hiver de 1709, qui fit périr grand nombre d'oliviers, donna occasion de remarquer que cet arbre pousse quantité de racines, & qu'elles subsistent en terre pendant des siecles entiers. En 1709, on a tiré plus de bois de ces racines, que des tiges & des branches des arbres; & plusieurs particuliers en vendirent alors pour plus d'argent que ne valoit leur fonds. Les branches ou rameaux d'oliviers chargés de feuilles, sont depuis très-long-temps, des signes de concorde, les symboles de l'amitié & de la paix, comme celles de laurier sont présentement les marques de la gloire.

L'huile d'olive est employée avec la soude d'Alicante & la chaux vive, pour faire le meilleur savon. Le savon d'Alicante est recommandé en médecine pour l'usage intérieur; on l'ordonne pour enlever les obstructions des viscères, même pour la gravelle, la pierre & les maladies scrophuleuses, surtout si on joint à son usage celui de l'eau de chaux d'huîtres calcinées. Ce savon est la base du fameux spécifique de Mademoiselle *Stephens.*

Les feuilles d'oliviers sont astringentes; plusieurs personnes s'en servent dans les gargarismes pour l'inflammation de la gorge.

OLIVIER NAIN. *Voyez* CAMELÉE.

OLLAIRE. *Voyez* PIERRE OLLAIRE.

OMALISE, *omalisus.* Insecte coléoptere, à antennes filiformes. Son corselet est aplati, à quatre angles, dont les deux postérieurs finissent en pointes aiguës. *Hist. des Insect. des envir. de Paris.* Cet insecte est rare en France, mais assez commun dans les pays chauds de l'Asie.

OMBELLIFERES, *umbellatæ.* Les Botanistes donnent ce nom à une famille de plantes assez rameuses, presque toutes herbacées: il y en a peu d'annuelles, mais il y en a beaucoup de biennales ou bisannuelles;

les autres sont vivaces par leurs racines, lesquelles sont ou en navets ou tuberculaires. Leurs tiges sont cylindriques, remplies de beaucoup de moelle, souvent creuses. Leurs branches sont alternes ainsi que leurs feuilles, qui sont ou entieres, ou digitées, ou ailées. La plupart des fleurs sont hermaphrodites, & disposées en ombelles ou parasol; elles sont à cinq étamines & à cinq pétales attachés à la couronne du germe qui pousse deux pistils & qui devient un fruit formé de deux graines nues, réunies contre un pivot commun. La naissance des ombelles, ou le centre d'où partent les pédicules des fleurs, est dans plusieurs especes environné de quelques feuilles en forme de fraise. La situation des ombelles sur les tiges fournit souvent des caracteres assez constans. La couleur des fleurs est peu changeante. Quelques-unes de ces plantes sont stomacales & très-échauffantes. La plupart des autres sont des poisons assez vifs, sur-tout celles qui croissent dans les marécages: le suc laiteux de leurs racines est caustique. On se préserve de leurs mauvais effets en buvant des acides végétaux. On range parmi les ombelliferes, les especes du *gens-eng*, du *fenouil*, du *carvi*, du *cerfeuil*, de la *ciguë*, de la *carotte*, de la *berce*, du *panais*, &c. *Voyez ces mots & celui d'*OMBELLE, *dans le Tableau alphabétique, &c. à l'article* PLANTE.

Nous avons un grand Ouvrage latin sur les *plantes en ombelles* par l'illustre *Morison*: en voici le titre: *Plantarum ombelliferarum distributio nova. Oxoniæ, 1672. in-fol. avec fig.*

OMBILIC & OMBILICAL. *Voyez* NOMBRIL.

OMBRAGE & OMBRE. L'ombre se dit d'un espace privé de lumiere, ou dans lequel la lumiere est affoiblie par l'interposition de quelque corps opaque. L'ombre suit exactement toutes les situations du soleil. La théorie des ombres est fort importante dans l'Optique & dans l'Astronomie; elle est le fondement de la Gnomonique & de la Théorie des éclipses, & de bien des connoissances Géographiques, sur-tout par rapport aux peuples situés sous l'un ou l'autre des deux Tropiques. Ombrager un lieu, est le couvrir de feuillages. On donne le nom de *pénombre* à cette ombre foible

qu'on observe dans les éclipses avant l'obscurcissement total, & avant la lumiere totale ; ce phénomene est principalement sensible dans les éclipses de lune. *Voyez* ÉCLIPSE.

OMBRE, *umbra marina*, est un poisson de mer à nageoires épineuses, connu tout le long de la côte du Languedoc, sous le nom d'*umbrino* : les François l'appellent *maigre*. Il est orné de certaines bandes transversales jaunes obscures, & de différentes teintes qui semblent faire ombre les unes sur les autres. Ce poisson, qui est de la grandeur d'une carpe, a une verrue au menton, deux trous devant les yeux, & d'autres petits trous au bout du museau & à la mâchoire inférieure, point de dents, des nageoires noires : sa chair est blanche & estimée dans toute l'Italie. C'est le *coragolus thymalus* de *Linnæus*.

L'OMBRE DE RIVIERE, *umbra fluviatilis*, est une espece de truite de couleur brunâtre ; ses nageoires sont molles ; sa chair est blanche, seche & de bon goût.

Les habitans de Lausanne donnent aussi le nom d'*ombre* ou d'*omble*, au saumon de leur Lac : sa chair a le goût de la truite saumonée.

OMBRETTE, *scopus*. Nom donné à un oiseau du Sénégal, seul de son genre. Son bec est épais, long, droit & écrasé par les côtés : le bout de la mâchoire supérieure est crochu. L'ombrette est de la grosseur de l'aigrette : son plumage est brunâtre.

ONAGRE, *onager*. C'est l'âne sauvage. *Voyez ce mot & ce qui est dit à la fin de l'article* ANE.

ONCE, *onca*. Animal quadrupede de l'ancien Continent, dont nous parlerons dans l'*article* PANTHERE.

ONDATRA. *Voyez à l'article* RAT MUSQUÉ.

ONDE. Se dit du mouvement oscillatoire que produit alternativement l'élévation & l'abaissement de la surface de l'eau doucement agitée. Les grandes ondes de la mer se nomment *vagues* & *flots*. Voyez ces mots. En Conchyliologie on appelle *ondes* les lignes qui vont en serpentant sur la robe d'une coquille.

ONDÉE. On donne ce nom à une pluie passagere, & qui dure d'autant moins, qu'elle tombe plus fortement. *Voyez l'article* PLUIE.

ONGLE MARIN ou DACTYLE, *unguis dactylus.* C'eſt un coquillage dont on ſe ſert quelquefois en Normandie pour pêcher : il eſt connu en France, ſous les noms de *ſolen* & de *coutelier.* Voyez ce dernier mot.

ONGLE ODORANT, *unguis odoratus.* Nom donné à une eſpece d'opercule de ſubſtance cornée qui appartient à un coquillage univalve, du genre des pourpres, lequel ſe pêche dans les marais des Indes, où croît une plante d'une odeur de ſpicanard, dont il ſe nourrit ; c'eſt ce qui rend, dit-on, ſon opercule ſi odorante. On va ramaſſer ce coquillage dans l'été, quand les marais ſont deſſéchés : les meilleurs ſont blancs & gros : les operculés ſentent un peu le *caſtoreum.* On prétend qu'on en fait des parfums utiles aux femmes qui ſont près d'accoucher, & aux épileptiques. M. *Adanſon* a nommé ce coquillage *kalan ;* cet Auteur dit que les bords des deux levres de cette coquille ſe teignent d'une couleur de cuivre, dès qu'elle eſt reſtée quelque temps ſur le rivage après la mort de l'animal.

ONGLES, *ungulæ*, eſt cette partie qui ſe trouve à l'extrémité des doigts tant des mains que des pieds des animaux : on la croit formée par les mamelons de la peau ; on diroit de couches membraneuſes, longitudinalement ſoudées enſemble & qui ſont devenues cartilagineuſes, & comme oſſeuſes pour la dureté : elle paroît avoir beaucoup de rapport avec la ſubſtance qui compoſe le bec des oiſeaux, & la corne de quelques quadrupedes, particuliérement avec celles du belier, du bœuf & du bouc.

Malpighi, *Boerhaave*, *Heiſter* & M. *Winſlow*, paroiſſent avoir développé la formation & la ſtructure des ongles. Les couches de ſubſtance cornée aboutiſſent à l'extrémité de chaque doigt ; la couche externe eſt la plus longue, mais les couches intérieures diminuent par degrés juſqu'au plan le plus interne, qui eſt le plus court de tous ; de ſorte que l'ongle augmente par degré en épaiſſeur depuis ſon union avec l'épiderme, où il eſt le plus mince, juſqu'au bout du doigt où il eſt le plus épais. Nous invitons le Lecteur à lire les

remarques particulieres de M. *du Verney* sur les ongles de l'homme, dans le *Journal des Savans*, *23 Mai 1689*.

Les ongles ont différentes couleurs & formes, selon leur usage, & l'espece d'animaux à qui ils appartiennent. Chez l'homme, l'ongle qui sert à donner plus de force à l'extrémité des doigts de la main & du pied, est de trois couleurs : on distingue ces trois parties ; savoir, la *racine* qui est blanche, le *corps* qui est couleur de chair, & l'*extrémité* qui n'est point attachée à la peau, qui croît toujours à mesure que l'on coupe ce bout de l'ongle, qui est insensible : sa couleur est ou blonde, ou terne ; nos ongles ne croissent que pendant la vie ; ils ont une forme convexe & tranchante ; ils recouvrent en partie le doigt où ils sont adhérens. Dans le cheval, l'âne, le mulet, &c. l'ongle s'appelle *corne du pied ;* il est plus épais & plus dur à mesure qu'il s'éloigne des chairs ; c'est un bouclier qui recouvre, en maniere de chaussure, l'extrémité du pied de ces animaux ; c'est un arc-boutant qui sert non-seulement à les renforcer dans ces parties, mais à les préserver d'un frottement, souvent aussi dangereux que douloureux.

Quand les ongles, ainsi que toute espece de poil, ont été une fois taillés, ils sont susceptibles d'un grand accroissement, lequel diminue alors leur force naturelle ; c'est pour remédier à ces inconvéniens, qu'on est dans l'usage de renouveller la taille de la corne des chevaux : mais nouvel incident ; cette corne est trop tendre, pour que l'animal puisse marcher sur un chemin caillouteux : il a donc fallu avoir recours à des semelles de fer, qui ne sont, pour l'animal, qu'un gage, qu'un stigmate de son esclavage.

Les bêtes de charge à pied fourchu, ainsi que le cochon, le mouton, l'élan, &c. ont aussi les doigts des pieds revêtus d'un sabot de corne, qui leur sert à battre la terre.

Les quadrupedes d'un genre différent, qui ont les pieds fendus & l'entre-deux des doigts garnis de poil, ont, à l'extrémité de ces mêmes doigts, des ongles crochus, qui restent constamment en dehors dans le chien, &c. ou qui peuvent être retirés en dedans,

comme chez le chat, le tigre, &c. ces ongles servent aux uns à fouiller, & aux autres pour grimper, pour déchirer, fixer un corps, &c. à d'autres ils servent de souliers.

L'ongle dans les oiseaux, est la partie appelée *griffe* ou *serre;* sa forme est ronde, pyramidale, presque toujours courbée; son usage est pour grimper, & pour tenir l'animal perché : il s'en sert pour emporter sa proie : l'ergot, l'éperon & le bec de ces animaux sont des especes d'ongles.

Les amphibies quadrupedes ont aussi des ongles, dont la forme varie beaucoup. Il suffit de citer ceux du castor, ceux de la tortue (l'écaille de cet animal, ainsi que les gros tuyaux de plumes des oiseaux, semblent être aussi de la nature de l'ongle) ceux du loup marin, ceux du crocodile; enfin, la défense de la scie de mer est armée d'un grand nombre d'ongles, d'une espece particuliere. *Voyez à l'article* BALEINE.

Les ongles ont quelques usages, tant dans les Arts, qu'en Médecine : ceux du dante, de l'élan, du mulet sont astringens & anti-épileptiques; ceux de l'homme sont vomitifs; ceux du bœuf & de la tortue servent à faire des manches de couteaux, des tabatieres, &c.

ONGULÉ & ONGUICULÉ. *Voy.* QUADRUPEDES.

ONICE ou ONYX, *onychium.* Communément on donne ce nom à une sorte d'agate, à peine demi-transparente, formée par couches de différentes couleurs, arrangées, ou en maniere de cercles, ou par lits, les unes sur les autres. Un silex veiné de deux teintes, très-dur, & également susceptible d'un beau poli, peut aussi porter le nom d'*onyx.*

La plus belle pierre onyx vient d'Arabie : (on en trouve aussi dans l'île de Ceylan, & l'Europe n'en manque pas, sur-tout en Hongrie) l'on y distingue des cercles noirs, des zônes tannées ou brunes, ou bleues, & des cercles blancs & placés distinctement : on appelle *onglet*, la partie laiteuse : la couche tannée, exposée entre la lumiere & l'œil, doit paroître rougeâtre ou enfumée. L'on a de la peine à trouver ces pierres bien parfaites, aussi sont-elles cheres quand elles ont un certain volume. Ceux qui travaillent à les

ſcier & polir, choiſiſſent celles dont les taches ſont diſpoſées de maniere à repréſenter, à l'aide de la taille, quelques parties d'animaux: c'eſt ainſi qu'en levant une partie de la premiere couche, on évide la ſeconde, qui eſt blanche ou bleuâtre, & l'on peut travailler ſur trois cordons de différentes couleurs: par ce moyen, dis-je, l'on forme de prétendus yeux pétrifiés d'animaux, que l'on vend aſſez cher au peuple crédule. On en fait communément des cachets & des bagues: il étoit d'uſage chez les Anciens de travailler cette pierre, de façon que le fond étoit d'une couleur, & ce qui étoit gravé, ſoit en creux, ſoit en relief, d'une autre couleur. Les Orientaux font un ſi grand cas de l'onyx, que dans la Chine, où on l'appelle *you*, il n'y a que l'Empereur qui ait droit de la porter: elle eſt nommée la *pierre des pierres* dans l'Ecriture Sainte.

La *memphite* ou *camée* eſt encore une ſorte d'onyx, gravée, mais naturellement compoſée de couches, l'une noire, rouſsâtre ou bleuâtre, ou couleur de chair; & l'autre blanche ou griſe: il arrive que l'on peut quelquefois ſéparer ces couches les unes des autres. Cette ſorte d'onyx eſt très-recherchée des Graveurs en relief, ſur-tout quand elle eſt d'un certain volume. *Voyez l'article* AGATE.

ONOCROTALE ou GRAND GOSIER. *Voyez* PÉLICAN.

ONOURÉ. Oiſeau de marécage qui ſe trouve en Guiane; il a les plumes émaillées de gris & de blanc; ſon bec eſt court & pointu; dès que la nuit eſt venue il fait entendre ces quatre notes, *ut*, *mi*, *ſol*, *ut*. Les Negres en tuent beaucoup; il n'eſt bon qu'à la daube.

ONYCHITES, *unguis lapideus*. *Mercati* donne ce nom à des pierres qui ont une ſorte de reſſemblance à des ongles humains. Il y a apparence que ce ſont des foſſiles, (peut-être des fragmens de palais de poiſſons) qui ont été arrondis par le mouvement des eaux & enſevelis en terre.

OOLITHE. Nom que les Naturaliſtes donnent à de petits corps pierreux arrondis, qui ont un certain rapport avec les *cenchrites*, les *méconites*, la *pierre ovaire*, ou avec les *ſtigmites*, les *hammites*, les *piſolites*, les

orobites, les *phacites*, &c. M. *Schmidt*, Professeur honoraire en antiquité dans l'Université de Basle, qui vient de donner un Mémoire sur les *oolithes*, dit que toutes ces pierres sont d'une nature très-différente; & qu'elles ne se ressemblent qu'en ce qu'elles sont toutes des amas de globules plus ou moins ronds & de toute sorte de grandeur, de couleur & de matiere. Il dit avec raison que ces différens noms ont causé une telle confusion parmi les Naturalistes, qu'il est presque impossible de les entendre. M. *Schmidt* entreprend de fixer dans son Mémoire la véritable nature des oolithes; & il n'accorde ce nom qu'aux œufs pétrifiés des poissons, ou d'autres insectes & animaux ovipares aquatiques. Ainsi les véritables oolithes ne se trouvent, selon lui, que rarement & en petite quantité. (M. *Dannone*, Résident à Basle, conserve dans son cabinet un crabe chargé d'œufs pétrifiés à l'endroit même où ces œufs sortent de l'animal). Les graines des plantes pétrifiées ne sont pas plus communes; & il conclut que tout le reste, sur-tout les amas immenses de corps ronds, qui forment quelquefois des montagnes entieres, ne sont autre chose que des jeux de la Nature presque toujours formés par une terre glaise ou martiale, disposée par couches sous une forme plus ou moins arrondie; mais l'Auteur des Annales Typographiques répond à cette assertion, que le hasard n'est point une cause; & quand il en seroit une, comment imaginer, dit-il, qu'une cause si aveugle eût pu produire des montagnes entieres de corps de même forme déterminée, telles qu'on en trouve près de Neuf-Châtel, dans le Piémont, sur le mont Randen & ailleurs?

Quant à notre sentiment sur les oolithes, il est certain que parmi ces concrétions globuleuses qui ressemblent plus ou moins bien à des œufs de poissons, d'écrevisses marines, &c. il y en a d'argileuses, de martiales, & d'autres qui sont spatheuses, semblables à des débris de coquilles roulées; d'autres sont composées de couches comme les bézoards; enfin d'autres ressemblent beaucoup à des boutons d'étoiles marines. Toutes ces variétés de figures & de couleurs indiquent nécessairement une différence dans la cause comme dans le

produit. *M. Desmarets a lu à l'Académie des Sciences en 1761 plusieurs observations sur ces sortes de corps.*

L'on a donné à ces corps pierreux des noms arbitraires ou analogues aux substances qu'ils représentent: *orobites*, quand ils ont la figure d'orobes; *pisolites*, quand ils imitent des pois; *méconites*, quand ils ont la figure des grains de pavot; *cenchrites*, quand ils sont de la grandeur des grains de millet, &c. Le gluten qui tient ces corps les uns aux autres, n'est pas toujours le même; ce qui fait que la masse totale qui résulte de leur assemblage a plus ou moins de dureté, de consistance & de couleur.

OPALE, *opalus*. Cette pierre précieuse désignée dans *Pline* sous le nom de *pæderos* est d'un bleu laiteux ou de couleur de nacre de perle, presqu'entiérement transparente, ayant la propriété de réfléchir tout à la fois les couleurs de l'iris ou de les changer suivant la différente exposition au jour, sous laquelle on la regarde: on en distingue de plusieurs sortes, qui toutes font feu avec l'acier.

1°. L'OPALE DE COULEUR DE LAIT, *opalus ireos lacteus*. C'est celle que les Joailliers appellent *opale Orientale* ou *opale Arlequine* ou *opale à paillettes*, parce que les lames couleur de gorge de pigeon qui s'y observent, paroissent comme autant de taches de différentes couleurs détachées. *Boëce de Boot*, Auteur du parfait Joaillier, la regarde avec raison comme la plus précieuse des opales, & même comme la pierre la plus merveilleuse que la Nature produise en ce genre: elle est dure, luisante, presque transparente, resplendissante, d'un beau blanc laiteux, d'où sort en chatoyant le feu du rubis, la pourpre de l'améthyste, le jaune de la topaze, le bleu du saphir, le vert de l'émeraude & toutes les autres couleurs les plus brillantes des pierreries. Cet éloge magnifique n'est que la traduction du passage de *Pline* sur l'opale. Cette pierre dont il est fait mention dans l'*Apocalypse*, *chap. 21*, sous le nom de la *plus noble des pierres*, étoit autrefois en si grande estime chez les Romains, que Nonius le Sénateur aima mieux être privé de sa patrie que céder son opale à Antoine qui la lui demanda. Cette pierre

Orientale se trouve dans le Ceylan, où on l'appelle *pierre élémentaire*, *lapis elementarius*. Les Indiens l'estiment autant que le diamant. On ne la taille point en facettes, mais en cabochon.

Il y a une autre sorte d'opale Orientale qui est estimée. On la nomme *opale en flammes*, parce que cette pierre chatoie comme si c'étoient des feux qui s'élançassent par lignes paralleles.

2°. L'OPALE OCCIDENTALE, *opalus occidentalis*, est ou jaunâtre ou noirâtre : la premiere, qui se trouve en Chypre & dans l'Arabie, domine par le jaune au travers duquel on voit quelques couleurs foibles ; celle qui est noirâtre, laisse sortir un éclat d'escarboucle ; l'on diroit d'un charbon noirâtre allumé par un côté : on la trouve en Egypte. Celle qui est verdâtre est peu estimée. Celle qui se trouve dans la mine d'argent de Freyberg en Saxe est assez belle. On nomme *argentine* celle qui est à fond blanc, & à petits points, couleur d'argent : on trouve aussi des opales a Eybenstock en Saxe, en Boheme, & en Hongrie, elles sont de peu de valeur. Les opales sont ordinairement par morceaux détachés, enveloppées dans des pierres d'autre nature, depuis la grosseur d'une tête d'épingle, jusqu'à celle d'une noix. Les opales de cette grosseur sont très rares.

Il est bien singulier que toutes les belles couleurs de l'opale, soient susceptibles de disparoître ou de changer de modifications, quand on la divise en éclats : l'expérience, qui a démontré plus d'une fois ce phénomene, fait croire que tout le jeu éclatant de l'opale est dû à la réfraction des rayons de la lumiere sur cette pierre, disposée naturellement pour produire cette réfraction : peut-être que l'*œil de chat*, l'*œil du monde*, & mieux encore le *girasol* & la *chalcédoine*, ne sont que des especes d'opales : au reste toutes les opales sont les seules pierres que l'art n'a pu contrefaire avec autant de succès que les autres pierreries. On en a cependant apporté une factice d'Egypte qui a trompé l'œil des Joailliers du Levant si experts dans cette connoissance.

OPASSUM, espece de philandre. *Voy.* DIDELPHE.

OPERCULES, *opercula*, ſont les couvercles des coquilles univalves qui ferment leur bouche. *Voyez* l'article OPERCULES *au mot* COQUILLAGE, *vol. II, p. 635 de ce Dictionnaire.* On appelle *operculites* les opercules devenus foſſiles.

OPHIOGLOSSE, ou HERBE SANS COUTURE, ou PETITE SERPENTAIRE, ou LANGUE DE SERPENT, *ophioglossum*, eſt une plante qui croît dans les lieux humides & quelquefois dans les endroits montagneux où il y a des ſources : ſa racine s'enfonce profondément en terre, elle eſt garnie d'un nombre de fibres aſſez groſſes & ramaſſées comme dans l'*hellebore*. Voyez ce *mot*. Elle pouſſe une queue haute comme la main, laquelle ſoutient une ſeule feuille, aſſez ſemblable à une petite feuille de poirée, d'un goût douceâtre & viſqueux. Du milieu de cette feuille, c'eſt-à-dire, du bout de la queue, ſort un fruit qui a la figure d'une petite langue applatie, pointue, dentelée, & partagée en pluſieurs petites cellules qui renferment, au lieu de ſemence, une pouſſiere menue qu'elles laiſſent échapper lorſqu'elles viennent à s'ouvrir dans la maturité.

L'ophiogloſſe, tranſplantée dans les lieux ombrageux des jardins, s'y conſerve & repouſſe tous les ans en Avril : elle reſte en vigueur juſqu'au mois de Juin, enſuite elle ſe fanne entiérement & diſparoît. Cette plante eſt vulnéraire, on en fait une infuſion au ſoleil avec de bonne huile d'olive : alors c'eſt un baume excellent, tant pour l'intérieur, que pour l'extérieur, particuliérement dans les maux de gorge violens.

OPHIOMORPHITE. Divers Auteurs donnent ce nom à la corne d'Ammon, à cauſe de ſes ſpirales qui la font reſſembler à un ſerpent entortillé.

OPHIONOT. *Voyez* MUSIMON.

OPHITE, *ophites*. Eſpece de porphyre à taches de forme carré-long, blanchâtres, diſpoſées ſouvent en forme d'étoile ou en forme de croix, ſur un fond vert foncé. Cette pierre connue des anciens eſt, dit-on, le *memphites* de Pline.

OPHTALMITES, nom donné à certaines pierres qui imitent un œil.

OPIER. *Voyez* OBIER.

OPIUM

OPIUM ou AMPHION DES INDIENS : *voyez* à l'article PAVOT BLANC. L'opium cyrénaïque eſt l'*Aſſa-fœtida*.

OPOBALSAMUM : *voyez* BAUME DE JUDÉE.

OPOCALPASUM ou OPOCARBASUM, ſubſtance gommo-réſineuſe, qui reſſemble beaucoup à la meilleure myrrhe liquide, & que l'on mêloit du temps de Galien avec la myrrhe même : il étoit difficile, ſelon cet Ecrivain, de les diſtinguer l'une de l'autre, ſinon par les effets : c'étoit un ſuc empoiſonné, qui cauſoit l'aſſoupiſſement & l'étranglement ſubit : il dit avoir vu pluſieurs perſonnes mourir pour avoir pris de la myrrhe, dans laquelle il y avoit de l'opocarbaſum ſans qu'elles le ſuſſent : peut-être n'étoit-ce qu'un ſuc compoſé d'une diſſolution d'*euphorbe*, dans laquelle on macéroit les *larmes d'opium*. Les poiſons de cette eſpece ont été de tout temps auſſi en uſage en Afrique, que l'eſt en Amérique celui des fleches empoiſonnées par le ſuc du *mancelinier*. Voyez *ces mots*.

OPOPANAX : *voyez ſon article au mot* GRANDE BERCE.

OPOSSUM ou OPASSUM. Eſpece de *Philandre*. Voyez DIDELPHE.

OPUNTIA, FIGUIER D'INDE, RAQUETTE, NOPAL, ou CARDASSE, *cactus coccinellifer* ; c'eſt une plante originaire d'Amérique & qui ſe fait remarquer, dans les ſerres du jardin du Roi, par ſa forme. Dans ſon pays natal elle devient grande & très belle. On dit communément que les feuilles de cette plante ſortent les unes des autres, mais on pourroit dire, avec plus de juſteſſe, que ce ſont ſes branches : les feuilles ſont proprement ces petits boutons qui paroiſſent toujours aux endroits où les épines croiſſent par la ſuite. Au reſte, puiſque ce que nous appellons des branches, avec *Bradley*, a toujours été regardé comme des feuilles, nous continuerons à leur donner le même nom que tout le monde.

Il y a pluſieurs eſpeces de ces plantes, qui different principalement par la grandeur de leurs feuilles, la couleur de leurs fleurs & de leurs fruits, & par la cou-

leur & la longueur de leurs épines. En général, elles ont toutes les feuilles de figure ovale; il y en a des especes qui les ont de près d'un pied de longueur, & d'autres seulement de deux ou trois pouces: leurs feuilles sont ordinairement garnies de distance en distance de nœuds d'épines; il y en a de si longues, que les Indiens du pays s'en servent au lieu d'épingles; d'autres ont les épines si courtes qu'on les apperçoit à peine. Les petites épines causent des piqûres cuisantes, & quand elles sont entrées dans la peau, elles sont quelquefois plus d'un mois à sortir, si on n'a bien soin de les chercher sur le champ & de les enlever. Une particularité singuliere, c'est que le fruit paroît toujours avant les fleurs sur cette espece de plante, & lorsqu'il semble être bien mûr, la fleur s'épanouit à son extrémité; elle est composée d'environ dix pétales & d'une grappe de petits filets au milieu. Cette fleur s'ouvre toujours à la chaleur du soleil, & se referme à l'approche de la nuit. Les étamines sont douées d'une grande sensibilité; en effet, si l'on touche les filets des étamines, avant qu'elles aient répandu leur poussiere fécondante, qui est composée de molécules ordinairement sphériques, très-petites, jaunâtres & luisantes, ils se couchent tous circulairement les uns sur les autres, pendant que les anteres jettent la poussiere qu'elles contiennent: (un mouvement semblable a été observé par M. *de Jussieu* dans les étamines de l'*hélianthême*. Voyez ce mot.) Quand le fruit est mûr, il a une ressemblance grossiere avec nos figues: *voyez Hist. de la Jamaïque de Hans-Sloane*. Il est ordinairement d'une couleur rouge foncée, & il a cela de particulier, qu'il rend l'urine de celui qui en mange trop, rouge comme du sang, sans cependant qu'il en éprouve la moindre douleur. C'est le suc de ce fruit, qui donne la couleur rouge à la cochenille qui s'en nourrit; aussi cet insecte nous donne-t-il en teinture une des plus belles couleurs. On dit que les Teinturiers Indiens se servent du suc même du fruit pour teindre en rouge.

Les fleurs des opuntia sont jaunes pour l'ordinaire, à l'exception d'une espece qui a des fleurs couleur d'écarlate; mais cette espece est plus tendre, plus difficile à

conſerver, & plus ſujette à pourrir que les autres. Celle-ci eſt le *tuna mitior*, *flore ſanguineo cochenillifera* de *Dillenius*. Les unes ſe plaiſent à ramper ſur la terre, d'autres croiſſent plus droites; mais toutes aiment les endroits pierreux & les rochers. Ces plantes demandent une chaleur proportionnée au climat d'où elles viennent: il y en a une petite eſpece à feuilles rondes, qui vient d'Italie; on peut la laiſſer dehors tout l'hiver; & elle porte du fruit en abondance. Les eſpeces de la Caroline & de la Virginie, peuvent auſſi réſiſter en plein air à l'abri d'une muraille bien expoſée. On les multiplie toutes en plantant des feuilles ſimples à deux pouces de profondeur.

Les Indiens plantent & cultivent autour de leurs habitations ces nopals à fruits rouges, ſur leſquels ils eſperent de faire pluſieurs récoltes dans l'année. Ces prétendues feuilles, comme celles de quantité de plantes graſſes des pays chauds, peuvent reſter long-temps hors de terre, ſans ſe deſſécher, & reprendre étant fichées en terre. L'avantage qu'on en peut tirer pour la nourriture des cochenilles (inſectes précieux qui fourniſſant la plus belle couleur rouge, ſont l'objet d'un très-riche commerce); cet avantage, dis-je, donne lieu à quelques Américains d'y employer des terres inutiles, trop maigres, ou comme épuiſées par d'autres plantations: elles y croiſſent juſqu'à la hauteur de huit pieds, quand on a bien ſoin d'empêcher l'herbe de croître aux environs. *Voyez* COCHENILLE.

OR, *aurum*. Ce métal, le principe de l'aiſance, l'auteur du luxe, l'idole de l'avarice, mobile puiſſant des actions de l'homme; l'or, dis-je, eſt un métal ordinairement jaune, peu dur, peu élaſtique, à peine ſonore, mais très-compacte; il ſurpaſſe tous les autres métaux en flexibilité, en peſanteur, en ductilité, en ténacité & en valeur. L'or n'eſt altéré, ni par l'air, ni par l'eau, ni par le feu des fourneaux. Il tombe au fond du vif argent qui le diſſout, ou plutôt avec lequel il s'amalgame en tout ou en partie; tandis que tous les autres métaux, tant parfaits qu'imparfaits, y ſurnagent juſqu'à ce qu'ils aient été diſſous ou pénétrés par ce menſtrue métallique; il n'y a que ceux qui ne s'amal-

gament point avec le mercure qui y surnagent continuellement.

Nous disons que l'or est le métal le plus malléable ; c'est ce que l'art du Batteur d'or & celui du Tireur d'or démontrent tous les jours : le premier peut multiplier une étendue donnée d'or, cent cinquante-neuf mille quatre-vingt douze fois, au moyen d'un fourreau de parchemin, de la baudruche & du marteau. On lit dans les *Mém. de l'Acad. des Sciences*, *année 1713*, qu'une once de ce métal peut être tirée en un million quatre-vingt-quinze mille pieds de long, c'est à-dire en une ligne de soixante-treize lieues de long, à deux mille cinq cents toises la lieue. Enfin l'idée avantageuse que nous avons de l'or est fondée sur son excellence réelle.

L'or varie par la dureté, la couleur & la pesanteur ; ce qui provient peut-être de ses degrés de pureté : c'est ainsi que l'or d'une guinée est, à volume égal, moins pesant que le louis d'or, celui-ci moins que le ducat dont le pied cube pese vingt-un mille deux cents vingt onces poids de Paris. L'or de Siam est moins cassant que le nôtre, & le son des cordes de clavecin qui en sont faites, est infiniment plus grave. Ce métal montre dans l'endroit de la fracture de petits angles prismatiques ; sa couleur est plus ou moins foncée. L'or d'Europe est plus haut en couleur que celui d'Amérique. Ce dernier est pâle, & l'on prétend que celui de Malacasse (ou Malgache), est tout-à-fait pâle & se fond presqu'aussi promptement que du plomb. L'or s'écrouit sous le marteau ; il entre en fusion un peu plus facilement que le cuivre, & aussi-tôt après avoir rougi : on remarque que lorsqu'il se fond il prend une couleur d'aigue-marine, ou de bleu céladon. Il est de tous les métaux celui qui s'échauffe le plus dans le feu (c'est en raison de sa densité) & qui s'amalgame le plus facilement avec le mercure : on diroit qu'il y a une sympathie entre ces deux métaux. C'est un axiome en Métallurgie, que l'or n'est jamais minéralisé par le soufre ni par l'arsenic ; cependant la seule vapeur d'un grain d'étain suffit pour ôter la propriété malléable à huit onces de ce métal ; mais il la recouvre par la fusion. L'or résiste à tous acides agissans séparément. Il y a deux

grands dissolvans de l'or : l'un est composé de l'acide marin & nitreux, c'est *l'eau régale* ordinaire : l'autre est la combinaison de l'alkali fixe avec le soufre. Ce dernier menstrue ou dissolvant est connu sous le nom de *foie de soufre*. Si l'on en précipite la dissolution faite à l'eau régale nitreuse & ammoniacale, par un alkali fixe ou volatil, on en obtiendra une poudre aurifique, fulminante, qui desséchée détonnera avec soixante-quatre fois autant de force élastique qu'un pareil volume de poudre à canon. On ne peut manier cette poudre avec trop de précaution. Nous le répétons, ses effets sont violens & terribles. La chaleur, le frottement occasionnent son inflammation & son explosion. Il en coûta la vue & presque la vie à un jeune homme de notre connoissance qui, après avoir versé de l'or fulminant dans un flacon, voulut le fermer : un grain pris entre le bouchon & le goulot, s'enflamma par le frottement ; l'explosion fut semblable à un fort coup de fusil. Le flacon se brisa en éclats, le renversa par terre & lui creva les deux yeux.

La vitrification de l'or au foyer d'une des grandes lentilles de *Tschirnhausen*, quoique donnée comme certaine par M. *Humbert*, a été contestée, & est demeurée au nombre de ces faits douteux qui demandent à être vérifiés ; mais Mrs. *Macquer*, *Brisson*, *Lavoisier* & *Cadet* ont fait sur cet objet, ainsi que sur un grand nombre d'autres substances, des expériences très-intéressantes avec cette grande lentille de *Tschirnhausen*, tirée du Cabinet de l'Académie, ainsi qu'avec la petite lentille de *Tschirnhausen*, que leur a confié M. le Comte *de la Tour d'Auvergne* ; elle est ainsi que celle de l'Académie, de trente-trois pouces de diametre, mais son foyer est un peu plus court. Ces Académiciens dont on connoît la sagacité, l'intelligence & le coup d'œil fin de l'observation, après avoir exposé au foyer de ces lentilles un grand nombre de fois de l'or très-fin & très-pur, & l'avoir mis successivement sur des supports de différente nature, tels que des creusets d'argile réfractaire, des tessons de poterie de grès, de porcelaine dure, crue ou cuite, de pierre de grès très-réfractaire & de charbon, & dans presque toutes ces épreuves avoir

obtenu des vitrifications de couleur brune pourprée à la surface de ce métal, n'osent point encore assurer positivement que ces vitrifications soient dues à une portion de la substance même de l'or; en variant ces expériences ils ont eu la satisfaction d'appercevoir & de bien constater plusieurs phénomenes importans dont les Physiciens qui les ont précédés n'ont point fait mention. De ce nombre sont, 1°. un cercle de couleur pourprée sur le support de l'or, qu'ils n'ont jamais manqué d'obtenir, de quelque nature qu'ait été ce support; 2°. une fumée très-sensible sortant certainement de ce métal, de même que de l'argent, & s'élevant quelquefois jusqu'à cinq ou six pouces; 3°. une lame d'argent a été très-bien dorée à cette seule fumée de l'or, de même qu'une lame d'or a été argentée à celle de l'argent; 4°. ils ont observé une rotation rapide de petits globes d'or & d'argent fondus au foyer, qui leur a paru assez constamment dans le sens où elle devoit être, en supposant qu'elle eût pour cause une impulsion de rayons solaires, que ces Messieurs ont déjà soupçonnée, mais qu'ils se proposent de constater par une suite d'observations aussi multipliées & aussi exactes que l'exige l'importance de la matiere. Ces Savans se proposent de suivre ces recherches avec des instrumens bien supérieurs à ceux qu'ils ont employés, & c'est avec une lentille à eau de quatre pieds de diametre, de l'exécution de laquelle M. *Bernieres* s'est chargé. Cet instrument devant surpasser de beaucoup en grandeur, en netteté, & par conséquent en force, tous ceux qui ont été faits jusqu'à présent, semble promettre une Chimie Pyrotechnique nouvelle, & paroît destiné à faire une de ces époques qui deviennent mémorables dans l'Histoire des Sciences.

L'or se trouve dans des mines qui lui sont propres ou particulieres, comme en Asie, à Aracan, & dans le Pégu, au Japon & près de Batavia, dans la Guinée, le Sénégal & le Royaume de Galam en Afrique, & sur-tout à l'endroit que l'on nomme la *côte d'Or*; (M. *de la Chapelle* a observé que l'or de Guinée ne peut se battre en feuilles, ni se tirer par la filiere), à Malacasse en Madagascar, & dans les pays de Bam-

bouc & de Congo. En Europe, on rencontre des mines d'or en Suede, en Norwege, en Sibérie & à Chemnitz en Hongrie. La mine d'or de Siderocaps dans le Jamboli en Europe, eſt fort riche. Dans l'Amérique Méridionale, l'or ſe trouve dans le Bréſil, dans le Mexique, dans le pays de Maricabo, à Sumatra, à Valdivia, à Copiapo & Andacoll, dans le Chili, dans la Province de Quito, & dans le Potoſi au Pérou.

Les galions d'Eſpagne exportent de ces dernieres contrées en Europe pour plus de quinze millions de ducats d'or en barres ou en lingots, par la voie de Cadix. C'eſt, dit un Auteur moderne, pour le malheur de ſes habitans que cette partie de l'Amérique produit une ſi grande quantité d'or. L'inſatiabilité de l'avarice y a fait autrefois commettre ſous un dangereux prétexte tous les actes de cruauté que peuvent inſpirer le fanatiſme & la cupidité. A-t-on eu tort de dire : *Quid non mortalia pectora cogis, auri ſacra fames ?* Quel bien ont produit en effet ces riches mines du Pérou? Il a péri, dit M. *de Buffon*, des millions d'hommes dans les entrailles de la terre pour les exploiter; & leur ſang & leurs travaux n'ont ſervi qu'à nous charger d'un poids incommode.

L'or vierge eſt d'une couleur jaune aurore ; ſa matrice ordinaire eſt le quartz, quelquefois la pierre cornée, ſouvent le fer & l'argent, rarement le cuivre & le plomb ; quelquefois dans de l'argile endurcie, tantôt il eſt en petits points ou en grains, tantôt en feuilles ou en maſſes, ou en rameaux. On reconnoît facilement, que les grains jaunes que l'on voit dans une pierre, ſont de l'or, quand avec la pointe d'un ciſeau on y trace facilement des lignes, ou quand en lui faiſant recevoir la vapeur du mercure, il blanchit; & que jeté dans le feu, il ne ſe détruit point. C'eſt par un procédé ſemblable qu'on a reconnu que la mine de Carthagene au Mexique, dont le métal reſſemble tout-à-fait à une mine de cuivre chatoyante grillée, étoit de l'or. Il n'en eſt pas de même pour l'or qui ſe trouve dans la pyrite que M. *de Juſti* appelle *gelſi* ou *gilſi*. Cette eſpece d'or eſt pâle & ſolide dans cette ſorte de matrice qui minéraliſe les métaux; lorſque l'or eſt allié à l'argent dans la mine ou à d'autres mé-

taux, il eſt déguiſé, ou du moins ſa couleur eſt fortement altérée. Des Minéralogiſtes modernes prétendent que l'or dans l'état de pyrite, a été uni au ſoufre par l'intermede du fer qui ſert comme de lien d'union, entre l'un & l'autre, & que la vitrioliſation qu'éprouve enſuite cette pyrite aurifere donne naiſſance à l'or en cheveux ou en fibres capillaires.

On trouve auſſi de l'or dans la belle eſpece de *lapis lazuli* de Perſe : *voyez ce mot.* Il y a auſſi une mine de cinabre en Hongrie qui contient de l'or, on l'appelle *mine d'or rouge.* Combien de ſables de rivieres ſont auriferes, ſur-tout à l'endroit où elles font angle ! Rien ne reſſemble mieux à des grains de mica. Nous avons pluſieurs rivieres en France qui en contiennent des quantités trop petites pour mériter attention ; tels ſont le Rhin, le Rhône, dans le pays de Gex ; le Doux, en Franche-Comté ; la Ceſe, dans les Cevennes ; le Gardon, près de Montpellier ; la Rigue, près de Pamiers ; l'Arriege, dans le pays de Foix ; la Garonne, près de Toulouſe ; la Salat, dont la ſource eſt dans les Pyrénées ; *voyez à ce ſujet un Mémoire de M. de Réaumur dans les Mém. de l'Acad. des Sciences, ann. 1718, p. 108 & ſuiv. & l'Hiſtoire de l'Acad. des Belles-Lettres, Tome XXI, p. 24*, à l'occaſion du Pactole. On abandonne ces paillettes d'or aux recherches des gens du pays, dont le travail pénible eſt rarement récompenſé par les découvertes qu'ils font. Il y a des rivieres dans la Caramanie & la Siléſie, où l'on trouve des grains d'or gros comme des pois : on en trouve auſſi dans le Tage & le Danube. Il eſt certain qu'en rétrogradant & fouillant avec attention les bords de ces rivieres, au-deſſus du lieu où elles font angle, ou mieux encore en travaillant dans les hautes montagnes où ces rivieres prennent leur ſource, l'on parviendroit à découvrir la miniere ; peut-être que les Souverains feront un jour exécuter ce projet chacun dans leurs Etats. *Pline* parle de l'or dont la mine étoit dans la Gaule, nous ignorons l'emplacement de cette ancienne mine : il eſt probable qu'elle n'a pas été entiérement épuiſée, mais la fureur des guerres, la barbarie & la révolution des temps en ont effacé juſqu'à la trace : il faut eſpérer qu'on la retrouvera un jour.

On nomme *Paillotteurs* ou *Orpailleurs* ceux qui, par le moyen d'une sébille (espece d'écuelle ou de vaisseau profond fait de bois, dont l'intérieur est tout sillonné ou rempli de rainures), prennent & lavent le sable des rivieres, pour en retirer la substance métallique précieuse. *Lémery, Dict. des Drogues, pag. 11*, dit qu'on voit beaucoup de Negres en Afrique, qui ne sont employés qu'à plonger & aller chercher de l'or. On en ramasse aussi de cette maniere une grande quantité dans le Pérou. M. *Frésier* prétend qu'on y trouve souvent dans le fond des rivieres de l'or en masse, du poids de quatre livres, & quelquefois de beaucoup plus considérables; c'est, dit-il, ce qu'on nomme *pépites*.

Lorsque l'or est répandu dans différentes especes de terres ou de sables, il n'a point de figure déterminée: il y en a aussi de différentes couleurs qui sont comme masquées; il est ordinairement semblable à de petites pointes d'épingles. On en trouve cependant une espece, qui est sous la forme de petits grenats bien rouges & transparens: c'est ce qu'on appelle *grenats d'or*; on en trouve aux Monts Crapacks en Hongrie. Il s'en rencontre aussi en Amérique.

Quand on trouve l'or pur, on l'appelle *or natif* ou *or vierge*: il est facile à graver; c'est celui de la premiere espece. L'or qui forme des especes de filons ou veines dans des pierres, ou ferrugineuses, ou schisteuses, ou quartzeuses, est celui de la seconde espece: l'or qui se rencontre dans les glaises rougeâtres & les sables, c'est le lavaderos des Espagnols, & qui est en petites paillettes, n'a besoin que d'une simple lotion pour en être séparé: cet or de lavage est celui de la troisieme espece; on l'appelle *or paléole* ou *poudre d'or*. Enfin l'or qui est en grains, & que des Plongeurs retirent des rivieres, est celui de la quatrieme espece: il s'appelle *or pépite*, c'est le moins bon, il n'est gueres qu'à dix-huit karats.

La méthode usitée pour l'extraction & la purification de ce métal interposé dans les pierres, consiste dans le lavage, le pilage, l'amalgame & l'ignition. S'il y a mélange de métaux, l'on a recours, ou aux dissolvans, ou à la fusion: le procédé en est fondé sur le même

principe, que pour le traitement de la mine d'*argent*. Voyez *ce mot*, & ce qui en eſt dit dans notre *Minéralogie;* mais particuliérement dans le *Dictionnaire de Chimie*.

Ce métal, qui dans la ſociété eſt d'une très grande utilité pour repréſenter la valeur de tout ce qui peut être néceſſaire, utile ou agréable aux hommes, ſert auſſi beaucoup à cauſe de ſon éclat, de ſa beauté, de ſon inaltérabilité, pour quantité d'ornements & de bijoux précieux.

L'or n'eſt donc pas ſeulement un moyen général d'échange entre les peuples, puiſqu'il devient une ſource de chefs-d'œuvres dans les mains induſtrieuſes d'une multitude d'Ouvriers. En effet, ce métal ſe plie facilement à tous les caprices du goût & de la mode. On l'emploie à maſquer tous les autres métaux. Nous avons expoſé ſa grande ductilité, elle le rend propre à cet uſage.

On trouve chez les Batteurs d'or de quatre ſortes d'or en feuilles. Le plus beau ſert aux Damaſquineurs, on l'appelle *or d'épée :* la ſeconde ſorte eſt employée par les Armuriers, on la nomme *or de piſtolet :* la troiſieme ſert pour dorer les livres, on l'appelle *or de Relieur :* la quatrieme enfin ſert aux Peintres, & en Pharmacie, pour envelopper, orner & maſquer le mauvais goût des médicaments, on l'appelle *or d'Apothicaire*. Ses propriétés particulieres en Médecine nous paroiſſent très précaires & fort chimériques, nous dirions volontiers une pure charlatanerie. Qui ne connoît le ſens figuré de cette expreſſion proverbiale, *dorer la pilule*. On eſt parvenu, par l'art de la dorure, à appliquer ce métal ſur une quantité de différentes matieres auxquelles il donne un extérieur de propreté & d'opulence : en le mêlant avec l'étain on en tire une très belle couleur pourpre pour la peinture des émaux & de la porcelaine. *Voyez* le *Dictionnaire des Arts & Métiers*.

Les Doreurs ſe ſervent d'un mélange d'or & d'argent, qu'ils appellent *amalgame d'or & d'argent*, parce qu'il s'étend facilement ſur les ouvrages. On dore ſur les métaux, ou ſur les cuirs, ou ſur le bois, ou ſur

les lambris de pierre. Ceux qui dorent sur le bois commencent par l'enduire de plusieurs couches de blanc, ensuite de jaune, enfin d'une pâte composée de bol & de molybdene, &c. c'est sur cette derniere couche, mouillée avec de l'eau gommée ou collée, qu'on applique la feuille d'or. On doit à feu M. de *Montamy* la maniere de retirer ce métal précieux employé sur le bois : elle consiste à faire subir une simple ébullition au bois doré ; le métal s'en détache avec la colle qui l'assujettissoit ; on évapore l'eau, il reste une matiere qu'on pulvérise & qu'on jette aussi-tôt dans le feu pour brûler la portion de colle, puis l'on procede par la voie de l'amalgame avec le mercure en la maniere usitée.

Les Ouvriers appellent *or trait*, un lingot d'argent doré au feu, & qui a passé par la filiere. L'*or en lame*, qui est presque le même, est un fil applati entre deux rouleaux d'acier poli ; on l'emploie comme l'*or filé* dans la fabrique des étoffes de soie ou de broderie, ou du galon. Une once d'or peut recouvrir & dorer très-exactement un fil d'argent long de 444 lieues ; quelle ductilité ! L'on peut dire que l'art du Tireur d'or & du Batteur d'or, où le commun des hommes ne trouve qu'un objet de commerce, ou des ressources pour le luxe, présente aux yeux d'un Physicien des merveilles qui n'ont point échappé aux observations de *Boyle*, du P. *Mersenne*, de *Rohault*, & notamment de M. *de Réaumur*. Voyez *Mémoires de l'Académie des Sciences*, *1713*, *pag. 205*, *&c.*

Ce que l'on appelle *or en coquille*, sont les battréoles, c'est-à-dire, les rognures de feuilles d'or, qu'on broie & qu'on incorpore avec du miel ; on les met ensuite dans de petites coquilles : cet or ainsi préparé, sert aux Peintres en miniature.

Les Orfevres désignent la pureté de l'or par le mot *karat*. Un karat est la vingt-quatrieme partie du titre de l'or : l'or pur ou fin est nommé *or à vingt-quatre karats*, mais il n'y en a que peu ou point à ce titre. Le karat est un scrupule, le scrupule est vingt-quatre grains ou le tiers d'un gros ; si l'or est allié ou diminue au feu d'un vingt-quatrieme, il n'en restera plus que

vingt-trois parties, & l'on dira *or à vingt-trois karats*. L'*or au titre* est à vingt karats : il n'est employé que pour les bijoux d'or. On détermine aussi le karat d'or par l'épreuve de la *pierre de touche ;* voyez ce mot.

Depuis quelques années le luxe qui rend les Artistes inventifs, leur a fait imaginer des moyens pour donner à l'or différentes nuances par les alliages, ce qui produit des ornemens agréables à l'œil, mais aux dépens de la valeur intrinseque du métal qui est sacrifié à la beauté de l'ouvrage. Il y a de l'*or vert*, qui se fait en alliant beaucoup d'argent avec l'or : l'*or rouge* se fait en l'alliant avec beaucoup de cuivre : l'*or jaune* est l'or pur : l'*or bleu* se fait par le mélange de l'arsenic ou de la limaille d'acier ou par le moyen du gros fil de fer doux amalgamé dans l'or fondu : l'*or blanc* est l'argent pur.

OR BLANC. *Voyez* PLATINE.

OR DE CHAT. *Voyez au mot* MICA.

ORAGE. Nom que l'on donne, tantôt à une tempête de vent sur mer, tantôt à un ouragan sur terre, l'un & l'autre accompagnés d'une grosse pluie souvent mêlée de giboulées, de grêle, & ordinairement précédée d'un changement de vent, ou d'un calme dans l'air, ou d'une grande chaleur, ou d'un temps fort chargé. Alors on voit des éclairs, des arcs-en-ciel, & l'on entend souvent gronder le tonnerre : les nuages sont fortement agités ; ils se rapprochent, se condensent, & dans l'instant ils se convertissent en grosses gouttes d'eau qui tombent avec vîtesse. Il est rare qu'un orage, accompagné d'éclairs & de tonnerres, continue quelque temps sans qu'il survienne une grosse pluie. Lorsque ces sortes d'ondées viennent à tomber, elles emportent ordinairement avec elles beaucoup de cette matiere qui produit la foudre ; ce qui fait que l'orage cesse beaucoup plutôt lorsqu'il pleut que lorsqu'il fait un temps sec. Ce phénomene n'est jamais universel : il suit le courant d'un vent impétueux, qui siffle & tourbillonne ; aussi ne se fait-il souvent remarquer que dans une petite étendue de quelques contrées, mais il n'y répand pas moins l'épouvante, la désolation & l'horreur. C'est dans des instans sem-

blables que des campagnes fleuries se convertissent en des déserts d'un aspect affreux.

Les orages les plus considérables & les plus effrayans qu'on ait essuyés en Europe, sont celui des environs de Londres en 1723, celui des environs de Ratisbonne le 22 Mai 1720, celui de Leicester en Angleterre le 22 Juin 1724, celui de Hambourg le premier Juillet 1717, celui de Francfort sur le Mein le 25 Juillet 1723, celui de Nimegue en Hollande le 25 Juillet 1725, celui de Crême en Italie le 30 Août 1720, celui de Boulogne en Picardie en 1722. La Suisse est sujette à être affligée & ravagée par les orages: les habitans se souviendront long-temps de celui qui consterna Zurich en 1449, de celui de Rothembourg en 1597, qui fit disparoître toute la moisson; le furieux orage de grêle qui épouvanta tant les Citoyens de Vienne en 1689, fut aussi des plus considérables. L'orage nocturne de Trieste en 1719, fut encore plus terrible: avant que ce météore commençât, on vit courir dans l'air une grande quantité de flammes semblables à des feux follets: on entendit soudain un grand fracas de tonnerre, qui, accompagné d'éclairs & de grêle, fit trembler toute la Nature dans cette contrée, où l'on trouva des maisons criblées de trous, & des arbres déracinés, cassés, brûlés par la chute d'une grêle prodigieuse & du tonnerre.

Le 24 Juillet 1771, sur les deux heures après midi, le Ciel s'étant extraordinairement obscurci à Grenoble, il tomba pendant quelques minutes une pluie très-abondante, laquelle fut suivie d'un orage de grêle qui dura un peu plus long-temps. Les moindres grains étoient du volume des plus grosses noisettes, & quelques-uns étoient gros comme des œufs de poule; toutes les vitres exposées au midi & au couchant furent entiérement fracassées, & une heure après les rues étoient encore couvertes de grêle de la hauteur d'un pied: les blés & les chanvres des environs de cette ville furent coupés & hachés, & tous les arbres furent dépouillés de leurs fruits. Le désastre a été encore plus terrible à Plombieres en Lorraine: sur les dix heures du soir les eaux monterent en un quart-d'heure jus-

qu'à dix pieds dans les maisons & en firent écrouler dix-sept ; les bains furent comblés de décombres & de débris, plusieurs personnes périrent. Le même orage se fit sentir en même temps dans toute la Province : la Meuse, la Moselle, la Meurte, la Nied, la Seille, la Sarre & les autres rivieres qui y coulent, déborderent, ainsi que tous les ruisseaux qui y affluent : partout les eaux monterent en moins de six heures aussi haut qu'en 1740. Les dégâts que cette inondation générale & subite causa, furent considérables : ce fut particuliérement dans les Vosges qu'on en ressentit les plus terribles effets. L'orage de pluie qu'on a éprouvé à Aix & aux environs de cette ville, le 15 Septembre 1771, a été aussi des plus considérables, & a causé beaucoup de ravage.

En 1773 le 18 Août, il tomba pendant toute la journée une pluie prodigieuse à Moncontour en Basse-Bretagne ; le vent étoit Sud-Est, le barometre à 27 pouces 4 lignes, la chaleur médiocre, & l'air extrêmement lourd. L'après midi on entendit le tonnerre gronder, le thermometre varia de 13 à 16 degrés, sur le soir il se fixa à 14 ; alors la pluie augmenta considérablement, & vers minuit elle devint si grosse, qu'elle sembloit tomber en masse. Le vent, disons l'ouragan, ayant tourné au Nord-Est, il s'éleva une tempête affreuse ; le tonnerre gronda sans interruption, l'air étoit tout en feu, & les eaux s'accrurent excessivement. Qu'on se représente un volume immense d'eau se précipitant par une chute rapide entre deux montagnes dans une gorge étroite, couverte de gros quartiers de pierre, roulant avec un fracas horrible ces lourdes masses, entraînant tout ce qui s'oppose à son passage, haies, murs, chaussées, ponts, ravageant & couvrant de pierres, de sable & de limon les vergers, les prairies, &c. après un cours de plus de 800 toises, ce torrent rassemblant toute sa violence, brisant les portes de la ville, inondant les maisons ou les ébranlant, les renversant de fond en comble, noyant les habitans, les bestiaux, détruisant ou bouleversant les moulins ; déposant çà & là dans les vallées les meubles, les débris & les cadavres ; arrachant les

moiſſons, interrompant les communications, & l'on n'aura qu'une image imparfaite de cet épouvantable & funeſte ſpectacle. Le même orage n'a pas moins produit de ravages dans les environs, ſur-tout à St. Brieux, à Guingamp, &c. ſur la grande route de Breſt. La ville de Chatelaudren a preſque été entiérement ſubmergée en un moment; la digue de l'étang de la mine, ſitué à 1200 toiſes au-deſſus de celui de la ville, ayant été renverſée, les eaux ſe précipiterent dans la ville, où elles s'éleverent à plus de dix pieds, & obligerent les habitans dont les édifices inondés réſiſtoient encore à l'effort des eaux, à monter dans leurs greniers, ſans pouvoir être ſecourus; dans cette affreuſe ſituation ils attendoient la mort qui leur étoit inévitable.

Voici la deſcription de l'orage du Bas-Maine faite & obſervée par M. *Buon*, Prêtre & Précepteur du jeune Marquis de *Dreux :* L'orage du 4 Août dernier (1774) a commencé ſur les quatre heures du ſoir. Il avoit été précédé quelques jours auparavant d'une grande chaleur avec des éclairs au Nord-Oueſt; mais ce jour-là la chaleur fut étouffante, & le thermometre de M. *de Réaumur* étoit à vingt-quatre degrés au-deſſus de la congélation. Le tonnerre après avoir grondé ſourdement depuis midi, éclata enfin par des exploſions qui furent le prélude du fléau terrible qui a déſolé ce canton, & ceux qu'il a rencontrés dans ſa marche. Un nuage épais & ſombre venant de la partie du Nord-Oueſt, intercepta la lumiere au point qu'on auroit eu peine à voir lire; il s'éleva un vent impétueux qui ſuivit conſtamment la même direction de l'orage. Bientôt après l'on entendit les ſifflemens de la grêle qui déjà faiſoit au loin un épouvantable fracas, & qui ſans être mêlée de pluie ne diſcontinua point de tomber pendant près d'une demi-heure. La premiere & la plus volumineuſe peſoit depuis une livre juſqu'à deux & trois; il y a même des Curés voiſins qui ont aſſuré en avoir trouvé de beaucoup plus peſante. La plus groſſe, comme la plus menue, étoit de différentes configurations; on voyoit des grains ronds & armés de pointes à-peu-près comme certaines noix de galle, d'autres carrés ou triangulaires, ou alongés & terminés en angles, &

de diverſes autres figures ; & elle étoit ſi dure & ſi compacte que notre Obſervateur en a trouvé trois ſemaines après dans des endroits ſombres pluſieurs grains gros comme des œufs ordinaires.

Dans la largeur à-peu-près de cinq quarts de lieue où la grêle a donné, la dévaſtation a été générale dans la campagne : les maiſons totalement découvertes, particuliérement du côté oppoſé à l'orage, les grains enterrés, les pailles en plus mauvais état que ſi elles euſſent été foulées par vingt mille hommes de cavalerie, les arbres hachés à leurs cimes, pelés en pluſieurs endroits à leurs troncs, & dépouillés de leurs feuilles & de leurs fruits, offroient aux yeux des malheureux habitans du Bas-Maine un ſpectacle tel qu'au mois de Décembre, mais mille fois plus déſolant pour eux. Les hommes & les animaux domeſtiques éloignés de leurs habitations ont beaucoup ſouffert, & des Laboureurs qui conduiſoient leurs voitures chargées de gerbes, ne pouvant dételer leurs beſtiaux devenus furieux, les ont laiſſés aller à leur gré pour ſe mettre eux-mêmes à couvert. Le gibier a été preſque tout détruit, ſans même en excepter les renards, qui malgré leurs ruſes & leurs fourrures n'ont pu ſoutenir un ſi terrible choc.

Auſſi-tôt après la tempête une partie de la grêle étant déjà fondue, il s'eſt élevé un brouillard épais d'une odeur beaucoup plus forte & plus infecte que celle qui frappe ordinairement l'odorat dans les temps orageux.

Vers le commencement de Septembre M. l'Abbé *Buon* a été témoin d'un autre phénomene plus étonnant encore que les précédens. La ſeve du mois d'Août, dont la circulation étoit alors dans toute ſon activité, ne trouvant plus rien dans les arbres capable de l'épuiſer, a agi fortement ſur les boutons qui, ſuivant l'ordre naturel, ne devoient ſe développer qu'au printems ſuivant, & bientôt après l'on a vu naître de nouvelles feuilles & des fleurs auxquelles ont ſuccédé des fruits qui, parvenus à la groſſeur des noix, ſont tombés aux premieres gelées.

A considérer les phénomenes qui précedent, qui accompagnent & qui suivent un orage, j'aurois bien des détails à proposer au lecteur : mais la cause des orages tenant au système des autres météores, tels que les *vents*, les *tourbillons*, le *tonnerre*, les *éclairs*, la *grosse pluie*, les *ouragans*, la *grêle*, les *nuées*, &c. (voyez *ces mots*), une observation importante est que l'air est autant agité avant un orage qu'il est ordinairement calme après. Il y a plus, ceux qui se trouvent sous l'orage ne sentent que peu ou point de vent.

ORANGER, *aurantium*. L'oranger est un arbre des plus beaux, par la blancheur & l'odeur suave de ses fleurs, par ses feuilles d'un beau vert, & dont il n'est jamais dépouillé, par ses fruits couleur d'or, *malus aurantia*, & sur-tout par le spectacle agréable qu'il réunit en même-temps, de boutons, de fleurs épanouies, & de fruits. Quoique cet arbre ne paroisse naturel qu'aux Provinces Méridionales de la France, il fait l'ornement de nos plus beaux jardins, parce-qu'on l'éleve en caisse, & qu'on le garantit, dans les serres, des rigueurs de l'hiver. Louis XIV étoit si grand admirateur de cet arbre, qu'il avoit toujours des orangers en fleurs, même pendant l'hiver, dans une galerie de son Palais, où ils étoient placés sur des piédestaux dans des caisses gravées & argentées. Pour parvenir à lui procurer ce délicieux spectacle pendant tout l'hiver, les Jardiniers choisissoient un nombre d'arbres suffisant, cessoient de les arroser jusqu'à ce que les feuilles tombassent, & ayant mis ensuite de la terre nouvelle sur la surface de leurs caisses, ils les arrosoient souvent dans un réduit garni de vitrages, d'où ils ne sortoient que chargés de fleurs & de feuilles nouvelles.

Parmi les vingt especes d'orangers connues (*l'orange aigre* ou *bigarade avec ou sans feuilles panachées ; l'orange douce ; l'oranger à feuilles coquillées ; l'oranger à fleurs panachées ; l'orange cornue ; l'oranger hermaphrodite*, dont le fruit participe de l'orange & du citron ; *l'oranger de Turquie ; l'oranger tortu ;* le *Pampelmouse ;* la *grosse orange ; l'orange étoilée ; l'orange à écorce double ; l'oranger à fleur double ; l'oranger de la Chine ; l'o-*

ranger nain à fruit aigre; le même à feuilles & fruit panachés, &c.) il y en a deux principales, dont le fruit est en usage parmi nous; savoir, l'*oranger à fruit aigre; amer* ou *bigaradier*, & l'*oranger à fruit doux*. Il n'y a aucune différence pour le port, les feuilles & les fleurs de ces deux sortes d'orangers. La description que nous allons en donner, conviendra donc aux deux, si ce n'est pour les fruits qui ont des différences bien sensibles.

L'oranger devient d'une hauteur médiocre; ses racines sont jaunes & s'étendent beaucoup: le bois du tronc est dur, compacte, blanc vers le cœur, odorant: ses feuilles sont toujours vertes, épaisses, lisses, portées sur des queues feuillées, & qui représentent la figure d'un cœur, remplies d'une infinité de petites cellules huileuses, transparentes, qui paroissent autant de petits trous, de même que dans le mille-pertuis. Ses fleurs sont en rose, odorantes, composées de cinq pétales blancs, disposés en rond. Dans le bigaradier le pistil se change en un fruit presque sphérique. Avant d'être mûr, il est de couleur verte, amer, âcre & piquant à la langue; lorsqu'il est mûr, on exprime des cellules intérieures du fruit un suc acide. Les bigarades sont d'un jaune pâle: au lieu que les oranges douces sont d'une couleur vive de safran; leur jus est doux & agréable.

Ces arbres sont originaires de la Chine, d'où les Portugais ont apporté les premieres graines. On voit encore à Lisbonne, dans le jardin du Comte de Saint-Laurent, le premier arbre d'où sont sortis tous les orangers qui font l'ornement de nos jardins d'Europe. Les orangers se sont comme naturalisés dans nos Provinces Méridionales, dans les îles d'Hyeres & en Provence, où ils forment des forêts agréables par leur verdure qui ne change point, & par les fruits dont ils sont toujours chargés. Les feuilles, les fleurs, l'écorce, la moëlle & la graine des orangers sont d'usage. Cet arbre nous charme trop par sa beauté, pour que nous ne disions pas quelque chose sur sa culture. M. *de la Quintinie* a donné un Traité sur cet objet.

L'oranger doux est préférable, tant pour la beauté

de ſes feuilles, que pour la bonté de ſon fruit. L'oranger de la Chine ne fait jamais un bel arbre ; car il a toujours l'air malade, & ſon fruit mûrit rarement. L'oranger de Genes, à feuilles de pluſieurs couleurs, mérite d'être placé dans un jardin, comme une rareté, à cauſe de la beauté de ſes feuilles. L'oranger nain eſt très agréable par ſes petites feuilles & la quantité de fleurs dont il ſe couvre.

On peut élever des orangers par le moyen de quelques jeunes orangers qui nous viennent de Provence ou de Genes, ou en ſemant des pepins de bigarade dans une terre préparée : on les greffe enſuite. On prétend que la petite eſpece de citron doit être préférée pour y greffer les eſpeces qu'on déſire. Une caiſſe de douze ou quinze pouces leur ſuffit juſqu'à l'âge de ſept ou huit ans ; alors on les tranſplante dans la derniere caiſſe, qui doit avoir vingt ou vingt-quatre pouces de large. Une bonne terre pour les orangers, eſt un mélange d'un tiers de terreau de brebis, repoſé depuis deux ans, d'un tiers de terreau de vieille couche, & d'un tiers de terre graſſe de marais. En taillant l'oranger, on cherche à lui donner une belle forme. Lorſque par maladie un oranger jaunit, on lui donne une nouvelle terre, ou bien on taille toutes les racines gâtées, & on ne les expoſe au ſoleil que pendant deux ou trois heures. S'il eſt attaqué par les gallinſectes qui le ſucent, on doit frotter l'arbre avec du vinaigre. Il faut ſur-tout défendre les orangers du froid & du vent. Le fumier à contre-temps leur eſt également pernicieux : on n'en doit jamais mettre de celui de vaches ni de pourceaux ; tous les autres doivent être bien conſommés & mis avec prudence. Quoique ces arbres aiment l'ombre, ils périſſent bientôt lorſqu'on leur donne trop d'humidité ; le fumier de brebis ou de chevre, trempé dans l'eau dont on arroſe les orangers, les rend ſains & vigoureux. L'effet que produiſent les arroſemens fréquens & trop abondans ſur ces arbres, eſt de faire jaunir, & ſouvent tomber les feuilles ; ils languiſſent un an ou deux ſans pouſſer aucune tige, & à la fin ils meurent entiérement. On doit ſerrer les orangers depuis le milieu d'Octobre juſqu'au retour de

la belle saison. Il y a dans le *Journal Economique pour le mois de Juillet, année 1757*, un *Mémoire sur la culture des orangers*, où l'on démontre qu'on doit préférer de les mettre dans de grands vases de terre, plutôt que dans des caisses, à l'exemple des Génois, parce que ces pots s'échauffent plus aisément, se refroidissent moins vite, & conservent mieux tous les sels de la terre que les caisses.

Depuis quelque temps on se sert avec succès des feuilles d'oranger dans les convulsions, les affections vaporeuses & l'épilepsie. On en fait usage en poudre au poids d'un scrupule qu'on délaye dans une tasse de chocolat. Des personnes ne se servent que de la décoction des feuilles, & y joignent du vin & du sucre. C'est encore un spécifique contre la colique des Peintres. La décoction doit se faire dans un vase fermé. On présume que ce remede est efficace dans toutes les maladies du genre nerveux.

Les fleurs d'orange, à cause de leur odeur agréable qui est préférée à celle des roses, de l'ambre & du musc, sont fort en usage parmi nous, soit dans les parfums, soit dans les assaisonnemens. On en tire, par la distillation, une eau qui est céphalique, stomachique, hystérique, & une huile essentielle, qui porte le nom de *néroly*; c'est un excellent parfum. L'eau de fleurs d'orange est aussi très-efficace contre les vers, & contre la toux qu'elle calme; & selon M. *Bourgeois*, elle facilite l'expectoration; mais elle ne convient pas à toutes les femmes, contre les vapeurs; il y en a un grand nombre auxquelles elle est fort contraire. L'*essence de Portugal* se fait avec l'écorce d'orange; il suffit d'exprimer cette écorce pour l'obtenir. On fait avec ces fleurs des conserves différentes, soit solides, soit molles; des tablettes qui sont très-agréables au goût & que l'on sert au dessert, ou que l'on mêle dans les médicamens pour corriger leur goût désagréable, & pour fortifier l'estomac. On fait aussi avec ces fleurs, un sirop & un ratafia délicieux. On confit les écorces de ce fruit. Tout le monde sait combien la pulpe d'orange douce est agréable. On prétend que si l'on mange une orange douce toute entiere avec l'écorce, avant

l'accès de la fievre intermittente, & sur-tout de la fievre tierce, elle arrête souvent l'accès, & guérit quelquefois la fievre. Enfin, avec le suc exprimé d'oranges aigres, délayé dans l'eau & adouci avec le sucre, l'on fait une boisson, que l'on appelle communément *orangeat* ou *orangeade*; c'est un bon rafraîchissant. Quand on veut que cette boisson soit bien aromatisée & plus gracieuse on y joint un peu *d'éléosaccharum* préparé sur le champ, en frottant un petit morceau de sucre contre l'écorce de la même orange; c'est le moyen d'unir le parfum de l'écorce à la saveur du suc. L'orange amere n'est employée parmi nos alimens qu'à titre d'assaisonnement; on arrose de son suc la plupart des volailles & gibiers rôtis, à dessein d'en faciliter la digestion; son écorce râpée est bonne pour corriger la fadeur, l'inertie des poissons gras mangés en ragoûts, comme l'anguille, &c. Cette même écorce est stomachique, fébrifuge & vermifuge; mais c'est surtout, dit M. *Bourgeois*, un bon remede contre les pertes des femmes, & le flux trop abondant de leurs regles: on la donne seche en poudre à la dose de trente à quarante grains, & on fait une décoction de l'écorce verte, en faisant cuire l'écorce de six oranges avec quatre livres d'eau, pendant une demi-heure: on en donne un verre trois ou quatre fois le jour.

ORANG-OUTANG. Nom que l'on donne aux Indes Orientales, à *l'homme sauvage* ou *des bois*, espece de grand *singe*, connu aussi sous le nom de *barris*. C'est le véritable genre de singe, qui se rapproche le plus de l'homme par la figure; il marche comme lui debout; on doit distinguer deux especes d'orang-outang; la grande espece, qui est le *barris* ou *drill* des Anglois ou le *pongo* de Guinée, & la petite espece qui est le *jocho*. Ce genre de singes differe de l'homme à l'extérieur par le nez, qui n'est pas proéminent, par le front qui est trop court, par le menton qui n'est pas relevé à la base; ses oreilles proportionnellement sont trop grandes, ses yeux trop voisins les uns des autres, l'intervalle entre le nez & la bouche trop étendu; ce sont-là les seules différences de la face de l'orang-outang avec le visage de l'homme. Le corps & les mem-

bres different en ce que les cuisses sont relativement trop courtes, les bras trop longs, les pouces trop petits, la paume des mains trop longue & trop serrée, les pieds plutôt faits comme des mains que comme des pieds humains; les parties de la génération du mâle ne sont différentes de celles de l'homme, qu'en ce qu'il n'y a point de frein au prépuce; les parties de la femelle sont à l'extérieur fort semblables à celles de la femme: à l'intérieur cette espece differe de l'espece humaine par le nombre des côtes; l'homme n'en a que douze, l'orang-outang en a constamment treize; il a aussi les vertebres du cou plus courtes, les os du bassin plus serrés, les hanches plus plates, les orbites des yeux plus enfoncés; il n'y a point d'apophyse épineuse à la vertebre du cou, les reins sont plus ronds que ceux de l'homme, & les ureteres ont une forme différente, aussi bien que la vessie & la vésicule du fiel, qui sont plus étroites & plus longues que dans l'homme; toutes les autres parties du corps, de la tête & des membres, tant extérieures qu'intérieures, sont si parfaitement semblables à celles de l'homme, qu'on ne peut les comparer sans admiration, dit M. *de Buffon*, & sans être étonné que d'une conformation si pareille, & d'une organisation qui est absolument la même, il n'en résulte pas les mêmes effets; par exemple la langue & tous les organes de la voix sont les mêmes que dans l'homme, & cependant l'orang-outang ne parle pas; le cerveau est absolument de la même forme & de la même proportion, & il ne pense pas: y a-t-il une preuve plus évidente, que la matiere seule, quoique parfaitement organisée, ne peut produire ni la pensée, ni la parole qui en est le signe, à moins qu'elle ne soit animée par un principe supérieur? L'orang-outang n'a point de poches au dedans des joues, point de queue, point de callosité sur les fesses; il les a renflées & charnues; il a toutes les dents & même les canines semblables à celles de l'homme; il a la face plate, nue & basanée; les oreilles, les mains, les pieds, la poitrine, le ventre aussi nus; il a des poils sur la tête qui descendent en forme de cheveux des deux côtés des tempes, du poil sur le dos & sur les

lombes, mais en petite quantité; il a cinq ou six pieds de hauteur & marche toujours droit sur ses pieds. *Voyez maintenant l'article* HOMME DES BOIS.

ORBAINE. *Voyez* ARBENNE.

ORBIS. Nom que les Voyageurs donnent au *poisson rond*, & quelquefois à la *lune poisson*. Voyez ces mots.

ORCA est le cétacée que les Anglois appellent *witlepoole*, & les Naturalistes *épaulard*. Voyez à la suite du mot BALEINE.

ORCANETTE, *anchusa puniceis floribus aut buglossum radice rubra*, est une espece de buglose, qui croit dans le Languedoc & dans la Provence aux lieux sablonneux. Sa racine est grosse comme le pouce, rouge en son écorce, blanchâtre en sa partie ligneuse: elle pousse plusieurs tiges, hautes de huit pouces ou environ, se courbant vers la terre. Ses feuilles sont semblables à celles de la buglose sauvage, longues, garnies de poils rudes; ses fleurs sont en entonnoir, à pavillon découpé, de couleur violette: il succede à chacune quatre semences grisâtres, qui ressemblent à une tête de vipere.

On fait sécher la racine d'orcanette au soleil, & on l'envoie aux Droguistes qui la débitent: on choisit celle qui est nouvellement séchée, un peu flexible, de couleur rouge foncée extérieurement, rendant une belle couleur vermeille quand on en frotte l'ongle. C'étoit le fard des Anciens. On s'en sert en Pharmacie pour donner une teinture rouge aux médicamens qu'on veut déguiser, à l'onguent rosat, à des pommades, à de la cire, à de l'huile, étant infusée dedans. Des Cuisiniers habiles s'en servent aussi pour imiter la sauce ou *beurre d'écrevisses*. Il n'y a que son écorce qui colore: l'intérieur n'est point colorant. Cette racine est astringente; prise en décoction, elle arrête le cours de ventre.

On nous apporte quelquefois du Levant une espece d'orcanette, appelée *orcanette de Constantinople*; c'est une racine presque aussi longue & grosse que le bras, mais d'une figure particuliere; car elle paroit, dit *Lémery*, un amas de grandes feuilles entortillées comme le tabac à l'andouille, de couleurs différentes, dont les principales sont un rouge obscur, & un très-beau

violet ; il paroît au haut de cette racine une sorte de moisissure blanche & bleuâtre. Dans le milieu l'on trouve une petite écorce mince, roulée, d'un beau rouge en dehors & blanche en dedans. Quoique cette racine paroisse artificielle, elle rend une teinture encore plus belle que la nôtre, mais moins durable.

Comme la teinture de l'orcanette ne consiste que dans le rouge dont sa superficie est couverte, *Pomet* conseille avec raison de préférer celle qui est menue à une plus grosse ; c'est aussi celle qu'emploient les Teinturiers : on la tire de Marseille & de Nimes.

ORCHIS, *orchys*. Nom donné à une famille de plantes qui approche beaucoup de celles des *gingembres* : voyez ce mot. Leurs racines sont des especes de tubercules charnus ; leurs feuilles sont marquées de nervures longitudinales assez grossieres ; leurs fleurs sont en épi ou en pannicule, au sommet des tiges ; (M. *Haller* dit qu'elles ont trois pétales extérieurs, nés du haut du germe, deux pétales intérieurs, les uns & les autres simples & uniformes, & un sixieme pétale dont la figure varie à l'infini : les étamines naissent souvent d'une colonne, qui s'éleve du centre de la fleur & qu'on prend pour la trompe, quoiqu'elle n'en ait pas la structure, & qu'une rainure gluante paroisse être le véritable chemin du sperme mâle :) leur fruit est une capsule, à une loge & trois battans : les graines sont en très-grand nombre & fort menues ; les racines sont douées d'une grande âcreté, qu'elles perdent par l'exsiccation, ou bien en les échaudant dans l'eau. On range parmi les *orchis* les especes du *satyrion*, de la *vanille*, *&c.* Voyez ces mots.

OREILLE, *auricula*. Organe de l'ouie : nous en avons parlé à l'article *Homme*. La structure de l'oreille est très-diversifiée dans les animaux. Si nous n'avons pas encore eu occasion de reconnoître cet organe dans les insectes, nous n'en dirons pas de même à l'égard des oiseaux, des quadrupedes, des gros poissons, &c. les uns l'ont large, droite & ouverte ; d'autres cachée bien avant dans le derriere de la tête. Tous les quadrupedes ont l'oreille très-saillante : cette analogie ne se retrouve pas dans les oiseaux & les poissons.

Les taupes qui ſont enterrées toute leur vie, n'ont point le conduit de l'oreille ouvert à l'ordinaire; car pour empêcher la terre d'y entrer, elles l'ont fermé par la peau qui leur couvre la tête, & qui ſe peut ouvrir ou ſe fermer en ſe dilatant ou en s'étréciſſant. Pluſieurs animaux ont ce trou abſolument bouché, comme la tortue, le caméléon, & la plupart des poiſſons: il y a une eſpece de baleine qui ne l'a pas fermé, mais elle a cette ouverture ſur les épaules ou placée derriere l'œil: c'eſt un conduit couvert d'un épiderme, & au fond duquel eſt un os en forme de coquille. L'adreſſe du Pêcheur conſiſte à enfoncer le harpon dans cet endroit foible & ſenſible. C'eſt cet os qui eſt improprement connu dans les Apothicaireries ſous le nom de *pierres de tiburon*. Preſque tous les quadrupedes ont ce trou ouvert par des oreilles mobiles & plus ou moins longues, qu'ils levent & tournent du côté d'où vient le bruit. Les lions, les tigres, les léopards ont les oreilles courtes; l'homme, le ſinge, le porc-épic les ont aplaties contre la tête; le veau marin, les lézards, les ſerpens n'ont point du tout d'oreilles externes: les oiſeaux ont le trou auditif couvert ſeulement de plumes; il s'en trouve cependant parmi ces bipedes qui l'ont découvert, comme l'outarde, le caſoar, le coq-d'Inde, la pintade.

OREILLE D'ANE. *Voyez* CONSOUDE GRANDE.

OREILLE DE COCHON ou CRÊTE DE COQ. Les Curieux donnent ces noms à une coquille bivalve du genre des huîtres. Sa couleur eſt d'un brun violet; ſes deux valves ſont ornées du côté de l'ouverture, de replis anguleux qui s'emboîtent très-exactement les uns dans les autres. *Voyez* CRÊTE DE COQ. On donne auſſi le nom d'*oreille de cochon* à un murex ailé; *voyez* MUREX.

OREILLE D'HOMME. *Voyez* CABARET.

OREILLE DE JUDAS. *Voyez au mot* CHAMPIGNON.

OREILLE DE LIEVRE. *Voyez* PERCE-FEUILLE VIVACE *au mot* PERCE-FEUILLE.

OREILLE DE MER ou ORMIER, *haliotis*, eſt un coquillage univalve, fait en baſſin ovale, con-

tourné, dont les spires sont aplaties & fort larges, & la bouche extrêmement grande & évasée. Ce coquillage se trouve sur les côtes de la Bretagne, dans plusieurs autres parages de nos mers, & très-communément dans l'Inde, &c.

Il est très-fortement attaché aux rochers à fleur d'eau, & l'on a beaucoup de peine à l'en détacher, ainsi que le lépas. L'ormier a une sorte de ressemblance avec l'oreille d'homme. M. *d'Argenville* dit que l'animal meurt dès qu'il est détaché du rocher: sa chair est jaunâtre, & l'on en mange. Cet Auteur dit aussi qu'il vide ses excrémens par les trous qui sont sur la superficie de sa coquille. A mesure que l'animal grandit, il fait un nouveau trou à sa coquille, & en ferme un autre: on voit de ces coquilles qui ont deux trous, d'autres en ont communément six, sept ou huit. Ces trous sont disposés près de la levre gauche ou bourrelet sur une ligne courbe, cependant parallele à la longueur de la coquille. Les trous qui ont été bouchés, paroissent toujours sous la forme de mamelons. M. *Adanson* dit en avoir compté jusqu'à cinquante. Lorsque l'oreille de mer est en marche, son pied déborde beaucoup l'étendue de la coquille, qui est revêtue en son sommet de quelques spires, dont une seule est très-apparente: sa couleur est assez variée; il y en a d'un cendré noir, de vertes, de tachetées de vert & de brun & d'une forme longue, de rougeâtres, avec une très-belle nacre en dedans, dont la couleur passe alternativement du blanc au vert, du vert au violet mêlé de pourpre, en un mot, toutes les différentes couleurs de l'arc-en-ciel, suivant les différens aspects sous lesquels on la regarde. La surface extérieure de la coquille est coupée par un nombre infini de sillons creusés légérement dans les unes, profondément dans les autres, ce qui forme des stries tantôt longitudinales en vive-arête, tantôt transversales, onduleuses & rabattues toutes d'un même côté en forme de feuilles roulées, & qui vont, en prenant la courbure d'un demi-cercle, se répandre sur toutes les parties du bord droit de la coquille, où ils se perdent. Les spires qui paroissent en relief en dehors, sont en

creux en dedans. Ces coquilles ont communément trois pouces de longueur, deux pouces de largeur, & environ un pouce de profondeur. La levre droite eſt courbée en arc, mince dans les jeunes, épaiſſe dans les vieilles. La levre gauche au contraire eſt épaiſſe, repliée comme un large bourrelet au dedans de la coquille, & nacrée comme elle : on trouve auſſi de ces coquilles plus alongées, d'autrefois plus courtes qu'ovales. Le nombre des ſillons, comme des trous, augmente avec l'âge ; on compte quelquefois dans les grandes & vieilles oreilles de mer neuf trous ouverts, & cent cinquante-quatre ſillons ; tandis que les jeunes n'ont ſouvent que trois ou quatre trous & cinquante ſillons. Il y a auſſi des oreilles de mer ſans trous, on les nomme *oreilles de vénus*. Les vieilles d'entre toutes ces ſortes de coquilles ſont preſque toujours couvertes d'un limon gras & verdâtre, ou enveloppées d'une croûte pierreuſe qui les défigure ; il n'eſt pas rare d'en voir qui ſont chargées de glands de mer : il faut les en dépouiller pour découvrir leur couleur naturelle, qui eſt un fond orange ou rouge marbré de blanc ; le milieu de la partie nacrée eſt ſouvent ſurſemé d'eſpeces de loupes de perles. On emploie les plus communes de ces coquilles, à cauſe de leur nacre, à décorer les grottes & les caſcades.

M. *Adanſon* dit qu'il y a peu de coquillages dont l'animal ſoit auſſi varié pour la couleur : tous les rochers de la côte du Sénégal nourriſſent, dit-il, une grande quantité de ce coquillage ; les Negres en mangent beaucoup.

OREILLE DE MIDAS. Nom donné à une coquille de la *famille des* BUCCINS à *bouche entiere dépourvue de queue ;* ſa bouche eſt ordinairement couleur de chair, garnie d'une ou deux dents, & de forme approchante de celle d'une oreille ; étant dépouillée, toute ſa robe eſt couleur de chair pâle faſciée de blanc : cette coquille eſt commune en différens parages d'Amérique. *V.* BUCCIN.

OREILLE D'OURS ou AURICULE, *auricula urſi.* C'eſt une des plantes les plus agréables, par la variété de ſes eſpeces, la beauté des couleurs, l'odeur ſuave de ſes fleurs, & par la durée de ſes bou-

quets. On contemple, avec plaisir, la richesse du pinceau de la Nature, sur un théatre garni des especes de ces plantes. Ces fleurs méritent, avec raison, les soins de l'Amateur de la belle nature.

L'oreille d'ours est une plante dont les feuilles sont longues de deux à trois pouces, polies, grasses, tantôt dentelées, tantôt entieres, & d'un goût amer; le nom de cette plante lui est venu de la ressemblance de ses feuilles avec l'oreille d'un ours. Du milieu de ses feuilles s'élevent des tiges qui soutiennent en leur sommet des fleurs en forme d'un tuyau évasé en entonnoir à pavillon, & découpé en six ou sept parties. Ces fleurs varient en couleur suivant les especes.

Les Amateurs les distinguent en trois classes, l'*oreille d'ours pure*, la *panachée* & la *bizarre*. La pure est celle qui n'a qu'une couleur, comme rouge, cramoisi, violet, pourpre, &c. Les jaunes & les blanches sont des especes dégénérées : on préfere les pures, parce qu'elles sont grandes, plus étoffées, plus veloutées. Les panachées ont leurs partisans, on exige que leurs panaches soient nets; les panaches blanc de lait & d'un jaune doré, sont les plus beaux. Les bizarres ont diverses couleurs opposées, agaçantes, comme le blanc au noir dans le même fleuron. Le caractere de la belle oreille d'ours, est d'avoir la fleur ronde, l'œil grand, rond, net, n'anticipant point dans la couleur; que les pistils soient placés à fleur de l'œil, le remplissent & le surpassent : les Curieux exigent encore d'autres qualités qu'il seroit trop long d'expliquer. Les oreilles d'ours estimées les plus belles, sont toutes simples; celles qui sont doubles n'ont point l'œil qui est la principale beauté de cette fleur, & ne se soutiennent pas. Un point essentiel dans la culture des fleurs, est d'approprier la nature du sol à l'espece de fleur : c'est de la Nature qu'il faut apprendre l'exposition, & l'espece de terre dans laquelle elles peuvent se plaire.

L'oreille d'ours est une plante humide, montagneuse, & qui aime l'ombre : il lui faut une terre qui réponde à son tempérament, & qui conserve toute sa fraîcheur. La terre la plus appropriée à cette plante, est un mélange de terre de taupiniere, de curures de ri-

viere ou de fossés de prés, avec un peu de terreau de fumier de cheval ou de vache. Il est essentiel, lorsqu'on empotte une plante, de ménager l'écoulement des eaux superflues; c'est pourquoi il faut mettre au fond du pot une écaille d'huître sur le trou. La terre des oreilles d'ours ne demande à être renouvellée que tous les trois ans; plus souvent, on courroit risque d'avoir de médiocres fleurs, tant la nature des alimens influe sur la structure organique. On peut faire cette opération au commencement de Mars, ainsi que celle de les œilletonner. On sépare, dans la longueur de toute la racine sur les côtés, les œilletons avec le doigt ou avec un couteau de buis; la tige principale en porte des fleurs plus belles & mieux nourries: on éleve ces œilletons séparés, & ils donnent les même fleurs que la tige principale. Le Fleuriste attentif enduit la blessure avec la térébenthine de Venise, qui empêche l'eau de pénétrer & de pourrir la racine. On laisse fleurir ces plantes dans un endroit où il y a très peu ou point de soleil, parce qu'il en brûleroit les nuances. Le goût du Fleuriste se fait remarquer dans l'art de disposer les fleurs sur son théâtre, afin de les faire contraster, & d'en relever les beautés par leur opposition. C'est dans le temps de la floraison, que l'Amateur apperçoit que les panachées ou anciennes bizarres dégénerent, ce qui se reconnoît quand elles deviennent entiérement de la couleur dont elles panachoient. La beauté altérée ne reviendra plus. Les pots doivent être conservés à l'ombre, même lorsque la fleur est passée: le Fleuriste ne doit jamais épargner les plus petits soins. La meilleure maniere de les conserver, est de les mettre dans une serre (froide ou non), parce que ces plantes ne craignent pas la gelée. Il faut dépotter tout œilleton, dont les feuilles se recoquillent, afin de le garantir de la pourriture, dont c'est une marque infaillible: on y remédie en coupant le navet jusqu'au vif. (Quoique les oreilles d'ours réussissent assez bien dans les pots, j'ai cependant observé, dit M. *Bourgeois*, qu'elles prosperent beaucoup mieux, & qu'elles viennent plus grosses & plus belles en pleine terre, pourvu qu'on observe de les planter dans des plate-bandes, qui soient un

peu humides, & qui n'aient, s'il eſt poſſible, que le ſoleil levant. On doit auſſi faire attention, pour avoir de belles oreilles d'ours, de ne laiſſer à la plante ni trop, ni trop peu d'œilletons. On en doit laiſſer au plus cinq à ſix & jamais moins de quatre.) Lorſqu'on veut avoir de belles fleurs, il faut ſemer, & ſe fier à la nature, qui eſt inépuiſable dans ſes couleurs, ſurtout ſur les oreilles d'ours, dont les eſpeces ne ſe reproduiſent jamais ſans variétés. Il faut faire choix, pour ſemence, de la graine des plus belles fleurs, des plus grandes, des plus veloutées & des plus foncées en couleur, avoir ſoin que la graine ait toutes les qualités requiſes de maturité. Il faut ſemer en Décembre, dans des terrines, ſur une terre préparée, ainſi que nous l'avons dit, & recouvrir la graine avec une terre ſeche tamiſée, environ de l'épaiſſeur d'un liard : il eſt eſſentiel de ne les arroſer qu'avec un arroſoir très fin. Dès le mois d'Avril la graine commence à lever ; lorſque le plant a ſix feuilles, on le repique ; & au bout de deux ans l'Amateur choiſit dans le nombre de celles que la Nature a pris plaiſir à embellir. Il eſt, dans la culture de ces fleurs & des autres que l'on cultive par prédilection, mille petits ſoins qui font le plaiſir de l'Amateur. C'eſt vraiment dans la culture des fleurs & des fruits, que l'on admire l'empire que l'Auteur de la Nature a accordé à l'homme ſur ces individus. Avec quelles délices ne voit-il pas paroître par ſes ſoins de nouvelles beautés inconnues juſqu'alors ! Par combien de titres l'oreille d'ours mérite-t-elle d'être chérie ! elle le diſpute à la tulipe, par ſon brillant, par ſon étoffe veloutée : elle a de plus une odeur ſuave, un air fin. Sans vouloir relever ſes attraits par la comparaiſon avec les autres fleurs cultivées par les Curieux, deux mots font ſon éloge : elle fleurit ordinairement deux fois par an, & ſon feuillage eſt toujours vert. Vous pouvez conſulter dans ce pays un traité fort détaillé ſur la *culture* de l'*oreille d'ours*. Il eſt imprimé à Paris, en 1745. en 2 vol. in-12.

L'oreille d'ours eſt la *ſanicle des Alpes :* ſes feuilles ſont vulnéraires & bonnes pour les coupures.

L'*oreille d'ours de Mycone*, dont on ſe ſert plus com-

munément en Médecine, est une sorte de petit bouillon blanc qui croît naturellement sur les Pyrenées & en Catalogne, sur le mont Ferrat & autres lieux ombrageux. Ses racines sont aussi déliées que des cheveux; ses feuilles sont éparses & courbées sur terre, ayant à-peu-près la figure de celles de la bourrache, un peu découpées & chargées de poils. Il s'éleve d'entre ces feuilles deux ou trois petites tiges, hautes de huit pouces, rondes, solides, pleines de suc, rougeâtres & d'un goût astringent. Les fleurs sont bleues, à une seule feuille disposée en rose. A cette fleur passée succede un petit fruit ovale qui se divise en deux loges, remplies de semences menues, anguleuses. Cette plante prise en décoction est estimée propre pour la gravelle: on en fait distiller une eau dont les Espagnols se servent pour la toux; & par cette raison ils ont donné à cette plante le nom de *yerva tussera*.

OREILLE DE RAT. *Voyez* PILOSELLE.

OREILLE DE SOURIS, *myosotis incana repens*. C'est un genre de plante qui differe de la morgeline par la figure de son fruit, lequel ressemble à une corne de bœuf tronquée. Celle dont on cite ici le nom est originaire des pays chauds. M. *de Tournefort* en a cité de plusieurs especes. L'oreille de souris la plus usitée croît aux lieux montagneux, notamment sur les Alpes; sa racine est fibrée; ses tiges qui sont couchées à terre, sont velues & garnies de petites feuilles lanugineuses, faites comme des oreilles de souris: sa fleur est à plusieurs feuilles disposées en rose; il lui succede une capsule qui a la figure de la corne d'un bœuf, & qui renferme plusieurs semences menues, arrondies: cette plante est astringente, rafraîchissante; & sa racine est estimée propre pour les fistules lacrymales.

Il y a une espece d'*oreille de souris* à feuilles & à fleurs blanches, avec laquelle on peut faire dans les jardins des tapis soyeux, argentins, de la plus grande beauté.

OREILLERE. *Voyez* PERCE-OREILLE.

OREILLETTE. *Voyez* CABARET.

ORFRAIE, Brise-os, Ossifrage ou Ossifrague; oiseau nommé aussi *grand aigle de mer*, *aquila marina*. Cet oiseau est à-peu-près aussi grand que l'aigle; il paroît même avoir à proportion le corps plus long, mais ses ailes sont plus courtes; car l'orfraie a trois pieds & demi de longueur depuis le bout du bec jusqu'à l'extrémité des ongles, & en même temps il n'a que sept pieds de vol ou d'envergure; tandis que le grand aigle qui n'a communément que trois pieds deux ou trois pouces de longueur de corps, a huit & jusqu'à neuf pieds de vol. L'orfraie est remarquable par sa grandeur, & reconnoissable, 1°. par la couleur & la figure de ses ongles, qui sont d'un noir brillant & forment un demi-cercle entier; 2°. par les jambes qui sont nues à la partie inférieure, & dont la peau est couverte de petites écailles d'un jaune vif; 3°. par une barbe de plumes qui pend sous son menton; ce qui lui a fait donner encore le nom d'*aigle barbu*. Cet oiseau se tient volontiers près des bords de la mer, & assez souvent dans le milieu des terres à portée des lacs, des étangs & des rivieres poissonneuses; il n'enleve que le plus gros poisson, mais cela n'empêche pas qu'il ne prenne du gibier; & comme il est très-grand & très-fort, il ravit & emporte aisément les oies & les lievres, & même les agneaux & les chevreaux. On observe dans l'orfraie une particularité singuliere: l'ouverture de la pupille qui d'ordinaire n'est recouverte que par la cornée, l'est encore dans cet oiseau par une membrane extrêmement mince, qui forme l'apparence d'une petite taie sur le milieu de l'ouverture de la pupille; la partie circulaire qui environne la pupille est transparente, au lieu que dans les autres oiseaux elle est opaque & de couleur obscure. Il résulte de cette conformation, que cet oiseau porte sur le milieu de tous les objets qu'il regarde une tache ou un petit nuage obscur, & qu'il voit mieux de côté que de face; cependant on ne s'apperçoit pas par le résultat de ses actions, qu'il voye plus mal que les autres oiseaux; il est vrai qu'il ne s'éleve pas à beaucoup près à la hauteur de l'aigle, qu'il n'a pas non plus le vol aussi rapide, qu'il ne vise ni ne poursuit sa proie d'aussi loin: ainsi il

est probable qu'il n'a point la vue aussi nette ni aussi perçante que les aigles ; mais il est sûr qu'il ne l'a pas comme les chouettes, offusquée pendant le jour, puisqu'il cherche & ravit sa proie aussi bien le jour que la nuit, & principalement le matin & le soir. Les oiseaux de nuit ne voient mal ou point du tout pendant le jour, que parce que leurs yeux sont trop sensibles, & qu'il ne leur faut qu'une très-petite quantité de lumiere pour bien voir. Leur pupille est parfaitement ouverte, & n'a pas la membrane ou la petite taie qui se trouve dans l'œil de l'orfraie. La raison qui a déterminé *Aristote*, dit M. *de Buffon*, à placer l'orfraie avec les oiseaux de nuit, c'est qu'en effet il pêche & chasse la nuit comme le jour ; il voit plus mal que l'aigle à la grande lumiere ; il voit peut-être aussi plus mal que la chouette dans l'obscurité ; mais il tire plus de parti, plus de produit que l'un ou l'autre de cette conformation singuliere de ses yeux, qui n'appartient qu'à lui & qui est aussi différente de celle des yeux des oiseaux de nuit, que des oiseaux de jour. On croit que l'*orfraie* s'unit au *balbuzard* ; ce qui rend croyable cette possibilité du mélange & du produit du balbuzard & de l'orfraie, c'est la conformité des appétits, du naturel & même de la figure de ces oiseaux ; car quoiqu'ils different beaucoup par la grandeur, l'orfraie étant de près d'une moitié plus grosse que le balbuzard, ils se ressemblent assez par les proportions, ayant tous deux les ailes & les jambes courtes en comparaison de la longueur du corps, le bas des jambes & les pieds dénués de plumes : tous deux ont le vol moins élevé & moins rapide que les aigles : tous deux pêchent beaucoup plus qu'ils ne chassent, & ne se tiennent que dans les lieux voisins des étangs & des eaux abondantes en poisson : tous deux sont assez communs en France & dans les autres pays tempérés : ces especes sont assez voisines pour pouvoir se mêler ; & des raisons d'analogie persuadent à M. *de Buffon* que le mélange est fécond, & que le balbuzard mâle produit avec l'orfraie femelle des orfraies ; mais que la femelle balbuzard avec l'orfraie mâle produit des balbuzards, & que ces bâtards, soit orfraies, soit balbuzards, tenant

preſque tout de la nature de leurs meres, ne conſervent que quelques caracteres de celle de leurs peres, par leſquels caracteres ils different des orfraies ou balbuzards légitimes. Par exemple, on trouve quelquefois des balbuzards à pieds jaunes & des orfraies à pieds bleus, quoique communément le balbuzard les ait bleus, & l'orfraie les ait jaunes. Cette variation de couleur peut provenir du mélange des deux eſpeces. Comme cet oiſeau ne pond que deux œufs par an, que ſouvent il n'éleve qu'un petit, l'eſpece en eſt peu nombreuſe; mais elle paroît commune aux deux Continens. *Voyez au mot* FRESAIE.

ORGANE. Partie du corps animal qui eſt capable d'exécuter telle action ou telle opération. Les ſens extérieurs ſont des organes, au moyen deſquels l'animal eſt affecté lorſqu'il touche, qu'il entend, qu'il voit, qu'il flaire ou qu'il goûte.

Les principaux organes des plantes ſont les moyens ou les inſtrumens qui les font agir, & qui leur portent la nourriture néceſſaire. Ainſi l'organiſation eſt l'arrangement des parties qui conſtituent les corps animés, & dont le premier principe ſe trouve dans les ſemences. *Voyez les art.* ANIMAL, PLANTE & MOLÉCULES ORGANIQUES.

ORGANO. *Voyez à l'article* ROUGET.

ORGANSIN. *Voyez à l'article* VER A SOIE.

ORGE, *hordeum*. Les Botaniſtes font mention d'un nombre aſſez conſidérable d'eſpeces ou de variétés d'orges; mais nous ne parlons ici que de celles que l'on cultive communément.

L'orge, comme toutes les autres plantes dont la tige eſt en tuyau, a beaucoup de racines fibreuſes: ſa tige a deux à trois pieds de hauteur, & eſt garnie de cinq à ſix nœuds, à chacun deſquels naiſſent des feuilles aſſez ſemblables à celles du chiendent, & verdâtres: ſes épis ſont compoſés de paquets de fleurs garnies en leur baſe de filets barbus, & auxquelles ſuccedent des grains longues, pâles ou jaunâtres, farineuſes, pointues & renflées en leur milieu: un même grain pouſſe pluſieurs tuyaux; chaque tuyau qui eſt penché vers la

terre, porte en son épi quelquefois vingt grains sur chaque côté.

Il y a une espèce d'orge qu'on peut appeler *orge d'hiver*, parce qu'elle se seme en même temps que le froment; on la nomme en François *orge carré*, parce que les grains qui sont rangés sur quatre lignes paralleles donnent une forme carrée à l'épi; on la nomme aussi *escourgeon*. Les grains en sont fort gros. Les Brasseurs font usage de ce grain, soit seul, soit mélangé avec du froment pour faire la biere : c'est l'*hordeum polystichum hibernum*.

On peut avec l'escourgeon faire des prés artificiels; on le coupe en vert, on le donne aux chevaux & aux ânesses dont on tire le lait pour les maladies : on pourroit en faire une seconde coupe sans perdre sa moisson, qu'on récolteroit seulement un peu plus tard; mais pour l'ordinaire on laboure la terre, & on y seme des haricots ou des pois. Il est bon d'avertir ici avec M. *Duhamel*, que l'herbe de froment donnée en trop grande quantité aux bestiaux, les rend malades. L'orge carré est excellent pour nourrir la volaille; ce grain est d'un grand secours pour les pauvres dans les années de disette, quoiqu'il fournisse une nourriture assez grossiere : il a l'avantage de mûrir de bonne heure.

Il y a d'autres especes d'orge qui sont du nombre de ces grains qu'on appelle *mars*, parce qu'on ne les seme que dans le mois de Mars; on les appelle *orge avancé*, *hordeum polystichum vernum* : il y a aussi une de ces especes d'orge qui est carrée. L'orge le plus commun dont les épis sont plats, est celui qui se cultive en plus grande quantité dans plusieurs Provinces; il grene beaucoup. Il y a encore une autre espece que les Paysans nomment *ris*, parce que les grains en sont blancs, & qu'ils rendent peu de son. Les épis d'orge sont remarquables par leur longue barbe.

Toutes les especes d'orges produisent quantité de grains quand on les seme dans un bon fonds bien cultivé & bien fumé : elles se plaisent mieux dans les terres douces que dans les argileuses. Il y a des Provinces où cette récolte est si importante, qu'on y cultive les orges avec presque autant de soin que les fromens,

En Suede l'orge fait la semaille ordinaire ; il en est de même aux Alpes, dit M. *Haller* : la récolte est plus riche que celle du froment, & elle est souvent au dodécuple (douze fois autant) de la semence. On a mandé de Berlin qu'un grain d'orge, mis au printems de l'année 1763 dans une terre de jardin bien fumée, poussa d'abord une touffe d'herbe composée de plusieurs tiges que le Cultivateur (M. *Kretzchmer*) sépara du jet principal pour les transporter dans les environs : chacune de ces tiges ainsi transplantées, forma comme la premiere une nouvelle touffe ; elles furent marcotées de même, & les pieds qu'on en tira, formerent à leur tour de nouvelles marcotes au moyen de la transplantation ; de sorte que toutes ces marcotes s'étant multipliées successivement pendant l'espace de seize à dix-huit mois, un seul grain d'orge se trouva avoir produit au-delà de quinze mille épis. On parle d'une trousse d'orge que les Peres de la Doctrine Chrétienne de Paris conservoient, & qui étoit composée de deux cents quarante-neuf tuyaux, aux épis desquels on comptoit plus de dix-huit cents grains.

L'orge mêlé avec le froment fait de très-bon pain, mais seul il en fait un qui n'est pas si estimé ; il n'est bon que lorsqu'il est frais, ce qui dure fort peu ; cependant les pauvres s'en nourrissent dans certains pays : il ne convient qu'à ceux qui s'exercent à de rudes travaux, parce qu'il est difficile à digérer. L'orge n'a pas les mêmes vertus que le froment, qui échauffe ; mais de quelque maniere qu'on prépare l'orge, il rafraîchit. On dépouille l'orge de sa peau, & on en fait ce qu'on appelle l'*orge mondé* ou *orge gruë*, de même qu'on prépare l'avoine pour en faire du *gruau :* ces nourritures sont excellentes pour les personnes infirmes, & qui ont quelque maladie qui attaque la poitrine. Les tisanes d'orge mondé sont très-bonnes pour appaiser l'ardeur des fievres bilieuses.

L'orge est fort recherché pour faire de la biere : cette liqueur, nommée autrefois *cervoise*, tient le milieu entre le vin & l'eau. Les Peuples du Nord en font un grand usage ; l'orge leur est aussi nécessaire pour faire

de la boiſſon, que le froment pour faire du pain : ils ſont dans l'habitude de n'employer dans la compoſition de leur biere que du *malt*, c'eſt-à-dire, du grain germé par une ſorte de fermentation faite à l'air libre, immédiatement après avoir été macéré pendant deux jours dans une cuve : le grain commençant à germer, on le deſſeche, on le torréfie légérement, enſuite on l'écraſe à la meule, puis on l'arroſe d'eau chaude, on agite le tout, &c. on ajoute du houblon & du levain ou de la lie de biere, & l'on procede à une bonne fermentation. On ſubſtitue quelquefois le froment & l'avoine à l'orge pour faire le *malt*, dont le négoce eſt en Angleterre d'une étendue conſidérable ; on eſtime qu'il s'en conſomme dans ce pays quarante milliers de boiſſeaux. Ce calcul eſt fait d'après le produit de l'impôt appelé *malt-tax*.

En quelques pays on nomme l'orge *pain de diſette*. Du temps de *Pline*, les Gladiateurs Athéniens qui avoient coutume de ſe nourrir d'orge, étoient ſurnommés *Hordearii*. Le *maza* ou maſſe-huile des Anciens, étoit compoſé de farine d'orge rôti, mêlée & pétrie avec quelque liqueur, comme de l'eau, de l'huile, du lait, du vin cuit, du miel, &c. On faiſoit auſſi une bouillie d'orge, appelée *polenta*. L'orgeat, dont on fait tant d'uſage pour déſaltérer agréablement, doit avoir pour baſe une décoction d'orge : l'orgeat eſt la crême d'orge des Anciens. On prépare en Allemagne & en Flandres un orge réduit en des grains ronds très-blancs, de la groſſeur d'un grain de millet ; c'eſt ce qu'on appelle *orge perlé*, parce qu'il reſſemble groſſiérement à des perles ; on le fait avec l'orge mondé que l'on met ſous une meule ſuſpendue ; le grain étant briſé en partie, on paſſe au crible ce qui a échappé à la meule. Les Allemands en font beaucoup plus d'uſage que nous : ils en mangent en bouillie, au lait, & quelquefois avec du bouillon de viande. On peut conſulter la Lettre ſur l'uſage d'une nouvelle découverte de pâtes, de ſirops & de tablettes d'orge, par M. *de Chamouſet*, à Paris chez *Barbou*.

ORGE PETIT ou PETIT ORGE. *Voyez* CEVADILLE.

ORGUE DE MER, ou TUYAU D'ORGUE; *tubularia marina purpurea.* Espece de vermiculaire rouge ou d'un beau pourpre, (nous en avons de blancs) du genre des vermisseaux tubulaires de mer. L'arrangement de ces tubes comme testacées est admirable; chaque ver est l'architecte de son tuyau, & ce tuyau presque cylindrique, dur & plus ou moins droit, est adhérent à celui de son voisin par le moyen d'une substance qui leur est commune, & qui sert à les groupper & à joindre leurs différens étages. Ainsi l'orgue de mer, dont l'animal n'est pas bien connu, est composé de tubes réunis en masses, adhérens les uns aux autres par des lames plates, minces, circulaires, extérieures, entourant chaque tuyau & posées irrégulièrement, quelquefois ces tuyaux sont collés par leurs côtés. L'orgue de mer se pêche dans les Moluques. On prétend que les Naturels des Moluques, notamment à Amboine, ont une certaine horreur de cette espece de tubulaire marin; ils ne cueilleroient pas le fruit d'un arbre auquel on auroit attaché un de ces tuyaux d'orgue, ils craindroient en touchant ce fruit d'être attaqués d'une ébullition par tout le corps. Superstition qui a pris naissance dans quelque esprit simple, & qui a fait donner à ce corps le nom de *pierre magique* ou des *magiciens.* Les Habitans de Java s'en servent comme d'un diurétique. *Voyez maintenant l'article* VERMISSEAUX DE MER.

ORCHETTA. Nom donné sur la côte de Genes à une espece de squille à tête large, de la grandeur d'une langouste. On en prend peu du côté de Marseille, mais beaucoup sur les côtes de Barbarie.

ORICHALQUE. *Voyez à l'article* CUIVRE DE CORINTHE.

ORIGAN, *origanum.* Plante dont les Botanistes distinguent avec *Tournefort* quatorze especes: nous en citerons deux qui sont en usage, & qui se trouvent dans notre pays; savoir, l'origan commun & le petit origan.

1°. L'ORIGAN COMMUN ou GRAND ORIGAN, ou la MARJOLAINE D'ANGLETERRE SAUVAGE & BATARDE, *origanum vulgare spontaneum*, est une plante

qui croît non-seulement dans les pays chauds, mais aussi dans les pays froids, comme en Allemagne, en Angleterre & en France: on la trouve fréquemment aux lieux secs & exposés au soleil, dans les brousailles, le long des haies, & principalement sur les collines & les montagnes; ses racines sont ligneuses, filamenteuses, traçant obliquement en terre: elles jettent plusieurs tiges à la hauteur de deux pieds ou environ, dures, carrées, velues: ses feuilles naissent des nœuds des tiges, opposées, (les plus grandes ressemblent à celles du calament vulgaire, & les plus petites à celles de la marjolaine,) velues, odorantes, d'un goût âcre & aromatique: ses fleurs paroissent en été, elles sont comme en parasol aux sommités des tiges, dans des épis grêles & écailleux, qui forment de gros bouquets: chaque fleur est en gueule & d'un rouge blanchâtre; il leur succede des semences très-menues & arrondies. Cet origan varie beaucoup par ses feuilles & par ses fleurs. *Tragus* observe que ces fleurs sont de trois sortes, l'une ponceau, l'autre rouge-blanchâtre, & la derniere toute blanche. L'origan commun qui se trouve en Espagne, est préférable au nôtre. En Suede les sommités d'origan sont usitées pour teindre les laines en rouge & pourpre.

2°. Le PETIT ORIGAN ou la PETITE MARJOLAINE SAUVAGE, *origanum minus*. Cette plante est assez rare, excepté dans la forêt d'Orléans, où elle est abondante: sa racine est ligneuse, roussâtre & fibreuse: sa tige est petite, ronde, haute de six à sept pouces, rameuse: elle ressemble d'ailleurs à l'espece précédente, même pour les vertus.

L'origan est diurétique, hystérique, stomacal & bon pour la tête: on en prend en infusion théiforme dans l'asthme & dans la toux violente: il est utile dans les indigestions, les rapports aigres & les vents, même pour augmenter le lait aux nourrices en facilitant la digestion, & faisant faire un chyle plus abondant. Son huile essentielle est excellente contre la douleur des dents causée par la carie; on tamponne le trou de la dent avec un peu de coton trempé dans cette huile, & la douleur cesse bientôt. On emploie extérieurement

cette plante dans les lave-pieds & dans les demi-bains qu'on prépare contre les vapeurs & les pâles couleurs, contre la paralysie & les rhumatismes, notamment pour celui du cou, appelé *torticolis*. Selon M. *Bourgeois*, l'origan est aussi un excellent aromatique qu'on fait entrer dans la plupart des fomentations qu'on met en usage contre la foiblesse des nerfs, les contusions, les enflures & autres accidens qui sont la suite de quelque coup, de chutes, d'entorses, &c.

ORIGNAC, ou ORIGNAL. Espece d'élan de l'Amérique. *Voyez* ELAN.

ORISEL. *Voyez* SEREQUE.

ORME, *ulmus*, est un grand & gros arbre de futaie, connu aussi sous les noms d'*ormeau*, *ormille*, & *arbre au pauvre homme*. On distingue plusieurs especes d'ormes qui different par les feuilles & par la nature de leur bois; mais il y en a beaucoup qui ne sont que des variétés, ainsi qu'on l'éprouve par la culture de la graine d'orme, d'où il naît des arbres dont quelques-uns ont des feuilles aussi petites que l'ongle, & d'autres plus larges que la main; les uns ont des feuilles rudes, d'autres molles. On dit vulgairement que l'orme à larges feuilles est femelle, & que celui à petites feuilles est mâle, mais c'est improprement. Voici la description de l'orme ordinaire ou *orme franc*: sa racine est grosse, dure, & trace au loin d'un côté & d'autre dans la terre: son tronc est fort rameux, assez droit, couvert d'une écorce crevassée, rude, de couleur cendrée, rougeâtre en dehors, blanchâtre & souple en dedans: son bois est robuste, dur, jaunâtre, tirant un peu sur le rouge; ses branches étalent ou s'étendent beaucoup: ses feuilles sont assez larges, ridées, veineuses, oblongues, dentelées en leurs bords, pointues, verdâtres & nerveuses: sa fleur qui naît avant les feuilles au sommet des rameaux, est un entonnoir à pavillon découpé: à cette fleur succede un fruit membraneux qui contient une semence blanche, douce au goût; les Latins appellent cette graine *samara*.

L'orme fournit un exemple merveilleux de la fécondité en fait de graines seulement. Un orme peut aisément vivre cent ans, & sans le secours de l'art, il peut

rapporter pour une année de fécondité moyenne beaucoup plus de 33000 graines, ce qui donne pour les cent années de la vie de l'orme 3,300,000 graines provenues d'une seule graine. Voyez l'*Hiſtoire de l'Acad. des Scienc. ann. 1700.*

L'orme croît dans les champs & dans les plaines, en terre graſſe & humide, proche des rivieres: il fleurit en Mars & Avril. C'eſt un arbre aſſez long à venir; la voie la plus courte eſt de l'élever de rejetons qui ſortent de ſes racines en pépiniere. Le temps le plus favorable de le planter eſt au mois de Février: on peut greffer en écuſſon à œil dormant les eſpeces qu'on aime davantage, ſur celles dont on fait moins de cas. Comme ces arbres ſe prêtent & ſe plient à toutes les formes, ils ſont très-propres pour faire des boſquets, des quinconces, des ſalles de verdure, des allées & de grandes avenues qu'on appelle *ormaies* ou *ormoies*, & dont l'ombrage eſt fort ſain tant pour les hommes que pour le bétail. Nos Anciens avoient ordinairement une ormaie derriere leur maiſon pour ſervir d'abri, de vue, de promenade, & pour leur fournir le bois de chauffage & de charronnage dont ils avoient beſoin. L'orme à petites feuilles convient le mieux pour les paliſſades. En Italie où l'on n'a que des vignes hautes, on plante des ormes pour les accoler & les ſoutenir: c'eſt ce que les Latins ont nommé *ulmus marita*, comme qui diroit *orme marié* avec la vigne. On diſtingue onze eſpeces principales d'ormes: 1°. l'*orme champêtre* à feuilles panachées ou non panachées; 2°. l'*orme de montagne*; 3°. l'*orme teille*; 4°. l'*orme à feuilles liſſes* plus ou moins panachées; 5°. le *petit orme* à feuilles jaunâtres; 6°. l'*orme d'Hollande* à feuilles quelquefois panachées; 7°. l'*orme d'Angleterre* à feuilles étroites; 8°. l'*orme de France* à graine étroite; 9°. l'*orme à écorce blanche*; 10°. l'*orme de Virginie*; 11°. l'*orme de Sibérie*, c'eſt un orme nain.

Il y a peu d'arbres foreſtiers qui ſouffrent auſſi facilement la tranſplantation que l'orme: on le peut tranſplanter avec ſuccès, même au bout de vingt ans. On prétend que l'orme reprend de ſa nature ſi aiſément, que des perſonnes ayant ſemé des copeaux d'orme

dans une piece de terre labourée, il en a pouſſé une grande quantité de ces arbres. *Bradley* qui ne nie pas la poſſibilité du fait, dit dans ſes obſervations phyſiques ſur le jardinage, qu'il y a certainement des cas où des bourgeons, des feuilles, & même des racines fibreuſes de plante, végetent & produiſent des arbres. On a fait prendre racine à des feuilles d'orangers, qui ont pouſſé des branches, des feuilles, des fleurs & du fruit, en les enfonçant à moitié en terre: on a fait la même choſe avec des feuilles de laurier thym. Revenons aux plants d'orme: on les place à quinze ou vingt pieds l'un de l'autre dans des trous fort larges & peu profonds. Lorſque l'orme a douze ou quinze ans, on peut en couper les branchages tous les cinq ans, pour en faire des fagots; à trente ans ils produiſent le double & au-delà à proportion de leur crue, & ſi on en a beaucoup, on les ébranche par coupe réglée: depuis quarante ans juſqu'à ſoixante ils ſont dans leur force. On fait ordinairement avec le bois d'orme des moyeux, des eſſieux, des jantes, des fleches & autres ouvrages de charronage; on en fait auſſi des canaux, des pompes, des moulins, les parties des vaiſſeaux qui ſont toujours dans l'eau, &c. On préfere l'*orme tortillard*, c'eſt-à-dire, qui eſt plein de nœuds, un peu tortu & le plus dur pour faire les moyeux de roue. On débite ces pieces en grume, & on peut les laiſſer ainſi deux ou trois ans ſans craindre le ver ni la ſéchereſſe. Les Menuiſiers, les Carroſſiers & les Tourneurs font auſſi uſage de ce bois.

L'on a obſervé que l'orme à feuilles très-larges, & qui ne pouſſe point de rejets ſur le tronc, ni ſur les groſſes branches, a le bois tendre & preſque auſſi doux que le noyer: l'autre eſpece d'orme auſſi à larges feuilles, mais qui pouſſe beaucoup de branches, eſt tout rempli de nœuds: c'eſt le plus recherché pour faire des moyeux de roue.

Ray dit avoir vu en Angleterre pluſieurs ormes de trois pieds de diametre ſur une longueur de plus de quarante pieds. Ce fameux Botaniſte rapporte encore qu'un orme à feuilles liſſes, de dix-ſept pieds de diametre au tronc, ſur cent vingt pieds de diametre à ſa

tête ou pomme, ayant été débité, sa tête seule produisit quarante-huit chariots de bois à brûler, & que son tronc, outre seize billots, fournit huit mille six cents soixante pieds de planches : toute sa masse fut évaluée à quatre-vingt-dix-sept tonnes. On a vu dans le même pays un orme creux à-peu-près de même taille, qui servit long-temps d'habitation à une pauvre femme qui s'y retira pour faire ses couches. On a des exemples d'autres especes d'arbres infiniment plus monstrueux. *Voyez le baobab au mot* PAIN DE SINGE.

L'écorce de l'orme & ses feuilles sont remplies d'un suc mucilagineux & gluant, qui est propre à la réunion des plaies. L'on emploie la décoction de ses racines contre toutes sortes de pertes de sang : on trouve quelquefois sur les feuilles de l'orme, certaines vessies qui s'enflent jusqu'à la grosseur du poing, semblables en figure aux truffes ; elles contiennent une liqueur dans laquelle on voit nager des *pucerons verdâtres*. La liqueur s'appelle *eau d'ormeau*. Ces vessies ont été formées, dit *Lémery*, par des moucherons qui ont piqué les feuilles de l'orme au printems, & qui ont donné lieu au suc de la feuille de s'étendre ; les pucerons qui font sortir de leurs œufs des moucherons, sont comme autant de masques qui couvrent de nouveaux moucherons : (ceci n'est pas tout-à-fait exact, dit avec raison M. *Deleuze*. Les pucerons qu'on trouve dans les vessies d'orme, sont la vraie cause de cette dilatation des feuilles : comme une partie des pucerons acquierent des ailes, c'est peut-être ces pucerons ailés qu'on appelle ici des *moucherons ;* mais ils ne sont pas tels en naissant : peut-être *Lémery* a-t-il voulu parler des petits *ichneumons* ou *cynips*, dont les larves vivent dans le corps des pucerons, mais elles ne contribuent point à la formation des vessies) : ces vessies sont nuisibles à l'arbre, mais le baume qu'elles renferment est très-bon pour les plaies nouvellement faites & pour les chutes : on passe ce baume naturel par un linge pour en séparer les pucerons. *Voyez les Mémoires de l'Académie des Sciences, an.* 1724. Les Payſans d'Italie & de Provence y font infuser les sommités de millepertuis : la liqueur devient rouge & se conserve plusieurs an-

nées ; la plus vieille est la meilleure. On prétend que les fleurs de l'orme sont nuisibles aux abeilles, & ses graines aux pigeons ; mais ses feuilles sont une excellente nourriture en hiver pour les moutons, les chevres, & sur-tout pour les bœufs, qui en sont aussi friands que d'avoine. Pour conserver ces feuilles, on coupe le menu branchage d'orme à la fin d'Août, & on le fait sécher au soleil.

ORMIER ou HALIOTITE. *V.* OREILLE DE MER.

ORMIN, *horminum verum*, est une plante que l'on cultive dans les jardins : elle a quelque rapport avec la sauge, & plusieurs la confondent avec l'*orvale*. Voyez ce mot.

L'ormin a une racine ligneuse & fibreuse ; ses tiges sont hautes d'environ un pied, rougeâtres, carrées, velues & rameuses ; ses feuilles sont opposées & lanugineuses, peu odorantes & d'un goût légérement amer : les sommités des branches sont garnies d'un amas de feuilles purpurines tirant sur le violet : ses fleurs, qui sortent de l'aisselle des feuilles, sont en gueule, verticillées, de couleur purpurine & blanche ; il leur succede des capsules qui contiennent des semences arrondies : toute la plante est détersive, résolutive & stomachique. On distingue aussi l'ormin sauvage, *horminum sylvestre latifolium verticillatum*. Ses propriétés sont les mêmes.

ORNE. Nom donné à une espece de frêne de l'Italie qui croît dans les forêts & sur les montagnes, & dont l'écorce est lisse & rousâtre. *Voyez les mots* FRÊNE & MANNE.

ORNITHOGALE ou CHURLE, *ornithogalum vulgare* : est une plante qui croît dans les haies & dans les blés. Sa racine, qui est une bulbe en grappe, blanche & fibreuse, est empreinte d'un suc visqueux tirant sur l'amer ; on la mange en guise d'oignon dans les lieux où elle se trouve : ses feuilles ressemblent un peu à celles du gramen, elles sont creuses & marquées d'une ligne blanche dans leur longueur. La tige est haute d'un demi-pied, & porte en son sommet plusieurs pédicules en maniere d'ombelle, qui soutiennent des fleurs disposées en rose, verdâtres en dehors, blanches en de-

dans : il leur succede des fruits arrondis, relevés de trois coins, & divisés intérieurement en trois loges qui renferment des semences noirâtres. En Médecine on se sert de la racine d'ornithogale pour exciter les crachats & les urines. Il y a l'ornithogale jaune qui fleurit en Mars & Avril, quelques Curieux la nomment *étoile jaune ;* ses fleurs sont vertes en dessus, & d'un beau jaune par dedans ; elles sont disposées en bouquet & ont la forme d'une étoile ; l'ornithogale vert fleurit en été. L'ornithogale à bouquet surnommé par les Fleuristes *dame d'onze heures*, fait un très-bel effet dans les parterres, ses fleurs sont larges & blanches ; elle commence à s'épanouir à neuf ou dix heures, elle l'est entiérement vers les onze heures du matin.

ORNITHOLITES. Nom que l'on donne à des parties d'oiseaux fossiles ou pétrifiées : telles que les *becs*, les *ongles*, les *os*, les *œufs*, les *nids*, &c. celles que nous avons toujours vues sous ce nom ne sont que des empreintes ou des incrustations.

ORNITHOPODE ou PIED D'OISEAU, *ornithopodium.* Plante dont M. *de Tournefort* compte six especes. Voici la principale, la grande, *ornithopodium majus.* C'est une plante qui croît dans les champs sablonneux, tant avant qu'après la moisson, sur les collines, dans les prés arides & exposés au soleil, le long des chemins dans les sables. Sa racine est petite, blanche, simple, fibreuse, & un peu tuberculaire ; elle pousse plusieurs petites tiges grêles, rameuses, presque couchées à terre & velues ; ses feuilles sont opposées ; ses fleurs sont petites, légumineuses & jaunâtres : il leur succede des gousses courbées en faucilles, & réfléchies en haut, composées chacune de cinq, six ou sept pieces attachées bout à bout, & terminées par un ongle pointu. Ces siliques naissent deux ou trois ensemble, disposées comme les griffes d'un oiseau : on trouve dans chacune de leurs pieces une semence arrondie comme celle du navet.

Cette plante fleurit en Juin : prise en décoction, elle est apéritive & excellente pour chasser les graviers des reins : pilée & appliquée en cataplasme, elle convient pour les hernies.

OROBANCHE, *orobanche*. Plante paraſite dont on diſtingue deux eſpeces principales.

1°. La GRANDE OROBANCHE, *orobanche major caryophyllum olens :* elle croît toujours au voiſinage de quelque autre plante dans les champs, entre les légumes, entre le lin, le chanvre, le fenugrec ; & dans les blés proche le genêt, elle ſe nourrit à leurs dépens. Ses racines ſont bulbeuſes, groſſes comme le pouce, arrondies, formées en cône, écailleuſes & noires en dehors, blanchâtres ou jaunâtres en dedans, tendres, empreintes d'un ſuc viſqueux & amer : en ſe ſéchant elles deviennent dures comme de la corne : elles pouſſent une tige haute d'environ un pied & demi, droite, arrondie, d'un rouge jaunâtre, velue, fiſtuleuſe & fragile : elle ne porte que des feuilles avortées & ſpongieuſes, leſquelles ſe corrompent en peu de temps : ſes fleurs ſont velues, purpurines ou jaunâtres, odorantes ; chacune d'elles eſt, ſelon M. *de Tournefort*, un tuyau évaſé & taillé en maſque d'une maniere groteſque : elle renferme deux paires inégales d'étamines, & un piſtil : le calice eſt fendu en quatre lanieres oblongues : à cette fleur ſuccede un fruit oblong qui s'ouvre en deux coques remplies de ſemences très-menues & blanchâtres. *C. Bauhin* dit que quand cette fleur naît contre le genêt commun, elle eſt verdâtre ; mais ſi elle naît contre le genêt d'Eſpagne, elle eſt jaunâtre & plus grande. On mange l'orobanche comme les aſperges.

2°. La PETITE OROBANCHE, *orobanche ramoſa minor.* Sa racine eſt tubéreuſe, groſſe comme une aveline & fibreuſe : ſes tiges ſont hautes d'environ demi-pied, plus menues & plus dures que celles de l'orobanche vulgaire. Ses fleurs ſont diſpoſées en épis. Elle reſſemble d'ailleurs à l'eſpece précédente ; elle naît ordinairement entre le chanvre & les blés.

L'orobanche ſéchée & pulvériſée eſt propre pour la colique venteuſe ; la doſe en eſt depuis un ſcrupule juſqu'à un gros : on prétend que cette plante met le taureau en rut quand il en a mangé : c'eſt pourquoi on la nomme auſſi *herbe de taureau.* Voyez maintenant à l'article PLANTE PARASITE.

OROBE ou ERS ou POIS DE PIGEON, *orobus, seu ervum verum*, est une plante dont on distingue plusieurs especes.

1°. L'OROBE VULGAIRE DES HERBORISTES, *orobus vulgaris Herbariorum.* Cette plante se seme dans les champs en plusieurs Provinces de France pour la nourriture des bestiaux : elle croît aussi naturellement parmi les blés en Espagne & en Italie. Sa racine est menue & blanchâtre : ses tiges sont hautes d'un pied, anguleuses, très-rameuses; ses feuilles sont semblables à celles de la lentille, & rangées par paires le long d'une côte ; ses fleurs sont légumineuses, petites, purpurines, quelquefois blanches : elles sont remplacées par des gousses longues d'un pouce, menues, pendantes, ondées, blanchâtres étant mûres, & contenant des semences semblables à de petits pois, d'un rouge brun, & d'un goût de légumes qui n'est ni amer ni désagréable.

Cette plante fleurit à la fin du printems, & sa semence est mûre en Juillet. C'est une nourriture très-agréable aux pigeons, & qui les fait beaucoup multiplier ; l'orobe se plaît en terre maigre & sablonneuse.

2°. La PETITE ESPECE D'OROBE, *ervum semine minore.* On l'appelle communément *orobe de Candie :* elle ne differe de la précédente que par sa petitesse ; on la cultive entre les choux.

M. *Haller* observe que quoique l'orobe paroisse être le nom Grec de l'*ervum*, les Botanistes distinguent cependant les deux genres : l'*ervum* a les siliques articulées & elle monte : l'orobe a les siliques lisses & vient toute droite. C'est, dit-il, l'espece premiere & seconde de M. *Vaillant* qui appartiennent à l'*ervum ;* la troisieme est un *orobus.*

3°. L'OROBE DES BOIS, *orobus sylvaticus nostras.* Ses fleurs sont purpurines bleuâtres ; ses semences sont ovales, plus menues que celle de la vesce, un peu ameres : cette plante croît dans les champs & dans les forêts aux lieux incultes.

La semence d'orobe est la seule partie de cette plante qu'on emploie en Médecine : elle est résolutive, apéritive, & augmente le lait aux nourrices. Les anciens

Médecins la réduiſoient en poudre, & la donnoient incorporée avec le miel dans l'aſthme humide pour faciliter l'expectoration. On en a fait du pain dans des années de diſette; mais il étoit de mauvais goût, & fourniſſoit peu de nourriture : aujourd'hui cette ſemence eſt une des quatre farines réſolutives qu'on emploie ſi communément en Chirurgie.

OROBIAS, OROBITES. *Voyez* au mot OOLITHES.

ORONGE : nom que l'on donne en Guienne à la bonne & délicate eſpece de *champignon*, ſi vantée des gourmets, c'eſt le *laſeras* de J. Bauhin. On peut dire auſſi que c'eſt le plus beau des champignons, il ſe développe dans le ſuc qu'on trouve dans la racine du panicaut lorſqu'il ſe pourrit. Il ſort de terre enveloppé d'une membrane très blanche qui, en ſe fendant, laiſſe voir la petite oronge ſous la forme & la couleur d'une orange de Portugal, laquelle s'épanouit enſuite en un paraſol d'un jaune doré en deſſus & d'un beau blanc par deſſous. *Voyez* CHAMPIGNON.

ORPHIE. Poiſſon très commun ſur les côtes de Normandie : on l'appelle *éguillette* en Bretagne. Il eſt long comme une anguille, mais plus gros, plus charnu & plus quarré; ſa peau eſt d'une couleur argentée bleuâtre; ſa chair eſt blanche, ferme, un peu ſeche & a un aſſez bon goût. Il eſt également bon à toutes ſauces. Les vertebres de l'orphie deviennent vertes par la cuiſſon, & ſe détachent aiſément de la chair : il a ſur le nez un avant-bec, qui eſt pour l'ordinaire d'une cinquieme partie de la longueur du reſte du corps. La figure de ce bec lui a mérité le nom d'*éguillette*, mais il ne faut pas confondre ce poiſſon avec celui qui eſt décrit ſous le nom d'*aiguille*. Voyez ce mot.

Voici la maniere de faire la pêche de ce poiſſon; qui dure depuis le mois de Mars, juſqu'en Juin plus ou moins, ſuivant la ſituation & l'expoſition des côtes que ce poiſſon vient ranger, comme tous ceux de ſon genre qui nagent en troupes & par bandes. Les Pêcheurs ſe mettent la nuit quatre dans leurs bateaux; l'un eſt placé en avant avec un brandon de paille enflammée, dont l'éclat attire les orphies, & les trois

autres

autres ont des fouanes ou dards en forme de rateaux, avec une douille de fer où le manche eſt reçu ; ces inſtruments ont au moins vingt tiges ou branches barbelées, de ſix pouces de haut & fort preſſées ; la tête du rateau n'a au plus que treize ou quatorze pouces de long, avec un manche de la longueur de huit, dix ou douze. Dès que les Pêcheurs voient les orphies ou éguillettes attroupées, ils lancent leurs dards & en prennent ſouvent pluſieurs d'un ſeul coup. Comme le bateau dérive doucement, la manœuvre de la pêche n'effarouche point les orphies. Les Pêcheurs qui ſont les plus heureux ou les plus adroits en peuvent prendre juſqu'à douze ou quinze cents dans une ſeule nuit ; mais il faut qu'elle ſoit fort obſcure, & que le temps ſoit calme, ainſi que pour toutes les autres pêches qui ſe font au feu dans l'obſcurité de la nuit. *Dictionnaire des Animaux, T. III.*

Tout le produit de cette pêche ne ſert pas à la nourriture des hommes : la plus grande partie s'emploie principalement à faire des appâts pour garnir les hameçons des lignes.

On donne auſſi le nom d'*orphie* à un poiſſon qui ſe trouve aux Antilles, & qui reſſemble beaucoup à l'*aiguille de mer*. Voyez *ce mot*. Il ſe jette quelquefois en l'air & fait des ſauts de trente pas de long : on prétend que ſi dans ce temps il rencontroit quelqu'un dans ſon chemin, il le perceroit de part en part ; ſa chair eſt d'un aſſez bon goût, quand il n'a pas mangé du fruit de *mancelinier*, voyez *ce mot* : ce qu'on reconnoît en lui voyant les dents blanches ; ſi elles ſont autrement, il eſt fort dangereux d'en manger. L'orphie du Cap de Bonne-Eſpérance reſſemble preſque entiérement à l'orphie de nos côtes.

ORPIMENT ou ORPIN MINÉRAL ou ARSENIC JAUNE, *auri-pigmentum aut arſenicum flavum nativum*, eſt une ſubſtance minérale d'un jaune verdâtre ou rougeâtre ou citrin, arſenicale, friable, cependant compacte, remplie de paillettes ou de lames comme talqueuſes & dorées, leſquelles ne ſont cependant la plupart que des criſtalliſations feuilletées d'orpiment même ; ſouvent l'orpiment paroît contenir des veines

comme spatheuses ; ce n'est encore que de l'orpiment différemment cristallisé. Cette substance arsenicale est minéralisée par le soufre, brillante dans l'endroit de la fracture, donnant sur le feu une légere flamme d'un bleu blanchâtre, accompagnée d'une fumée fort épaisse, & d'une odeur suffoquante de soufre & d'ail.

On trouve l'orpiment natif en morceaux de différentes grosseurs, disposés par lits & attachés à la surface des fentes de mines, dans la Lusace, dans le territoire de Neuhsol, de Servie & du Piémont, particuliérement dans la Turquie d'Asie, dans la Mysie. Tout l'orpiment du commerce nous vient, par l'entremise de l'Angleterre, de Hollande, d'Allemagne, de Suede & d'Italie, & notamment du Piémont, où on l'appelle *or de Piémont.*

L'on trouve dans les boutiques une espece d'arsenic jaune factice qui se fait en quelques lieux de l'Allemagne avec une pyrite arsenicale, qui contient plus ou moins de soufre, selon que la couleur en est plus ou moins vive : on l'appelle ou *orpin pur*, ou *réalgar*. Voyez RÉALGAR.

On emploie l'orpiment à divers usages, par la fusion & par la solution, dans la peinture & dans la verrerie : mis en poudre il prend le nom d'*orpin*. On nous a assuré que si les Peintres broient l'orpin à l'eau pendant que le tonnerre roule, la couleur de l'orpin qui est d'un beau jaune devient aussi-tôt noirâtre. Des Marchands de bois de couleur se servent de l'orpin pour jaunir les bois blancs dont on fait des peignes, &c. afin de les faire passer pour du buis. Cette sophistication est dangereuse & criminelle, en ce que des personnes tiennent tous les jours leur peigne à la bouche. On devroit même le défendre en peinture sur les boiseries : car non-seulement il altere les couleurs avec lesquelles on le mêle, & celles qui sont dans son voisinage, mais il en exhale souvent des odeurs pernicieuses qui portent fortement à la tête, & influent certainement sur la santé ; mêlé avec de l'indigo il devient vert. Les Maréchaux en font entrer aussi dans leurs onguens escarrotiques. On fait avec l'orpiment & la chaux, une liqueur dépilatoire qui est d'usage chez

quantité de Barbiers en Allemagne. Les Orientaux s'en servent dans la compoſition de leur *ruſma* artificiel. *Voyez* RUSMA. Les Empyriques font avec l'orpiment, la poix blanche & la poix noire, un emplâtre qu'ils appliquent ſur la tête des enfans attaqués de la mauvaiſe teigne. Au bout de vingt-quatre heures, ils enlevent l'emplâtre qui emporte avec lui les cheveux & leurs racines ſans grande douleur : on réitere cette opération juſqu'à ce qu'il ne reſte plus de cheveux, & la teigne ſe trouve entiérement guérie. L'orpiment & la chaux donnent une encre de ſympathie & une liqueur à éprouver le vin lithargiriſé. Voici ſa préparation ; on prend une partie d'orpiment & deux de chaux vive qu'on fait diſſoudre enſemble dans l'eau commune, on obtient alors le *foie de ſoufre arſenical*. Si l'on en verſe dans des vins ſuſpects, le vin noircit ſur le champ. Le phlogiſtique du ſoufre s'unit au plomb. La vapeur de ce foie de ſoufre fait paroître en noir des caracteres tracés avec une diſſolution de ſel de Saturne par une ſuite des mêmes principes, & ſert alors d'encre de ſympathie. *Voyez le Dictionnaire de Chimie* & notre *Minéralogie*. On a banni l'orpiment de la Médecine comme un poiſon funeſte.

ORPIN, *anacampſeros*, *vulgò faba craſſa*. Cette plante également connue ſous les noms de *repriſe*, de *joubarbe des vignes*, de *graſſette* & de *feve épaiſſe*, reſſemble à la joubarbe par ſa fleur, ſon fruit & ſes feuilles, qui ſont épaiſſes & ſucculentes : on l'en diſtingue cependant, parce qu'auſſitôt qu'elle pouſſe, elle monte en tige, au lieu que les feuilles de la joubarbe ſe ramaſſent en des globules, qui reſſemblent à des yeux de bœuf. (M. *Haller* dit qu'il y a des *orpins*, dont les feuilles forment des artichauts mieux marqués que ceux de pluſieurs *ſedums ;* comme le *paluſtre*.) La racine de l'orpin eſt formée de tubercules charnus & blancs. Ses tiges ſont droites, rondes, ſolides, comme rameuſes, hautes de deux pieds : ſes fleurs ſont rougeâtres.

L'orpin croît dans les lieux ombrageux & humides, ſur-tout le long des haies. On fait uſage de ſes racines & de ſes feuilles ; elles ſont vulnéraires, conſolidantes ; leur ſuc exprimé, appliqué extérieurement dans

les plaies récentes, arrête le sang, déterge les ulceres, les fait cicatriser, excite la suppuration des tumeurs, & adoucit les douleurs des hémorroïdes. On appelle cette plante *telephium* du nom de Télephe Roi de Mysie, qui s'en est servi pour guérir les ulceres. L'orpin est du nombre des simples qui entrent dans la préparation de l'eau d'arquebusade.

Il y a plusieurs autres especes d'orpin, entr'autres celle qu'on appelle ORPIN ROSE, *rhodia radix*, parce que le goût & l'odeur de la rose se trouvent en sa racine, qui est grosse, tubéreuse, inégale, blanche, charnue, succulente : on en fait usage pour guérir les taches qui viennent de coups de soleil. On en vante le cataplasme pour des maux de tête & les migraines : on l'applique sur les tempes. On nous envoie la racine seche des Alpes : elle pousse plusieurs tiges hautes d'environ un pied, chargées de beaucoup de feuilles, charnues, dentelées & vertes. Les fleurs sont des bouquets en ombelles, disposées en rose, jaunâtres ou purpurines : il leur succede des fruits ramassés en maniere de tête, & remplis de semences oblongues & pâles : M. *Haller* dit que cette espece d'*orpin* porte souvent, sur des tiges séparées, des fleurs mâles & des fruits : quelquefois cependant les deux sexes se trouvent sur la même fleur : cette plante croît aux lieux ombrageux des Alpes ou du Nord.

L'orpin doit être cultivé en terre grasse & à l'ombre : il se multiplie de semence & de plant enraciné.

ORSEILLE ou ORSEIL. Dans le commerce on donne ce nom à une pâte molle, d'un rouge violet ou colombin, parsemée de taches, comme marbrée. On en distingue deux especes : l'une qui est commune, moins belle & moins bonne, vient ordinairement d'Auvergne, où elle est appelée *perelle*, & se tire d'un lichen, espece de mousse qui croît sur les rochers. *Voyez* PERELLE : on la prépare avec la chaux & l'urine; nous l'appellons à Paris *orseille d'Auvergne*, ou *orseille de terre*. La seconde espece, qui est supérieure en tout à la précédente, est appelée *orseille d'herbe*, ou *des Canaries*, ou *du Cap Vert ;* on la prépare à Amsterdam, à Londres & même à Paris. Cette *orseille d'herbe*, qui est le *lichen*

græcus polypoïdes tinctorius saxatilis, *Cor.* 40, ou le *fucus verrucosus tinctorius*, *J. Bauh. & Inst. rei herbar.* croît abondamment dans les îles Canaries, sur les rochers qui sont les plus exposés à la mer. Ce *lichen* se trouve par bouquets grisâtres, longs d'environ deux pouces, divisés en petits brins, presque aussi menus que du crin, & partagés en deux ou trois cornichons, plus déliés à leur naissance, arrondis & roides, courbés en faucille; ces cornichons sont garnis dans leurs longueurs d'un rang de bassins plus blancs que le reste, relevés en petites verrues, semblables aux bassins des polypes de mer: toute la plante est solide & d'un goût salé. Les îles de la Gomere & de Fer produisent la plus excellente orseille d'herbe: elle est brunâtre, tachetée de blanc, bien nourrie, ainsi que le porte le Mémoire de M. Porlier Consul, datée de Sainte-Croix de Teneriffe, 29 Janvier 1731: il dit que dans une année ordinaire l'on récolte cinq cents quintaux d'orseille à Teneriffe, quatre cents aux Canaries, trois cents à Fuerta Ventura, trois cents à Lansarotta, autant à la Gomere & huit cents à l'île de Fer, ce qui produit deux mille six cents quintaux d'orseille Africaine. Il en vient aussi de l'île de Candie & d'Amorgos, qu'on nomme *alga tinctoria*. M. *de Tournefort*, d'après *J. Bauhin*, la met dans le genre des *fucus*.

Les orseilles de Teneriffe, des Canaries & de Palène, sont affermées, pour le Roi d'Espagne, à des particuliers qui les font recueillir. En 1730 on donna quinze cents piastres pour cette ferme, sans compter quinze à vingt réaux du quintal à ceux qui la récolterent. Les autres îles appartiennent à des Seigneurs qui en tirent aussi un bon parti. Dans les années de disette, on récolte une plus grande quantité d'orseille que ci-dessus, parce que c'est tout le gagne-pain des pauvres de ce pays; c'est depuis 1725 que l'orseille est devenue chere: des Négocians de Londres l'acheterent jusqu'à quatre livres sterling le quintal.

Les îles de Madere, de Porto-Sancto, & les Sauvages, produisent aussi de l'orseille. Vers la fin de 1730, un Capitaine de vaisseau Anglois, venant des îles du Cap Vert, apporta à Sainte-Croix un sac d'orseille pour

montre, & communiqua ſon ſecret aux Eſpagnols & aux Génois. L'année ſuivante en Juillet, ces Nations envoyerent aux mêmes Iles un bateau, ſur lequel ils mirent huit Eſpagnols accoutumés à faire la cueillette de l'orſeille ; ils aborderent aux îles de Saint-Antoine & de Saint-Vincent, où en peu de jours ils en recueillirent ſi prodigieuſement, qu'ils en firent un chargement d'environ cinq cents quintaux ; elle y étoit ſi abondante, que le Gouverneur n'exigea d'eux qu'une piaſtre par quintal. Elle ſembloit d'abord préférable à celle des Canaries, mais on a ceſſé d'y retourner, & nous n'en recevons maintenant que de celle que l'on récolte aux Canaries.

Feu M. *Hellot*, Membre de l'Académie des Sciences, homme très-connu des Savans par ſes Ouvrages utiles, dit, dans ſon *Traité de la teinture des laines*, que les Ouvriers font un myſtere de la préparation de cette plante ; mais on la trouve, dit-il, aſſez bien détaillée dans un Traité d'*Antoine-Pierre Micheli*, intitulé *nova plantarum genera*, imprimé en latin, *in*-4°. à Florence, en 1729, p. 78. Voici l'extrait que nous en traduiſons.

Des Ouvriers de Florence appellent l'orſeille *rocella* ou *orcella* ou *raſpa* : ils ont l'art de tirer de cette plante non-ſeulement une teinture pourpre ou colombine, mais encore les nuances intermédiaires de ces couleurs, & ils s'en ſervent pour colorer la laine, la ſoie, &c. Pour cette opération, ils réduiſent la plante en une poudre fine, & la paſſent par un tamis ; enſuite ils l'arroſent légérement d'urine vieille d'homme (*nam mulieris pernicioſa habetur.*) Ils remuent pluſieurs fois ce mélange dans le même jour, en y jetant à chaque fois, pendant pluſieurs jours, un peu de ſoude en poudre, juſqu'à ce que la matiere fourniſſe une couleur colombine. C'eſt alors qu'on la met dans un tonneau de bois, en obſervant de garnir la ſurface, ou d'urine, ou d'une leſſive de chaux, ou de gypſe. Tel eſt l'*oricello* ou *orſeille préparée* des Florentins.

On trouve encore une autre préparation de l'orſeille dans un petit livre Italien, intitulé *dell' arte tintoria* ou *plicto*. C'eſt un petit *in*-12. A la page 210 on trouve cette préparation.

Prenez une livre d'orseille du Levant bien nette ; ayez soin de l'humecter avec l'urine (M. *Hellot* dit qu'il faut qu'elle soit demi-putréfiée) du salpêtre, du sel gemme, du sel ammoniac, de chaque deux onces. Faites un mélange du tout après l'avoir pilé, & laissez-le macérer pendant douze jours ; ayant soin de l'agiter de temps en temps, jusqu'à ce que le mélange soit humecté comme il faut. Au bout de deux jours, ajoutez-y deux livres & demie de potasse pilée, & une livre & demie de vieille urine ; laissez reposer encore la matiere pendant huit jours, puis ajoutez-y une pareille quantité d'urine, & enfin deux gros d'arsenic en poudre : alors la matiere ayant bien fermenté, sera en état de servir à la teinture.

Il paroît que M. *Hellot*, dans son art de la teinture, a imité en quelque façon ce procédé : il en a préparé par une méthode où il ne s'agit que de développer la couleur rouge (cachée dans l'orseille) par un volatil urineux, excité par un alkali terreux, c'est-à-dire, qu'il lui a suffi de mêler l'urine & la chaux avec la plante. Il paroît encore qu'il a réussi de même, ou à peu de chose près, sur l'orseille de terre, appelée *perelle d'Auvergne.*

On reconnoît la bonté d'une orseille préparée en mettant un peu de cette pâte liquide sur le dos de la main, & la laissant sécher ; ensuite on lave cette tache avec de l'eau froide : si elle ne paroît s'être déchargée qu'un peu de sa couleur, l'on doit juger & conclure que l'orseille est en état de réussir ; aussi les Teinturiers, tant en soie qu'en laine, veulent que la teinture de l'orseille se tire en deux fois.

M. *Bernard de Jussieu* nous a appris que le *lichen saxatilis tinctorius*, n'est pas la seule plante de ce genre dont on puisse préparer l'orseille ; il en a rapporté de la forêt de Fontainebleau qui ont pris la couleur pourprée avec la chaux & l'urine : c'est une expérience facile à faire sur celles qui peuvent se convertir en orseille. Il suffit d'enfermer dans un petit bocal la plante, & de l'humecter d'esprit volatil de sel ammoniac, ou de partie égale d'eau de chaux premiere, avec une pincée de sel ammoniac : au bout de quatre jours la

liqueur sera rouge; & en s'évaporant la plante se chargera de cette couleur; sinon il n'y auroit rien à espérer. M. *Haller* dit aussi que plusieurs autres lichens gris, blancs & noirs, donnent une couleur rouge, que rien n'annonce dans la plante, & l'on s'en sert en Suede.

Nous terminerons cet article intéressant pour les Arts, en disant que l'on préfere l'*orseille des Canaries* à celle d'Auvergne; car quoiqu'elle soit plus chere, elle rend à proportion beaucoup plus de teinture que celle de terre; d'ailleurs sa couleur est infiniment plus belle, & ne se ternit point. C'est un beau gris de lin, tirant sur le violet d'amaranthe, couleur que l'on peut encore aviver par les acides, &c. ou fixer en bleu par le jus de citron. On en peut colorer à froid le marbre & l'albâtre blancs, y former des veines, &c.

ORTHOCÉRATITES, *orthoceratiti*, est le nom que les Naturalistes donnent à des corps pierreux cloisonnés, cylindriques ou coniques, tantôt droits, tantôt recourbés ou arqués à une de leurs extrémités, comme un pommeau de canne en bec de corbin. On distingue extérieurement des futures à articulations ou des engrenures branchues comme dans les cornes d'Ammon; & dans l'intérieur ces tuyaux, quoique remplis, sont séparés par chambres ou cloisons comme les nautiles. Ces cloisons qui sont comme autant de calotes, convexes d'un côté, concaves de l'autre & empilées les unes dans les autres, sont percées par un petit siphon ou canal qui communique d'une chambre à l'autre, quelquefois par le milieu, plus souvent par les côtés, c'est-à-dire, près du bord intérieur. Ces tuyaux qu'on trouve toujours fossiles & légérement altérés & mutilés, ont depuis quatre pouces jusqu'à plus de deux pieds de longueur; ils sont communément remplis de la même terre, où ils se trouvent enfouis. Quand on vient à bout de les nétoyer, on apperçoit alors les cellules & le siphon: pour cela on les met macérer quelque temps dans l'eau, qu'on charge peu-à-peu de vinaigre, qui détache ou dissout la partie terreuse ou sableuse. On peut aussi reconnoître la structure intérieure des orthocératites en les faisant scier longitudinalement. On donne à ces orthocératites le nom de

tuyaux cloisonnés lorsqu'ils sont droits, & celui de *lituites* quand ils sont contournés ou arqués à l'une des extrémités comme la crosse d'un Evêque. Ceux qui sont aplatis ou comprimés de maniere à représenter des queues de crabes, sont appelés *queue de crabes*. Tout annonce que l'orthocératite est une espece de coquillage d'une figure conique, sans spirales, chambré & fossile, *tubulus concameratus polythalamium*. On ne trouve point l'analogue de ce fossile dans nos mers, ni celui de la bélemnite, qui paroît être du même genre. La Norwege est la patrie principale des *orthocératites*, dont on ne trouve guere que des noyaux ou parties pierreuses qui s'y sont moulées. M. le Marquis *de Castejа*, Gouverneur de Marienbourg nous en a fait voir de très-belles & grandes especes qu'il a trouvées en quantité dans la Principauté de Lignes sur la frontiere de France. M. le Baron *de Hupsh* en a trouvé de plusieurs sortes dans l'Eifel du Duché de Juliers. Il paroît qu'il y en a à chambres plus ou moins étroites, minces & nombreuses. *Voyez* QUEUE DE CRABE.

ORTIE, *urtica*. Plante dont on distingue plusieurs especes : nous rapporterons ici celles qui sont d'usage en Médecine. Entre les neuf especes d'ortie piquante que distingue M. *de Tournefort*, nous ne décrirons que la grande, la petite & la romaine.

1°. La GRANDE ORTIE PIQUANTE, ORTIE VIVACE ou VULGAIRE, *urtica urens maxima*. Cette plante croît presque par-tout en abondance, particuliérement aux lieux incultes & sablonneux, dans les haies, dans les fossés, contre les murailles, dans les bois mêmes, & dans les jardins : elle pousse des tiges à la hauteur de trois pieds, carrées, cannelées, roides, couvertes d'un poil très-piquant, creuses & rameuses. Ses feuilles sont opposées, oblongues, pointues & dentelées, également garnies de poils piquans & brûlans. Ses fleurs naissent aux sommités des tiges & des rameaux & dans les aisselles des feuilles, disposées en grappes branchues : chacune d'elles est à plusieurs étamines, soutenues par un calice à quatre feuilles, de couleur herbeuse. Ces fleurs ne laissent aucune graine après elles.

L'on distingue les orties, comme le chanvre, en

mâle & en femelle. L'ortie mâle porte sur des pieds qui ne fleurissent point des capsules pointues, formées en fer de pique, brûlantes au toucher, qui contiennent chacune une semence ovale, aplatie & luisante. L'ortie femelle ne porte que des fleurs, & ne produit aucun fruit: ce qui est une maniere de parler, usitée seulement chez le vulgaire; car les Botanistes appellent proprement *fleurs mâles* celles qui ne sont point suivies de graines, & *fleurs femelles* celles qui en sont suivies.

L'ortie fleurit en Juin, & sa graine se mûrit en Août. Ses feuilles se flétrissent chaque hiver, mais sa racine ne périt point: elle repousse de nouvelles feuilles dès le premier printemps. Excepté la tige, toute la plante est d'usage en Médecine: de ses tiges on peut aussi faire de la toile, comme l'on en fait de celles de chanvre. On voit dans le Cabinet de Chantilly un sac fait de tiges d'orties par les Sauvages du Canada; il paroît fait à l'aiguille, on y observe des desseins colorés assez réguliérement. Mon frere, le Médecin, étant à la campagne il y a quelques années, ramassa une quantité de tiges d'orties mûres, les fit rouir & les prépara ensuite comme le chanvre; il en a obtenu des fils de différentes qualités, & a reconnu que cette matiere pouvoit effectivement être utile au Cordier & au Tisserand. Il fit aussi quelques essais sur la tige des feves de marais, mais les fibres lui ont paru trop courtes & trop roides. A Angers on a fait différens essais sur la filasse de l'ortie: on en a fabriqué de la toile qui s'est trouvée assez bonne, & qui se blanchissoit avec facilité; on en a même fait de la toile peinte. La maturité des tiges d'ortie qu'on destine à la filature s'annonce par une couleur jaune ou d'un rouge pâle, & quand la graine se détache facilement de son enveloppe. M. *Linnæus* dit qu'au printems l'on fait cuire ses jeunes pousses avec les légumes. Rien n'est plus commun en Suede & dans le pays Messin en France, que de voir les gens de la campagne employer les racines de la grande ortie pour jaunir la coque des œufs. Cette espece d'ortie varie quelquefois par la couleur de ses tiges, de ses racines & de ses feuilles: on l'appelle alors *ortie rouge*, *ortie jaune* ou *panachée*.

2°. La PETITE ORTIE ou ORTIE GRIECHE, *urtica urens minor*. Elle croît fréquemment le long des maisons, parmi les décombres des bâtimens, dans les jardins potagers où elle se renouvelle tous les ans de graine, ne pouvant endurer la rigueur de l'hiver. Ses tiges sont hautes d'un demi pied ou environ, un peu crochues; ses feuilles très-découpées. Ses fleurs, tant mâles ou stériles que femelles ou fertiles, naissent toutes sur le même pied.

3°. L'ORTIE ROMAINE, ou ORTIE GRECQUE, ou ORTIE MALE, *urtica Romana*, *urens*, *pilulas ferens*. Cette plante, qui est aussi annuelle, croît en toutes sortes de pays; cependant elle est plus rare que les deux especes précédentes. On la seme pour l'agrément dans les jardins: sa tige est haute de quatre ou cinq pieds, ronde, foible, rameuse & garnie de poils qui causent beaucoup de mal quand on les touche. Les feuilles & les fleurs sont comme les précédentes: il succede aux fleurs de celle-ci des globules ou pilules vertes, qui sont autant de petits fruits ronds, gros comme des pois, épineux, & composés de plusieurs capsules qui s'ouvrent en deux parties, & renferment chacune une semence ovale, semblable à de la graine de lin: elle fleurit en Juin, & sa graine est mûre en Août.

Les Latins ont nommé cette plante *urtica*, *ab urere*, brûler, parce que l'ortie est couverte d'un poil très-fin, roide, pointu, qui, s'attachant à la peau de ceux qui la touchent, la pénetre, & fait sur leurs nerfs la même impression de douleur, que si la partie avoit été touchée par le feu. Elle y excite aussi-tôt une chaleur vive, des pustules, & des démangeaisons importunes; à quoi l'on peut remédier, dit *Parkinson*, avec le suc de la plante même. Ce secours est connu dans l'art sous le nom d'*urtication*.

Hook (*Hookius*) a découvert au microscope, que la base des piquans de l'ortie est une véscicule qui renferme une liqueur âcre, mordicante, vénéneuse, & que la pointe est une substance très-dure, qui a un trou au milieu par où la liqueur coule dans la partie piquée, & y excite de la douleur. Il faut que *Langius* n'ait pu trouver un microscope, tel que celui de *Hook*,

puisqu'il n'a pu appercevoir ces sortes de vésicules, ni les cavités ou trous des orties; mais la preuve que cet effet n'est pas produit par les piquans seuls, c'est que les orties un peu desséchées au soleil, ne font plus de mal.

Les feuilles des orties dont on vient de parler, ont un goût fade & gluant, & un peu styptique. Le suc d'ortie dépuré, arrête le crachement de sang, l'hémorragie du nez, & le flux des hémorroïdes: il convient aussi pour la dyssenterie & pour les fleurs blanches. Dans la Médecine Vétérinaire on donne ce suc à la dose d'une demi-once aux animaux qui pissent le sang. Le suc d'ortie, sur-tout celui de la petite espece, est, selon M. *Bourgeois*, d'un grand secours dans les pertes immodérées des femmes: la graine de cette plante en tisane, est très-utile dans toutes les especes d'hydropisie, parce qu'elle est très-apéritive & diurétique. La graine d'ortie grieche prise en poudre, à la dose de trente à quarante grains matin & soir, guérit très-souvent le goître, sans nuire à l'estomac, ni à la santé, comme la plupart des autres qu'on met en usage contre cette maladie. On sait que les orties hachées & mêlées avec du lait caillé font une excellente nourriture pour les dindonneaux: dans quelques Provinces de la France on donne pendant l'été les feuilles fraîches d'orties aux vaches, & pendant l'hiver les feuilles qui ont été séchées à l'ombre. On assure que la graine d'ortie bien mûre, mangée par les poules, les échauffe & les fait pondre plus tôt. Des Maquignons Danois pulvérisent cette graine, en mettent une poignée avec l'avoine qu'ils donnent à leurs chevaux soir & matin; cet aliment les rend gras & leur rend le poil lisse & luisant. Les tendrons d'ortie cuits, purifient le sang: la racine d'ortie confite est un bon remede contre la jaunisse & pour la vieille toux. Le cataplasme d'ortie est émollient & résolutif, & soulage les goutteux. Plusieurs Médecins praticiens recommandent aussi, comme un bon remede contre la sciatique, la paralysie & la léthargie, de frapper les parties affligées jusqu'à rougeur avec un paquet d'ortie, & de les laver ensuite avec du vin chaud. Ce remede a souvent rendu le sen-

ſiment & le mouvement. Paſſons à quelques autres eſpeces d'orties différentes, & qui ſont auſſi d'uſage en Médecine. Mais nous avertiſſons que les autres plantes auxquelles on a donné improprement le nom d'*ortie*, ſont des *lamium*, & leur caractere, dit M. *Haller*, eſt infiniment éloigné des orties. Telles ſont:

L'ORTIE MORTE A FLEUR BLANCHE, ou ORTIE QUI NE PIQUE POINT, ou LAMIER BLANC, *urtica iners floribus albis*, *aut lamium vulgare album*. On trouve cette plante dans les lieux incultes; ſes rejetons ſont nombreux & rampans. Ses tiges ſont longues, carrées & moins groſſes vers la terre, branchues, entre-coupées par quelques nœuds, purpurines en leur baſe; le duvet de leurs feuilles ne fait point de mal: ſes fleurs ſont verticillées, petites, blanches & formées en gueule: les ſommets des étamines ſont bordés de noir, & ne repréſentent pas mal un 8 de chiffre. A chaque fleur paſſée ſuccedent quatre graines triangulaires, rougeâtres, luiſantes, tombant d'elles-mêmes quand elles ſont mûres.

Toute la plante a une odeur déſagréable. Les Médecins modernes recommandent cette eſpece d'ortie pour les fleurs blanches, les maladies du poumon, les tumeurs & les duretés de la rate, & ſur-tout pour arrêter les hémorragies de la matrice, & pour conſolider les plaies: on fait uſage de ſes ſommités fleuries en infuſion théiforme ou en conſerve. On applique auſſi deux fois par jour la plante pilée avec du ſel ſur les ulceres gangreneux.

Il y a une autre eſpece d'*ortie morte à fleurs purpurines* ou *jaunes*, qui ne differe de la précédente que par ſa couleur.

L'ORTIE MORTE PUANTE ou GALIOPSE, ou ORTIE ROUGE, *lamium purpureum*, *fœtidum*, *aut lamium folio oblongo*, *flore purpureo*, (lamier rouge). Sa racine n'eſt pas rampante: ſes tiges ſont garnies d'une ou deux paires de feuilles preſque nues. Ses fleurs ſont purpurines, & ſes graines triangulaires & brunâtres.

Toute cette plante a une odeur fétide & déſagréable, & vient dans les lieux incultes: elle eſt vulnéraire, réſolutive, adouciſſante & propre à déterger les ulceres

putrides. L'on donne auſſi le nom d'*ortie pied-de-poule* à une ſorte d'ortie rouge, annuelle & des jardins, & le nom d'*ortie muſquée* ou *piquante* à une eſpece de *galeopſis*.

En général, ſous le nom latin de *galeopſis* de M. *Tournefort*, autre genre, dit M. *Haller*, qui differe du *lamium*, on comprend la *grande* & la *petite orties puantes*, & l'*ortie morte à fleurs jaunes*. La grande ortie puante, *urtica iners*, *magna*, *fœtidiſſima*, a une racine rampante & donne quelques tiges grêles qui ſortent de ſes nœuds. Ses fleurs forment des épis longs. Cette plante eſt fort puante, & differe peu de l'eſpece d'ortie puante & rouge. La petite eſpece d'ortie puante, *galeopſis paluſtris*, *anguſti-folio*, *fœtida*, vient ſur le bord des ruiſſeaux: ſa racine eſt inégale & boſſelée, & ſes fleurs purpurines ſont en gueules, ayant les levres panachées: on eſtime ſes feuilles très-ſpécifiques pour l'enrouement & contre les fievres tierces: elle eſt encore efficace, appliquée ſur les plaies; c'eſt elle dont il eſt parlé dans quelques Auteurs ſous le nom de *panax coloni*, c'eſt-à-dire *panacée du Laboureur*: à l'égard de l'ortie morte à fleurs jaunes, d'une ſeule piece & en gueule, *lamium flore luteo & folio oblongo*, cette plante eſt rarement d'uſage; on s'en ſert quelquefois à la place de l'*ortie morte & blanche*. Il y a pluſieurs autres eſpeces de *galeopſis* & de *lamium* dont nous ne ferons pas mention ici. Au reſte les *galeopſis* n'ont rien de commun avec les orties, dit M. *Deleuze*, que la dénomination que quelques Auteurs leur ont donnée dans l'enfance de la Botanique.

ORTIE ERRANTE. *Voyez à l'article* ORTIE DE MER.

ORTIE DE MER ou ORTIE MARINE, ou POISSON-FLEUR, *urtica marina*. On donne aſſez improprement ce nom à certains corps marins dont on diſtingue deux eſpeces; ſavoir les *orties marines fixes* & les *orties marines errantes*.

Les premieres ſont appelées *fixes*, de la lenteur de leur mouvement progreſſif: on diroit qu'elles ſont immobiles; à peine au bout d'une heure ont-elles avancé de l'eſpace d'un pouce: l'on en trouve beaucoup ſur

les côtes du Poitou & du pays d'Aunis, où on les appelle *culs de chevaux*; on les nomme *culs d'ânes* sur les côtes de Normandie. M. *de Réaumur* dit dans un *Mémoire de l'Académie des Sciences, année 1710, page 466*, que ces noms leur conviennent beaucoup mieux que celui qui leur est commun avec une plante terrestre, puisqu'ils retracent une image de la figure que ces corps marins font paroître dans un grand nombre de circonstances. Cet Académicien dit que ces orties ne causent point de démangeaisons cuisantes à ceux qui les touchent, comme on l'a prétendu; que ces corps marins sont de véritables animaux bien organisés, susceptibles de sentiment quand on les touche, qui attrapent des poissons & des coquillages pour s'en nourrir. Ils ouvrent la bouche plus ou moins grande suivant le volume de la proie qu'ils avalent, rejettent ensuite les os ou la coquille par la même ouverture. Lorsque la bouche est ouverte, on voit toutes les cornes de l'ortie de mer qui ressemblent en cet état à une fleur épanouie, ce qui l'a fait nommer *poisson-fleur*.

Quoique ces orties prennent successivement quantité de figures différentes, on peut cependant dire qu'en général elles ont extérieurement la figure d'un cone tronqué; leur base est très-fortement appliquée sur les pierres, auxquelles on les trouve toujours adhérentes: il y en a de verdâtres, de blanchâtres & de couleur de rose. Nous en avons trouvé de brunes & de bleuâtres sur les parages de l'île de Rhé, & sur la côte de Plugastel au-delà de Brest. M. *de Romé de l'Isle* m'a assuré en avoir vu de noires à l'île de Sainte-Hélene. Dans quelques orties ces couleurs paroissent par-tout sur la surface; dans d'autres elles sont mêlées par raies ou par taches distribuées d'une maniere très-agréable: on en trouve aussi dans les fentes des rochers qui bordent la mer; elles ressemblent à une grande chevelure & paroissent vivipares.

2°. Les ORTIES ERRANTES. Celles-ci n'ont de commun que le nom avec les précédentes: on les appelle *orties détachées* ou *orties errantes*, &c. Mais M. *de Réaumur* dit que s'il vouloit joindre un nouveau nom aux anciens qu'elles ont, il les appelleroit *gelée de mer*;

nom qui effectivement caractérise si bien la substance dont elles sont formées, qu'il vaut seul une petite description pour aider à les reconnoître. Leur chair, leur ensemble, a la consistance & la couleur d'une vraie gelée. Dans l'eau les *gelées marines* remuent avec assez de vîtesse, elles s'y soutiennent par un mouvement de contraction & de dilatation; mais jetées à sec sur la greve, elles paroissent sans aucune action.

Sur les bords de la Méditerranée, les gelées de mer se nomment *capello di mare* (*chapeau de mer.*) *Rondelet* dit que c'est une masse spongieuse, ronde, creuse & percée au milieu, ayant tout autour un petit cordon rouge; par cet endroit elle ressemble à un chapeau; l'autre partie ressemble aux pieds des poulpes: elle en a, dit-il, huit, gros & carrés dans leur commencement, & qui finissent en pointe; on en trouve aussi qui n'en ont que quatre. Nous en avons vu beaucoup en été dans les parages de Cette en Languedoc, & aux îles d'Hieres; leur corps est gélatineux, couleur de rose, très-brillant, un peu transparent; on les voit souvent flotter comme au gré des eaux, & il nous a paru que si on les manie long-temps, elles se dilatent, se contractent, & causent une petite démangeaison aux mains; il semble même que la chaleur de la main les dissout presqu'entiérement, & si l'on porte aussi-tôt les mains sur les yeux, la sensation de chaleur & notamment de démangeaison est infiniment plus vive. Il paroît que M. *Linnæus* regarde la gelée de mer, comme une espece de *méduse*. Voyez ce mot.

Tous ces individus ont la propriété de faire rentrer dans leur intérieur le rhomb ou rose de pattes dont elles sont fournies. Les orties de mer sont des zoophytes, de la classe des mollusques.

ORTOLAN, *hortulanus aut ortolanus*, est un oiseau de passage, du genre du bruant, très-connu par l'excellence de sa chair: on en distingue de plusieurs especes, qui ne varient que par les couleurs. L'ortolan des roseaux a les plumes de la poitrine & du dessus de la tête, noirâtres. Le véritable ortolan des Naturalistes, *miliaria pingue scens*, est un peu plus grand que l'alouette, il en a aussi la couleur: il a une grosseur notable

notable sur le bec : il se nourrit principalement de millet : c'est un oiseau très-gras : sa chair rôtie est tendre, délicate, succulente, & d'un goût si exquis, que les Grands le recherchent beaucoup pour leurs tables. En Suede, on les fait payer aux Etrangers un ducat la piece, quoique ce ne soit pas toujours le véritable ortolan. C'est une nourriture restaurante, fortifiante : sa graisse est émolliente, résolutive & adoucissante. Cet oiseau est si tendre, que la courte application d'une chaleur légere suffit pour le cuire parfaitement. On pourroit facilement l'enfermer dans des coques d'œufs de poule bien réunies, le cuire dans l'eau ou sous la cendre, & répéter à peu de frais une des magnificences de Trimalcion qui est un jeu de festin assez plaisant.

L'ortolan se rencontre dans les pays chauds, depuis le quinze d'Avril jusqu'à la fin d'Août; on en voit vers Saint-Jean de Bonne-Font une si grande quantité, que les Oiseleurs y viennent de vingt lieues à la ronde pour en prendre. On en trouve encore communément sur les térébinthes à Smyrne : son cri est *zi-zi*. Les *ortolans* du Cap de Bonne-Espérance & de la Louisiane, ont de belles couleurs aurores. Il y a aussi l'ortolan jaune ; l'ortolan tout blanc ; l'ortolan noir ; l'ortolan des roseaux ; celui de la Caroline, celui de neige ; l'ortolan à collier, &c.

ORVALE ou TOUTE-BONNE, ou SCLARÉE, *horminum sclarea dictum*, est une plante que l'on cultive dans les jardins & dans les vergers (il y a aussi la *toute-bonne des prés*). L'orvale est la principale espece du genre des *sclarées* de M. *de Tournefort*, & celle qu'il désigne sous le nom de *sclarea pratensis, flore cæruleo*. Sa racine est simple, ligneuse & fibrée ; brunâtre, d'un goût qui n'est pas désagréable, & qui échauffe le palais & la gorge : elle pousse une tige à la hauteur d'environ deux pieds, de la grosseur du petit doigt, carrée, velue, noueuse, rameuse & remplie de moelle : ses feuilles sont opposées deux à deux, & portées sur de longues queues ; elles sont ridées, gluantes, oblongues, larges en leur base, & terminées en pointe, légérement crenelées, velues, & d'une odeur désagréable, mais citronnée, d'une sa-

veur amere & aromatique : au sommet de chaque tige, sont deux feuilles opposées, petites, creuses, sans queue, & d'une couleur purpurine : ses fleurs sont disposées en longs épis, comme par anneaux, d'une seule piece, en gueule, bleuâtres, dont la levre supérieure est alongée en forme de faucille : à chaque fleur succedent quatre grosses graines arrondies, convexes d'un côté, anguleuses de l'autre, de couleur roussâtre.

Toute cette plante a une odeur forte & puante, & une saveur amere ; elle est toute d'usage. L'orvale est connue, sur-tout des Cabaretiers Allemands, dit *Ettmuller*, pour falsifier leurs vins ; car ils ont coutume de changer le vin du Rhin en un vin muscat, par l'infusion des fleurs d'orvale & de sureau. *Tragus* assure qu'un tel vin est d'un grand secours pour les femmes qui sont froides, stériles, & pour guérir les fleurs blanches : il faut cependant en faire un usage modéré, car il porte à la tête, & y cause, dit *Lobel*, des pesanteurs. On prétend que la graine d'orvale introduite dans l'œil, en fait sortir les corps étrangers.

L'orvale est beaucoup en usage dans les pays du Nord pour faire de la biere ; car quand le houblon est rare, ou qu'on veut rendre la biere plus forte, on en met dans les chaudieres bouillantes, & l'on fait alors une liqueur qui enivre, même prise en petite quantité ; souvent elle cause une gaieté qui tient de la folie. *Hoffman* met l'orvale parmi les remedes spasmodiques. *Ray* rapporte que les Anglois font des gâteaux avec des feuilles d'orvale, des œufs, de la crême & un peu de farine, & que l'on frit dans la poile : ces gâteaux sont agréables, on les sert au dessert pour exciter à l'amour.

L'ORVALE DES PRÉS est assez commune par tout, & se distingue principalement par la disposition de ses fleurs, rangées en anneaux sur des branches dégarnies de feuilles, dit M. *Deleuze*, chaque anneau formé seulement de six fleurs, & accompagné de deux stipules en cœur fort petites. Les fleurs sont bleues, leur levre supérieure est grande, en faucille & un peu gluante.

ORVET ou ORVERT, *cœcilia*, est le serpent ovipare, décrit dans beaucoup d'Auteurs sous le nom

d'*anvoye* ou d'*aveugle* ; il eſt très-connu en Allemagne & au Cap de Bonne-Eſpérance : on le trouve le plus ſouvent dans les fentes des rochers & aux environs : on le tue ſans beaucoup de peine : on le prendroit au premier aſpect pour une anguille. Sa longueur ordinaire eſt d'un pied : il eſt de forme cylindrique : ſa peau paroît fort unie tout le long du corps : il a la levre ſupérieure très-élevée & obtuſe : ſes yeux, quoique brillans, ſont ſi petits, que quelques-uns ont avancé qu'il n'en avoit pas : il eſt partagé de taches noirâtres ; blanches & purpurines ; ſes dents ſont ſi menues, qu'à peine paroiſſent-elles : ſa langue eſt fourchue, il rampe d'une grande vîteſſe : on prétend que ſa morſure eſt très-dangereuſe, mais elle ne l'eſt pas plus que celle de la couleuvre ordinaire ; ſa queue eſt obtuſe & ſi courte, qu'à peine la diſtingue-t-on ; l'ouverture de l'anus eſt placée à l'extrémité du corps. Les Auteurs citent l'anvoye de Surinam, de la Négritie, de l'Amérique, de la Guinée & du Ceylan. *Voyez* SEBA.

ORUBU. *Voyez* VAUTOUR DU BRÉSIL.

OS, *os*, eſt cette ſubſtance endurcie, qui ſert à ſoutenir toutes les autres parties du corps dans les animaux ; c'eſt un compoſé de fibres blanches très-dures, très-ſolides, très-ſeches & caſſantes, entrelacées les unes dans les autres, incapables de flexibilité, & ſervant de baſe, de ſoutien, d'appui, d'attache, de paſſage, de rempart, de borne & de défenſe à toutes les parties qui les environnent. En un mot les os ſont le ſupport de toute la machine animale.

La charpente de l'os ou l'oſſature, appelée *fulchrum*, n'a pas de ſolidité par elle-même ; elle eſt cartilagineuſe, poreuſe, on diroit d'un réſeau dont les mailles & tous les intervalles ſont remplis d'une matiere compacte, calcaire. Néanmoins la légéreté ſe trouve dans la conſtruction des os, réunie à la force : leur ſtructure réticulaire eſt des plus admirable, elle donne paſſage à une multitude de petits vaiſſeaux qui y portent la vie & la nourriture ; un réſeau ſoutient la moelle & l'empêche de s'affaiſſer. Par-tout on reconnoît la main habile du Créateur... Mais entrons en matiere. Si l'on prend l'os de la jambe ou du bras d'un enfant venant

au monde, qu'on le dépouille bien de ses chairs, l'on pourra alors le couper par tranches aussi facilement que les cornichons du cerf, qui s'endurcissent aussi par la suite. Ces os, tendres comme ces cornichons, sont flexibles; ils se consument entiérement dans le feu: ils ne font point d'efferveſcence avec les acides; mais dès que des sucs, chargés de parties calcaires, ont commencé à se déposer dans les pores de ces os, alors ils prennent de la consistance, de la solidité & de la dureté. Si l'on expose ces os à l'action du feu, la partie cartilagineuse brûle, en exhalant une forte odeur de plumes brûlées. Que reste-t-il? une terre blanche, calcaire, soluble dans les acides. Si l'on se contente d'enlever seulement par l'ustion, le gluten animal, qui masque les surfaces de cette terre, l'acide y aura également prise, & la détruira; on peut aussi détruire cette terre sans le secours de la calcination, mais par une macération acidulée; de sorte que l'os qui étoit dur, peut ensuite redevenir mou, être replié & chiffonné comme un linge. Par cette théorie de la nature des os des animaux, qui a un rapport assez immédiat avec les madrépores & les coquilles, & la maniere de les ramollir par le moyen d'une liqueur nitreuse, affoiblie par l'eau commune (opération qui est due à M. *Hérissant* de l'Académie des Sciences); par cette théorie, dis-je, l'on peut concevoir l'ossification & même le ramollissement des os, tel qu'on l'a observé en la personne de la femme Supiot il y a quelques années à Paris. On prétend que la suite d'un lait répandu, dont l'acide s'étoit développé, en fut la cause. Nous nous étendrons ci-après davantage sur cet objet, d'après les remarques de M. *Hérissant*.

Nous disons que les os sont quelquefois sujets à une sorte de ramollissement général. Dans cette maladie, que les Anatomistes nomment *carnification* ou *osteosarcose*, la substance des os est entiérement changée; elle perd sa dureté; ses fibres ne paroissent plus fibres osseuses; les os ont une consistance de chair, & l'on diroit qu'ils sont en effet devenus chair: voyez *Mémoires de l'Académie des Sciences*, 1722, *p.* 229, plusieurs observations de MM. *Petit* & *Morand*, qui constatent la cer-

titude de cette maladie. En consultant les ouvrages des Anciens on y trouve aussi plusieurs observations de ce genre. *Ismaël Albufeda* parle (en 1570) d'un homme sans os, & *Olhuzy* ajoute qu'on le portoit sur une claie de branches de palmier; il est encore question d'un ramollissement des os par *Abbon*, Moine qui vivoit dans le neuvieme siecle : d'un autre par *Houlier*, Médecin de Paris; on a vu à Sedan, en 1672 le nommé *Pierre Siga* âgé de 33 ans, dont les os de tout le corps devinrent mous comme de la cire, de sorte que dans trois ans de temps son corps se trouva réduit à la grandeur de celui d'un enfant de trois ans, & il mourut en cet état. On trouve encore des citations d'autres faits semblables dans la Bibliotheque raisonnée, &c. &c.

M. *de Haller* a donné aussi deux Mémoires sur la formation des os, fondés sur des expériences. On y voit avec plaisir, la structure organique de ces corps, qui commencent par être une colle, qui deviennent cartilage, & qui finissent par être un os.

De la glu au cartilage, dit M. *de Haller*, le passage est prompt & facile, il paroît qu'il ne faut qu'un degré de solidité de plus; mais du cartilage à l'os, la marche est plus longue & plus obscure; il faut former des fibres, des lames, des alvéoles, des vaisseaux, de la moelle, & douer le cartilage de toutes ces parties qu'il n'avoit pas. Il n'y a guere, selon cet Auteur, que les arteres capables d'effectuer dans le cartilage les changemens qui le transforment en os. La nature osseuse se déclare par l'opacité, par les fibres longitudinales, & par la couleur jaune qui s'introduit dans le cartilage : le noyau osseux est une nouvelle preuve de l'influence des arteres sur l'ossification; ces arteres naissent du milieu de l'os & du tronc nourricier. Si tous les cartilages ne deviennent pas osseux, il faut l'attribuer à la petitesse de leurs vaisseaux, toujours trop fins pour admettre les particules du suc osseux. On a observé que les têtes des os destinées à éprouver des frottemens dès l'instant de la naissance, sont les premieres ossifiées, & même les plus dures. Il suffit d'examiner les extrémités de la mâchoire inférieure & des fausses côtes. On peut

encore consulter sur l'ossification les *Mém. de l'Acad. des Sciences*, 1730.

Nous ajoutons ici que des fractures dans les articles, des luxations ou autres causes peuvent donner lieu à l'épanchement du suc osseux, nécessaire pour la formation du cal, ou à la synovie, matiere qui lubrefie les jointures des os, entretient leur souplesse. Alors l'anchylose se forme des os qui devroient être mobiles, ils s'articulent, se soudent, & ne font plus qu'une piece continue. Toutes les parties osseuses dans leurs jointures & leurs articulations y sont sujettes : combien d'exemples en ce genre ne voit-on pas dans les divers morceaux d'Ostéologie conservés dans les Cabinets ! On voit quelquefois dans certains sujets, par des vices particuliers, des parties molles s'ossifier, tels que le foie, le pancréas, même des vaisseaux, des veines & des arteres.

La Nature, si sage & si réglée dans sa marche, est quelquefois troublée par diverses causes au moment de son développement ; de là naissent les différentes difformités dans la charpente osseuse. Les enfans noués ou rachitiques le deviennent ordinairement depuis l'âge de neuf mois jusqu'à deux ans. Les extrémités des os grossissent aux articulations des bras & des jambes, leur démarche devient chancelante. Fatigués, ils se plaisent dans l'inaction ; du reste ils ont très-bon appétit, leurs sens sont très-bien disposés, ils sont même plus gais, ont l'esprit plus vif que leurs camarades de même âge. On prétend que cette maladie ne s'est fait connoître dans l'Europe Septentrionale que depuis deux cents ans. Son époque avec celle de la maladie vénérienne pourroit, dit-on, faire soupçonner qu'elle en a été un des principes.

Voici des détails intéressans sur les os & sur les coquilles, & autres corps qui y ont le plus de rapport. Dans le volume des *Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de l'année 1758*, on trouve un Mémoire sur l'*Ossification* par M. *Hérissant*, Médecin de la Faculté de Paris, &c. Cet Auteur y fait d'abord une question : il demande qu'est-ce qui constitue la dureté des os, ensuite il démontre par quantité d'expériences

très-curieuses, que la transformation des membranes & des cartilages en des parties osseuses, n'est point du tout l'effet d'une ossification parfaite, telle qu'on l'a cru jusqu'au moment de ses découvertes ; mais qu'elle est réellement l'effet d'une espece d'incrustation animale formée par le moyen d'une matiere terreuse qui enduit de toutes parts les fibres & fibrilles du réseau qui constitue le *parenchyme* cartilagineux de la partie qui s'ossifie.

Après cela M. *Hérissant* donne les moyens de faire reparoître sous leur premiere forme les cartilages ou les membranes qui se sont ossifiés, en les dépouillant entiérement de la matiere terreuse dont chaque fibrille est encroûtée en dedans & en dehors. Il suit des découvertes de cet Académicien, que les os sont des organes dans la composition desquels il entre deux substances principales : l'une, qui sert de base à l'autre, est une espece de *parenchyme* cartilagineux qui ne s'ossifie jamais ; la seconde substance est purement terreuse : c'est elle qui donne la solidité & la dureté aux parties osseuses. Le procédé dont notre Auteur s'est servi pour dépouiller la substance animale des os de sa matiere terreuse, consiste à laisser tremper des os plus ou moins de temps dans une liqueur composée d'une partie de bon esprit de nitre & de trois parties d'eau commune ; alors les os perdent, au profit de la liqueur, presque la moitié de leur poids. M. *Hérissant* ayant fait évaporer cette liqueur jusqu'à pellicule, il en a retiré des cristaux jaunâtres, assez semblables à un sel neutre vitriolique à base terreuse. Il fit ensuite calciner dans un creuset toute cette masse saline, laquelle devint alors très-blanche & analogue en tous points à une vraie terre absorbante : elle pesoit, à quelques grains près, le même poids que celui que les os d'épreuve avoient perdu après la dissolution entiere de la matiere terreuse.

La substance animale & cartilagineuse, dépouillée ainsi de toute sa terre & présentée à la flamme d'une bougie, brûla aussi-tôt comme un morceau de cuir ou de vessie desséchée : il n'en resta qu'un charbon noir, spongieux, luisant, léger & friable.

M. *Hérissant* a fait passer tous les os du corps humain

par les mêmes épreuves que les précédentes, & il n'a trouvé que l'émail des dents qui ait apporté une exception à cette conformation, en se dissolvant totalement dans sa liqueur acide, sans y laisser aucun vestige de substance animale. Cette conformation de l'émail des dents est encore expliquée par le même Auteur dans un Mémoire de l'Académie, an. 1754.

M. *Hérissant* a prouvé depuis cette époque, que les *madrépores*, les *coraux* & les diverses productions de *polypiers* à consistance de pierre sont, ainsi que les os, formés par incrustation. Les os de poissons & les cartilages en général ne different des os des autres animaux, que parce qu'ils ne se trouvent incrustés que d'une très-petite quantité de matiere terreuse.

Dans le même volume de l'Académie, M. *Hérissant* rapporte un autre Mémoire intitulé, *Eclaircissemens sur les maladies des os.* Cet Auteur démontre, par une longue suite d'expériences, que toutes les maladies des parties osseuses, (si l'on en excepte les luxations), commencent par un ramollissement plus ou moins sensible, qui se manifeste dans une ou dans plusieurs portions de ces organes : d'où il résulte nécessairement une décomposition plus ou moins complette de l'os malade. En sorte que ces parties sont obligées de se recomposer de nouveau pour se rétablir. L'Académicien établit deux sortes de décompositions ; savoir une *insensible*, & l'autre *sensible*. La premiere consiste en la déperdition plus ou moins grande de la matiere terreuse des os, que les sucs viciés rongent & détruisent peu-à-peu. La décomposition sensible est toujours la derniere, & a lieu lorsque les os perdent leur forme naturelle, leur volume ou leur consistance. La décomposition des os, dit M. *Hérissant*, consiste en ce que les sucs viciés dépouillent la partie terreuse de la substance cartilagineuse, en sorte que les os acquierent par-là un degré de mollesse toujours relative à la déperdition de cette terre calcaire. La décomposition des os a lieu dans les exostoses, dans les anchyloses, dans la carie, dans le cal des os, dans l'exfoliation, &c. & la matiere terreuse se porte alors du côté des urines ; c'est ce que M. *Hérissant* a démontré très-évidemment

tant dans les cas de vérole, de scorbut & d'humeurs froides, que dans celui où l'on est attaqué d'une goutte avec exostoses ou des nodosités.

M. *Ravoton*, Chirurgien Major de l'Hôpital royal & militaire de Landau, &c. a fait plusieurs remarques sur l'exfoliation des os, qui est proprement l'ouvrage de la Nature. La Nature, dit-il, emploie plus ou moins de temps dans cette opération. L'action de l'air agissant sur la surface d'un os mis à découvert, ne peut être regardé tout au plus que comme cause seconde. Les os ne s'exfolient que parce que le périoste qui les couvroit, & qui leur apportoit par des milliers de petits tuyaux un suc propre à les nourrir, n'existe plus; d'où il suit que la portion d'os qui en étoit pénétrée, doit se dessécher & perdre insensiblement son principe de vie. L'air seconde cette exfoliation dans une plaie exposée souvent à nu. Plus les hommes sont jeunes, vigoureux & bien constitués, & plus l'exfoliation des os est prompte & active; si au contraire les hommes sont vieux, foibles & languissans, l'exfoliation sera longue & tardive: cette différence ne provient que de l'abondance & du degré de bonté des sucs qui s'épanchent au temps que la circulation est cessée dans la portion d'os qui doit se séparer. M. *Ravoton* dit que l'exfoliation de ceux chez lesquels le sang se trouve imprégné d'un vice vénérien, chancreux, écrouelleux ou scorbutique, éprouve des longueurs & des difficultés infinies; elle se fait le plus souvent par parcelles où il se développe un principe de carie, qu'on ne détruit que bien difficilement, & après avoir mis en usage les moyens les plus propres à combattre le vice dominant. On sait que les exfoliations superficielles du crâne & celle des grands os de la jambe se font en quarante ou cinquante jours; mais si l'agent qui a mis les os à découvert, les a contusionnés profondément, la portion qui se séparera sera épaisse, & se fera attendre près de trois mois.

M. *Hérissant*, dans un autre Mémoire lu à la Rentrée publique, année 1766, a voulu éclaircir la formation des moules, des pétoncles, des huîtres, &c. Il démontre aussi qu'il y a une grande analogie dans la

formation & la nature des os, & dans celles des coquilles. Cet Académicien ayant prouvé de reste l'existence d'une substance animale & d'une substance terreuse dans la composition des coquilles, a cherché à connoître si l'organisation de cette matiere animale étoit la même dans toutes les coquilles, ou bien si elle n'offroit point quelques différences dignes de notre attention.

Pour s'en instruire d'une maniere non équivoque, il a fait passer une quantité prodigieuse de coquilles par des épreuves semblables à celles où il avoit déja fait passer tout le squelette humain, & il a découvert que cette substance n'est qu'un tissu de fibres à réseau engendrées d'une liqueur analogue à celle qui nous donne la soie. La disposition & l'arrangement de ces fibres donnent lieu à deux sortes d'organisations des coquilles, dont l'une est *simple*, & l'autre *composée*: la *simple* est celle où ces fibres forment simplement des membranes; la *composée* est celle où non-seulement ces fibres forment des membranes, mais encore où ces membranes se trouvent hérissées d'une quantité prodigieuse de petits poils soyeux ramassés en maniere d'aigrettes.

Ensuite M. *Hérissant* fait voir que les couleurs des coquilles dépendent principalement des particules colorantes des liqueurs variées qui circulent dans la substance animale, lesquelles particules teignent les molécules de la substance terreuse qui seules se chargent des particules colorantes.

Cet Académicien fait voir encore que les coquilles croissent par développement, & que leur durete dépend de l'interposition de la substance terreuse qui en pénetre les fibres & les incruste à mesure qu'elles prennent leur forme.

Enfin, cet Auteur finit en disant que les pores, les madrépores, millepores, les coraux, &c. sont, 1°. des especes singulieres de groupes formés par une quantité prodigieuse de petits tubes dont chacun est à l'individu qu'il renferme ce qu'une coquille est par rapport à l'animal qui y est renfermé, & que ces tubes sont composées comme les coquilles d'une substance

animale & d'une substance terreuse. 2°. Que ces belles machines animales, aussi bien que les *glands de mer*, les *tuyaux vermiculaires*, les *perles fines*, les *coquilles d'œuf*, l'*os de seche*, les *crustacées*, les *belemnites*, les *piquans d'oursins fossiles*, les *glossopetres*, &c. sont autant d'incrustations qui donnent, par l'analyse chimique, les mêmes principes que les coquilles. 3°. Enfin que l'organisation de la substance animale de toutes ces productions est des plus dignes de notre attention, comme on sera a portée d'en juger par les dessins & gravures qui sont placés à la fin de ce Mémoire.

Quelle variété ne trouve-t-on pas dans les os des animaux? Les dents qu'on ne peut s'empêcher de regarder comme des especes d'os, en fourniſſent un exemple; il nous suffira de citer celles du cachalot, de l'éléphant, du narwhal, de la lamie, du lion, de la dorade, de la vache marine, du crocodile, du marsouin, & celles de l'homme, qui sont de tous les os humains les plus durs & les plus compactes: *voyez l'article* DENTS.

Peut-être que ſi les cornes du bœuf, du bouc, &c. euſſent été remplies par la Nature de sucs calcaires, elles auroient acquis la dureté de celles du cerf, de l'élan, du chevreuil, qui sont des especes d'os. Ne pourroit-on pas en dire autant des ongles des oiseaux & des quadrupedes?

Dans la tête de la seche, de la carpe, de l'aloſe, du merlan, dans le cœur du cerf, & dans une infinité d'autres animaux, l'on trouve une singuliere variété d'os: il y a quelques poiſſons, tels que l'orphie, dont les os verdiſſent par la cuiſſon: les os des crustacées, animaux que l'on ne peut gueres s'empêcher de regarder comme couverts d'une espece d'os, deviennent rouges par une semblable cuiſſon: les os des quadrupedes & des volailles, même l'ivoire, se ramolliſſent & deviennent friables en les faiſant bouillir dans un vaſe fermé, qui contient une certaine quantité d'eau.

De quelle utilité ne sont pas les os dans les beſoins de la vie? Sans parler de ceux qui sont, dit-on, utiles en Médecine; tels que ceux du talon & du cœur

du cerf, les cornes de cerf, les dents de brochet, la coquille d'huître, celle de l'œuf, l'os de la seche, celui du crâne humain, & quantité d'autres que l'on regarde comme astringens, anti-épileptiques, alexipharmaques, &c. les os sont employés par les Tablettiers pour faire des touches d'épinettes, des spatules, des peignes, des jetons, & quantité d'autres ouvrages moins chers que ceux faits avec l'ivoire ; les dents du cheval de riviere servent à faire des dents artificielles, elles en ont la dureté. L'os de seche, connu sous le nom de *biscuit de mer*, sert aux Oiseliers pour amuser les serins, & à quelques Fondeurs qui en mettent dans la composition de certains moules où ils coulent des métaux : les os de mouton calcinés donnent une poudre dont les Diamantaires se servent pour dégraisser leurs pierreries : enfin, l'os du bœuf qui ne sembloit être qu'une matiere de rebut, & seulement propre aux Cordonniers pour polir la semelle de leurs souliers, vient d'être employé avec succès comme un moyen de subsistance pour les pauvres, & même pour les riches dans un temps de disette. C'est en employant ces os cruds ou cuits que la Société Littéraire de Clermont-Ferrand a, sinon appris, au moins rectifié l'art utile d'en faire des bouillons gras, très bons, très-nourrissans, de la gelée, & de les réduire en tablettes pour l'utilité du Voyageur, du Soldat, du Marin, &c. Voyez son *Mémoire sur l'usage économique du Digesteur de* Papin, *ann. 1761.*

Les tablettes de bouillon osseux, peuvent aussi servir de coulis de viande, elles ne reviennent pas à un sou chaque : cependant une tablette est la dose d'un excellent bouillon, ou d'un potage très-sain pour une personne.

On ne doit pas inférer de cet avantage connu que les os soient farineux, & que lorsqu'ils ont été épuisés par un long séjour dans une terre humide, ils contiennent encore quelque matiere alimenteuse : il n'en est rien ; & l'idée de réduire en poudre les os humains & de les convertir en aliment à titre de corps *farineux*, qui fut conçu en effet & exécuté pendant le siege de Paris, au temps de la Ligue, ne peut être tombée que

dans une tête essentiellement ignorante & bouleversée par la faim & par le désespoir.

Dans les animaux les os composent presque tout le volume apparent; réunis ensemble, ils portent le nom de *squelette*, lequel est l'image de la conformation de l'animal auquel il a appartenu. Prenons pour exemple celui de l'homme: quel spectacle merveilleux présente à un œil philosophique cette charpente animale! nous l'avons déjà dit, quelle légéreté & quelle force dans ces os! quel appareil! quelle variété admirable dans les formes, dans leurs diverses manieres de se joindre, de se mouvoir, tous appropriés d'une maniere singuliere à leurs usages: mouvement de coulisse, de charniere, de genou, de pivot; on observe des cavités, des fosses, des sinus, des rainures, des échancrures, des trous destinés à recevoir, à loger diverses pieces de la machine, à donner passage aux veines, arteres, nerfs, vaisseaux qui portent la nourriture, le mouvement & la vie à toutes les parties du corps animé.... La plupart des brutes ont, pour ainsi dire, une charpente semblable au squelette de l'homme: ceci étant, on les pourra reconnoître & comparer dans l'histoire des os du corps humain que nous allons donner.

Description du squelette de l'homme.

On sait que le squelette est l'assemblage de tous les os du corps humain: on le divise en *tête*, en *tronc* & en *extrémités*: la tête comprend le crâne & la face.

Le *crâne* est une boîte osseuse, arrondie, un peu ovale ou sphéroïde, formée de l'assemblage de huit os, qui sont le *coronal* ou frontal, l'*occipital*, les deux *pariétaux*, les deux *temporaux*, le *sphénoïde* & l'*ethmoïde*. On regarde communément les six premiers comme les os propres du crâne, & les deux derniers, communs au crâne & à la face. Ces os sont plus durs à la surface, que dans le milieu de l'épaisseur: c'est ce qui les fait distinguer en deux tables, l'externe & l'interne, & en partie moyenne appellée *diploé*, qui est d'une substance spongieuse.

La *face* est formée de l'assemblage de plusieurs pieces

qu'on renferme sous deux principales, appellées *mâchoires*, dont l'une est supérieure & l'autre inférieure. La mâchoire supérieure est immobile, & composée de treize os, savoir de deux *os maxillaires*, qui sont les plus grands, & font proprement la mâchoire supérieure; de deux *os propres du nez*, de deux *os de la pomette*, des deux *os unguis*, des deux *lames inférieures du nez*, des deux *os du palais* & du *vomer*, à quoi il faut ajouter seize *dents*: savoir, quatre incisives, deux canines ou œilleres & dix molaires. La mâchoire inférieure est faite d'un seul os, qui contient aussi seize dents, quatre incisives, deux canines & dix molaires. *Voyez* l'article DENTS.

Le *tronc* peut être divisé en trois parties; une commune appellée l'*épine*, & deux propres qui sont le *thorax* ou la *poitrine* & le *bassin*.

L'*épine du dos* est une colonne osseuse très forte composée de vingt-quatre *vertebres*, distinguées en *cervicales*, en *dorsales* & en *lombaires*, & de l'*os sacrum* à l'extrémité duquel se trouve joint un autre os appellé *coccix*.

Le *thorax* ou la poitrine est formé 1°. par vingt-quatre *côtes*, douze de chaque côté, dont on appelle les sept supérieures *vraies*, & les cinq inférieures *fausses*; 2°. par le *sternum* qui est ordinairement composé de deux pieces; 3°. & par les vertebres dorsales.

Le *bassin* ainsi nommé de sa forme & de son usage est fait de deux grands os, dits *innominés*, ou les os des hanches, qui se joignent ensemble par devant, & sont attachés par derriere à l'*os sacrum* qui acheve de former le bassin.

Les *extrémités* du squelette sont au nombre de quatre; deux supérieures & deux inférieures.

Chaque extrémité supérieure est divisée en *épaule*, en *bras*, en *avant-bras* & en *main*. L'épaule est faite de deux pieces, une antérieure appelée *clavicule*, & une postérieure dite *omoplate*. Le bras n'est fait que d'un seul os nommé *humerus*. L'avant-bras en comprend deux, l'un est appelé l'*os du coude*, & l'autre, *rayon*. La main est distinguée en trois parties; savoir, en *carpe* ou poignet qui est composé de huit os, en *métacarpe*

qui est fait de quatre, & en *doigts* qui sont au nombre de cinq, chacun desquels est formé de trois pieces appelées *phalanges*.

Chaque extrémité inférieure est partagée en *cuisse*, en *jambe* & en *pied*; la cuisse n'est faite que d'un os appelé *femur*; la jambe est composée de deux grands os nommés *tibia* & *peroné*, & d'un petit appelé la *rotule*. Le pied est divisé en trois parties comme la main: savoir, en *tarse*, en *métatarse*, & en *doigts*; le tarse est fait de sept os, savoir de l'*astragal*, du *calcaneum* ou os du talon, de l'*os naviculaire* ou scaphoïde, du *cuboïde* & des trois *cunéiformes*. Le métatarse est fait de cinq pieces, & les doigts ou *orteils* sont au nombre de cinq, dont le plus gros est fait de deux os, & chacun des autres de trois appelés *phalanges*. Il se trouve encore plusieurs petits os que l'on ne conserve pas ordinairement dans le squelette; tels sont les *osselets de l'oreille*, l'os *hyoïde*, & ceux qu'on nomme *sesamoïdes*.

On peut aisément supputer le nombre de tous les os qui composent pour l'ordinaire le squelette d'un adulte humain, selon le dénombrement que nous venons de faire; savoir, cinquante-quatre à la tête, cinquante-quatre au tronc, en prenant le *coccix* pour une piece & le *sternum* pour deux, & cent vingt-quatre aux extrémités; d'où résulte le nombre de deux cents trente-deux, auxquels si l'on ajoute les huit *osselets des oreilles*, dont il est parlé à l'article des *sens* au mot HOMME, & les trois principales pieces de l'*os hyoïde*, on trouvera que le total monte à deux cents quarante-trois os, sans y comprendre les os *sesamoïdes*.

Comme le tissu des os est spongieux, & que leurs cavités sont remplies de liqueurs & de moëlle, pour parvenir à former de beaux recueils d'ostéologie, & à conserver leurs os avec leur blancheur, on a recours à quelques procédés. On fait bouillir les os à plusieurs reprises dans de l'eau, & on les place ensuite à l'air pour les faire sécher à l'exposition du levant & du midi; de maniere qu'ils puissent recevoir les différentes impressions de l'air, le soleil, la pluie, la rosée: on les met sur une table couverte de sable, qui en absorbe l'humidité. Si l'on fait macérer les os dans une eau con-

tenant de la chaux vive, du sel de soude, de l'alun; ils acquierent par ce procédé, qui a ses désagrémens, une plus grande blancheur. Après ces opérations, il faut enduire les os d'un vernis léger; il les garantit de l'impression de l'air.

Observations sur les squelettes des hommes & des brutes.

Il y a long temps qu'on a remarqué de la variété dans le nombre des os du squelette humain. Les jeux de la Nature sur le seul nombre des côtes nous en fournissent un exemple: s'il se trouve par hazard treize vertebres au dos, il s'y trouve aussi treize côtes; mais quelquefois on en trouve onze d'un côté & douze de l'autre. On a nommé *adamites* les hommes qui se sont trouvés dans ce cas-là. *Ruisch*, *Bonius*, *Fallope*, &c. citent des sujets qui avoient chacun vingt-six côtes. Ces faits suffisent pour justifier que ce n'est point une chose étrange que le manque ou l'excès du nombre des côtes, au de-là de l'ordinaire. Mais dans tous les cas notre machine n'en souffre aucun dommage: l'on en peut dire autant des personnes dont les sutures du crâne, sur-tout dans la lambdoïde, sont garnies d'iles osseuses qu'on nomme *clés* ou *os wormiens*, *ossa wormiana* (ainsi appellés de leur Auteur Allemand): ces os surnuméraires qui tombent ordinairement quand on démonte les pieces du crâne, ne se rencontrent pas dans tous les sujets. On peut consulter l'excellente *Ostéogonie* ou *Anatomie des os*, par M. *Monro*, imprimée à Edimboutg, en Anglois, *in-12*. dont M. *Sue* a donné une traduction ornée de très belles planches.

Nous avons exposé que la tête est une boîte osseuse composée d'une multitude de pieces de diverses formes & structures, lesquelles s'emboîtent avec une justesse singuliere les unes dans les autres; elles sont disposées de maniere que tout le poids qui paroîtroit devoir écraser la tête, tend au contraire à les lier plus étroitement. Avec quel art l'os de la pomette est-il retenu! c'est lui qui est la vraie clef du crâne; c'est sur lui que se porte tout l'effort. Tous les événemens sont prévus par la sage nature. Elle a disposé les différentes

pieces

pieces du crâne, comme celles d'un parquet d'appartement. C'eſt cette ſtructure qui fait que quand un coup eſt reçu ſur une piece, il ſe trouve anéanti dans les autres. En un mot le crâne peut réſiſter aux différens chocs modérés qui peuvent lui arriver dans tous les ſens. S'il eût été d'une ſeule piece, le moindre coup lui eût occaſionné des fêlures. Nous avons dit auſſi qu'on diſtinguoit le crâne en deux tables. C'eſt encore cette ſtructure qui fait qu'une partie du crâne peut s'exfolier dans toute ſon épaiſſeur & ſe ſéparer du reſte; témoin cette femme de l'Hôtel-Dieu de Paris dont parle *Saviard* (Obſ. XC.) qui demandoit l'aumône dans ſon crâne? objet touchant pour l'humanité, & ſujet de ſpéculation pour un Anatomiſte Phyſicien. C'eſt cette même femme dont il eſt queſtion dans les *Mém. de l'Académie des Sciences, ann. 1700, p. 45.* Au reſte tous les os du crâne ſont joints entr'eux, & quelques-uns même avec ceux de la face par ſutures, & ces ſutures ſont d'autant plus apparentes que les ſujets ſont plus jeunes. On voit au Cabinet du Roi, une ſuite de crânes humains, dont les variétés qu'on obſerve dans la figure & le volume paroiſſent ſi étranges, qu'on ne comprend pas comment le cerveau a pu ſe développer d'une façon qui y réponde, & qui ſoit ſi différente de celle qu'il doit naturellement avoir. Il eſt bon d'obſerver que l'homme en comparaiſon des autres animaux a la tête plus groſſe, & qu'à proportion elle contient plus de cervelle. *Voyez* CERVEAU.

Enfin il eſt digne de remarque 1°. Que l'épine du dos eſt le principal appui de la tête, des bras & de la poitrine. 2°. Que les vertebres ſont articulées enſemble, tant médiatement qu'immédiatement par des cartilages & des ligamens qui donnent à l'épine la facilité d'obéir aux mouvements du corps. La forme des vertebres varie admirablement ſuivant la néceſſité de la place où elles ont été miſes. La nature deſcend par nuances de la forme de la premiere juſqu'à la derniere. L'épine des brutes ne reſſemble point à celle de l'homme, tant par la quantité des vertebres que par la différence, la difficulté ou la privation du mouvement. Dans les ſerpens qui, comme les couleuvres, ne ſont

point venimeux, les vertebres ſont plus ſouples & en grand nombre, ce qui fait que pris par la queue, ils peuvent s'entortiller autour du bras. La vipere qui eſt venimeuſe n'a pas cette propriété. Les apophyſes ſpinales peuvent chez l'homme être horizontales au lieu d'être perpendiculaires, ainſi qu'on le remarque dans les perſonnes qui font des tours & qu'on a exercées dès leur jeuneſſe à différentes flexions. Les oiſeaux n'ont de vertebres qu'au cou, & elles égalent en longueur le reſte du corps. Mais on ne les voit point ſe racourcir, & prendre une forme irréguliere, comme on le voit dans les différens boſſus de l'eſpece humaine. *Voyez* maintenant l'art. *Vertebres*. 3°. Que l'attitude droite eſt la plus ferme & la plus aſſurée, parce que la ſurface du contact des points d'appui eſt plus large, & que le poids porte deſſus plus perpendiculairement. 4°. Que les os ſont plus larges, plus épais, plus élaſtiques à leurs extrémités qu'au milieu, afin de mieux s'articuler & de ſupporter un effort plus conſidérable ſans ſe déplacer ou ſe diſloquer facilement. 5°. Que les lames des os & leur gluten ſont plus rapprochées les unes des autres & en plus grande quantité dans le milieu qu'aux extrémités : auſſi ſont-elles dans cet endroit d'un tiſſu plus fort & plus ſerré : ce ſont elles qui comme autant de petits crochets retiennent la moelle & l'empêchent de s'affaiſſer & de tomber au moindre effort, ce qui produiroit des douleurs très aiguës dans les os; c'eſt ce mal qu'on appelle *ſpina ventoſa* : en effet la moelle étant tombée, ne reçoit plus de nourriture, elle ſe corrompt & gâte les os, qui s'exfolient. Mais heureuſement ces cas ſont rares. 6°. Que le coccix étant encore cartilagineux ſe prête lors de l'accouchement; mais lorſqu'il eſt uni à l'os ſacrum, il fait obſtacle ou rend plus difficile l'enfantement. (Le coccix eſt auſſi ce qui ſert de queue à tous les animaux par ſon prolongement.) 7°. Que le baſſin eſt plus grand, plus évaſé chez la femme que chez l'homme : afin de donner de la place à l'accroiſſement du fœtus. Ses os innominés ſont auſſi plus élevés, ſes hanches plus égales, plus larges & plus en arriere, ce qui lui donne ſinon plus de ſoupleſſe, au moins plus de grace dans la marche & la danſe. 8°. Que le

ſternum des femmes va toujours en augmentant depuis le haut juſqu'en bas ; il eſt auſſi plus large que celui des hommes. Leur poitrine eſt encore plus courte, plus relevée, plus large, & le ventre bien plus long que n'ont les hommes. Il manque ſouvent au ſternum un os, ou bien l'on y obſerve un trou qui ſert de paſſage aux vaiſſeaux des mamelles. 9°. Que la poitrine des animaux tant quadrupedes que volatiles, differe de celle de l'homme; celle des quadrupedes eſt terminée par une épine qui regne tout du long, & leurs bras ſont placés ſur le devant de la poitrine ; les oiſeaux au contraire les ont ſur le dos, & leurs côtes ſont attachées à une large épine, unies les unes aux autres, garnies de beaucoup de chair, ainſi que leur poitrine, & de muſcles très forts. 10°. Que les quadrupedes qui ſe ſervent de leurs pattes antérieures pour porter à la bouche ont une clavicule comme l'homme. Celle des oiſeaux eſt par proportion infiniment plus longue, ce qui leur eſt d'une grande utilité pour maintenir leurs ailes à égales diſtances, & pour les rejeter en arriere. On a obſervé que les quadrupedes qui ont une clavicule, ont, comme les ſouris, les écureuils, les ſinges, &c. les jambes rentrantes. Le cheval & le bœuf n'ont point de clavicule, leurs bras, (jambes antérieures), ſont attachés à l'omoplate en devant de la poitrine ; auſſi leurs jambes ſont-elles cagnes, & leurs mamelles au lieu d'être en devant ſont placées en arriere. Les femmes ont la clavicule plus longue & plus large que chez les hommes, ce qui repouſſe leurs bras plus en arriere & leur donne une plus grande agilité dans tout ce qu'elles font, & ne gêne point le volume des mamelles, ſur-tout dans le temps qu'elles allaitent ; leur omoplate eſt auſſi plus platte & plus large que celle des hommes qui eſt voûtée & triangulaire. 11°. Que le pied, pour être bien conformé doit être large, long & voûté, & que nous ſommes d'autant plus fermes & plus forts étant debout, que le triangle que forment les extrémités des pieds avec les talons eſt plus grand, ſoit qu'on ait les pieds tournés en dehors, ou en dedans.

OSCABRION ou OSCABIORN, eſt un coquillage que M. *Adanſon* a rangé dans la claſſe des univalves,

à cause de l'animal qui l'habite, & qu'il a reconnu appartenir à la famille des *lépas*. M. *d'Argenville* en compose la seconde famille de ses *multivalves* : voyez *ce mot*. Cet Auteur dit aussi que c'est une espece de lépas à huit côtes séparées, qui s'attache aux rochers, ainsi que les autres; mais comme ces pieces détachées ressemblent un peu à la queue d'un petit crabe, & que les divisions de cet Ecrivain ne sont en quelque sorte fondées que sur les coquilles même privées de leurs animaux, dans ce système l'oscabrion rentre naturellement dans la classe des coquilles multivalves.

Les *oscabrions* ont la forme d'un demi-ovoïde, & sont composés de huit écailles courbes, posées en recouvrement les unes sur les autres de devant en arriere, relevées toutes dans le milieu d'une petite côte plus ou moins aiguë, & enclavée vers le bas dans une membrane flexible, écailleuse & chagrinée dans son contour.

L'oscabrion offre plusieurs variétés connues sous différens noms. Si leur forme est un peu applatie, on les appelle *cloporte de mer*, ou *punaise de mer*, *cimex marina*; si la forme est arquée sinueuse, c'est la *chenille de mer*; enfin s'ils sont un peu arqués on les appelle *nacelle* : en effet ils ressemblent beaucoup à une chaloupe, les membres & les varangues sont représentés par les écailles courbes de la coquille. Quand on détache les huit pieces de l'oscabrion pour en faire voir la structure, il reste une membrane qui ressemble alors à la carcasse d'une chaloupe privée de son bordage. L'on nous en apporte une très-belle espece de l'Amérique : on la prend sur les côtes de la grande Anse, île de S. Domingue, à quatre pieds de profondeur; ils sont d'un gris cendré en dehors, chagrinés sur leurs bords, verdâtres en dedans. Ceux du Chili sont à écailles violet-noir nuées de jaune. Il y en a qui sont d'un bleu céleste en dedans, & dont le dessus est à taches alternatives de gris & de noir. Ceux de la Caroline sont gris de lin, nués de vert en dessus & blancs en dedans. Les oscabrions des parages des Magellans sont fort larges, & leurs écailles étant nétoyées paroissent brunes, tachées dans le milieu de blanc. Ceux de nos mers sont ou gris ou

bruns nués de verdâtre, quelquefois violets en dedans, de forme étroite & alongée.

On dit que l'oscabrion s'attache sur l'algue, sur le bois & sur le dos de la baleine, & qu'il vit en parasite. Il ne faut pas le confondre avec le *pou de la baleine:* voyez *ce mot.* Les Pêcheurs de la mer d'Islande, où il se trouve des oscabrions, en mangent pour étancher leur soif: on prétend que c'est encore un bon remede pour le mal de mer, notamment l'espece de petite pierre rubine qu'on trouve dans son corps, & que les Islandois avalent volontiers pour obtenir l'accompliſſement de leurs souhaits: ils nomment ce corps pierreux, *Peter's ſtein*, pierre de S. Pierre, & son enveloppe *Peter's ſkip*, barque de S. Pierre. *Voyez* les *Actes de Coppenh.* & les *Collections Académ. T. IV. p. 354.* pour la description anatomique de l'oscabrion, entr'autres celles de HANNAS THARLEVIUS, & de JACOBÆUS, où l'on apprend avec étonnement le nombre d'yeux fixes de ce testacée.

OS DE SECHE. *Voyez à l'article* SECHE.

OSEILLE ou SURELLE, *acetoſa ſeu oxalis*, est une plante dont on distingue trente-une especes: nous en rapporterons de trois sortes principales qui sont en usage dans les cuisines, dans la médecine & dans les pâturages.

1°. L'OSEILLE ORDINAIRE ou OSEILLE LONGUE ou VINETTE, *acetoſa longi-folia aut oxalis vulgaris pratenſis.* On la trouve communément dans les prés & les forêts, on la cultive aussi dans les jardins pour l'usage de la cuisine: sa racine est fibreuse, longue, jaunâtre, amere & acerbe; elle pousse des feuilles alternes, oblongues, à oreilles du côté qu'elles tiennent à leurs queues, vertes, luisantes & remplies d'un suc acide; sa tige est cannelée & monte à la hauteur d'un pied & demi, portant en sa sommité des fleurs sans pétales. *J. Ray* observe que dans cette espece de plante il y a des fleurs stériles & d'autres fertiles; les fleurs stériles ne portent point de fruit, & le pistil de celles qui sont fertiles se change en une graine triangulaire de couleur de châtaigne & luisante. La fructification de l'oseille est, dit M. *Deleuze*, essentiellement la même

que celle de la *patience*, & elle eſt du même genre; mais elle porte des fleurs mâles & des fleurs femelles ſéparées ſur différens pieds.

On emploie la graine, les feuilles & la racine de cette plante: le ſuc de l'oſeille eſt d'un goût acide manifeſte, qui donne la couleur de pourpre au papier bleu; auſſi en fait-on quelquefois uſage pour préparer le fil de lin, celui de chanvre & les toiles de fil pour la teinture rouge: on en tire un ſel eſſentiel qui, jeté ſur les charbons ardens, brûle comme la crême de tartre; mais ſi on le mêle avec le ſel de tartre, il répand une odeur urineuſe, de même que le ſel ammoniac. On peut dire que cette plante potagere poſſede toutes les propriétés des végétaux. La vertu des graines, dit M. *Geoffroy*, *Mat. Médic.* eſt entiérement différente de celle des feuilles & des racines.

2°. L'OSEILLE RONDE ou FRANCHE, *acetoſa rotundi-folia hortenſis*. Sa racine eſt rampante ainſi que ſes tiges; ſes feuilles ſont preſque rondes, garnies à leur baſe de deux oreillettes; leur couleur eſt un vert de mer: du reſte elle reſſemble à l'eſpece précédente, mais ſes fleurs ſont hermaphrodites: on la ſeme dans les jardins pour l'uſage de la cuiſine.

3°. La PETITE OSEILLE ou L'OSEILLE SAUVAGE ou OSEILLE DE MOUTON, *acetoſella ovina*. Cette plante qui croît dans les champs aux lieux ſablonneux, eſt haute de quatre pouces ou environ; ſes feuilles ſont petites & ont la figure d'une lance; ſes fleurs ſont diſpoſées par grappes: cette petite plante paroît toute rouge ſur la terre, principalement quand ſes ſemences ſont mûres; ſa racine eſt rampante, ligneuſe, fibreuſe & rouge: c'eſt la plus acide de toutes les oſeilles: les brebis en mangent; & c'eſt de là que lui eſt venu le nom d'*oſeille de mouton*.

On fait avec les feuilles de l'une & l'autre oſeille des ſauces très-bonnes; car elles rendent les viandes plus agréables, & excitent l'appétit par leur goût acide: on en fait auſſi des conſerves & un ſirop. L'oſeille priſe intérieurement, eſt rafraîchiſſante, tempere le mouvement du ſang, réprime la bile qui bouillonne: elle l'épaiſſit ou l'adoucit ſelon les circonſtances; elle con-

vient dans les fievres peſtilentielles & intermittentes : c'eſt un bon ſpécifique dans le ſcorbut alkalin. *Bartholin* dit dans les *Mém. de Coppenh. 1671, Obſ. IX*, que les Peuples du Groënland en font uſage avec le *cochléaria* dans des bouillons d'avoine ou d'orge pour la même maladie qui y eſt endémique. Il dit auſſi que l'oſeille & le *cochléaria* naiſſent abondamment dans ce pays, & qu'on doit faire uſage des deux enſemble.

La racine d'oſeille eſt peu ou point acide, mais fort huileuſe ; elle eſt apéritive. Cette racine étant ſeche, a la propriété ſinguliere de donner à l'eau bouillante une belle couleur rouge délayée : on peut profiter de cette propriété pour faire une tiſane dont la couleur imite celle d'un vin rouge, & tromper avec cette boiſſon certains buveurs malades, à qui il ſeroit dangereux d'en accorder. La graine de l'oſeille eſt eſtimée cordiale, & convient dans la dyſſenterie : les feuilles ſont réſolutives, maturatives & ſuppuratives ; en général l'uſage de cette plante potagere eſt recommandé dans toutes les maladies qui ont pour cauſe un alkali ſpontané. Les perſonnes ſujettes à l'aſthme, à la toux, aux aigreurs de l'eſtomac, & les filles attaquées des pâles couleurs, en doivent éviter l'uſage.

OSEILLE DE GUINÉE. M. *de Préfontaine* dit qu'on ſe ſert des feuilles de cette plante dans la cuiſine comme de l'oſeille de jardin, au défaut d'autre : on en fait une boiſſon agréable & des confitures. *Maiſon Ruſtique de Cayenne.* M. *Haller* dit que cette plante eſt un *geranium.*

OSERAIE. On donne ce nom à un lieu planté de jeunes *oſiers.*

OSIER, eſpece de ſaule : *voyez à l'article* SAULE.

OSINOWIECK. Nom que les habitans des environs de Kaſimof en Sibérie donnent à un champignon d'une eſpece très-ſinguliere : à peine l'a-t-on coupé que le chapeau dont il eſt couvert devient bleu ; la chair qui eſt blanche, prend également la couleur bleue lorſqu'elle eſt expoſée à l'air ; enſuite elle devient verte : le jus qu'on en exprime ſur un morceau de toile paſſe preſque ſubitement de nuances en nuances, juſqu'au vert de Saxe, & puis ſe change en bleu,

couleur qui pâlit ensuite & qu'on n'a pu encore fixer. Ce champignon croît sur-tout dans les bois où l'on trouve beaucoup de peupliers; il ressemble assez au *boletus viscidus*, espece de mousseron, mais il est plus charnu.

Nous avons observé plusieurs fois dans les bois de Chantilly, que nombre de champignons de cuisine qui paroissoient suspects au jugement des gourmets, devenoient aussi-tôt bleus à l'endroit où j'en avois enlevé une portion du chapeau.

OSMONDE. *Voyez au mot* FOUGERE.

OSSEMENS FOSSILES ou PÉTRIFIÉS. *Voyez* OSTÉOLITHES.

OSSIFRAGE, c'est l'*orfraie*: on la nomme aussi *ossifrague*.

OSSONS. Nom que les Negres de Guinée donnent aux éléphans.

OSTÉOCOLLE ou PIERRE DES ROMPUS, *lapis ossifragus aut stelechites*. C'est communément une pierre topheuse ou en forme de tuyaux qui ressemble à des racines d'arbres, ou à des portions de roseaux comme pétrifiées; elle est raboteuse, grisâtre ou blanchâtre ou jaunâtre, d'une substance marneuse, où la partie calcaire & le sable dominent tantôt plus, & tantôt moins: elle se forme par incrustation dans tous les lieux arides, sablonneux, garnis de végétaux & arrosés d'eaux qui charient avec elles les substances qui la composent, & qui la forment par dépôt. L'ostéocolle se durcit à l'air, mais tant qu'elle est en terre, elle est tendre & fragile; ce qui est cause qu'on a de la peine à la tirer en grands morceaux. *Voy. à l'article* STALACTITES de cet Ouvrage, & le Mémoire sur les Stalactites par M. *Guettard*, lequel se trouve parmi ceux de l'*Acad. Royale des Scienc. ann. 1754.* Voyez aussi les Observations sur l'ostéocolle par Mrs. *Gleditsch* & *Margraff*, *Mémoires de l'Acad. de Berlin*, *ann. 1748. pag. 35-59.* M. *Herman* fait mention d'une ostéocolle bleue de Massel, qui est aujourd'hui très-connue parce qu'elle contient cinq onces & demie d'argent par quintal.

L'ostéocolle est d'un grand usage dans la Pharmacie

d'Allemagne : on prétend que prise intérieurement, elle a la propriété de réunir les os rompus ; mais toute la propriété de cette substance fossile ne consiste guere que dans les préjugés, qu'on accueille avec enthousiasme contre toute raison : aussi *Cartheuser* l'appelle-t-il *rude, crassum & ignobile concretum.*

OSTÉOLITHES. En général on donne ce nom à des os d'animaux décharnés qu'on retire de la terre, & qui sont plus ou moins altérés : il y en a qui peuvent recevoir le poli ; quelques-uns sont colorés, d'autres sont comme calcinés : on en trouve des exemples dans les turquoises, l'unicorne fossile ou les os de mammoth, les glossopetres, les os humains, ceux d'oiseaux & de quadrupedes. On reconnoît souvent à quelle espece d'animaux ces os ont appartenu, témoins ces parties de squelettes de rhenne & d'hippopotame, qui ont été soupçonnées tels par les Académiciens de Paris, & qui ont été trouvés à mi-côte sous une même roche dans un lit de sable gris près d'Etampes, (M. *Guettard* pense que ces os ont appartenu les uns à une bête fauve & les autres au tur). Témoins encore ces os d'éléphans, de chiens ou de loups, de brebis, de chevreaux, de bœufs & de cerfs avec leurs cornes, que le Docteur *Targioni-Tozetti* a trouvés dans les collines & dans la vallée inférieure d'Arno en Toscane : on trouve quelquefois des arêtes de poissons très-bien conservées, sur-tout dans les lieux d'où l'on tire les pétrifications des matieres marines. Nous avons ramassé des côtes, des mâchoires, &c. dans les plâtrieres de Montmorenci & de Montmartre. Les environs de Dax au pied des Pyrénées offrent aussi un amas très-considérable d'os de poissons, de dents, de vertebres, & entr'autres la mâchoire d'un crocodile de l'espece appelée *gavial* dans le Gange : on a trouvé à Mary près de Meaux un os de la tête de l'hippopotame. La Sibérie, la Pologne, l'Allemagne & l'Angleterre sont remplies d'ostéolithes. *Voyez* une Dissertation Latine qui a pour titre : *Œdipus osteolithologicus, seu Dissertatio de cornibus & ossibus fossilibus Canstadiensibus*, par *David Spleisi*. Voyez aussi les *Mém. de l'Acad. Royale des Scienc. ann. 1719 & 1727.*

OSTRACITE, *ostracites*. On appelle ainsi les espèces d'huîtres proprement dites & devenues fossiles, & parmi lesquelles il y en a dont on ne rencontre pas l'analogue marin: voyez *Huître*. Quantité d'ostracites font encore effervescence avec les acides, & d'autres sont en quelque sorte assez pétrifiés & assez durcis pour faire feu avec le briquet; on en rencontre par-tout dans des lits de pierres calcaires & sableuses.

Les anciens Métallurgistes ont aussi donné le nom d'*ostracites* aux cadmies des fourneaux de fonderie. *Voy. le mot* CADMIE.

OSTRÉOPECTINITE. *Voyez* HYSTÉROLITE & TÉRÉBRATULE.

OUACAPOU. Arbre de la Guiane qui a les mêmes propriétés & usages que l'*ouapa*. Voyez ce mot.

OUAÏLLE. Arbre qui croît dans la plaine & sur les hauteurs de la Guiane, & qui sert à faire des canots & des bois de bâtiment; celui des montagnes est rouge & celui des plaines est blanc.

OVAIRE. En Botanique on entend par *ovaire* l'endroit où les semences des plantes sont attachées, & où elles reçoivent leur nourriture. En Anatomie, on entend par *ovaire* les deux corps blanchâtres, ovales, aplatis & attachés aux côtés du fond de la matrice; ils sont très-petits avant l'âge de puberté, relevés & polis dans cet âge, moins gros & ridés dans les vieilles, & remplis de cicatrices dans celles qui ont eu plusieurs enfans: il y a des choses bien singulieres à remarquer dans les ovaires; il y a les faux œufs qu'on appelle *hydatides*. L'ovaire est ordinairement de la grosseur d'un œuf de pigeon; on y trouve quelquefois vingt œufs, chacun gros comme un pois. Des Anatomistes pensent que le fœtus se forme d'un de ces œufs fécondé par la liqueur seminale du mâle, ensuite détaché de l'ovaire & porté dans la matrice. Toujours est-il vrai que les femelles ne sauroient concevoir sans les ovaires, & que celles à qui on les a coupés, cessent, dit-on, d'avoir du penchant à l'amour.

OUANDERONS ou OUANDEROU. Nom donné aux singes babouins du Ceylan. Il y en a en grande abondance, & de diverses especes, les uns sont grands

comme nos épagneuls; ils ont le poil gris & le visage noir, avec une grande barbe blanche, qui va d'une oreille à l'autre, laquelle les feroit prendre pour des vieillards sauvages; il y en a aussi dont la barbe & le corps est couleur d'écarlate pâle; ils ne vivent que de feuilles & de bourgeons: d'autres qui se nomment *rillours*, sont sans barbe, mais leur visage est blanc, & leurs cheveux se partagent comme ceux de l'homme: cette espece de singe fait beaucoup de tort aux grains. On lit dans l'*Hist. génér. des Voy. T. VIII, pag. 546, Edit. in-12.* que les Chingulais estiment autant la chair de ces especes de singes que celle de chevreuil.

Le véritable ouanderon est une espece de babouin qui a des abajoues, des callosités sur les fesses, la queue de sept ou huit pouces de long, la tête environnée d'une large criniere & d'une grande barbe de poils rudes, marche plus souvent à quatre pieds qu'à deux: il y a dans cette espece des races qui varient pour la couleur du poil; les uns ont celui du corps noir & la barbe blanche; les autres ont le poil du corps blanchâtre & la barbe noire. Lorsque les ouanderons ne sont pas domptés, ils sont si méchans qu'on est obligé de les tenir dans une cage de fer, où souvent ils s'agitent avec fureur; mais lorsqu'on les prend jeunes, on les apprivoise aisément, & ils paroissent même être plus susceptibles d'éducation que les autres babouins. Les Indiens se plaisent à les instruire, & ils prétendent que les autres singes, c'est-à-dire les guenons, respectent beaucoup ces babouins, qui ont plus de gravité & plus d'intelligence qu'elles. Les ouanderons blancs sont les plus forts de tous & les plus méchans: ils sont très-ardens pour les femmes, & assez forts pour les violer lorsqu'ils les trouvent seules, & souvent ils les outragent jusqu'à les faire mourir.

OUANGUE ou OUANGLE. *Voyez* SESAME *à l'article* JUGOLINE.

OUAPA. C'est l'orobe en arbre qui croît en Guiane dans les terres grasses: il est tortueux & souvent creux; mais il est utile pour divers ouvrages: on en fait des fourches & des piquets qu'on emploie au soutien des terres. On s'en sert dans le pays avec le plus grand suc-

rès pour le pilotis, parce qu'il se conserve dans l'eau & dans la vase. *Maiſ. Ruſt. de Cay.*

OUARINE. L'ouarine & l'alouate sont de la famille des sapajous ; & ce dernier ne differe de l'ouarine que parce qu'il n'a point de barbe bien marquée, qu'il a le poil d'un rouge-brun, au lieu que l'ouarine l'a noir. L'ouarine a la face large & carrée, les yeux noirs & brillans, les oreilles courtes & arrondies, la queue nue à son extrémité, avec laquelle il s'accroche & s'attache fermement à tout ce qu'il peut embrasser : les poils de tout le corps sont longs, luisans & polis ; des poils plus longs sous le menton & sur la gorge lui forment une espece de barbe ronde ; le poil des mains, des pieds & d'une partie de la queue est brun ; il n'a point d'abajoues, point de callosités sur les fesses ; ces parties sont couvertes de poil comme le reste du corps ; il est de la grandeur d'un levrier ; le poil long qu'il a sous le cou lui forme une espece de barbe ronde, & il marche ordinairement à quatre pieds. Ces sapajous ont une voix qui retentit comme un tambour, & se fait entendre à une très-grande distance. *Marcgrave* raconte que tous les jours, matin & soir, les ouarines s'assemblent dans les bois ; que l'un d'entr'eux prend une place élevée & fait signe de la main aux autres de s'asseoir autour de lui pour l'écouter ; que dès qu'il les voit placés il commence un discours à voix si haute & si précipitée, qu'à l'entendre de loin on croiroit qu'ils crient tous ensemble ; que cependant il n'y en a qu'un seul ; & que pendant tout le temps qu'il parle, tous les autres sont dans le plus grand silence ; qu'ensuite, lorsqu'il cesse, il fait signe aux autres de la main de répondre, & qu'à l'instant tous se mettent à crier ensemble, jusqu'à ce que par un autre signe de main il leur ordonne le silence ; que dans le moment ils obéissent & se taisent ; qu'enfin alors le premier reprend son discours ou sa chanson, & que ce n'est qu'après l'avoir encore écouté bien attentivement qu'ils se séparent & rompent l'assemblée. Ces faits dont *Marcgrave* dit avoir été plusieurs fois témoin, pourroient bien être exagérés & assaisonnés d'un peu de merveilleux : le tout, dit M. *de Buffon*, n'est peut-être fondé

que sur le bruit effroyable que font ces animaux; ils ont dans leur gorge une espece de tambour osseux, dans la concavité duquel le son de leur voix grossit, se multiplie & forme des hurlemens par écho; aussi a-t-on distingué ces sapajous de tous les autres par le nom de *hurleurs*.

OUAROUCHI. C'est l'arbre à suif de la Guiane. Il paroît un peu différent de celui dont nous avons parlé sous le nom d'*arbre à suif* de la Chine: celui de Cayenne est laiteux, & passe pour un figuier: sa graine, qui est jaune, de la figure d'une muscade, & de la grosseur d'une noisette, est couverte d'une petite pellicule, qui renferme son amande: c'est de cette amande grattée, lavée & pilée, qu'on fait une pâte qu'on doit remuer fortement dans une chaudiere jusqu'à ce qu'elle se couvre d'humidité & d'une espece de fumée: on la met alors à la presse, & il en sort le suif qui se fige: on le fait rebouillir le lendemain, on le passe dans un linge, ensuite on le jette dans un moule. L'on récolte la graine en Mars, temps où elle tombe; on la laisse sécher pendant deux ou trois jours avant que de la mettre en œuvre.

Le lait qu'on fait sortir de l'arbre, en l'entaillant, est un remede contre les vers auxquels les enfans sont sujets: on fait prendre cette matiere laiteuse avec de l'huile & du citron.

OUASSACOU. Arbre de la Guiane auquel on donne des coups de hache, pour en faire sortir le lait, prenant garde qu'il n'en saute dans les yeux, à cause de sa vertu corrosive: on prend autant d'eau que de lait, que l'on brasse avec un peu de vase; on met le tout dans une feuille, ou linge qu'on laisse tremper dans les fosses à prendre du poisson: la subtilité du poison est telle, que le poisson, enivré de cette façon, paroît sur le champ sur l'eau: il faut même éventrer ce poisson aussi-tôt après, car il se gâte en très peu d'instans. *Maisf. Rust. de Cayenne.*

OUATTE ou HERBE DE LA HOUETTE ou OUATIER. *Voyez* APOCIN & TON-NYHIOU.

OUAYE. Plante de la Guiane, appelée ainsi du nom de la Nation Indienne des Ouayes, où elle a été

d'abord connue : elle eſt fort rare en Guiane, & ne vient que dans les endroits qui lui ſont propres & particuliers. La tige ſert de *bois de meche*, ou d'amadou aux habitans ; ſon corps, dont la couleur eſt brune, fait des cannes très-propres, partagées de nœuds ; ſes feuilles ſortent de terre : elles ſont plates, courtes, en éventail, & formées comme celles du latanier ; elles ſont les meilleures de toutes celles qu'on emploie dans le pays de Cayenne, pour couvrir les maiſons ; elles durent très-long-temps, ſur-tout quand elles ſont employées par les Indiens : le feu n'y fait que ſon trou, & ne ſe communique pas au reſte. On en garnit auſſi les chapeaux de paille contre la pluie.

OUCLE, eſt une liane groſſe & épineuſe fort commune à la Côte de Mahury : on peut s'en ſervir pour faire des cercles de barriques. *Voyez* LIANE.

OUIE, eſt une ſenſation excitée par les ſons reçus dans l'oreille, c'eſt-à-dire une perception du ſon qui ſe fait dans l'ame par le ſecours de tout l'organe nommé *auditif*. Voyez ce que nous avons dit de l'*ouie* à l'article des ſens inſéré à la ſuite du mot HOMME.

OVIPARE. Se dit des animaux qui ſe multiplient en faiſant des œufs, tels que les oiſeaux, la plupart des inſectes, les cruſtacées, les ſerpens, les lézards, les tortues, &c. L'on oppoſe à cette claſſe d'animaux les vivipares, c'eſt-à-dire ceux qui produiſent leurs petits tout vivans, comme l'homme, les quadrupedes. *Voyez à la ſuite de l'article* VIVIPARE *& le mot* ŒUF.

OUISTITY. Cette eſpece de petit ſagouin, eſt des plus jolis, a la forme élégante, les mœurs douces, il n'a pas plus d'un demi-pied de longueur le corps & la tête compris ; ſa queue a plus d'un demi-pied de long & eſt marquée par des anneaux alternativement noirs & blancs, ſa face eſt nue de couleur de chair aſſez foncée ; il eſt coiffé fort ſinguliérement par deux toupets de longs poils blancs au devant des oreilles ; en ſorte que quoiqu'elles ſoient grandes, on ne les voit pas en regardant l'animal en face ; il n'a ni abajoues, ni calloſités ſur les feſſes ; ſes oreilles ſont arrondies, plates, minces & nues ; ſes yeux ſont d'un châtain rougeâtre, il marche à quatre pieds ; ils ſe

nourriſſent de fruits, légumes, inſectes, limaçons, biſcuits, même de poiſſons; on en a vu multiplier en Portugal, ce qui donne lieu de croire qu'ils pourroient auſſi multiplier dans les Provinces Méridionales de l'Europe: les petits en naiſſant ſont d'abord fort laids, n'ayant preſque point de poils ſur le corps, ils s'attachent fortement aux tettes de leur mere; quand ils ſont devenus un peu grands, ils ſe cramponnent fortement ſur ſon dos ou ſur ſes épaules, & quand elle eſt laſſe de les porter, elle s'en débarraſſe en ſe frottant contre la muraille; lorſqu'elle les a écartés, le mâle en prend ſoin ſur le champ & les laiſſe grimper ſur ſon dos pour ſoulager la femelle. On voit un ouiſtity du Mexique dans un des Cabinets de Chantilly.

OULEMARY, eſt un des grands arbres du pays de la Guiane: ſa feuille eſt luiſante, & reſſemble à celle du citronnier. Il eſt revêtu d'une écorce brune, épaiſſe de près d'un pouce. Le dedans ſe ſépare en pluſieurs feuillets rouſsâtres, unis, minces comme les feuilles du baliſier, & ſur leſquelles on peut écrire comme ſur du papier. M. *de Préfontaine* dit qu'il ſe ſouvient que ce fut par un feuillet de cet arbre, ſur lequel un Indien avoit écrit, *Oyapock eſt pris*, qu'on apprit en 1745 à Cayenne la priſe du Fort d'Oyapock: cet Indien qui étoit alors à Oyapock, trouva le moyen de faire parvenir cette lettre.

Ces feuillets ſervent aux Indiens à un autre uſage: ils roulent dedans, le plus ſerré qu'ils peuvent, une feuille de tabac, & en font ainſi ce qu'on appelle aux Iles une *cigale*, ce qui leur ſert de pipe. *Maiſ. Ruſt. de Cayenne.*

OURAGAN. Ce phénomene, qui produit quelquefois la déſolation & l'épouvante tant à la ville qu'à la campagne, eſt un tourbillon ou tournoiement d'air en tout ſens produit par des vents contraires très-violens qui s'élevent promptement, & qui ſe diſſipent bientôt après; ces ouragans ſont communs dans la mer de la Chine & du Japon, dans celles des îles de Bourbon & des Antilles, & dans pluſieurs autres endroits de la mer, ſur-tout auprès des terres avancées & des côtes élevées; mais ils ſont encore plus fréquens ſur la terre,

& les effets en ſont quelquefois prodigieux ; ſouvent on en ſent les approches par un ſifflement qui ſe fait entendre des montagnes, & ce ſifflement eſt ſuivi de pluie & de tourbillons de vent affreux. Le Pere *Fournier* dans ſon Hydrographie dit que les ſignes des vents & des tempêtes ſont, 1°. un nuage rouge ſur l'horizon, au lever ou au coucher du ſoleil ; 2°. un cercle bleuâtre ou noir autour du ſoleil lorſqu'il ſe couche ; 3°. la pâleur du ſoleil couchant & celle du ſoleil levant annoncent la pluie ; 4°. la rougeur du ſoleil couchant ; 5°. les rayons qui ſortent par le milieu des nuées qui couvrent le ſoleil levant ; car ſi le ſoleil darde ſes rayons par deſſous, il n'y a que de la pluie ; 6°. les nuées qui viennent de toutes parts & s'aſſemblent autour du ſoleil ; 7°. une nuée que le ſoleil entraîne après lui en ſe couchant ; 8°. pluſieurs cercles blanchâtres & interrompus autour de la lune, quand elle paroît rougeâtre ; 9°. enfin c'eſt ſigne d'une longue & rude tempête, lorſque la mer paroît noirâtre, & que ſon écume épaiſſe çà & là paroît s'élever ſur l'eau en bulles. On peut dire auſſi que les ouragans tiennent au ſyſtême des *mouſſons*, des *typhons* & des *gouffres ;* ceux-ci ne ſont que des tournoiemens d'eau qui ſont produits par des courans oppoſés. *Voyez* VENTS, GOUFFRE, COURANS, & *ce qui en eſt dit à l'article* MER.

M. *de Chanvalon*, dans ſon *Voyage à la Martinique*, donne la deſcription d'un ouragan furieux qui ravagea une partie de cette Ile le 12 Septembre 1756. La déſolation & la mort accompagnerent cet ouragan : ſes traces furent comme celles du feu ; tout diſparoiſſoit ſur ſon paſſage, & ce changement fut auſſi prompt qu'il étoit terrible : les maiſons furent détruites tout-à-coup il n'en reſta d'autres veſtiges que leurs débris répandus de toutes parts. Des arbres, peut-être auſſi anciens que nos établiſſemens dans cette Colonie, & dont la groſſeur énorme avoit bravé juſqu'alors tous les efforts des élémens, furent déracinés, enlevés de terre, & renverſés tout entiers ; ceux qui réſiſterent furent briſés comme de fragiles roſeaux ; les plantations de toute eſpece détruites & bouleverſées ; l'herbe même foulée

& desséchée comme si elle eût été brûlée ; l'œil appercevoit de tous côtés des crevasses & des cavernes creusées sur le penchant des côteaux, par l'éboulement des terres qu'entraînerent la chute des arbres & les torrens de pluie. Qui ne frémiroit pas en voyant des lieux toujours ornés de verdure, dépouillés dans un instant par une main invisible ! Les horreurs de l'hiver succéderent tout-à-coup aux charmes du printems ; la terre étoit comme ébranlée ou tremblante sous les pieds ; le jour étoit presque éclipsé par une obscurité qui voiloit tout le ciel, & qui présentoit par tout l'image effrayante de la nuit. Les animaux effarés cherchoient de tous côtés quelque asile pour se préserver de l'impétuosité de l'air, qui en suffoqua un grand nombre. La terreur & la consternation régnoient par tout : la Nature épouvantée sembloit toucher à son dernier terme ; & dans cet instant où tout gardoit un silence d'effroi, le vent seul se fit entendre avec un bruit semblable au tonnerre. La mer offrit en même temps le triste spectacle de tous les ravages d'une tempête ; le rivage & les eaux furent couverts des débris des naufrages ; les bâtimens fracassés & battus par les lames, flottoient de toutes parts, confondus avec les membres & les corps défigurés des malheureux qui en avoient été la victime. M. *de Chanvalon*, qui étoit témoin de ce désastre, dit que son habitation essuya ce même ravage, & que les couleurs de ce tableau ne sont ni chargées, ni noircies par la douleur.

Ces ouragans sont des phénomenes si communs en Amérique, qu'ils auroient suffi seuls pour la faire déserter, ou la rendre inhabitable depuis des siecles ; mais ces ouragans si terribles dans le moment de leur action, amenent des récoltes plus abondantes, & hâtent les reproductions de la terre, soit que de si violentes agitations ne déchirent son sein que pour le préparer à la fécondité, soit que l'ouragan charie des corpuscules propres à la végétation des plantes ; & on a remarqué que ce désordre apparent & passager étoit non-seulement une suite de l'ordre constant qui pourvoit à la régénération par la destruction même, mais un moyen de conserver ce tout, qui n'entretient sa

vie & sa fraîcheur, que par une fermentation intérieure, principe du mal relatif & du bien général.

OURDON, espece de plante qu'on nomme aussi *petit séné*, & dont les feuilles se trouvent quelquefois dans les balles de séné qu'on envoie en Europe : souvent ce n'est que du plantain séché & brisé.

OURS, *ursus*, est un animal quadrupede & sauvage, d'une structure informe par lui-même, & qui nous le paroît encore davantage, parce qu'il est couvert de longs poils qui cachent le contour de toutes les parties de son corps; sa tête a quelque rapport à celle du loup par la forme & la position oblique des yeux; les pieds de devant de l'ours posent sur la terre jusqu'au poignet, & les pieds de derriere jusqu'au milieu de la plante; son garot paroît fort élevé, parce qu'il est couvert d'un poil long & hérissé; sa queue a peu de longueur, & ses pieds de devant sont un peu tournés en dedans.

L'ours, dit M. *de Buffon*, a les sens de la vue, de l'ouie & du toucher très-bons, quoiqu'il ait l'œil très-petit relativement au volume de son corps, les oreilles courtes, la peau épaisse, le poil fort touffu : il a l'odorat excellent, & même plus exquis qu'aucun autre animal; car la surface intérieure de cet organe se trouve extrêmement étendue; on y compte quatre rangs de plans de lames osseuses, qui, séparés les uns des autres par trois plans perpendiculaires, multiplient prodigieusement les surfaces propres à recevoir les impressions des odeurs. Il a les bras & les jambes charnus comme l'homme; il a cinq orteils aux pieds de derriere; le plus gros doigt est en dehors de cette espece de main, au lieu que dans celle de l'homme, il est en dedans; ses doigts sont gros, courts & serrés l'un contre l'autre, aux mains comme aux pieds; les ongles sont noirs & fort durs. Il frappe avec ses poings, comme l'homme avec les siens : mais ces ressemblances grossieres avec l'homme ne le rendent que plus difforme, & ne lui donnent aucune supériorité sur les autres animaux.

Il n'y a aucun animal, du moins de ceux qui sont assez généralement connus, sur lequel les Auteurs

d'Hiſtoire naturelle aient autant varié que ſur l'ours : leurs incertitudes, & même leurs contradictions m'ont paru venir, dit M. *de Buffon*, de ce qu'ils n'ont pas diſtingué les eſpeces, & qu'ils rapportent quelquefois de l'une ce qui appartient à l'autre.

D'abord il ne faut pas confondre l'ours de terre avec l'ours marin, ni avec l'ours de mer, appelé communément *ours blanc*, *ours de la mer glaciale ;* ce ſont des animaux très-différens, tant pour la forme du corps, que pour les habitudes naturelles; voyez *ours blanc* & *ours marin*. Enſuite il faut diſtinguer deux eſpeces dans les *ours terreſtres*, les *bruns* & les *noirs*, leſquels n'ayant pas les mêmes inclinations, les mêmes appétits naturels, ne peuvent être regardés comme des variétés d'une ſeule & même eſpece, mais doivent être conſidérés comme deux eſpeces diſtinctes & ſéparées. De plus, il y a encore des ours terreſtres qui ſont naturellement blancs, & non point par la rigueur du climat qui les faſſe blanchir dans l'hiver, comme les hermines ou les lievres.

Quoique ces ours reſſemblent aux ours de mer par la couleur, ils en different par tout le reſte, autant que les autres ours. On trouve ces eſpeces d'ours dans la grande Tartarie, en Moſcovie, en Lithuanie & dans les autres Provinces du Nord.

C'eſt dans les Alpes que ſe trouve aſſez communément l'*ours brun*, & rarement l'*ours noir*, qui ſe trouve au contraire en grand nombre dans les forêts des pays Septentrionaux de l'Europe & de l'Amérique. Le *brun* eſt féroce & ſouvent carnaſſier; mais comme dit M. *Haller*, il ne l'eſt que par néceſſité, il mange avec plaiſir toute ſorte de fruits, des raiſins même & du pain. C'eſt la faim qui le contraint d'attaquer des troupeaux. On éleve les petits, & on les garde dans des foſſes, en leur donnant des eſpeces de ſoupes ſans leur laiſſer goûter de chair. L'*ours noir* n'eſt que farouche, & refuſe conſtamment de manger de la chair : celui-ci eſt ſi friand de miel & de lait, lorſqu'il en rencontre, qu'il ſe laiſſeroit plutôt tuer, que de lâcher priſe. Suivant le témoignage de M. *du Pratz*, on en voit à la Louiſiane deſcendre en troupes des montagnes couvertes de neige; preſſés par la faim, ils ne recherchent que des fruits & des racines,

nourriture que les bêtes uniquement carnassieres refusent de manger. On dit qu'il y a en Savoie & en Canada des *ours rougeâtres* qui sont aussi carnassiers que les loups.

Les *ours noirs* n'habitent gueres que les pays froids; mais on trouve des ours bruns ou roux dans les climats froids & tempérés, & même dans les régions du Midi. Ils étoient communs chez les Grecs; les Romains en faisoient venir de Lybie, pour servir à leurs spectacles: on trouve des ours dans tous les pays déserts, escarpés, ou couverts; on n'en trouve point dans les pays bien peuplés, si ce n'est peut-être quelques-uns dans les montagnes les moins fréquentées.

L'ours selon M. *de Buffon*, est non-seulement sauvage, mais solitaire: il fuit par instinct toute société; il s'éloigne des lieux où les hommes ont accès; il ne se trouve à son aise que dans les endroits qui appartiennent à la vieille nature: une caverne antique dans des rochers inaccessibles, une grotte formée par le temps dans le tronc d'un vieux arbre, au milieu d'une épaisse forêt, lui servent de domicile; il s'y retire seul, y passe une partie de l'hiver sans provisions, sans en sortir pendant plusieurs semaines: cependant il n'est point engourdi, ni privé de sentiment, comme le loir ou la marmotte. Mais, comme il est naturellement gras, & qu'il l'est excessivement sur la fin de l'automne, temps auquel il se recele, cette abondance de graisse lui fait supporter l'abstinence, & il ne sort de sa bauge ou taniere, que lorsqu'il se sent affamé.

On prétend que c'est environ au bout de quarante jours que les mâles sortent de leurs retraites; mais que les femelles y restent quatre mois, parce qu'elles font leurs petits. J'ai peine à croire, continue M. *de Buffon*, qu'elles puissent non-seulement subsister, mais encore allaiter leurs petits, sans prendre elles-mêmes aucune nourriture pendant un aussi long espace de temps. S'il est vrai que les mâles, pressés par le besoin de prendre de la nourriture, sortent au bout de quarante jours, il n'est pas naturel de penser que les femelles ne soient pas encore plus pressées du même besoin, puisqu'en allaitant leurs petits, elles se trouvent doublement épuisées; à moins qu'on ne veuille supposer qu'elles en dé-

vorent quelques-uns avec leurs enveloppes, & tout le reste du produit superflu de leur accouchement; ce qui ne me paroît pas vraisemblable, malgré l'exemple des chattes, qui mangent quelquefois leurs petits. Au reste, nous ne parlons ici que de l'espece des ours bruns, dont les mâles dévorent en effet les ourſons nouveaux nés, lorsqu'ils les trouvent dans leurs bauges. Mais les femelles, au contraire, semblent les aimer jusqu'à la fureur: elles sont, lorsqu'elles ont mis bas, plus féroces, plus dangereuses que les mâles; elles combattent, & s'exposent à tout pour sauver leurs petits.

C'est vers l'automne que les ours se recherchent; la femelle est, dit-on, plus ardente que le mâle: on a vu l'ourse qu'on avoit séparée de son mâle & qu'on lui avoit ensuite rendu, embrasser le mâle avec une joie & une tendresse marquée. On prétend qu'elle se couche sur le dos pour le recevoir, qu'elle l'embrasse étroitement, qu'elle le retient long-temps; mais il est plus certain qu'ils s'accouplent à la maniere des quadrupedes. On a vu des ours captifs s'accoupler & produire; mais on n'a point observé le temps de la gestation: comme l'ours vit vingt ou vingt-cinq ans, & que le temps de la gestation est ordinairement proportionné à celui de la durée de la vie, il y a lieu de croire que la gestation est de plusieurs mois. Le mâle & la femelle n'habitent point ensemble, le plaisir ne les réunit qu'un moment: ils ont chacun une retraite séparée, & même fort éloignée. Lorsqu'ils ne peuvent trouver une grotte pour se gîter, ils grimpent sur les arbres, cassent des branches & ramassent du bois pour se faire une loge, qu'ils recouvrent d'herbes & de feuilles au point de la rendre impénétrable à l'eau. La femelle prépare à ses petits *ourſons* un lit de mousse & d'herbe dans le fond de sa caverne: elle n'en a ordinairement qu'un, deux, trois ou quatre, qui ont besoin du secours de leur mere, & la suivent pendant un an ou deux.

La voix de l'ours est un grondement, un gros murmure, souvent mêlé d'un frémissement de dents, qu'il fait sur-tout entendre lorsqu'on l'irrite: il est très-suf-

ceptible de colere, & ſa colere tient toujours de la fureur & ſouvent du caprice. Quoiqu'il paroiſſe doux pour ſon maître & même obéiſſant lorſqu'il eſt apprivoiſé, il faut toujours s'en défier & le traiter avec circonſpection; ſur-tout ne le pas frapper au bout du nez, ni aux parties de la génération. On lui apprend à ſe tenir debout, à geſticuler, à danſer; il ſemble même écouter le ſon des inſtrumens, & ſuivre groſſiérement la meſure: mais pour lui donner cette eſpece d'éducation, il faut le prendre jeune & le contraindre pendant toute ſa vie. On voit à Berne, ville d'un Canton de la Suiſſe, la foſſe aux ours; ce ſont deux eſpeces d'antres ouverts, dans leſquels on nourrit pluſieurs ours qui, pour être habitans d'une cité très-peuplée, n'en paroiſſent pas moins cruels: (ils ont déchiré des malheureux qu'une infortune avoit expoſé à leur férocité:) ce monument eſt ſans doute conſacré aux armes de la ville & du Canton qui ſont un ours. L'ours ſauvage ne ſe détourne pas de ſon chemin, ne fuit pas à l'aſpect de l'homme; (il n'attaque pourtant qu'à l'extrémité, dit M. *Haller*, & il y a plus d'un exemple où cet animal a laiſſé paſſer même des femmes ſans les inſulter:) cependant on prétend qu'en Iſlande par un coup de ſifflet on le ſurprend, on l'étonne au point qu'il s'arrête & ſe leve ſur les pieds de derriere; on lui jette un gant pour l'amuſer, car il ne manque jamais d'en tourner & retourner chaque doigt: c'eſt-là le temps qu'il faut prendre pour le tirer.

Ces animaux qui rempliſſent en été les forêts & les campagnes du pays de Kamtſchatka, ſont peu farouches & n'attaquent jamais un homme, à moins qu'ils ne le trouvent endormi, encore en tuent-ils rarement. Ce qu'il y a de plus ſingulier, c'eſt que les ours de cette contrée ne font jamais de mal aux femmes; lorſqu'elles vont pendant l'été cueillir des fruits ſauvages, ces animaux les ſuivent & ne leur font d'autre mal que de leur dérober quelques-uns des fruits qu'elles ont ramaſſés. Quelle peut être la raiſon phyſique de cette ſorte de prédilection que certains animaux paroiſſent avoir pour les femmes?... Les habitans ont pluſieurs manieres de tuer ou de prendre ces ours, mais le moyen

le plus extraordinaire eſt celui que nous allons décrire. Un homme prend dans ſa main gauche un couteau, & à ſa main droite un ſtilet aiguiſé par les deux bouts, & une corde dont il enveloppe ſon bras; il s'avance ainſi vers un ours, lequel ſe dreſſe comme d'ordinaire ſur ſes pattes de derriere & attaque le Chaſſeur la gueule ouverte. Celui-ci avec autant d'adreſſe que de courage, enfonce ſa main dans la gorge de l'ours & y place le ſtilet verticalement, de maniere que non-ſeulement cet animal ne peut plus refermer ſa gueule, mais qu'il eſt forcé par les douleurs cruelles qu'il reſſent, de ſuivre le Chaſſeur ſans réſiſtance par-tout où l'on veut le mener: on tue l'animal; c'eſt un jour de fête, on le mange avec ſes voiſins & ſes amis. Il y a une maniere bien moins dangereuſe de prendre ces animaux, ainſi qu'il ſe pratique en Suede, en Norwege, en Pologne, &c. c'eſt de les enivrer en jetant de l'eau-de-vie ſur le miel qu'ils aiment beaucoup, & qu'ils cherchent dans les troncs d'arbres. A la Louiſiane & en Canada où les ours noirs ſont très-communs, (on en voit un dans la Ménagerie de Chantilly), ils ſe nichent dans des troncs d'arbres pourris à la hauteur quelquefois de trente ou quarante pieds, car ils grimpent très-bien: on met le feu à l'arbre, & quand la mere deſcend on la tue avant qu'elle ſoit à terre. Les petits deſcendent enſuite, on les prend en leur paſſant une corde au cou, & on les emmene pour les élever ou pour les manger, car la chair de l'ourſon eſt délicate & bonne: celle de l'ours eſt mangeable & même fort eſtimée en Chine; mais comme elle eſt mêlée d'une graiſſe huileuſe, il n'y a guere que les pieds dont la ſubſtance eſt plus ferme, qu'on puiſſe regarder comme une viande délicate. En Allemagne ils ſont encore réſervés pour la table des Princes, où l'on ſert des pattes d'ours ſalées & enfumées. Les Kamtſchadales mangent la chair & la graiſſe de cet animal; & quand ils ont tué un ours, ils ſont obligés de régaler leurs voiſins.

La chaſſe de toutes les eſpeces d'ours eſt aſſez dangereuſe, dit M. *Bourgeois*, car ſi on ne fait que bleſſer cet animal ſans l'arrêter, il ſe met en furie & court ſur

le Chaſſeur qu'il aſſomme avec ſes pattes antérieures & déchire avec ſes griffes ; il l'embraſſe auſſi avec ces mêmes pattes & cherche à l'étouffer : le Chaſſeur ne peut échapper au danger qu'en montant ſur un arbre, pourvu qu'il ſoit armé d'un bon coutelas ; il n'a qu'à couper les pattes de l'ours lorſqu'il grimpe après lui ſur l'arbre où il s'eſt réfugié, ce qui le fait tomber tout de ſuite à terre, & alors il a le temps de charger ſon fuſil pour le tuer. Cette chaſſe eſt très-utile lorſqu'on la fait avec quelque ſuccès. La peau eſt de toutes les fourrures groſſieres celle qui a le plus de prix ; la quantité d'huile qu'on retire de l'ours eſt conſidérable. A la Louiſiane on voit dans l'automme des ours qui ſe font tellement engraiſſés, qu'ils n'ont pas la force de marcher, ou du moins qu'ils ne peuvent courir auſſi vîte qu'un homme. Les ours noirs de ce pays s'engraiſſent ainſi en mangeant des patates, du mahis & les fruits des plaqueminiers ſur leſquels ils grimpent, ils ſe mettent à califourchon ſur une branche, ſe tiennent d'une patte & de l'autre cueillent les fruits. La graiſſe dont les ours ſont chargés les rend très-légers à la nage ; on leur trouve en automne juſqu'à dix doigts d'épaiſſeur de graiſſe aux côtes & aux cuiſſes ; le deſſous de leurs pieds eſt gros & enflé : lorſqu'on le coupe il en ſort un ſuc blanc & laiteux. Cette partie paroît compoſée de petites glandes qui ſont comme des mamelons, & c'eſt ce qui fait que pendant l'hiver dans leurs retraites ils ſucent continuellement leurs pattes. On prépare la graiſſe d'ours, on la purifie ; on en retire une huile claire qui ſurnage, qui, dit-on, eſt auſſi bonne que la meilleure huile d'olive & ſert aux mêmes uſages. Au deſſous de cette huile on trouve un ſain-doux auſſi blanc, mais un peu plus mou que le ſain-doux de porc, & qui ſert aux beſoins de la cuiſine. Les Sauvages trafiquent beaucoup avec les François de l'huile d'ours ; on dit qu'elle ne ſe fige guere que par un grand froid, que quand cela arrive elle eſt toute en grumeaux, & d'une blancheur à éblouir. En France les Epiciers-Droguiſtes ne tiennent point d'huile d'ours ; mais ils font venir de Savoie, de Suiſſe ou de Canada, de la graiſſe ou axonge qui eſt rarement pu-

rifiée : on se sert de cette graisse comme de topique, pour les hernies, les rhumatismes, &c. & beaucoup de gens assurent en avoir ressenti de bons effets. On dit que la graisse d'ours est encore très-utile pour faire croître & épaissir les cheveux des enfans & des convalescens qui les ont perdu dans quelque maladie.

OURS À FOURMIS. *Voyez* FOURMILLIER.

OURS BLANC ou OURS DE LA MER GLACIALE, *ursus albus maris glacialis*. Nom donné à un animal très-cruel, très-vorace qui attaque les animaux, même les hommes, & se jette sur les cadavres. Il ne faut pas confondre l'ours blanc de mer avec l'ours blanc terrestre; ce sont des animaux très-différens par plusieurs caracteres. L'ours blanc de mer est seul de son genre, & ne se trouve que le long de la mer septentrionale.

Voici la copie d'une lettre adressée à feu S. A. S. Monseigneur le Duc de Bourbon, & que nous avons trouvée dans le dépôt des Cabinets de Chantilly; elle concerne les *ours blancs* & les *loups de Labrador*, pays de la Nouvelle France.

« M. *de Brouague*, Commandant à Labrador, revenant de Québec dans un canot d'écorce, lui cinquieme, a trouvé à la mer, à une lieue & demie au large de la côte, & à 15 lieues de son poste situé à la côte de Labrador, pays des Esquimaux, un ours blanc qu'il apperçut nageant à la mer; il lui tira un coup de fusil, & l'ayant manqué l'ours plongea & vint au canot. L'ayant apperçu dans l'eau il le fit éviter, & l'ours s'étant remis à nager il s'en éloigna toujours jusqu'à ce que son fusil fût chargé; il lui tira un second coup & le blessa au cou, & la balle sortit par la mâchoire.

» L'ours replongea & revint une seconde fois entre deux eaux au canot. Il l'apperçut une seconde fois, fit la même manœuvre que la premiere, & l'ours s'étant remis à nager il lui tira un troisieme coup, ayant chargé son fusil à deux balles, & le tua roide.

» M. *de Brouague* fit approcher son canot de cet animal, qui alors flottoit sur l'eau; il lui fit attacher une corde à la patte, & le remorqua à terre avec son canot.

» En arrivant à la côte il y trouva des Sauvages qui » étoient venus au coup de fusil qu'ils avoient entendu ; ils se mirent tous à tirer à terre cet animal, » qui pesoit aux environs de deux mille, & ils étoient » tant hommes que femmes, plus de quarante à le » mettre à sec. Les Sauvages mangent ces animaux, » & il fut bientôt partagé entr'eux.

» *M. de Brouague* en réserva seulement pour lui la » peau & un des paturons qu'il fit écorcher ; les Sau» vages mangerent la chair ; & la peau de dessous & » de dessus le paturon avoit trois pieds de large. Il » a apporté cette peau du paturon en France, laquelle » après s'être retirée, a encore vingt-un pouces de » large. (Cette piece qui s'est un peu rétrécie se voit actuellement dans l'un des Cabinets de Chantilly).

» C'est le deuxieme ours blanc qu'il a tué à la mer ; » il en a tué trois autres à terre, dont il y en avoit un » qui étoit plus gros & qui pesoit environ trois milliers.

» Il y a de ces animaux qui sont aussi gros que trois » moyens bœufs ; ils ont les jambes plus courtes que » celles du bœuf & considérablement plus grosses, » avec cinq griffes à chaque pied. Ils ont environ sept » à huit pieds de long, la queue de trois à quatre » pouces de long, le cou court & prodigieusement » gros, la tête aussi très-grosse & faite comme celle » d'un mouton, à l'exception que dessous le menton » il s'y trouve quantité de poil long de plus d'un pied, » ce qui lui forme une barbe comme à une chevre, » mais bien plus fournie.

» La peau de cet animal est couverte d'un poil blanc » & luisant, qui est gros & assez court. Il a à chaque » patte cinq griffes noires, au lieu que les ours noirs » ont des doigts comme ceux d'un homme, qui sont » très-délicats à manger. Le poil de dessous les pattes » de l'ours blanc est long & en grande quantité.

» On ne fait nul usage de sa peau, & les Sauvages » se servent seulement de la peau des jeunes pour » faire des mitaines, & mettent le poil en dedans.

» La chair de cet animal est fort vermeille & tendre » comme celle de l'ours noir, mais elle n'est pas si » bonne à manger.

» La graisse ne s'en fige point, non plus que celle » de l'ours noir, mais elle est bien plus pénétrante. » Les Sauvages la boivent comme un grand régal.

» Cet animal va par préférence à la mer; il y vit » de loups marins, de poissons & de coquillages; & » quand la mer est glacée & qu'il ne trouve plus à » y manger, il va à terre où il vit de la chasse que » les loups y font au caribou: en sorte que quand un » ours blanc arrive dans un endroit où un loup marin a » tué un caribou, le loup s'en va sur le champ de peur » d'être mangé, & abandonne sa proie; il manque » par-là souvent de nourriture, & devient fort maigre » jusqu'à ce qu'il puisse retourner à la mer.

» Il y a à la côte de Labrador de très-gros loups » & de différentes couleurs, y en ayant de noirs, de » gris sale, d'argentés, de blancs & de roux. On en » trouve des bandes de cinquante qui marchent en- » semble.

» L'ours blanc marche au plus trois ensemble, sa » femelle & deux petits. Il ne cabane point l'hiver » comme l'ours noir; il va à terre plus vite qu'un » homme, & à la mer nage fort vite, & de manière » que c'est tout ce que quatre hommes dans un canot » peuvent faire que de s'en éloigner.

» Il se trouve à présent à cette côte très-peu d'ours » blancs, ils se retirent du côté de la baie d'Hudson; » la quantité de navires qui vont à la pêche & les ha- » bitations de quelques François à la côte les en ont » éloignés.

» Il y a aussi très-peu d'ours noirs.

» Il se trouve aussi de ces ours blancs au nord du » lac supérieur, & il en a été tué dans la rivière de » Nepigon. Ceux de ce pays-là sont plus souvent dans » le lac & dans les rivières qu'à terre.

» Il y a beaucoup de ces ours blancs dans la Na- » polie & à la Nova Zembla, qui veut dire en Russe » *nouvelle terre;* ils sont aussi gros & aussi féroces que » dans le nord de l'Amérique ».

Il paroît que l'ours blanc est une espece différente de l'ours marin, dont le poil est coloré ou nué de

différentes teintes, & dont nous parlerons à l'article *Ours marin*. Sa description est très-curieuse.

L'ours blanc n'est point amphibie comme les phoques, & ne peut point rester sous l'eau aussi longtemps qu'il le voudroit, ainsi que l'ont avancé quelques Auteurs. Le contraire est évident, dit M. *de Buffon*, & résulte de la maniere dont on les chasse; ils ne peuvent nager que pendant un petit temps, ni poursuivre de suite un espace de plus d'une lieue. On les suit avec une chaloupe, & on les force de lassitude. S'ils pouvoient se passer de respirer, ils se plongeroient pour se reposer au fond de l'eau; mais s'ils plongent, ce n'est que pour quelques instans; & dans la crainte de se noyer, ils se laissent tuer à fleur d'eau.

La proie la plus ordinaire des ours blancs sont les phoques, qui ne sont pas assez forts pour leur résister; mais les morses auxquels ils enlevent quelquefois leurs petits, les percent de leurs défenses & les mettent ensuite à mort. Il en est de même des baleines; elles les assomment par leur masse, & les chassent des lieux qu'elles habitent, où néanmoins ils ravissent & dévorent souvent les petits baleineaux ou baleinons.

OURS MARIN. C'est une espece d'animal demi-amphibie, vivipare, de l'ordre des *phoques*, assez semblable à l'ours pour la figure de sa tête, l'instinct, la maniere dont il exécute les mouvemens de la partie antérieure de son corps, & la férocité de son naturel. L'histoire de ces animaux présente des particularités assez singulieres.

M. *Steller*, de l'Académie de Petersbourg, qui s'est trouvé dans le cas de pouvoir observer les ours marins, dit que ces animaux changent de climats comme les *oies*, les *cygnes* & les *hirondelles* parmi les oiseaux; les *truites* parmi les poissons; les *lievres* & les *rats* parmi les quadrupedes. Certains animaux ne changent de demeure que pour chercher de la nourriture quand ils commencent à en manquer. Les oiseaux cherchent des lieux solitaires, & les poissons des mers tranquilles pour y déposer plus surement leurs œufs, pour y peupler sans être inquiétés & pour réparer leurs forces. La Nature a donné le même instinct aux ours marins;

ils cherchent les mers méridionales & les îles désertes qui sont en grand nombre entre l'Amérique & l'Asie, depuis le cinquantieme degré de latitude jusqu'au cinquante-sixieme ; ils s'arrêtent dans les parties du Continent qui paroissent les plus tranquilles ; c'est-là qu'ils se livrent à leurs amours & multiplient sans trouble ; les femelles y mettent bas leur portée, nourrissent leurs petits & s'en retournent avec eux au bout de trois mois dans leurs premieres demeures. Comme on voit de ces demi-amphibies dans l'hémisphere boréal, il y a lieu de croire que cette même espece d'animaux se trouve tant dans l'hémisphere boréal que dans l'hémisphere austral sous le même degré de latitude. Les meres mettent leurs petits au jour vivans ; ils sont en naissant d'un noir très-brillant, mais au bout de quatre ou cinq jours les poils des pieds de devant changent un peu de couleur ; le ventre qui se termine en cône & les côtés se bigarrent.

Les mâles, dès en naissant, sont plus grands & plus forts que les femelles, leur peau devient de jour en jour plus noire ; au lieu que celle des femelles est constamment cendrée, avec quelques taches rousses sous les pieds. Lorsque les femelles ont mis bas, elles coupent avec les dents le cordon ombilical ; & à force de le lécher, elles arrêtent le sang & dessechent le cordon. Leurs petits naissent les yeux ouverts, ils les ont fort grands & saillans, & la bouche armée de trente-deux dents ; mais les dents canines qui sont les plus grandes, les plus fortes, & dont ils font le plus d'usage dans leurs combats, ne paroissent que le quatrieme jour : elles sont tournées vers le gosier.

Les femelles ont pour leurs petits une tendresse extrême ; elles ne les quittent pas, & sont toujours rassemblées avec eux sur le bord du rivage où elles passent une partie du temps à dormir. La jeunesse folâtre entr'elle comme de jeunes chiens, ils imitent leurs peres & s'exercent déjà aux combats. Si l'un d'eux renverse l'autre à terre, le pere survient en murmurant, les sépare, caresse le vainqueur, le leche tendrement & légérement ; car sa langue est très-rude : il l'oblige quelquefois à se coucher sur la terre, &

s'il réſiſte il paroît l'en aimer davantage : le pere ſemble s'applaudir & ſe féliciter d'avoir un ſucceſſeur digne de lui ; mais il témoigne moins d'empreſſement pour les lâches : ces poltrons ſont toujours à la ſuite de la mere, tandis que les courageux accompagnent leur pere par-tout.

Les ours marins, quoique raſſemblés par milliers, ſont toujours diviſés par familles ; une famille eſt ſouvent compoſée de cent vingt ; chaque mâle a ſon ſérail formé de quinze & juſqu'à cinquante femelles : il les poſſede ſeul ; jaloux par nature, il les garde avec beaucoup de ſoin & d'inquiétude : ſi quelque rival en approche & oſe les lui diſputer, il entre en fureur, & le combat le plus ſanglant commence entre ces deux amans. Les ſultanes tranquilles alors ſpectatrices ſe déterminent à ſuivre le vainqueur, le lechent amoureuſement, & pouſſent en commun des cris de victoire.

Ces animaux ſont d'une intrépidité étonnante : lorſqu'ils ont une fois pris un poſte, rien que la mort ne peut le leur faire quitter ; ils ne permettent point aux autres de venir s'établir trop près d'eux. Lorſqu'il s'éleve des ſujets de guerre entr'eux, on les voit quelquefois ſe battre une heure entiere, ſe tendre des pieges, ſe coucher de laſſitude, l'un auprès de l'autre, haletans, ſans force & ſans mouvement ; puis ſe relevant tout-à-coup l'un & l'autre, s'exciter & recommencer avec chaleur un nouveau combat. Chaque athlete ne quitte point la place qu'il a priſe : ils tournent la tête de côté, & ſe frappent de bas en haut, chacun tâchant d'éviter le coup de ſon adverſaire. Tant qu'ils ſont d'égales forces, ils ne peuvent frapper que des pieds ; mais bientôt le plus fort ſaiſit ſon adverſaire avec les dents & le terraſſe ; les autres ours, ſpectateurs du combat, accourent alors au ſecours du plus foible, & terminent la querelle.

On les voit toujours, dit M. *Steller*, prêts à ſecourir le foible & l'opprimé. Si deux ours en attaquent un ſeul, les autres, comme indignés de l'inégalité du combat, viennent à ſon ſecours : ceux qui ſont encore dans la mer, levent la tête pour contempler ce ſpectacle ſanglant ; alors il ſe fait des partis : la colere les

enflamme, ils s'animent, sortent de l'eau, & viennent tout furieux se jeter dans la mêlée & augmenter le carnage.

Les *ours marins*, comme nous l'avons dit, ne quittent point leurs postes. Quelquefois les Voyageurs obligés de poursuivre leur chemin écartent ces animaux, en les attaquant à coups de pierres, sur lesquelles ils se jettent, & qu'ils saisissent avec cette fureur qu'on remarque quelquefois dans les chiens; leur rage en augmente, & ils rempliſſent l'air d'hurlemens affreux. Lorsqu'on veut les attaquer, on s'attache d'abord à leur crever les yeux, & à leur casser les dents à coups de pierres: mais quoiqu'aveugle & couvert de blessures, un ours marin ne quitte jamais sa place, parce que s'il s'en éloigne d'un pas, les autres se jettent sur lui, & l'obligent à coups de dents de la reprendre, & quelquefois le mettent en pieces. Si quelques-uns d'entr'eux accourent à lui pour l'empêcher de fuir, d'autres les soupçonnent de vouloir fuir eux-mêmes, & se jettent sur eux; ce qui donne lieu à différens combats particuliers, & forme un spectacle curieux, mais horrible.

On voit ces ours marins rester un mois entier dans la même place, sans la quitter un seul moment. On a tué de ces animaux dans ces circonstances, on les a ouverts, & on n'a trouvé dans l'estomac & les intestins que de l'écume sans excrémens. On a remarqué que le panicule adipeux diminuoit tous les jours, ainsi que la circonférence de leur corps, & que leur peau devenoit si flasque, qu'elle pendoit de tous les côtés comme un sac; ce qui fait croire que pendant ce temps d'inaction & de repos ces demi-amphibies ne se nourrissent que de leur propre graisse, qui est repompée par les vaisseaux absorbans.

L'accouplement de ces animaux se fait, dit-on, sur le bord des eaux, ils n'ont que la tête dehors. Pour cette fonction la femelle se couche sur le dos, & reçoit son mâle entre ses bras, elle le serre vigoureusement; le mâle appuie mollement l'extrémité de ses levres sur celles de sa femelle, comme s'il vouloit la baiser. Cette opération se fait ordinairement vers la

fin du jour. Une heure avant que de s'accoupler, le mâle & la femelle nagent tranquillement à côté l'un de l'autre, & reviennent sur la greve ; ensuite le mâle appuyé sur ses pieds de devant se livre ardemment à son instinct ; ses pieds sont entiérement cachés dans le sable, dans lequel son poids fait enfoncer tout le corps de la femelle, à l'exception de la tête ; ils sont si fort occupés de leurs amours qu'on est souvent long-temps à les examiner avant qu'ils s'en apperçoivent. Si on s'avisoit de les troubler & de les distraire, le mâle quitteroit sa femelle, se jetteroit sur la personne & la dévoreroit, si elle ne pouvoit se sauver par la fuite, ou tuer l'animal.

Quand les ours marins sortent de l'eau, ils secouent tout le corps, se frottent la poitrine & arrangent ce qu'ils peuvent de leurs poils avec leurs pieds de derriere, lesquels sont palmés. Lorsqu'ils sont couchés à quelque abri au soleil, ils élevent les pieds de derriere en haut, & les remuent sans cesse, comme les chiens remuent la queue. Ils se couchent tantôt sur le dos, tantôt sur le ventre, tantôt tout le corps plié en cercle. Quelque profond que soit leur sommeil, avec quelque précaution qu'un homme puisse marcher, ils s'en apperçoivent & s'éveillent. Le sentent-ils, l'entendent-ils ? C'est ce qu'on n'a pas encore découvert.

On dit que ces animaux nagent avec tant de facilité, qu'ils peuvent faire plus de deux mille d'Allemagne par heure. Quand ils nagent sur le ventre, on ne voit jamais leurs pieds de devant, mais ceux de derriere paroissent souvent hors de l'eau. Ces animaux peuvent demeurer très-long-temps dans l'eau, parce qu'ils ont le trou ovale un peu ouvert.

Les Kamtschadales attaquent & blessent les ours marins avec une espece de javelot troué, dont le fer abandonnant le bois, reste dans le corps de l'animal ; & comme il entre de biais, il n'en peut sortir : le fer est arrêté à une corde très-forte, dont les Pêcheurs tiennent l'autre extrémité. L'animal blessé fuit avec la vitesse d'une fleche, entraîne avec lui la barque, jusqu'à ce que fatigué par sa course & épuisé par la perte de son sang, il s'arrête. Dans ce moment les Pêcheurs tirent

tirent à eux la corde, percent l'ours de leurs lances ; & s'il fait quelques mouvemens pour renverser la barque, on lui coupe les pieds de devant avec une hache. Ils s'attachent particuliérement aux femelles qui viennent de mettre bas au printems, & entre les mâles aux plus jeunes. On voit une grande quantité de ces ours marins dans l'île de *Béring*. La chair & la graisse des mâles est fort dégoûtante, celle des femelles est délicate.

OURS DE MER. Nom donné à un crustacée, sans piquans, que l'on pêche en Walachie, en Bulgarie & en Servie : c'est le même qu'on appelle à Naples & à Messine, *messacara*.

OURSE. Nom de deux constellations voisines du pôle Septentrional, l'une portant le nom de *grande ourse*, l'autre celui de *petite ourse ;* cette derniere est celle où se trouve l'étoile polaire, ainsi nommée parce qu'elle n'est qu'à deux degrés du pôle. Suivant *Ptolomée*, la grande ourse est composée de 35 étoiles.

OURSIN DE MER, Bouton ou Chataigne de mer, ou Hérisson de mer, *echinus marinus*. C'est un genre de coquille multivalve, de forme voûtée, plus ou moins convexe, ronde, ovale, à pans irréguliers, quelquefois aplatie & toute unie, d'autres fois mamelonnée & élevée. L'ourſin est composé d'une quantité prodigieuse de pieces de rapport à sutures & fragiles, couvertes de pointes fort nombreuses, assez semblables en cela, & pour la forme, aux enveloppes des châtaignes. Ces pointes tombent souvent après la mort de l'animal, & laissent alors à découvert les apophyses & les petits trous sans nombre dont la coquille est couverte ; l'appareil avec lequel est formé cet animal est merveilleux.

Ce ver testacée ou coquillage est fort connu sur le bord des mers, & particuliérement sur les côtes de la Méditerranée : il y en a de noirs, de verts, de rouges, de purpurins ou violets ; mais ces couleurs s'alterent après la mort de l'animal : les uns habitent les bords des mers ; d'autres vivent en haute mer. Leurs piquans sont plus ou moins gros & plus ou moins longs, les uns sont obtus, d'autres très-pointus & plus ou moins

durs ; auſſi voit-on des ourſins qui ne ſont revêtus que de petites pointes ſemblables au poil des animaux, tandis que d'autres ont des pointes fort grandes en forme de baguettes. Ces piquans ſont ou ronds, ou triangulaires, en un mot de différentes configurations, ſelon l'eſpece d'ourſin, mais tous ſont aſſez durs & ſe caſſent net : ils ſervent de pieds à l'animal ; car quand il veut aller d'un lieu à un autre, il s'appuie ſur ces pointes, mobiles dans leurs charnieres, & tourne non ſur lui-même, mais aſſez horizontalement : ſon mouvement progreſſif eſt ſi prompt, qu'il eſt ſouvent difficile de l'attraper. M. *de Réaumur* eſt le premier qui nous a donné une idée exacte du ſquelette de l'animal, & qui a développé la mécanique ſinguliere de ſon mouvement progreſſif. *Mém. de l'Acad. des Sciences, ann. 1712.*

Ce qui ſert de tête aux ourſins eſt placé au centre inférieur, c'eſt la partie concave, qui eſt toujours contre terre : mais la partie par où ils fientent eſt en-deſſus, quelquefois auſſi en-deſſous près de la bouche même. Cet animal a cinq dents aiguës & viſibles, creuſes en dedans, ſemblables à des oſſelets, qui toutes enſemble ont la figure d'une lanterne (auſſi l'appelle-t-on la *lanterne d'Ariſtote*), & entre leſquelles eſt un petit morceau de chair qui lui ſert de langue, à laquelle eſt attaché le goſier, enſuite le ventre, diviſé en cinq parties, de ſorte que l'on diroit que l'ourſin a pluſieurs ventres ſéparés les uns des autres & pleins d'excrémens ; mais ils dépendent d'un ſeul ventricule, & tous ſe terminent à un boyau culier. Ainſi les ourſins n'ont que deux ouvertures proprement dites, dont l'une eſt la bouche & l'autre l'anus.

Les ourſins n'ont point de chair vers le ventre comme au reſte du corps : leurs œufs ſont attachés aux cinq pans ou parois ou lobes intérieurs de la coquille en grand nombre ; les ourſins ſont tous bons à manger ; leur couleur eſt rouge étant cuits ; ils ont le goût des écreviſſes, ſur-tout ceux de la Méditerranée.

On prétend avoir obſervé que ces animaux préſagent la tempête, & qu'ils coulent à fond pendant l'orage, en s'attachant aux plantes du fond de la mer,

ou à d'autres corps, avec des filets gonflés par le bout, d'une substance assez semblable aux cornes des limaçons : on a compté plus de treize cents de ces filets, ce sont autant de cordages dont l'animal se sert, soit pour tâter le terrain, soit pour se tenir à l'ancre dans le fort de la tempête. Ces filets sortent par les petits trous dont nous avons parlé : il peut marcher la bouche en haut, en bas & dans une infinité d'autres positions. Dans la séance publique que l'Académie de Rouen tint le 3 Août 1774, M. *Dufay*, de Dieppe, lut un Mémoire sur les oursins. Cet Observateur décrit cet animal avec un appareil plus nombreux. Il résulte qu'un oursin de quatre pouces & deux de diametre, sur trois pouces de hauteur, est formé de neuf cents cinquante pieces, parsemées de quatre mille cinq cents mamelons, dont chacun sert de genou à une épine mobile, & qu'il est perforé de trois mille huit cents quarante petits trous, par lesquels passent autant de cornes flexibles qui aident aux sensations de l'animal ; il est à présumer que les petits oursins de la même espece ont leur coquille, composée d'autant de pieces, d'autant de mamelons, d'autant d'épines, d'autant de trous & d'autant de cornes ou filets flexibles ; mais les oursins d'especes différentes ne paroissent pas être munis d'un appareil de pieces aussi nombreux : au reste on ne peut qu'admirer la symétrie des pointes & des mamelons de l'oursin. M. *d'Argenville* dit avoir compté sur la superficie d'un oursin de la Mer Rouge, cinq divisions à deux rangs de mamelons, & de grandes pointes au nombre de soixante-dix, sans compter cinq autres rangs de petites, & toutes les bandes qui séparent les rangs des mamelons, lesquelles sont percées d'une infinité de petits trous par où sortent ses cornes ou *tentacula*.

Dès que l'oursin est à flot, il contracte ses filets entre les bases ou mamelons de ses pointes. On apperçoit aussi l'oursin sur la greve par un beau temps, & comme il est souvent couvert de dix à douze pieds d'eau, on se sert pour le prendre d'un long roseau entr'ouvert dans un des bouts par un petit morceau de bois pour en écarter les parties : on l'enfonce dans l'eau,

on le darde sur l'oursin, & à la place du morceau de bois qui se dégage aisément de lui-même, l'oursin s'y loge; alors on le retire de l'eau: quelquefois, quand le flux & le reflux est grand, on le suit sur la greve très-avant dans la mer; alors on peut le prendre à la main. On vend dans les rues de Marseille les oursins, comme l'on vend à Paris les huîtres. Pour les ouvrir on a une main gantée à cause des pointes, & des ciseaux à l'autre; on les cerne tout autour, puis avec de petits morceaux de pain faits en carrés longs, comme quand l'on veut manger un œuf à la coque, on ratisse la substance interne, rougeâtre, pleine d'œufs, avec ce pain, & on le mange ainsi assaisonné. On en est dégoûté dans les premiers jours; car rien ne ressemble mieux à du pus, que cet amas d'œufs, qui procure souvent un petit cours de ventre; mais on s'accoutume bientôt à ce mets, qui étant cuit a le goût des écrevisses. On nomme l'intérieur de l'oursin, *echinus ovarius*, & l'extérieur *echinus digitatus*.

Les oursins de la Mer Rouge sont plus épais que ceux de la Méditerranée; ceux-ci sont d'un meilleur goût que ceux de l'Océan & de la Manche.

M. *Klein* a donné au public deux distributions synoptiques de ces coquilles; l'une tirée de l'anus, l'autre de la bouche: on peut y joindre celle tirée de la figure extérieure de la coquille.

Voici les especes principales des oursins, & les endroits où on les trouve.

1°. Les oursins de forme hémisphérique ou sphéroïdale, nommés *turbans* (*cidares*). Le sommet est élevé, à bouche arrondie & située au milieu de la base, qui est un peu convexe, à grands & petits colures, chargés d'apophyses nombreuses en *forme de grains de millet*: ses pointes sont fines comme des aiguilles, bien rondes ou striées; tel est le *turban miliaire*. Il y en a de différentes couleurs, rougeâtres, verdâtres, violets, d'un gris cendré; quelquefois l'extrémité des pointes est blanche; ils se trouvent dans nos mers: les *turbans à panneaux* ont les colures marbrés ou nués de couleur rose, de verdâtre & de brun; ceux à bouche décagone sont un peu anguleux; tantôt ce sont les grands

colures qui sont élevés, tantôt ce sont les petits; tel est le *turban turc*. Ceux dont les apophyses sont un peu grandes s'appellent *turbans à grains de petite vérole*. Celui que l'on nomme l'*artichaut* ou le *chardon*, a de grands piquans aplatis en forme de spatule ou de pignons de pommes de pin, se recouvrant mutuellement, & ne laissant voir que les extrémités en petits pentagones: la base de ces oursins est aussi hérissée de petites pointes. *L'oursin digité* est hérissé de gros piquans en forme de pieux de palissade ou de doigts, cendrés, rayés vers le bout & par zones de fauve clair, longs, arrondis, finissant en tiers-point. On voit à la base d'autres pointes plus petites en forme de spatule. On en voit dont les piquans sont en lames d'épée, triangulaires & verdâtres. Le *turban à mamelon* a les apophyses séparées les unes des autres par des bandes onduleuses dont les bords sont ordinairement en filigrane; ainsi qu'on le voit bien dans le *turban maure* dont les piquans sont pyramidaux, striés dans leur longueur & forés dans le bout; ces derniers oursins ne se trouvent guere que dans les parages des Indes.

2°. Les oursins de forme ovoïde, échancrée d'un côté, à base un peu aplatie & à partie supérieure un peu sillonnée, nommés *pas de poulain*, *barillets*, *cœurs marins* (*spatagi*). Ils sont ornés en dessus d'une espece d'étoile en maniere de fleur à cinq pétales rabatus, quatre desquels sont bordés d'une double ou quadruple rangée de petits trous, semés dans le reste d'apophyses inégales & peu saillantes. La bouche est près de la circonférence.

3°. Les oursins de forme ovoïde sans échancrure, & fort convexe depuis la bouche jusqu'à la pointe tronquée: on les nomme *œufs marins* (*briss.*) On y distingue quatre larges sillons partant d'une cavité garnie de quatre trous, ornés chacun de quatre rangées de petits trous, & entourés d'un autre sillon très-léger. Les apophyses sont comme autant de petites semences de perles, & les pointes sont capillaires. La couleur de ces oursins est ordinairement d'un gris ou blanc sale. Le contour de quelques-uns semble représenter cinq bastions avec leurs flancs & leurs courtines qui correspondent à

une étoile à cinq rayons qui se voit sur le dos. Ces oursins sont communs dans les mers des Indes.

4°. Les oursins à pans irréguliers, de forme large & peu bombée, & ornés dans leur partie convexe d'une espece de fleur à cinq pétales, nommés *pavois* ou *boucliers* (*scuta*): leur base est concave, la robe est semée de petits cercles creux dans lesquels sont les apophyses. Les cinq dents molaires sont doubles: ces oursins sont plus communs aux parages de l'Amérique, qu'ailleurs.

5°. Les oursins de forme aplatie, ornés dans leurs deux faces de cinq feuilles, quelquefois percés de plusieurs trous oblongs; on les nomme *gâteaux* ou *beignets* (*placentæ*); l'espece nommée le *pain d'épice* est percée de part en part de plusieurs larges fentes; la bouche est au centre, & l'anus près de la troisieme partie de l'axe; ses pointes sont capillaires, de couleur grise: ces coquilles se trouvent dans les deux Indes.

6°. Les oursins appelés *rotules* (*rotulæ*) ont la même forme que les précédens, mais plus de la moitié de la circonférence est rayonnée ou dentée en forme de roue, tandis que l'autre moitié est entiere & arrondie. L'espece appelée *oursin solaire* a douze rayons, dans la moitié de sa circonférence.

Lorsqu'on veut conserver des oursins pour les Cabinets des Curieux, il faut aussi-tôt qu'ils sont sortis de la mer, les faire tremper dans l'eau douce pendant quelques heures, ensuite les laisser sécher sans les vider, afin d'en conserver les mâchoires, & de ne rien défigurer. Sa substance intérieure n'est qu'une gélatine dont la plus grande partie s'évapore, & l'autre se desseche: il importe d'en hâter la dessication, avant que la putréfaction attaque les membranes qui soutiennent les pointes dont l'animal est hérissé, ce qui cause leur chute. Pour éviter cet accident, M. *Mauduit* conseille de faire promptement sécher ces animaux au grand soleil ou dans un four, dont la chaleur soit très-douce, il faut ensuite les tenir dans des lieux bien secs.

OURSINS DE MER FOSSILES, *echinites*, sont les mêmes coquilles multivalves que les précédentes, devenues fossiles par la récession des mers qui couvroient autrefois les lieux où l'on en trouve présentement. Il y a de ces fossiles qui sont mutilés ou changés de nature; l'on en trouve qui sont d'une nature spatheuse, d'autres sont changés en silex, & ont conservé leur forme & leurs caracteres primitifs. On distingue encore sur ces coquilles, les sutures, les petites éminences, les milliers de petits trous, les especes de gravures autour des mamelons, dont il est parlé dans l'article des *oursins vivans*. On peut consulter l'Ouvrage latin sur les oursins de M. *Klein*, & qui est traduit en françois par M. *Desbois*, & imprimé à *Paris en 1754, in-8°.*

On peut aussi rapporter aux oursins fossiles, les parties qui en sont séparées, & que l'on trouve également dans la terre, telles que leurs dents, leurs osselets, leurs pointes & leurs mamelons.

Les pierres ou pointes judaïques, sont aussi des dards fossiles d'oursins. *Voyez* PIERRE JUDAÏQUE.

Les pointes d'oursins fossiles & ordinaires, sont des baguettes pierreuses, communément spatheuses, cylindriques, lisses ou striées, & de différentes grandeurs. *Voyez* OURSIN DE MER.

On donne le nom d'*écusson d'oursin pétrifié*, à ces pieces carrées, ou de figure irréguliere, dont l'assemblage d'un certain nombre compose l'oursin lui-même; on en peut souvent compter jusqu'à six cents. Les écussons orbiculaires sont les mamelons de l'oursin mamillaire. *Voyez* MAMELONS.

On trouve beaucoup d'oursins ou de parties qui en dépendent, devenues fossiles ou pétrifiées, dans plusieurs Provinces en France, en Angleterre, dans les Pays-Bas Autrichiens, en Suisse, & en quantité d'autres contrées.

OURSINE, est le nom que l'on donne à une phalene (papillon nocturne) qui provient d'une chenille toute velue, laquelle se trouve sur la laitue.

OUTARDE, OTARDE ou BITARDE, *otis, seu tarda avis*. Genre d'oiseau dont on distingue plusieurs

especes. L'*outarde vulgaire* ou la *bistarde* est un oiseau de la grandeur du coq d'Inde ; elle a la tête & le cou de couleur cendrée, le ventre est blanc & le dos bigarré par des lignes transversales, rousses & noires ; son bec est conique & un peu semblable à celui d'une poule : elle n'a point de doigts de derriere, ce qui est fort notable, car par cette marque & par sa grandeur elle est suffisamment distinguée de tous les autres oiseaux avec lesquels on a voulu la confondre. Elle n'a que trois doigts posés antérieurement, dont les ongles sont larges, courts, peu crochus, peu pointus, de figure ovale & convexe, tant en dessus qu'en dessous. Le duvet de l'outarde est un peu rose ou rougeâtre.

En hiver les outardes vivent en troupes dans les plaines, ces sociétés se désunissent en Avril, c'est la saison de leurs amours. Lorsqu'elles sont à terre, en bande, il y en a toujours quelques-unes un peu éloignées de la troupe qui font sentinelle, ayant toujours la tête levée pour avertir par un cri les autres quand quelqu'un paroît ; & comme elles ont beaucoup de peine à s'élever, à cause de leurs ailes courtes, elles s'y prennent de bonne heure. Lorsque l'outarde est chassée elle court fort vîte, en battant des ailes, & va quelquefois plusieurs milles de suite & sans s'arrêter ; mais comme elle ne prend son vol que difficilement & lorsqu'elle est aidée, ou si l'on veut, portée par un vent favorable, & que d'ailleurs elle ne se perche ni ne peut se percher sur les arbres, soit à cause de sa pesanteur, soit faute de doigt postérieur dont elle puisse saisir la branche & s'y soutenir, les levriers, les chiens courans la peuvent forcer, & même l'attrapent souvent lorsqu'elle est peu élevée de terre : on la chasse aussi avec l'oiseau de proie, & on lui tend des filets. On prétend que dans ce genre d'oiseaux d'Europe les individus sont ceux qui ont le plus de rapport avec l'autruche, que les femelles ont au-dessus de l'ovaire des testicules comme les mâles, & que le mâle, dans le temps de l'amour, fait aussi la roue avec sa queue. On la prend encore à l'hameçon, en y attachant un morceau de pomme ou de viande.

On prétend que les outardes sont carnassieres & qu'elles se nourrissent de grenouilles, de souris, de mulots, de petits oiseaux & de différens insectes; toujours est-il vrai que pendant l'hiver elles mangent des feuilles de navets, des choux, des plantules & des graines. On a trouvé souvent dans leurs estomacs, de petits cailloux qu'elles avalent, comme l'autruche, pour faciliter le broiement des grains qu'elles mangent.

Quand ces oiseaux s'accouplent, ils vont ordinairement à l'écart, (chaque couple) pour jouir solitairement de leurs plaisirs. Quelquefois des rivaux se disputent une femelle, ils se battent à toute outrance, & on trouve de temps en temps de ces victimes de l'amour sur le champ de bataille. Le mâle exprime ses désirs à sa femelle, en faisant la roue ou l'éventail avec sa queue, comme le coq d'Inde; pendant qu'il se pavane ainsi, la peau de dessous son cou s'enfle, se colore, de même que lorsqu'il entre en fureur. Ils font leurs nids dans les terres en friche, & se contentent le plus souvent de creuser la terre. La femelle y dépose deux œufs, qui sont blancs, avec quelques taches rousses aux gros bouts, du reste ils sont aussi blancs que des œufs de cygne.

La ponte se fait sur la fin de Mai ou de Juin. La couvaison est à-peu-près de cinq semaines, comme celle des dindes. Les petits courent, comme les poulets, aussi-tôt qu'ils sont éclos. Le cri des outardes est à-peu-près semblable à celui du corbeau. La chair de cet oiseau a le goût de celle du dindon.

On voit beaucoup d'outardes aux environs de Châlons en Champagne : il y en a aussi en Poitou. On trouve quelquefois de ces oiseaux engourdis au milieu des neiges, & on les prend aisément. On en éleve dans les basses-cours.

La vraie outarde est fort rare dans bien des pays. La graisse de cet oiseau est anodine & résolutive. Les Sauvages se font des robes des plumes d'outarde : on trouve la description anatomique de l'outarde, dans les *Mémoires de l'Académie des Sciences*.

PETITE OUTARDE ou CANNEPETIERE, *otis minor; anas campestris, vulgo dicta*, Cette petite espece d'ou-

tarde a, dit M. *de Buffon*, tous les attributs extérieurs de la grande, & même presque toutes les qualités intérieures, le même naturel, les mêmes mœurs, les mêmes habitudes; il semble que la petite soit éclose d'un œuf de la grande, dont le germe auroit eu moins de force de développement; le mâle se distingue de la femelle par un double collier blanc & par quelques autres variétés dans les couleurs; la femelle pond au mois de Juin, trois, quatre, & jusqu'à cinq œufs fort beaux, d'un vert luisant; les petits ne commencent à voler que vers le milieu d'Août, & quand ils entendent du bruit ils se tapissent contre terre, & se laisseroient plutôt écraser que de remuer de la place; leur cri d'amour est *brout* ou *prout*, ils le répetent sur-tout la nuit, & on l'entend de fort loin. La petite outarde est moins répandue que la grande, & paroît confinée dans une zone beaucoup plus étroite; elle paroît particuliérement habiter le climat de la France & est commune dans le Maine, dans la Normandie. La petite outarde est naturellement rusée & soupçonneuse, au point que cela a passé en proverbe, & que l'on dit des personnes qui montrent ce caractere, *qu'ils font de la cannepetiere*. Lorsque ces oiseaux soupçonnent quelque danger, ils partent & font un vol de deux ou trois cents pas très-rapide, & fort près de terre; puis lorsqu'ils sont posés, ils courent si vîte, qu'à peine un homme les pourroit atteindre. La chair de la petite outarde est noire & d'un goût exquis.

On trouve en Afrique une espece de petite outarde: *voyez* HOUBARA; & en Arabie une grande outarde huppée: *voyez* LOHONG. On trouve aussi en Afrique une petite outarde huppée connue sous le nom de *rhaad*. Voyez ce mot.

OUTIN. *Voyez* HAUTIN.

OUTREMER EN PIERRE. *Voyez* LAPIS LAZULI.

OXICEDRE ou PETIT CEDRE. *Voyez au mot* CEDRE.

OXIPETRE, est tantôt une terre farineuse, & tantôt une pierre cristalline, blanche, jaunâtre, d'un goût aigrelet, laquelle se trouve dans le territoire de Rome: on nous a assuré qu'on s'en sert dans le pays en

boiſſon, pour modérer la chaleur de la fievre. Les oxipetres que nous avons reçues de cette contrée, étoient alumineuſes ou vitrioliques. *Voyez* ALUN & VITRIOL.

OYE ou OIE, *anſer*, eſt un oiſeau très-vorace, aquatique, & dont on diſtingue beaucoup d'eſpeces dont le caractere eſt d'avoir trois doigts antérieurs & palmés, & celui de derriere ſans membranes; le bec eſt convexe en deſſus, plane en deſſous, d'une largeur & groſſeur égales dans toute la longueur, onguiculé par le bout qui eſt obtus, les côtés du bec ſont denticulés comme une lime. Nous donnerons ici l'hiſtoire de l'*oie domeſtique*, & nous ne rapporterons que les ſingularités des autres eſpeces qui ſont ſauvages.

L'OIE DOMESTIQUE OU PRIVÉE, *anſer vulgaris*. C'eſt un oiſeau de baſſe-cour, connu de tout le monde; il eſt plus petit que le cygne, mais plus grand & plus gros que le canard: il peſe juſqu'à dix livres étant engraiſſé: ſa longueur, depuis le bout du bec juſqu'à celui des pieds, eſt de trois pieds; l'envergure a plus de quatre pieds & demi: le bec eſt long de deux pouces & demi; la queue longue de ſix pouces & demi, & compoſée de dix-huit grandes plumes; les ailes ont chacune vingt-ſept grandes plumes. L'oie a le cou plus court que le cygne, & plus long que le canard: la couleur de ſon plumage varie comme dans tous les autres oiſeaux domeſtiques; tantôt elle eſt brune & bigarée; tantôt elle eſt cendrée ou blanche, mêlée de brun. Le mâle eſt ordinairement blanc. Le bec & les pieds ſont jaunes dans les jeunes oies, qu'on nomme *oiſillons* & *oiſons*, ou *oyons* quand elles ſont un peu plus grandes: ceux des vieilles ſont rouges. On nomme le mâle *oyard* ou *jars*.

Quand l'oie ſe met en colere, elle ſiffle comme le ſerpent: elle vit fort long-temps. *Willughby* cite une oie qui avoit quatre-vingts ans, (il ſuffit de lire vingt ans) & qu'on fut obligé de tuer, à cauſe de ſa méchanceté & des mauvais traitemens qu'elle faiſoit aux oiſons.

L'oie eſt un oiſeau amphibie, qui vit comme le canard ſur la terre & dans l'eau. L'on en voit le long

de la Loire s'assembler en certains temps de l'année, & faire leur passage en d'autres pays d'où elles reviennent ensuite chacune dans leurs maisons. Cet oiseau se nourrit principalement d'herbes & de grains : il est pesant, s'exerce peu à voler & marche lentement : cependant on mene quelquefois une troupe d'oies à plus de quinze lieues comme l'on conduit des dindons. *Belon* dit que l'oie privée tire son origine de l'oie sauvage, & qu'il y en a une espece grande, de belle couleur & féconde ; & l'autre qui tire sur l'oie sauvage, est plus petite & de moindre revenu. Les bons Economes qui savent tirer avantage des oies, préferent celles qui sont blanches & de grande race à celles dont le plumage change de couleur. Mais quoique ces oiseaux s'élevent par-tout, l'on n'en peut tirer bon parti que quand l'on est proche d'une riviere, d'un ruisseau ou d'un étang, ou d'un très-grand vivier toujours plein d'eau pour les faire barboter. Deux mâles suffisent pour six ou sept femelles : celles-ci font jusqu'à trois pontes par an, & dix à douze œufs à chaque ponte. *Jean Liébault* nous apprend dans sa *Maison Rustique*, que si l'on ne retire pas les œufs des oies à mesure qu'elles pondent, elles les couvent dès que leur ponte est complette ; mais que quand on les leur ôte, elles ne cessent point de pondre quelquefois jusqu'à deux cents œufs, & même jusqu'à en périr. Leur ponte commence en Mars & finit en Juin : elles n'oublient point l'endroit où on les a menées pondre pour la premiere fois : elles couvent trente jours, & la couvée est de quinze à trente œufs. Dans le Hainault, l'Artois & dans quelques autres Provinces de France on en tire un grand profit ; aussi y voit-on après la moisson de nombreux troupeaux d'oies pâturer dans les champs avec les dindons : en automne on les engraisse dans l'espace de quinze jours ou trois semaines, en leur crevant les yeux ; les Juifs excellent dans la maniere d'engraisser ces oiseaux. On en fait vers la S. Martin un débit considérable. Autrefois l'on en débitoit à Paris dans la seule *rue aux oies*, d'où l'on a fait par corruption la *rue aux ours* : les Rôtisseurs qui les vendoient se nommoient *Oyers*.

Les jeunes oies sont attaquées aux mois de Juin & de Juillet d'un plus grand nombre de maladies, & de maladies plus dangereuses que dans les autres saisons de l'année ; c'est à cette époque qu'elles périssent en quantité. La négligence avec laquelle on éleve ordinairement ces sortes d'oiseaux, doit être regardée comme la cause principale de ces pertes. On lit dans la *Nature considérée sous différens aspects* des moyens pour prévenir la mortalité des oisons, tirés de la Gazette d'Agriculture. Dans ces deux mois de l'année (Juin & Juillet) il faudroit donner à ces jeunes oiseaux plus de soins que dans tout autre temps ; parce qu'alors la nature les pourvoit d'ailes & leur fait pousser leurs plus grosses plumes, ce qui doit les affoiblir beaucoup : d'ailleurs la nourriture maigre & souvent seche qu'ils trouvent dans les prairies pendant les grandes chaleurs, n'est pas suffisante pour les nourrir & ajouter à leurs forces ; il faudroit donc leur donner une bonne pâture avant qu'ils se répandent dans les prairies & à leur retour : l'expérience a démontré le succès de cette pratique pendant que ces oiseaux prennent leurs plumes. D'autres especes de maladies font une cruelle guerre à ces jeunes oiseaux, en voici les divers symptômes : si dans les mois de Juin & de Juillet il vient à pleuvoir beaucoup, l'herbe qui poussera trop rapidement, acquiert une qualité qui donne le dévoiement aux oies qui la picorent ; ces pluies abondantes rafraîchissent & même refroidissent par trop ces oiseaux. Peut-être aussi le mal peut-il provenir d'une eau rougeâtre, remplie d'insectes du genre des *monocles* & des *binocles*, qu'on leur laisse boire en cette saison : *voyez l'article* BINOCLE. D'habiles Economes ont employé divers moyens suivis de bons effets, & dont voici la méthode. Il faut faire boire aux oisons attaqués de la dyssenterie une infusion légere de baies & de petites branches vertes de sapin pilées & broyées ensemble dans de l'eau bien propre : le lierre mêlé avec un peu d'orge égrugée est aussi un bon remede en pareil cas ; l'usage de ce breuvage est pour le matin avant d'envoyer ces oiseaux aux champs, & le soir lorsqu'ils sont de retour. La paille hachée très-menue

& le ſon forment dans l'eſtomac des oiſons une bouillie viſqueuſe, qui tempere l'âcreté de l'eau ſale, des inſectes & de l'herbe tendre & froide qu'ils ont avalés. Cette nourriture en fortifiant l'eſtomac, adoucit auſſi les inteſtins & arrête la dyſſenterie. Le chardon pilé & mêlé avec le marc des braſſeries & un peu d'orge égrugée eſt encore un remede plus sûr que les précédens, ſur-tout ſi on ſaupoudre cette nourriture trois ou quatre fois par ſemaine d'un peu de cendre de tabac: alors c'eſt encore un excellent ſpécifique contre les autres maladies des oiſons, que les inſectes, & ſur-tout les ſang-ſues qu'ils avalent leur occaſionnent. Un autre fléau pour les oiſons, ce ſont les petits inſectes, poux, moucherons, couſins, &c. qui ſe mettent dans les oreilles & les naſeaux de ces bipedes, qui les tourmentent, les fatiguent, les épuiſent de force, & les font périr par l'excès de la douleur. Les oiſons qui en ſont attaqués marchent les ailes pendantes, ſecouent la tête, ou alongent le cou & ne mangent que peu ou point: pour faire déloger ces hôtes importuns & cruels, il faut préſenter aux oiſons au retour des champs de l'orge au fond d'un vaſe rempli d'une eau bien claire; ces oiſeaux avides de l'orge, voulant la manger, ſont obligés néceſſairement de mettre la tête & le cou dans l'eau, les inſectes fuient ou ſe retirent au haut du cou, c'eſt-à-dire, près du corps; les parties affectées, malades ſe nétoient & bientôt ces bipedes recouvrent la ſanté: en répétant pendant quelques jours cette opération, les inſectes n'y tiennent pas & abandonnent leur proie pour toujours. Une friction d'huile de ſapin battue dans de l'eau, ou d'onguent mercuriel peu chargé de vif-argent, écarte & détruit auſſi ces ennemis opiniâtres.

C'eſt à tort qu'on a taxé l'oie d'être ſtupide, elle eſt vigilante; ſon ſommeil eſt léger, elle ſe réveille au moindre bruit; elle eſt même auſſi propre que quelques chiens à garder la nuit une maiſon de campagne; car dès qu'elle entend quelque choſe, elle ne ceſſe de jeter des cris. On en cite un exemple fameux dans l'Hiſtoire Romaine, où elle étoit au rang des oiſeaux ſacrés, pour avoir averti les ſoldats de l'appro-

che des Gaulois, près de s'emparer du Capitole. Il eſt certain, dit *Lémery*, que cet oiſeau eſt diſciplinable ; cet Auteur en a vu un tourner une roue de cheminée pour faire rôtir de la viande.

Perſonne n'ignore combien cet oiſeau entre dans nos uſages domeſtiques : ſes petites plumes ſervent à faire des lits, des couſſins & des oreillers, qui nous facilitent un ſommeil agréable ; & les grandes plumes de ſes ailes nous fourniſſent des plumes à écrire, dont l'uſage eſt connu de tout le monde. On peut plumer les oies deux fois l'année, au printems & en automne. Il ne paroît pas que les Anciens euſſent coutume de ſe coucher ſur la plume d'oie : *Belon* dit qu'ils ne connoiſſoient pas même les lits de plumes, puiſqu'ils ne ſont pas encore aujourd'hui en uſage chez les Orientaux ; leurs lits ſont compoſés de bourre de chameau, de laine, de coton & de ſommités de roſeaux.

On prétend que la fiente de l'oie gâte un peu les prés & brûle l'herbe ; ces oiſeaux ſont capables de faire beaucoup de dégâts dans les jardins & dans les blés, ſi l'on n'y prend garde : la juſquiame, la ciguë & l'amande amere ſont des poiſons pour ces animaux ; mais en revanche l'oie aime beaucoup l'orge qui l'engraiſſe. Il y a peu de volaille plus ſujette à produire des monſtres que l'oie : les Payſans prétendent connoître par la groſſeur & par la figure des œufs ceux qui doivent en faire naître, & ils les rejettent comme peu propres à être couvés, ou plutôt comme ne devant pas produire des êtres d'une longue & bonne durée.

La chair de l'oie eſt un aſſez bon manger, mais elle eſt peu ſalutaire, étant groſſiere & difficile à digérer : il faut être robuſte, faire de l'exercice pour qu'elle nourriſſe bien & qu'elle produiſe un aliment ſolide & durable ; ceux qui ſont ſédentaires, & particuliérement les gens de cabinet, doivent s'en abſtenir. On choiſit cet oiſeau d'un âge moyen, car étant trop jeune, ſa chair eſt viſqueuſe & moins ſaine ; quand au contraire il eſt trop vieux, ſa chair eſt ſeche, dure & indigeſte. On mange l'oie rôtie ou en ragoût : l'on fait en quelques pays des pâtés de cuiſſes d'oies qui ſont fort eſtimés ; en Gaſcogne on les marine, en les ſalant à

sec, les faisant cuire à demi dans de la graisse d'oie : c'est ainsi qu'on les mange dans les potages aux choux verts, que les Béarnois appellent *garbure*. Les œufs de cet oiseau se mangent chez le petit peuple, mais ils ne sont pas à beaucoup près aussi agréables que ceux de poule. Le sang de l'oie est alexipharmaque : sa graisse qui est très-fine, très-douce, est émolliente, résolutive, nervale & laxative ; elle empêche les grains de la petite vérole de creuser profondément : cette substance, ainsi que le foie du même oiseau, passoit chez les Romains pour quelque chose d'exquis ; tout le monde connoît encore les foies gras de l'oie qui nous viennent de Metz. Sa fiente est hystérique, diurétique, fébrifuge, sudorifique, & très-propre contre la jaunisse : on prétend que la premiere peau des pieds de l'oie est propre pour arrêter toutes sortes de flux, &c. L'*oie huppée* n'est qu'une variété de l'oie domestique.

L'Oie de neige, *anser niveus*, est blanche par tout le corps ; les cinq premieres grosses plumes sont noires : elle ne paroît chez nous qu'en hiver, où elle vole en troupes.

L'Oie sauvage, *anser ferus aut sylvestris*. Cet oiseau fréquente les terres labourées où il pâture ; il est plus petit que l'oie domestique, s'apprivoise difficilement ; il arrive chez nous en hiver après les *grues* : voyez ce mot. Il vole par bandes le jour & la nuit avec beaucoup d'ordre en forme d'angle rectiligne, comme font les grues & les canards sauvages. Celui qui est en tête fend l'air dont il soutient le choc, les deux colonnes suivent ; lorsqu'il est fatigué, il retourne à la queue & est remplacé par celui qui le suit. La troupe s'abat sur terre ; comme ils ne s'élevent de terre que difficilement, un d'entr'eux fait sentinelle, est aux aguets, avertit ses camarades du moindre danger. Leur cri est perçant & se fait entendre de fort loin ; aussi a-t-on remarqué que dans l'oie sauvage la trachée-artere est réfléchie comme dans la grue en façon de trompe. Son envergure est très-étendue, son cou est fort long ; son bec, ses jambes & ses pattes sont d'un jaune safrané ; sa mâchoire supérieure est toute garnie de plusieurs rangs de petites dents, & celle de dessous

dessous d'un seul rang de chaque côté, la langue en a aussi un de chaque côté sur la membrane extérieure; quelquefois le palais est aussi denté.

Cette oie se plaît dans les grandes plaines remplies de blé vert qui lui sert de pâture. Elle fait ses petits dans les îles & dans les lieux maritimes où il y a des marécages. Sa chair est infiniment plus légere, plus savoureuse & plus délicate que celle de l'oie domestique.

On voit aux environs de Ferrare en Italie & dans la Flandre, quelques oies sauvages qui varient par le plumage. Il y a aussi l'oie sauvage du Nord: c'est l'*oie moqueuse* d'Edwards, la même aux ailes bleues de la baie d'Hudson.

L'OIE DE MER, *merganser*. Cet oiseau qui est le grand plongeon de plusieurs Naturalistes, a une envergure moins considérable que les autres oies en proportion de sa taille. Il a le corps long, le dos large & plat; son plumage supérieur est d'un cendré brunâtre, l'inférieur est de couleur isabelle, les grandes ailes ont les pointes blanches: le bec est plus long que le doigt index, d'une couleur brune-jaunâtre; la mâchoire supérieure est crochue par le bout: toutes deux sont armées de dents, & ressemblent à une petite scie de chaque côté: les jambes & les pattes sont rouges. C'est une espece de *harle*. Voyez ce mot.

L'OIE NONNETTE. Cet oiseau n'est pas fort commun parmi nous: on le nomme ainsi, de sa contenance commune avec celle de l'oie, & parce que son plumage ressemble à l'habillement d'une Religieuse vêtue de blanc & de noir. Il n'est pas si grand que l'oie vulgaire; mais il est plus grand que le canard. Sa queue est courte & noire: il est haut monté sur jambes; ses pieds sont plats, larges & fort noirs, de même que ses jambes, son bec & ses yeux; son bec est court, mais large & comme denté. *Belon* dit que l'oie nonnette a la finesse du renard pour faire échapper ses petits quand quelqu'un veut s'en saisir. Elle fait semblant de vouloir se laisser prendre, & leur donne le temps de s'échapper. Quelquefois elle fait comme si elle avoit les ailes & les cuisses cassées; & quand elle voit ses petits hors de danger, elle s'envole & s'échappe à son

tour des mains des Chaſſeurs. Elle prend les mouches qui volent ſur l'eau ; ce qui l'a fait appeler *anas aut anſer muſcaris*. Pluſieurs Méthodiſtes regardent l'oie nonnette comme une variété de la *bernache*, *bernicla*.

L'Oie de Soland, Oie d'Écosse, Oie de Bassan, *anſer Baſſanus*. Elle a la peau ſur les côtés de la tête, au-delà des yeux, dégarnie de plumes : elle n'a point de narines ; mais il y a une rigole à leur place qui s'étend des deux côtés tout le long du bec : les bords des deux mâchoires ſont toujours gluans ; les quatre doigts ſont liés enſemble par la membrane qui va juſqu'à la naiſſance des ongles ; ſes pattes ſont noires. Cette ſorte d'oiſeau, qui eſt une véritable eſpece de *fou*, voyez ce mot, ne multiplie que dans l'île de Baſs en Ecoſſe, où il en vient annuellement un nombre prodigieux ; chaque femelle ne pond qu'un œuf. Elle fait ſon nid dans les rochers élevés de l'île ſituée dans la mer d'Ecoſſe : elle aime ſes petits très-tendrement ; malheur aux enfans du pays qui iroient les dénicher, ils s'expoſeroient à perdre la vie. Comme on tire rarement ſur ces oiſeaux, & que perſonne ne les effraie, ils nourriſſent avec confiance leurs petits tout près des habitations. Leur nourriture eſt de poiſſon. Les Écoſſois diſent que la chair de cet oiſeau eſt exquiſe : ils ſe ſervent de ſa graiſſe pour la compoſition de quelques remedes. Le Seigneur de l'île en tire annuellement de grands revenus, car on les vend cher : ils ne viennent que dans le printems, & s'en vont dans l'automne. Ces oiſeaux ſont d'excellens pêcheurs ; ils vont à la pêche pour eux & pour leurs petits ; moyennant quoi les Inſulaires ſont fournis pendant tout l'été de poiſſon frais, car ils partagent ſouvent le ſervice de la table de ces oiſeaux.

L'Oie de Moscovie, *anſer Moſcoviticus*, eſt plus grande que les oies ordinaires ; la mâchoire ſupérieure eſt chargée d'une ſorte de tubercule ou de boſſe large, ronde & de couleur orangée ; & le deſſous du bec a une grande bourſe. Le bec, les jambes & les pieds ſont d'une belle couleur d'orange ; le plumage eſt d'une couleur ſombre. C'eſt le *cygnoides Orientalis* de Linn.

Les Naturaliſtes font mention de pluſieurs autres

sortes d'oies : il y a celle de Brenta, *Brenta anas torquata Bellonii* ; c'est le *cravant :* celle de Canada, *anas Canadensis ;* l'une & l'autre ne sont que des variétés de l'oie ordinaire : celle d'Espagne ou de Guinée, *anser Hispanicus aut Guineensis*, qui est très-grande & qui semble être une espece de cygne abâtardie par l'accouplement du cygne & de l'oie ; sa chair est excellente. L'oie de marais est la même que l'oie sauvage ; l'oie d'Islande est le canard de montagne de Spitzberg. M. *Anderson* dit que les oies d'Islande sont connues sous le nom de *margées ;* & qu'elles y viennent en si grande quantité, que leurs troupes sont par milliers. Ces oiseaux sont, dit-il, si fatigués en arrivant, vraisemblablement par la grande route qu'ils viennent de faire en traversant la mer, qu'on en peut tuer des milliers à coups de bâton. L'oie de Magellan est, selon *Ray*, le penguin des Anglois. *Voyez* PENGUIN.

Au cap de Bonne-Espérance on trouve trois sortes d'oies ; savoir l'*oie sauvage*, celle de *montagne* & l'*oie aquatique :* elles different beaucoup soit pour la couleur, soit pour la grosseur ; celle de montagne est plus grosse que nos oies d'Europe. Ses plumes sont d'un beau vert éclatant : on donne à ces oies sauvages le nom de *jabotieres*, à cause de la grosseur extrême du jabot qu'elles ont. On dit que les soldats & le commun du peuple en font des poches pour mettre du tabac, qui peuvent en contenir environ deux livres. Ces oies ne seroient-elles pas des especes de *pélicans ?* L'*oie à duvet* du Danemarck est le *canard à duvet* d'Islande.

Les *oies sauvages* de la Gambra ont des éperons aussi longs, dit-on, que ceux de nos coqs. Les lacs de la Chine sont aussi remplis d'oies.

L'*oie Magellanique* de *Clusius* est une espece de *manchot*. Voyez ce mot.

Nous le répétons, les marques caractéristiques de ces oiseaux sont d'être grands de corps, d'avoir le cou long, les ailes amples, ainsi que la queue qui est ronde ; un anneau blanc proche du croupion ; le dos élevé & rond, & non aussi plat que dans le genre des canards ; le bec fort, épais à la base, comme denté, pointu vers le bout, & plus crochu que celui des canards.

P.

PAC. C'eſt le nom que les Perſans donnent à une eſpece d'*aigle de mer*, nommée en Afrique *maroly*. Voyez ce mot.

PACA. Petit quadrupede ſemblable à un pourceau de deux mois. Il y en a une grande quantité dans l'Amérique Méridionale, & il ne ſe trouve point dans notre continent: quelques-uns ſont d'un blanc de neige; leur chair eſt entrelardée & tendre, ainſi que leur peau, mais difficile à cuire: elle a le goût de celle du lievre: c'eſt un mets exquis pour les habitans du pays; les blancs ſe trouvent rarement ailleurs qu'aux rivages de la riviere de Saint-François. Le paca a depuis le bout du muſeau juſqu'à la queue environ un pied de long; ſa tête eſt groſſe, ſa mâchoire inférieure courte: cet animal a une grande barbe de lievre, des oreilles pointues & très-courtes, ainſi que la queue; les jambes de devant plus courtes que celles de derriere: il a cinq doigts à chaque pied; le corps couvert de poils courts, rudes au toucher; il eſt tacheté réguliérement de blanc, gris & noir: auſſi ſa peau donne-t-elle une aſſez belle fourrure. Les Guianois l'appellent *ourena* & *pack*. Ces petits animaux ont le grognement & l'allure du cochon: comme lui ils fouillent la terre avec leur muſeau pour chercher leur nourriture. Ils ſont organiſés de maniere à plonger & reſter pluſieurs heures ſous l'eau. Ils ſont difficiles à chaſſer pendant l'hiver. Les grandes eaux leur ſont favorables. Les femelles portent au commencement des pluies ou de l'hiver. La chaſſe de ces animaux eſt alors très-pénible. Il faut des chiens dreſſés pour les prendre. Ils ſe creuſent des terriers comme les lapins, mais peu profondément; de ſorte que ſouvent les Chaſſeurs en marchant enfoncent dans l'endroit où ils ſont cachés, & les font partir. Il y a trois iſſues en triangle dans la retraite qu'ils ſe font. Ils la recouvrent de feuilles ſeches, qui font croire au Chaſſeur que c'eſt un ancien trou aban-

donné. Quand on veut les prendre en vie, on bouche deux issues & on fouille la troisieme ; mais il faut être sur ses gardes, car ils se défendent vigoureusement & se vengent en mordant avec autant d'acharnement que de vivacité. M. *Brisson* place le *paca* dans le genre du lapin ; mais M. *Klein* le range parmi les cavia, petits animaux, dit-il, que les Portugais nomment *ratos do matto*, qui habitent les bois, qui ont le poil & le cri du cochon, & qui se retirent dans des trous ou dans des creux d'arbres.

PACAGE ou PASCAGE. C'est un pâturage humide dont on ne fauche point l'herbe, & qui sert pour la nourriture des bestiaux. Quand le pâturage est sec on le nomme *pâtis*. Les mots de *pacages*, *pâturages*, *pâtures*, *pâtis* ou *pasquis*, *herbages* & *communes*, sont presque synonymes.

PACAL. Arbre de l'Amérique méridionale, qui croît aux bords d'une riviere distante de vingt-cinq lieues de Lima : la description de cet arbre est insuffisante. On dit que les Indiens en retirent par l'ustion une cendre qu'ils mêlent avec du savon, pour guérir toutes sortes de vieilles cicatrices, de dartres & de feux volages.

PACANE ou PACANIER. Espece de noyer de la Louisiane. *Voyez au mot* NOYER.

PACAY. C'est le *pois sucré* de la Guiane. *Voyez ce mot.*

PACHÉE. *Voyez au mot* ÉMERAUDE.

PACO ou PACOS. L'histoire de ce quadrupede & du *lama*, que nous réunissons dans ce même article d'après ce qu'en a dit M. *de Buffon*, fournit un exemple que dans toutes les langues on donne quelquefois au même animal deux ou un plus grand nombre de noms différens, dont l'un se rapporte à son état de liberté, un autre à celui de domesticité, &c. Le *sanglier* & le *cochon* ne font qu'un animal, & ces deux noms ne sont pas relatifs à la différence de la nature, mais à celle de la condition de cette espece, dont une partie est sous l'empire de l'homme, & l'autre indépendante. Il en est de même des *pacos* & des *lamas*

qui étoient les seuls animaux domestiques des anciens Américains ; ces noms sont ceux de leur état de domesticité ; le lama sauvage s'appelle *huanacus* ou *guanaco*, & le paco sauvage *vicunna* ou *vigogne*. Les Anglois ont désigné le lama par la dénomination de *peruicheattle*, c'est-à-dire *bétail du Pérou*. Quelques-uns l'appellent aussi *cornera de tierra*, mouton de terre. C'est le *guanapo* de *Gentil*, le *wianaque* de *Wood*, le *pelon ichiatl oquitli* d'*Hernandez*, le *chameau du Pérou* de M. *Brisson*, le *glama* de plusieurs Auteurs, & la *brebis du Pérou* de *Marcgrave*.

Le lama & le paco sont des animaux à laine qui appartiennent uniquement au nouveau Continent, & ne se trouvent pas dans l'ancien ; ils affectent même de certaines terres, hors desquelles on ne les trouve plus : en effet ils paroissent attachés à la chaîne des montagnes qui s'étend depuis la Nouvelle Espagne jusqu'aux terres Magellaniques. Ainsi ils habitent les régions les plus élevées du globe terrestre, & semblent avoir besoin pour vivre de respirer un air plus vif & plus léger que celui de nos plus hautes montagnes de France.

Il est assez singulier, dit M. *de Buffon*, que quoique le lama & le paco soient domestiques au Pérou, au Mexique, au Chily, comme les chevaux le sont en Europe, ou les chameaux en Arabie, nous les connoissions à peine, & que depuis plus de deux siecles que les Espagnols regnent dans ces vastes contrées, aucun de leurs Auteurs ne nous ait donné l'histoire détaillée & la description exacte de ces animaux dont on se sert tous les jours, & qui étoient les seuls animaux domestiques des Indiens du Pérou, avant l'arrivée des Espagnols : ils prétendent à la vérité qu'on ne peut les transporter en Europe, ni même les descendre de leurs hauteurs sans les perdre, ou du moins sans risquer de les voir périr après très-peu de temps. On ignore comment ils sont conformés intérieurement, combien de temps ils portent leurs petits, quelle est leur véritable forme & figure ; l'on ignore si ces deux especes sont absolument séparées l'une de l'autre, si elles ne peuvent se mêler par l'accouplement, s'il n'y a point entr'elles de races intermédiaires, & beaucoup

d'autres faits qui seroient nécessaires pour rendre cette histoire complette.

Quoique les Espagnols prétendent que ces animaux périssent lorsqu'on les éloigne de leur pays natal, il n'en est pas moins vrai qu'immédiatement après la conquête du Pérou, & même encore long-temps après, l'on a transporté quelques lamas en Europe. L'animal dont *Gesner* parle, sous le nom d'*allocamelus*, & dont il donne la figure, est un lama qui fut amené vivant du Pérou en Hollande en 1558, c'est le même quadrupede dont *Mathiole* fait mention sous le nom d'*elæphocamelus*.

Gregoire de *Bolivar* qui a rassemblé beaucoup de faits sur l'utilité & les services qu'on tire des *lamas* & sur leur naturel, dit que le Pérou est le pays natal, la vraie patrie de ces animaux : on les conduit à la vérité dans d'autres Provinces, comme à la Nouvelle Espagne, mais c'est plutôt pour la curiosité que pour l'utilité ; au lieu que dans toute l'étendue du Pérou, depuis Potosi jusqu'à Caracas, ces animaux sont en très-grand nombre : ils sont aussi de la plus grande nécessité : ils font seuls toute la richesse des Indiens, & contribuent beaucoup à celle des Espagnols ; leur chair, sur-tout celle des jeunes, est bonne à manger ; leur poil est une laine fine d'un excellent usage, & pendant toute leur vie ils servent constamment à transporter toutes les denrées du pays : leur charge ordinaire est de cent cinquante livres, & les plus forts en portent jusqu'à deux cents cinquante ; ils font des voyages assez longs dans des pays impraticables pour toutes les autres bêtes de charge ; ils marchent assez lentement, & ne font que quatre ou cinq lieues par jour ; leur démarche est grave & ferme, leur pas assuré ; ils descendent des ravines précipitées, & surmontent des rochers escarpés, où les hommes même ne peuvent les accompagner ; ordinairement ils marchent quatre ou cinq jours de suite, après quoi ils veulent du repos & prennent d'eux-mêmes un séjour de vingt-quatre ou trente heures avant de se remettre en marche. On les occupe beaucoup au transport des riches matieres que l'on tire des mines du Potosi. *Bolivar* dit que de son

temps on employoit à ce travail trois cents mille de ces animaux. Leur voyage le plus ordinaire, dit *Frefier*, eſt depuis Cozer juſqu'à Potoſi, d'où l'on compte environ deux cents lieues : on les conduit comme les chameaux par caravanes, ou par milliers ; & ils portent toutes ſortes de marchandiſes.

Leur accroiſſement eſt aſſez prompt, & leur vie n'eſt pas bien longue ; ils peuvent produire dès l'âge de trois ans, ils ſont en pleine vigueur depuis cet âge juſqu'à dix & onze ans; ils commencent à dépérir à douze ; en ſorte qu'à quinze ils ſont entiérement uſés : leur naturel, dit M. *de Buffon*, paroît être modélé ſur celui des Américains, ils ſont doux & flegmatiques, & font tout avec poids & meſure : lorſqu'ils voyagent & qu'ils veulent s'arrêter pour quelques inſtans, ils plient les genoux avec la plus grande précaution, & baiſſent le corps en proportion, afin d'empêcher leur charge de tomber ou de ſe déranger ; mais dès qu'ils entendent le coup de ſifflet du Conducteur, ils ſe relevent avec les mêmes précautions & ſe remettent en marche : ils broutent chemin faiſant, & par tout où ils trouvent de l'herbe verte, mais jamais ils ne mangent la nuit, quand même ils auroient jeûné pendant le jour, ils emploient ce temps à ruminer : ils dorment appuyés ſur la poitrine les pieds repliés ſous le ventre, & ruminent auſſi dans cette ſituation. Si on les excede de travail & qu'ils ſuccombent une fois ſous le faix, il n'y a nul moyen de les faire relever, on les frapperoit donc inutilement; la derniere reſſource qu'on emploie quelquefois pour les aiguillonner, eſt de leur ſerrer les teſticules, mais cette correction barbare eſt ſouvent inutile ; communément ils s'obſtinent à demeurer au lieu même où ils ſont tombés, & l'on a vu nombre de fois que ſi l'on continue de les maltraiter, ils ſe déſeſperent & ſe tuent en battant la terre à droite & à gauche avec leur tête. Ils ne ſavent pas ſe défendre des pieds ni des dents, & n'ont pour ainſi dire d'autres armes que l'indignation; ils vomiſſent ou crachent à quelques pas de diſtance, à la face des hommes qui les inquiétent, qui les inſultent, qui les outragent, & l'on pré-

tend que cette salive qu'ils lancent dans la colere par la fente de leur levre supérieure, est âcre & mordicante, au point de faire lever des ampoules sur la peau.

Le lama (les Espagnols prononcent *l'hama*) est un animal sans cornes, bisulce, ruminant & porte-laine; il est haut d'environ quatre pieds, sa longueur est de cinq ou six pieds; le cou seul a près de trois pieds de long; sa tête qu'il tient levée est bien faite, cependant petite en proportion du corps, & tenant un peu de celle du cheval & de celle du mouton, dit *Frésier*; ses yeux sont grands, le museau alongé, les levres épaisses, la supérieure fendue, & l'inférieure un peu pendante; il manque de dents incisives & canines à la mâchoire supérieure; ses oreilles sont longues de quatre pouces, il les porte en avant, les dresse & les remue avec facilité; sa queue qui a huit pouces de longueur, est droite, menue & un peu relevée; ses pieds sont fourchus comme ceux du bœuf, mais ils sont surmontés d'un éperon en arriere, qui aide à l'animal à se retenir & à s'accrocher dans les pas difficiles; il est couvert d'une laine courte sur le dos, la croupe & la queue, mais fort longue sur les flancs & sous le ventre: du reste les lamas varient par les couleurs; il y en a de blancs, de noirs & de mêlés: leur fiente ressemble à celle des chevres.

La nature qui dans toutes ses opérations, agit ordinairement par les moyens les plus faciles, paroit s'en écarter dans le physique de ces animaux; le mâle a le membre génital menu & recourbé, en sorte qu'il pisse en arriere: c'est un animal très-lascif, & qui cependant à beaucoup de peine à s'accoupler. La femelle a l'orifice de la vulve fort étroit; elle se prosterne pour attendre le mâle, & l'invite à l'acte de la génération par ses soupirs; mais il se passe toujours plusieurs heures & quelquefois un jour entier avant qu'ils puissent jouir l'un de l'autre, & tout ce temps se passe à gémir, à gronder, & sur-tout à se conspuer; & comme ces longs préludes les fatiguent plus que l'acte même, on leur prête une main secourable, officieuse, pour abréger, c'est-à-dire pour les aider à s'arranger, à s'appa-

reiller : ils ne produiſent ordinairement qu'un petit, & rarement deux. La mere n'a auſſi que deux mamelles, & le petit la ſuit au moment qu'il eſt né. Nous avons dit que la chair des jeunes eſt très-bonne à manger, celle des vieux eſt ſeche & trop dure ; en général celle des lamas domeſtiques eſt bien meilleure que celle des ſauvages, & leur laine eſt auſſi beaucoup plus douce & mieux fournie : leur peau eſt aſſez ferme ; les Indiens du Pérou en faiſoient leurs chauſſures, & les Eſpagnols l'emploient pour faire des harnois de cheval. Ces animaux ſi utiles & même ſi néceſſaires dans le pays qu'ils habitent, ne coûtent ni entretien ni nourriture ; ſa conformation de leurs pieds & l'épaiſſeur de leur fourrure, diſpenſent de les ferrer & de les bâter. Le Conducteur prend ſeulement ſoin d'arranger leur laine de façon qu'elle ne porte pas ſur l'épine du dos. L'herbe verte qu'ils broutent eux-mêmes leur ſuffit, & ils n'en prennent qu'en petite quantité ; ils ſont encore plus ſobres ſur la boiſſon : & l'on aſſure qu'au beſoin ils s'abreuvent de leur ſalive, qui dans cet animal eſt plus abondante que dans aucun autre.

Le lama dans l'état de nature, & que l'on appelle *huanacus*, eſt plus fort, plus vif & plus léger que l'eſpece domeſtique ; le lama ſauvage court comme un cerf & grimpe comme le chamois ſur les rochers les plus eſcarpés : ſa laine eſt moins longue, moins fournie & toute de couleur fauve : ces eſpeces ſauvages, quoiqu'en pleine liberté, ſavent ſe raſſembler en troupes, & ſont quelquefois deux ou trois cents enſemble : lorſqu'ils apperçoivent quelqu'un, ils regardent avec une ſorte d'attention, ſans marquer d'abord ni crainte, ni plaiſir ; bientôt l'étonnement ſuccede, enſuite ils ſouffient des narines & henniſſent à-peu-près comme les chevaux, & enfin ils prennent la fuite tous enſemble vers le ſommet des montagnes ; ils cherchent de préférence le côté du Nord, & la région froide ; ils grimpent & ſéjournent ſouvent au-deſſus de la ligne de neige : nous l'avons déjà dit, ces animaux biſulces voyageant dans les glaces & couverts de frimats, ils ſe portent mieux que dans la région tempérée ; autant ils ſont nombreux & vigoureux dans les *ſierras*, qui ſont

les parties élevées des Cordillieres, autant ils sont rares, rabougris, au moins chétifs dans les *lanos* ou parties qui sont au-dessous.

On chasse les *huanacus* ou *lamas sauvages*, pour en avoir la toison; les chiens ont beaucoup de peine à les suivre; & si on donne aux *huanacus* le temps de gagner leurs rochers, le Chasseur & les chiens sont contraints de les abandonner. Ils paroissent redouter la pesanteur de l'air autant que la chaleur; on ne les trouve jamais dans les terres basses, & comme la chaîne des Cordillieres qui est élevée de plus de trois mille toises au-dessus du niveau de la mer au Pérou, se soutient à-peu-près à cette même élévation au Chili, & jusqu'aux terres Magellaniques, on y trouve des *huanacus* ou lamas sauvages en grand nombre; au lieu que du côté de la Nouvelle Espagne où cette chaîne de montagnes se rabaisse considérablement, on n'en trouve plus, & l'on n'y voit que les lamas domestiques que l'on y conduit.

M. *de Buffon* dit que les *pacos* ou *vigognes* sont aux lamas une espece succursale, à-peu-près comme l'âne l'est au cheval; ils sont plus petits & moins propres au service, mais plus utiles par leur dépouille; la longue & fine laine dont ils sont couverts est une marchandise de luxe aussi chere, aussi recherchée & aussi précieuse que la soie. Les pacos qu'on appelle aussi, dit *Frézier*, *alpagnes* ou *alpaques*, & qui sont les vigognes domestiques, sont souvent tout noirs & quelquefois d'un brun mêlé de fauve. La toison des vigognes ou pacos sauvages est de couleur de rose seche, un peu claire, & cette couleur naturelle est si fixe, qu'elle ne s'altère pas sensiblement sous la main de l'Ouvrier. On fait de très-bons mouchoirs de cou, de très-beaux gants & bas fort doux, très-chauds, & autres ouvrages de bonneterie avec cette laine de vigogne; l'on en fait d'excellentes couvertures & des tapis d'un très-grand prix; en un mot le castor du Canada, la brebis de Calmouquie, la chevre de Syrie ne fourniſſent pas un plus beau poil, & la laine de vigogne forme seule une branche dans le commerce des Indes Espagnoles. On distingue même dans le commerce

trois sortes de laines de vigogne, la *fine*, la *carneline* ou *bâtarde*, & le *pelotage*; toutes trois néanmoins sont employées; on en mêle aussi avec du poil de lapin & de lievre pour faire des chapeaux; on en fait aussi des cordes. La vigogne, c'est le *vicunas* des Espagnols, a beaucoup de choses communes avec le lama; mêmes mœurs, même naturel, même tempérament, originaires de la même contrée, habitant le même canton: cependant comme la laine de la vigogne est beaucoup plus longue & plus touffue que celle du lama, l'animal vigogne paroît craindre encore moins le froid; il habite & passe dans les endroits les plus élevés des montagnes; il se tient plus volontiers dans la neige & sur les glaces, & les contrées les plus froides paroissent plutôt le récréer que l'incommoder: on le trouve en grande quantité dans les terres Magellaniques.

Les vigognes ressemblent aussi par la figure aux lamas, mais elles sont plus petites, leurs jambes sont plus courtes & leur muffle plus ramassé; leur toison est d'une teinte bien différente. Les vigognes n'ont point de cornes; elles vont en troupes & courent très-légérement: timides ou craintives, dès qu'elles apperçoivent quelqu'un, elles s'enfuient, & si elles ont des petits, elles les chassent devant elles. Les anciens Rois du Pérou, qui connoissoient bien les avantages réels que produisoient ces animaux, en avoient rigoureusement défendu la chasse, parce qu'ils ne multiplient pas beaucoup, & aujourd'hui il y en a infiniment moins que dans le temps de l'arrivée des Espagnols. Comme la chair des vigognes sauvages ou pacos sauvages n'est pas si bonne que celle des *huanacus* ou lamas sauvages, on ne recherche les vigognes que pour leur toison & pour les bézoards qu'elles produisent. La maniere dont on prend ces animaux, prouve leur extrême timidité, ou si l'on veut, leur imbécillité: quantité d'hommes s'assemblent pour battre les bois, on les fait fuir & ils s'engagent dans des passages étroits où l'on a tendu des cordes à trois ou quatre pieds de haut, le long desquelles on laisse pendre des morceaux de linge ou de drap; ces animaux arrivant à ce passage, sont tellement intimidés par le mouvement de

ces lambeaux agités par le vent, qu'ils n'osent passer au-delà, & qu'ils s'attroupent, demeurent en foule & deviennent la proie du Chasseur qui les tue en grand nombre, ou qui peut les prendre vivantes avec un lacet de cuir; mais si dans la troupe, dit *Frésier*, se trouvent quelques *huanacus* (lamas sauvages), comme ceux-ci sont plus hauts de corps & moins timides que les vigognes, ils sautent par dessus les cordes; & dès qu'ils en ont donné l'exemple, les vigognes sautent de même & échappent aux Chasseurs.

On se sert de vigognes domestiques ou pacos comme des lamas pour porter des fardeaux; mais les pacos étant plus petits, plus foibles, ils portent beaucoup moins; ils sont encore plus capricieux, plus obstinés; lorsqu'une fois ils se couchent avec leur charge, ils se laisseroient plutôt hacher que de se relever. Les Indiens n'ont jamais fait usage du lait de ces animaux, parce qu'ils n'en ont que la quantité nécessaire à la nourriture de leurs petits.

Le grand profit que les Espagnols avoient retiré des vigognes, les avoit engagés à tâcher de naturaliser ces animaux en Europe: ils en ont transporté plus d'une fois, ainsi que des lamas, par ordre du Roi, en Espagne pour les y faire peupler; mais le climat se trouva si peu convenable, qu'ils y périrent tous. Cependant, dit M. *de Buffon*, je suis persuadé que ces quadrupedes plus précieux encore que les lamas, pourroient réussir dans nos montagnes, & sur-tout dans les Pyrénées. Ceux qui les ont transportés en Espagne n'ont pas fait attention qu'au Pérou même les vigognes abandonnées à la Nature, ne subsistent que dans la région froide, c'est-à-dire, dans la partie la plus élevée des montagnes, où elles paissent en troupes; qu'on ne les trouve jamais dans les terres basses, & qu'elles meurent dans les pays chauds: qu'au contraire elles sont aujourd'hui très-nombreuses dans les terres voisines du Détroit de Magellan, où le froid est beaucoup plus grand que dans notre Europe méridionale, & que par conséquent il falloit, pour les conserver, les débarquer non pas en Espagne, mais en Ecosse ou même en Norwege, & plus surement encore aux pieds

des Pyrénées & des Alpes, où elles eussent pu grimper & atteindre promptement la région qui leur convient, celle qui approche le plus de celle des Cordilleres. Je n'insiste sur cela, dit M. *de Buffon*, que parce que je m'imagine que ces animaux seroient une excellente acquisition pour l'Europe, & produiroient plus de biens réels que tout le métal du Nouveau Monde, qui n'a servi qu'à nous charger d'un poids inutile, puisqu'on avoit auparavant pour un gros d'or ou d'argent ce qui nous coûte une once de ces mêmes métaux.

Les animaux qui se nourrissent d'herbes & qui habitent les hautes montagnes de l'Asie & même de l'Afrique, donnent les bezoards que l'on appelle *orientaux*, dont les vertus sont, dit-on, les plus exaltées; ceux des montagnes de l'Europe, où la qualité des plantes & des herbes est plus tempérée, ne produisent, dit M. *de Buffon*, que des pelotes sans vertus qu'on nomme *égagropiles*: (cependant ils donnent quelquefois des bézoards,) & dans l'Amérique méridionale tous les animaux qui fréquentent les montagnes sous la zone torride donnent d'autres bézoards que l'on appelle *occidentaux*, qui sont encore plus solides & peut-être aussi qualifiés que les orientaux: néanmoins ils ne sont pas autant estimés en médecine, ni aussi recherchés des Commerçans. La vigogne sur-tout en fournit en grand nombre, le huanacus en donne aussi, & l'on en tire, dit *Acosta*, *Hist. Natur. des Indes Occid. pag. 207.* des cerfs & des chevreuils dans les montagnes de la Nouvelle Espagne. Les lamas & les pacos ne donnent de beaux bezoards qu'autant qu'ils sont huanacus & vigognes, c'est-à-dire, dans leur état de liberté, en un mot sauvages; ceux qu'ils produisent dans l'esclavage, dans leur condition de servitude, sont petits, noirs & ont peu de vertu: les plus estimés sont ceux dont la couleur est d'un vert obscur, & ils viennent ordinairement des vigognes, sur-tout de celles qui habitent les parties les plus élevées de la montagne, & qui paissent habituellement dans les neiges: de ces vigognes montagnardes les femelles comme les mâles produisent des bezoards, & ces bezoards du

Pérou tiennent le premier rang après les bezoards orientaux, & sont plus estimés que les bezoards de la Nouvelle-Espagne qui viennent des cerfs, & sont les moins efficaces de tous. Vers le mois de Novembre on trouve aussi dans le premier ou second ventricule de quelques vigognes l'espece de bezoard de poil appelé *égagropile*. Voyez maintenant les mots BEZOARD & EGAGROPILE.

PACOCEROCA, *alpinia*, plante d'un genre particulier, selon quelques Botanistes. Cette plante croît à la Martinique & au Brésil, elle a le port & le feuillage de la canne d'inde. Sa tige principale est haute de six à sept pieds, droite, spongieuse, verte, & ne donne point de fleurs; mais de sa racine, & même à côté d'elle, s'élevent deux ou trois autres tiges moins hautes, d'environ un pied & demi, grosses comme le petit doigt, & chargées de fleurs rouges, auxquelles succedent des fruits gros comme une prune, oblongs, triangulaires, remplis d'une pulpe filamenteuse, succulente, d'un jaune safrané, d'une odeur vineuse & agréable au goût, renfermant beaucoup de semences triangulaires, jaunâtres & ramassées en un petit peloton, contenant chacune une petite amande blanche: le suc du fruit donne une teinture d'un très beau rouge, ineffaçable à la lessive. Si l'on y mêle un peu de suc de citron, le mélange teindra alors en un beau violet. La racine de ce cette même plante est noueuse, & rend une belle couleur jaune, étant bouillie dans de l'eau: *Lémery* dit que toute la plante étant écrasée avant que son fruit soit mûr, rend une odeur de gingembre, & que les Indiens l'emploient dans leurs bains.

PACQUIRES, especes d'animaux semblables aux porcs, lesquels se trouvent dans l'île de Tabago: ils ont le lard ferme, peu de poil, & le nombril sur le dos; les Sauvages en mangent beaucoup.

PADUS ou BOIS DE SAINTE-LUCIE: *voyez* à l'article CERISIER.

PAGALOS, oiseau étranger assez semblable à une poule pour le port & la hauteur. Son plumage est de différentes couleurs fort vives; sa queue a environ deux

pieds de longueur : on en a vu dans la Ménagerie de Chantilly.

PAGANELLO. A Veniſe on donne ce nom à une eſpece de goujon de mer, qui eſt mis dans le rang des poiſſons à nageoires épineuſes : *voyez* BOUILLEROT *au mot* GOUJON.

PAGAYE, arbre de Cayenne, mal bâti, creux, mais fort droit. Il y eſt fort commun ; il dure long-temps ; il eſt bon à faire des fourches : on en fait principalement des canots, qu'on appelle de ſon nom. *Maiſon Ruſt. de Cayenne.*

PAGE DE LA REINE. En Hollande on donne ce nom à un beau papillon de Surinam, qui provient d'une chenille toute couverte de pointes, au bout deſquelles pend une toile noire. (Voyez *l'Hiſtoire des Inſect. de Surinam*, *Pl. 48.*)

PAGEL, *rubellio erythrinus.* Poiſſon de mer à nageoires épineuſes, mis par *Artedi* dans le rang des *ſpares.* En hiver, ce poiſſon ne quitte point la haute mer ; mais en été, il vient proche des rivages où on le pêche : la couleur de ſon dos eſt rouſſe en hiver, bleuâtre en été ; celle de ſon ventre eſt blanche : il a beaucoup de reſſemblance extérieure avec le pagre ; cependant il en differe par ſon muſeau plus pointu, plus étroit ; il a le corps moins large, les yeux grands, la bouche petite, ainſi que les dents qui ſont rondes & pointues : ſa chair eſt blanche, nourriſſante, laxative & de bonne digeſtion. Il a des pierres dans la tête ; on pêche plus de femelles que de mâles.

PAGGÈRE. Les Portugais appellent ainſi un animal teſtacée du Cap de Bonne-Eſpérance. *Kolbe* dit qu'il a une eſpece de corne ou piquant ſi venimeux, que ſi la main en eſt bleſſée, on y ſent auſſi-tôt des douleurs très-vives, l'inflammation s'y joint, & même on perd la main, ſi l'on n'eſt ſecouru promptement.

PAGRE, *phagrus*, poiſſon de mer à nageoires épineuſes qu'*Artedi* met, ainſi que le pagel, au rang des ſpares. *Voyez ce mot.* Ce poiſſon ſe trouve ſouvent dans le Nil : *Rondelet* dit qu'il reſſemble, par les nageoires, à la petite dorade ; mais il en differe par les aiguillons, par la queue & par la couleur qui eſt rouſſe en tout temps ;

temps; il a le museau épais & figuré en nez aquilin: ce poisson a une grande vessie pleine d'air. On lui trouve des pierres dans la tête: il vit de bourbe, d'algue, de seches & de petits poissons. *Rondelet*, Hist. Natur. des Poiss. *I. part. L. V. Chap. XV.*

PAGUL ou PAGURUS, est une des especes de cancres de la Méditerranée: il y en a qui pesent jusqu'à dix livres. *Voyez* CANCRE.

PAILLE, se dit du tuyau ou de la tige du blé, de l'avoine, &c. lorsque le grain en est dehors. *Voyez* à la suite du mot FOURRAGE. Les pailles d'un diamant sont autant de défauts. *Voyez* DIAMANT.

PAILLE DE LA MECQUE: *voyez* SCHENANTE.

PAILLE-EN-CUL ou FÉTU-EN-CUL ou OISEAU DES TROPIQUES ou OISEAU DE MER, *leptupus*, c'est le *phaëton æthereus* de *Linnæus*. On a donné ce nom à un genre d'oiseau qui habite la Zone Torride, c'est-à-dire, l'espace qui est entre les deux Tropiques. Le Pere *Labat*, dans ses *Voyages aux Isles de l'Amérique*, *Tome VIII*, *p. 305*, dit que ces oiseaux sont à-peu-près de la grosseur d'un pigeon: ils ont la tête petite & bien faite; le bec d'environ trois pouces de longueur, assez gros, fort, pointu, un peu courbé, dentelé & tout rouge, ainsi que les pieds qui sont palmés: en effet les quatre doigts tiennent ensemble par une membrane commune. Leurs ailes sont très-grandes & longues, à proportion de la grandeur du corps; le plumage est assez blanc. Il y en a aussi de tachetés de noir & de fauves. La queue est composée de douze à quinze plumes de cinq ou six pouces de longueur, du milieu desquelles sortent deux plumes longues d'environ quinze à seize pouces, lesquelles semblent accollées, & n'en faire qu'une: c'est ce qui a donné occasion aux Matelots d'appeler cet oiseau, *paille-en-cul*. Il a un cri perçant; il vole très-bien & fort haut; il s'éloigne de terre autant que l'oiseau nommé *frégate*: mais si le trajet est trop long, il se repose sur l'eau, comme les canards. Il vit de poissons; il pond, couve & éleve ses petits dans les Isles désertes. Le Pere du Tertre, *Hist. Natur. des Antilles*, *T. II*, *p. 276*, croit que c'est un oiseau de paradis; cependant il ne lui ressemble gueres: cet Auteur ajoute,

qu'on ne le voit presque jamais à terre pour couver & nourrir ses petits : les Sauvages font grand cas des deux longues plumes de la queue ; ils les mettent dans leurs cheveux, & les passent aussi dans l'entre-deux des narines en guise de moustaches.

PAIN, *panis*. Nom donné à une pâte cuite qui se fait avec la farine de blé & de plusieurs autres grains, ou fruits & racines, tels que de *seigle*, d'*orge*, de *millet*, de *riz*, d'*épeautre*, d'*avoine*, de *sarasin*, de *manihot*, de *gland*, de *marron*, d'*arum*, d'*asphodele*, &c. Voyez ces mots.

La maniere de bien faire le pain de froment, consiste, 1°. en la quantité & qualité du levain que l'on met dans la farine ; 2°. dans le degré de chaleur de l'eau que l'on verse sur la farine & le levain ; 3°. dans l'exactitude du pétrissage ; 4°. dans le degré de fermentation & de gonflement qu'on doit donner à propos à la pâte ; 5°. enfin, au degré de chaleur qu'on emploie pour faire cuire le pain dans le four.

M. *Bartholin*, Médecin Danois, dit qu'en certains pays de la Norwege, on fait une sorte de pain qui se garde jusqu'à quarante ans ; & c'est dit-il, une commodité, car quand un homme de ce pays-là a une fois gagné de quoi faire du pain, il en cuit pour toute sa vie, sans craindre la famine. Ce pain, de si longue durée, est une sorte de *biscuit* fait de farine d'orge & d'avoine pétries ensemble, & que l'on fait cuire entre deux cailloux creux, ce pain est presque insipide au goût : plus il est vieux, & plus il est savoureux ; de sorte qu'en ce pays-là l'on est aussi friand de pain dur, qu'ailleurs on l'est de pain tendre. Aussi a-t-on soin d'en garder très-long-temps pour les festins, & il n'est pas rare qu'au repas qui se fait à la naissance d'un enfant, on mange du pain qui a été cuit à la naissance du grand-pere.

PAIN A COUCOU, est la plante appelée *alléluia* : voyez ce mot.

PAIN BLANC. *Voyez* OBIER.

PAIN DE CASSAVE ou DE MADAGASCAR. *Voyez* MANIHOT.

PAIN D'ÉPICE. Pain fait de miel & de farine de seigle. C'est à Reims qu'on a l'art de le faire plus nourrissant & d'un goût plus agréable que par-tout ailleurs, il s'y en fait un très grand débit. Ce pain peut servir de cataplasme maturatif dans la formation des abcès qui viennent dans la bouche. Ce qu'on voit dans les droguiers sous le nom de *pain d'épice*, paroît être une préparation du fruit du COURBARIL. *Voyez ce mot.*

PAIN FOSSILE, *artolithus aut panis dæmonum.* Quelques Auteurs ont donné ce nom à des concrétions pierreuses à qui la nature a donné accidentellement la forme d'un pain : ce sont là de vrais jeux de la nature propres à amuser ceux qui ne cherchent que le singulier: ils en trouveront dans le voisinage de la ville de Rothweil, dans les montagnes des environs de Bologne en Italie ; on en rencontre aussi dans les grotes des montagnes du Hartz.

PAIN D'OISEAU ou VERMICULAIRE BRULANTE : *voyez* à l'article JOUBARBE.

PAIN DE POURCEAU COMMUN, *cyclamen orbiculato folio, internè purpurascente.* C'est une plante qui croît dans les bois parmi les buissons, & sous les arbres ; on la cultive aussi dans nos jardins : sa racine est orbiculaire, grosse, large, charnue, fibreuse, noirâtre en dehors, & blanchâtre en dedans ; d'une saveur âcre, piquante, désagréable & sans odeur : elle pousse de larges feuilles arrondies, d'un vert brunâtre, piquetées de blanc en dessus & de pourpre en dessous ; il s'éleve d'entr'elles des pédicules longs qui soutiennent de petites fleurs purpurines, & d'une odeur agréable : ces fleurs sont à cinq étamines, & partagées en cinq lobes qui se rabattent vers le pédicule ; elles sont succédées par des fruits sphériques & membraneux, renfermant des semences anguleuses & brunâtres.

Cette graine, semée dans la terre, ne germe pas ; mais, contre l'ordinaire de toutes les graines, elle se change en un tubercule ou en une racine qui pousse des feuilles dans la suite : ses fleurs paroissent au commencement de l'automne : ses feuilles durent tout l'hiver ; mais elles périssent vers le mois de Mai : sa racine étant séchée, n'est plus âcre ; c'est cependant un vio-

lent purgatif : souvent elle excite des inflammations à la gorge, à l'estomac, aux intestins : on s'en sert extérieurement pour résoudre les tumeurs dures & squirreuses ; appliquée en cataplasme sur l'estomac, elle produit des nausées & le vomissement.

M. *Bourgeois* dit avoir connu un Chirurgien, qui faisoit usage de la racine de cette plante, pour faire sortir l'arriere-faix, lorsque le cordon se trouvoit rompu par l'imprudence d'une sage-femme ignorante ; il en donnoit demi gros en poudre dans un demi verre de vin : ce remede causoit deux ou trois vomissemens, qui étoient bientôt suivis de l'expulsion de l'arriere-faix ; mais ce remede, dit M. *Bourgeois*, me paroît dangereux, & très propre à produire une funeste hémorragie de matrice. Il n'en faut faire usage que dans des cas désespérés, & après avoir tenté inutilement tout autre moyen plus doux & moins dangereux.

PAIN-DE-SINGE. Les François donnent ce nom au fruit d'un arbre monstrueux, qu'ils nomment *calebassier*, & qui croît au Sénégal, où cet arbre est appelé, par les gens du pays, *goui ;* & son fruit, *boui*. Le véritable nom de cet arbre est *baobab*. M. *Adanson* a donné, dans les Mémoires de l'Académie, une exacte description de cet arbre, dont nous allons tracer l'idée d'après l'Extrait de l'Histoire de l'Académie.

On dit communément, observe l'Historien de l'Académie, que la Nature a des bornes & des limites, dont elle ne s'écarte pas dans ses productions : mais ne se presse-t-on pas trop quelquefois de poser ces bornes & d'assigner ces limites ? On regarderoit comme une chose dénuée de vraisemblance la description d'un arbre qui forme seul un bois considérable, dont le tronc a communément deux fois autant de diametre qu'il a de hauteur, & qui met peut-être un grand nombre de siecles à parvenir à cette énorme grosseur ; c'est cependant la peinture fidelle de l'arbre dont nous parlons.

Le baobab ne peut croître que dans les pays très-chauds : il se plaît dans un terrain sablonneux & humide, sur-tout si ce terrain est exempt de pierres qui puissent blesser ses racines ; car la moindre écorchure qu'elles reçoivent est bientôt suivie d'une carie, qui se com-

munique au tronc de l'arbre, & le fait infailliblement périr.

Le tronc de ce singulier arbre n'est pas fort haut; M. *Adanson* n'en a gueres vu qui excédassent soixante à soixante & dix pieds de hauteur; mais il en a vu plusieurs qui avoient soixante & quinze, ou soixante & dix-huit pieds de tour, c'est-à-dire, vingt-cinq à vingt-sept pieds de diametre. Les premieres branches s'étendent presque horizontalement; & comme elles sont grosses, & qu'elles ont environ soixante pieds de longueur, leur propre poids en fait plier l'extrémité jusqu'à terre; en sorte que la tête de l'arbre, d'ailleurs assez réguliérement arrondie, cache absolument son tronc, & paroît une masse hémisphérique de verdure, d'environ cent vingt ou cent trente, & même cent soixante pieds de diametre. Mais d'autres Voyageurs en ont vu de plus gros dans le même pays du Sénégal; *Ray* dit qu'entre le Niger & la Gambie on en a mesuré de si monstrueux, que dix-sept hommes avoient bien de la peine à les embrasser, en joignant les uns aux autres leurs bras étendus, ce qui donneroit à ces arbres environ quatre-vingt-cinq pieds de circonférence, ou environ vingt-neuf pieds de diametre. *Jule Scaliger* dit qu'on en a vu qui avoient jusqu'à trente-sept pieds; ainsi le baobab est dans le regne végétal ce qu'est la baleine dans le regne animal.

L'écorce de cet arbre est grisâtre, épaisse, fort souple & très-liante: celle des jeunes branches est parsemée de poils fort rares. Le bois de l'arbre est tendre, léger & assez blanc. Les feuilles sont longues d'environ cinq pouces, sur deux pouces de large, attachées, trois, cinq ou sept, sur un pédicule commun, à-peu-près comme celles du marronier, auxquelles elles ressemblent beaucoup: elles ne naissent que sur les jeunes branches.

M. *Adanson* a vu de ces arbres, quoique de médiocre grosseur, dont il estimoit que la racine, qui s'étend pour l'ordinaire horizontalement, pouvoit avoir cent cinquante ou cent soixante pieds de longueur. Les fleurs sont proportionnées à la grosseur de l'arbre: elles ont, lorsqu'elles sont épanouies, quatre pouces de longueur,

sur six de diametre. Ces fleurs sont du genre des malvacées : on pourroit les appeler des *belles de jour*, parce qu'elles ne s'ouvrent que le matin, & se ferment à l'approche de la nuit : elles sont composées de cinq pétales, égaux entr'eux, courbés en dehors en demi-cercle, blancs, épais, parsemés de quelques poils. Cette fleur est garnie de sept cents étamines, qui se rabattent sur le pistil comme une houppe ; & chacun de ces filets porte, à son extrémité, un sommet en forme de rein : en s'ouvrant, il laisse échapper la poussiere fécondante, qui est reçue par les stigmates du pistil. Aux fleurs succedent des fruits oblongs, pointus à leurs deux extrémités, ayant quinze à dix-huit pouces de long sur cinq à six de large, recouverts d'une espece de duvet verdâtre, sous lequel on trouve une écorce ligneuse, dure, presque noire, marquée de douze ou quatorze sillons qui la partagent comme en côtes, suivant sa longueur ; ce fruit tient à l'arbre par un pédicule d'environ deux pieds de long.

Ce fruit renferme une espece de pulpe ou substance blanchâtre, spongieuse, remplie d'une eau aigrelette & sucrée. Cette pulpe ne paroît faire qu'une seule masse, quand le fruit est frais ; mais en se desséchant, il se retire & se sépare en un nombre de corps à plusieurs facettes, qui renferment chacun une semence luisante, de la figure à-peu-près de la feve de haricot, de cinq lignes de largeur. *Prosper Alpin* dit que la pulpe qui les enveloppe, se réduit aisément en une poudre fine qu'on apporte ici du Levant, & que l'on connoît depuis long-temps sous le nom très-impropre de *terre sigillée de Lemnos ;* parce qu'effectivement les Mandingues la portent aux Arabes, qui la distribuent ensuite en Egypte, & dans toute la partie orientale de la Méditerranée, où elle est d'un usage familier, prise à la dose d'un gros, soit en substance, soit en dissolution dans une liqueur appropriée, pour les crachemens de sang, le flux de sang hépatique, les fievres pestilentielles & putrides, où l'*alcali* domine, dans la lienterie, la dyssenterie, & pour procurer les regles : elle a les mêmes usages au Sénégal. Cet Auteur prétend qu'il savoit que cette poudre étoit végétale ; mais on ne se seroit certainement pas avisé de cher-

cher au Sénégal l'origine d'une drogue que l'on tiroit de l'Archipel. Nous ajouterons cependant, quoi qu'en dise *Prosper Alpin*, que la terre sigillée de Lemnos est une véritable terre argileuse bolaire, & non une substance immédiatement végétale. Il peut bien exister des pastilles de pulpe de baobab; mais tous les Naturalistes qui ont voyagé, & les Négocians instruits savent très-bien quelle est la nature de la terre de Lemnos, & d'où elle vient. *Voyez l'article* BOLS.

Outre la carie qui attaque, comme nous l'avons dit, le tronc de cet arbre lorsque ses racines sont entamées, il est encore sujet à une autre maladie, plus rare à la vérité, mais qui ne lui est pas moins mortelle; c'est une espece de moisissure qui se répand dans tout le corps ligneux, & qui, sans changer la texture de ses fibres, l'amollit au point de n'avoir pas plus de consistance que la moelle ordinaire des arbres, alors il devient incapable de résister aux coups de vents, & ce tronc monstrueux est cassé par le moindre orage.

La véritable patrie du baobab est l'Afrique; si l'on en voit actuellement en Asie ou en Amérique, ils doivent probablement leur origine à des graines transportées; car les Negres esclaves qu'on fait passer tous les ans d'Afrique dans nos Colonies, ne manquent guere d'emporter avec eux un petit sachet de graines, qu'ils présument devoir leur être utiles; & dans le nombre, est toujours celle de baobab.

On ne verra de long-temps en Asie & en Amérique de ces baobabs aussi gros qu'en Afrique; car quoique ces arbres soient d'un bois fort tendre, ils sont fort long-temps à parvenir à cette énorme grosseur. M. *Adanson* a rassemblé soigneusement tous les faits, dont il a cru pouvoir tirer des connoissances sur cet article. Il a vu deux de ces arbres, dans une des îles de la Magdelaine, sur l'écorce desquels étoient gravés des noms Européens, & des dates, dont les unes étoient postérieures à 1600, d'autres remontoient à 1555, & avoient été probablement l'ouvrage de ceux qui accompagnoient Thevet dans son voyage aux terres australes; car il dit lui-même avoir vu des baobabs dans cet endroit: d'autres enfin paroissent antérieures à

1500; mais celles-ci pourroient être équivoques. Les caracteres de ces noms, avoient environ six pouces de haut, & les noms occupoient deux pieds en longueur, c'eſt-à-dire moins de la huitieme partie de la circonférence de l'arbre. En ſuppoſant même que ces caracteres euſſent été gravés dans la premiere enfance de l'arbre, il en réſulteroit que, ſi en deux cents ans il a pu croître de ſix pieds en diametre, il faudroit plus de huit ſiecles pour qu'il pût arriver à vingt-cinq pieds de diametre, en ſuppoſant qu'il crût toujours également; mais il s'en faut bien que cette ſuppoſition puiſſe être regardée comme vraie, car M. *Adanſon* a obſervé que les accroiſſemens de cet arbre, très-rapides dans les premieres années qui ſuivent ſa naiſſance, diminuent enſuite aſſez conſidérablement; & quoique la proportion dans laquelle ſe fait cette diminution, ne ſoit pas bien connue, il croit cependant devoir ſoupçonner que les derniers accroiſſemens du baobab ſe font avec une extrême lenteur; & que ceux de ces arbres qui ſont parvenus à la groſſeur dont nous avons parlé, peuvent être ſortis de terre dans des temps peu éloignés du Déluge univerſel. En un mot, il paroît par nombre d'obſervations, dit notre Auteur, qu'un baobab qui a vingt-cinq pieds de diametre, a déjà vécu trois mille ſept cents cinquante ans, & qu'il doit vivre & groſſir infiniment au-delà. Celui dont le tronc aura trente pieds de diametre, ſoixante & treize pieds & demi de hauteur, aura cinq mille cent cinquante années: qu'on juge à préſent de l'âge de celui qui avoit trente-ſept pieds de diametre. Mais ce qui eſt bien à remarquer, c'eſt que ceux que l'on éleve ici dans des ſerres tenues ſoigneuſement à la température de leur climat, n'y prennent tout au plus que la cinquieme partie de l'accroiſſement qu'ils reçoivent au Sénégal, dans un temps ſemblable; obſervation qui prouveroit bien, s'il étoit poſſible d'en douter, que la chaleur artificielle ne peut, que très-imparfaitement, tenir lieu aux plantes étrangeres de la température de leur climat naturel.

Le baobab, comme toutes les autres plantes de la famille des malvacées, a une vertu émolliente, capa-

ble d'entretenir dans le corps une transpiration abondante, & de s'opposer à la trop grande ardeur du sang. Les Negres font sécher ses feuilles à l'ombre, & ils en font une poudre qu'ils nomment *alo ;* ils la mêlent avec leurs alimens, non pour leur donner du goût, car cette poudre n'en a presque aucun, mais pour en obtenir l'effet dont nous venons de parler. M. *Adanson* lui-même en a éprouvé la vertu : la tisane faite avec ces feuilles réduites en poudre, l'a préservé, lui & un seul des Officiers François qui voulut s'astreindre à ce régime, des ardeurs d'urine & des fievres ardentes, qui attaquent ordinairement les Etrangers au Sénégal, pendant le mois de Septembre ; & qui regnerent encore plus furieusement en 1751, qu'elles ne l'avoient fait depuis plusieurs années.

Le fruit récent de cet arbre n'est pas moins utile que ses feuilles : on en mange la chair, qui est aigrelette & assez agréable ; on fait, en mêlant le jus de cette chair avec de l'eau & un peu de sucre, une boisson très-propre dans toutes les affections chaudes, dans les fievres putrides & pestilentielles ; enfin, lorsque ce fruit est gâté, les Negres en font un excellent savon en le brûlant, & mêlant ses cendres avec de l'huile de palmier qui commence à rancir.

Les Negres font encore un usage bien singulier de cet arbre prodigieux : ils agrandissent les cavités de ceux qui sont cariés, & en font des especes de chambres, où ils pendent les cadavres auxquels ils ne veulent pas accorder les honneurs de la sépulture : ces cadavres s'y dessechent parfaitement, & y deviennent de véritables momies, sans aucune autre préparation. Le plus grand nombre de ces cadavres, ainsi desséchés, sont ceux des Guiriots, appelés *Guéouls*, qui peuvent être comparés aux anciens Jongleurs, si fameux chez nos Aïeux : ce sont des Poëtes-Musiciens, en assez grand nombre à la Cour des Rois des Negres, qui les divertissent & qui les flattent avec excès dans leurs poésies ; (ils entreprennent aussi la conduite des fêtes, des bals & des danses du pays). Cette supériorité de talens les fait regarder des autres Negres comme des Sorciers.

Cette description du baobab fait présumer que cet arbre est vraisemblablement le plus gros des végétaux connus de l'univers. On cite cependant, dans les Ouvrages de différens Naturalistes dignes de foi & dans quelques Voyageurs célebres, d'autres exemples d'arbres très-connus, & dont la grosseur étoit si prodigieuse, qu'on doit les regarder comme des monstres dans les végétaux. Nous en avons fait mention aux articles POIRIER, SAULE, YEUSE, CEIBA, PLATANE, TILLEUL, ORME, CHÊNE, CHATAIGNIER, &c. *Ray* cite encore le rapport des Voyageurs qui ont vu au Brésil un arbre de cent vingt pieds de tour, c'est-à-dire quarante-deux pieds de diametre ou environ, & qu'on conserve religieusement à cause de son ancienneté : c'est peut-être un *baobab*. Il est dit dans l'*Hort. Malabar.* que le figuier appelé *atti-meer-alou* par les Malabares, a communément cinquante pieds de circonférence, ce qui fait environ dix-sept pieds de diametre, & qu'il y en a un dans la Province de Cochin, près du Temple de Beika, qui vit depuis deux mille ans. Mais *Pline* en cite de beaucoup plus gros : il dit, *Liv. 12, Chap. 5, de son Hist. Nat.* que la conquête d'Alexandre en fit connoître qui avoient pour l'ordinaire soixante pieds de diametre. Il est encore mention d'autres arbres plus merveilleux dans les dernieres Histoires de la Chine : le premier de ces arbres se trouve dans la Province du Suchu, près de la ville de Kien : il s'appelle *fiennich*, c'est-à-dire, *arbre de mille ans.* Il est si vaste, qu'une seule de ses branches peut mettre à couvert deux cents moutons. Un autre arbre de la Province de Chékiang a près de quatre cents pieds de circonférence, & environ cent trente pieds de diametre. M. *Adanson* dit que si la grosseur, si disproportionnée de ces arbres de la Chine à celle des arbres actuellement existans en Europe, n'est pas digne de croyance, le baobab d'Afrique, qui a trente & trente-sept pieds de diametre, suffiroit seul pour en constater la possibilité.

Le châtaigner colossal qui existe encore en Angleterre, qu'on croit âgé de plus neuf cents ans, & dont M. *Collinson* a envoyé la description en 1767 à *M. Du-*

hamel, mérite bien d'être rangé parmi ces individus giganteſques. Suivant l'échelle jointe à la deſcription, le tronc de ce châtaignier a cinquante pieds de circonférence à cinq pieds au-deſſus de terre, c'eſt-à-dire, plus de ſeize pieds & demi de diametre, meſure d'Angleterre.

PAISSE SOLITAIRE ou PASSE, *paſſer ſolitarius*, eſt un oiſeau aſſez commun en France, c'eſt une eſpece de moineau : il tient beaucoup du roſſignol par ſa contenance ; il eſt de la groſſeur d'un *mauvis* : on pourroit le prendre pour une eſpece de grive ; ſon plumage eſt d'un roux fauve grivelé de gris : il remue ſa queue après avoir volé ou marché en avant ; ſon bec eſt rond & pointu, d'un gris noirâtre, & plus fort que celui d'un merle. Il a les jambes & les pieds comme ceux d'une grive & de la même couleur ; il ſe nourrit d'inſectes, & ſe plaît dans les vallées ; il ſe retire dans certains temps de l'année ſous les toits des maiſons couvertes de tuiles concaves ou imbricées ; il fait ſon nid dans les lieux pleins de rochers & de buiſſons. On éleve quelquefois cet oiſeau en cage ; ſon chant doux & agréable le rend eſclave de nos amuſemens, il chante la nuit comme le jour, la vue de la lumiere lui donne encore plus de gaieté : cet oiſeau eſt ſujet aux mêmes maladies que le ſerin commun, ſur-tout à l'épilepſie.

PALAIS DE LIEVRE. *Voyez* LAITRON.

PALE ou PALETTE ou BEC A SPATULE, *platea ſeu leucorodius*. M. *Perrault*, qui dans les *Mém. de l'Académie des Sciences*, *Tom. III*, *Part. III*, a donné la deſcription anatomique de quatre *palettes*, dit qu'il ne ſait pas pourquoi l'on a mis cet oiſeau au nombre des hérons ; car d'avoir un panache au derriere de la tête & vivre de poiſſons comme le héron, ſont des choſes qui lui ſont communes avec beaucoup d'oiſeaux : cet oiſeau eſt, dit-il, d'ailleurs très-différent. Les noms qu'on lui a donnés à cauſe de la figure de ſon bec, ſemblent avoir plus de fondement ; ſon bec vers le bout eſt large, arrondi & aplati en deſſus & en deſſous comme une pelle, & la partie voiſine de la tête eſt étroite & faite comme le manche d'une palette. Ce

bec est droit dans sa longueur, & ressemble en total à la spatule dont les Apothicaires se servent.

L'oiseau *bec à spatule* ne doit pas être non plus confondu avec le pélican. M. *Perrault* dit que ceux qu'il a disséqués étoient blancs par tout le corps, & d'un blanc sale vers l'extrémité des plumes, ayant des plumes courtes au cou, fort longues & fort étroites au derriere de la tête, où elles faisoient comme un panache renversé en arriere; les jambes étoient garnies de plumes jusqu'à moitié, le reste étoit couvert d'écailles, les ongles longs & pointus, le bout du bec supérieur avoit une petite pointe recourbée en dessous; ce bec qui est d'une figure particuliere & extraordinaire, quoique d'une substance ferme, nuancée de gris, de brun, de noir & de rouge, ne sauroit serrer que foiblement, parce qu'il est long de six pouces, mince, uni & flexible. Sur la partie du bec la plus large, il y a quatorze grandes cannelures.

M. *Brisson* fait un genre particulier de la palette, & l'on en distingue plusieurs especes.

Albin dit que ces oiseaux font leur nid dans un petit bois près de Leyde en Hollande sur le sommet des arbres les plus hauts, & qu'ils y engendrent annuellement en grand nombre. Lorsque les petits sont presque en état de s'envoler, ceux qui tiennent le bois à ferme les descendent dans leur nid avec des crochets attachés à de longues perches. Les œufs en sont aussi gros que ceux d'une grande poule, ils sont blancs & mouchetés de rouge. La palette a trente-quatre pouces de longueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité des griffes, & vingt-quatre pouces de cette pointe jusqu'au bout de la queue: elle n'a ni plume, ni duvet au-delà des yeux; l'angle de la mâchoire inférieure est chauve; & selon *Albin*, les doigts de devant sont attachés ensemble par une membrane; il ajoute encore que les bouts de quelques grandes plumes sont noirâtres.

Belon prétend que cet oiseau se voit aussi sur les confins de la Bretagne & du Poitou: on le rencontre assez communément dans la Guiane, près des bords de la mer; dans la mue ses plumes changent de cou-

leur, elles changent auſſi de nuance à meſure que l'animal vieillit. *Willughby* cite la *palette du Mexique*, *tlauhquechul*, qui eſt d'une couleur rouge ou d'un blanc rougeâtre; ſon bec a une couleur cendrée; la tête, le cou & une partie de la poitrine ſont dégarnis de plumes & blancs; il y a un large trait noir entre la tête & le cou. La *palette de Cayenne* eſt d'un beau couleur de roſe, mais cette couleur n'eſt pas toujours la même dans la durée de l'oiſeau; ſon bec eſt jaunâtre. Quand on approche de cet oiſeau, il fait réſonner ſon bec avec le même bruit que ſi l'on frappoit deux palettes de bois l'une contre l'autre.

PALÉTUVIER ou PARÉTUVIER. Quelques-uns prétendent que ce n'eſt pas le même arbre que le *figuier admirable* de l'Amérique. Peut-être ces arbres ne ſont-ils avec l'*enſade*, le *chivef*, le *mangrove*, le *manglier*, &c. que des variétés du même arbre, & qui ont dégénéré par tranſplantation, ou par la nature du ſol & du climat; peut-être auſſi ces différences ne proviennent-elles que de la confuſion que certains Voyageurs peu inſtruits ont jeté dans leurs deſcriptions.

M. *de Préfontaine* dit dans la *Maiſ. Ruſt. à l'uſage de Cayenne*, qu'il y a trois ſortes de palétuviers, le *blanc*, le *rouge* & le *violet*. Le bois n'en eſt bon qu'à brûler. Les Indiens ſe ſervent de l'écorce du violet pour teindre en cette couleur & en noir: elle ſeroit propre auſſi à tanner les cuirs, de même que le chêne & l'orme. Il part des branches des parétuviers un grand nombre de filamens, qui de même que dans la cuſcute, deſcendent verticalement à terre, & y prennent racine, ce qui produit en peu d'années une forêt épaiſſe. Les Caraïbes s'en ſervent pour lier. Quand on veut conſerver les ſeines, les lignes & les autres inſtrumens de pêche, on les fait bouillir avec l'écorce de cet arbre, à laquelle on joint un morceau de gomme d'acajou; la teinture violette qu'ils acquierent, les rend plus durables.

Suivant M. *de Préfontaine*, le palétuvier blanc de Cayenne differe beaucoup par ſes parties eſſentielles du *mangle véritable*; voyez ce mot. M. *Fermin* dit que

la deuxieme écorce du palétuvier reſſemble beaucoup au *quinquina ;* voyez ce mot.

PALIPOU ou PAREPOU, *palma dactylifera, fructu minori turbinato*, BARR. eſt un palmier de Cayenne, dont le *régime* reſſemble à celui du *palmier aouara*. Voyez ce mot.

Le fruit eſt petit ; on le préſente au deſſert cuit ſimplement avec de l'eau & du ſel. Son goût eſt ſi peu attrayant, qu'on a de la peine à s'y accoutumer ; mais on s'y fait, & on le mange enſuite avec d'autant plus de plaiſir, qu'il excite à boire & provoque l'appétit.

PALIURE, ou ÉPINE DE CHRIST, ou PORTE CHAPEAU, ou L'ARGALOU DES PROVENÇAUX, *paliurus*. Eſpece d'arbriſſeau qui croît naturellement dans les haies, aux lieux humides & incultes des pays méridionaux de la France & de l'Italie : il eſt quelquefois de la hauteur d'un arbre. Sa racine eſt dure, ligneuſe ; ſes longues tiges ſont d'un bois très-ferme, courbées & garnies à chaque inſertion de deux épines, dont l'une eſt droite & l'autre crochue. Les épines qui ſe rencontrent proche des feuilles, ſont plus petites & moins nuiſibles que celles des autres endroits, qu'on ne manie pas impunément tant elles ſont aiguës & roides. Ses feuilles ſont petites, arrondies, d'un vert brillant ou rougeâtre : ſes fleurs qui paroiſſent en Juin, ſont jaunes, petites, ramaſſées aux ſommets des branches, diſpoſées en roſe ; elles ſe changent enſuite en un fruit fait en chapeau dégancé, contenant un noyau diviſé en trois loges qui renferment ordinairement chacune une ſemence de la couleur & du poli de la graine de lin.

Les fleurs du paliure paroiſſent à la fin du printems, ou au commencement de l'été, ſon fruit mûrit en automne, & tient à l'arbriſſeau tout l'hiver. Quelques-uns nomment le paliure *épine de Chriſt*, en Anglois *the Chriſt-thorn*, parce qu'ils croient que la couronne d'épine que les Juifs mirent ſur la tête de Notre Sauveur, étoit faite de cet arbriſſeau. Aujourd'hui l'on en fait des haies vives, très-commodes pour empêcher les incurſions des animaux. Il ſupporte auſſi aſſez bien l'hiver : cet arbuſte n'eſt pas encore bien commun en

France. La racine, les tiges & les feuilles de cet arbrisseau prises en décoction, arrêtent le flux de ventre; son fruit est très-diurétique, & facilite l'expectoration dans l'asthme humide. M. *Gustaldi* le regarde comme un excellent remede contre la pierre. Ses graines ont été employées avec succès dans l'hydropisie, comme donnant le ton aux fibres trop relâchées.

On sait que l'espece de paliure qui est le *ceanothus* de M. *Linnæus*, passe pour le spécifique, non-seulement des gonorrhées qu'elle arrête en deux ou trois jours sans aucune suite fâcheuse, mais même des maladies vénériennes les plus invétérées qu'elle guérit, à ce qu'on prétend, en moins de quinze jours dans la Virginie & le Canada où croît cette plante. Pour préparer ce remede, on fait bouillir un gros de la racine dans une livre & demie d'eau jusqu'à réduction d'une livre, qu'on prend en deux fois tous les jours: il faut se servir d'un grand vase pour cette décoction, parce que cette plante jette pendant l'ébullition une grande quantité d'écume qu'il ne faut pas perdre: peut-être que les racines du paliure de notre pays auroient les mêmes propriétés.

PALME DE CHRIST ou KARAPAT, *palma Christi*. Sous-arbrisseau commun aux îles du Vent, dont le tronc & les branches sont creuses comme un roseau, & dont les feuilles ressemblent à celles du plane; mais elles sont plus grandes & plus noires. Les Jardiniers ont comme naturalisé par la culture cette plante dans nos jardins pour servir d'ornement dans les plate-bandes: on prétend qu'elle chasse les taupes. Les Negres tirent de sa graine, qu'on appelle *faux café*, une huile fort commode dans nos habitations d'Amérique, sur-tout pour éclairer & pour faire mourir la vermine ou pour s'en préserver. Les Caraïbes en levent la peau par aiguillettes, en font un frontal contre le mal de tête, chauffent la feuille, en frottent la partie douloureuse, & en reçoivent du soulagement. On ramasse le fruit en Novembre: il s'ouvre de lui-même au soleil & lance au loin ses graines. Quand on en a tiré l'huile avec précaution, on s'en sert pour purger. Huit grosses graines de karapat pilées & brassées dans un verre

d'eau chaude, passées ensuite par une étamine, sont un remede dont les Negres se servent contre la fievre.

On donne aussi le nom de *palma Christi* à la racine d'une espece d'orchis ou satyrion, qui est disposé en main ouverte. Il paroît que le *ricin ordinaire* & le *palma Christi*, autrement *karapat*, different peu l'un de l'autre; *Voyez à l'article* RICIN. Le *palma Christi* est fort commun aussi à la côte de Coromandel. M. *de Romé de l'Isle* est porté à croire que le nom de *karapat* donné à cet arbrisseau, vient de la ressemblance de sa graine avec l'insecte appelé *tique*, que l'on nomme *karapat* aux Indes. Cette conjecture est d'autant mieux fondée, que le nom latin *ricinus* convient également à cet insecte & au ricin, qui est une espece de *palma Christi*.

PALME MARINE ou PANACHE DE MER, *litophyton reticulatum purpurascens*. C'est une espece de lithophyte à réseau, étendu en éventail. Le *lacis* ou les *mailles* de cette production à polypier ressemblent à un rets à prendre des poissons & des oiseaux: il y en a de différentes couleurs, mais plus communément d'un rouge violet; les plus beaux & les plus curieux se trouvent en Amérique & aux Indes Orientales. On dit que les Dames Indiennes s'en servent comme d'éventail dans les grandes chaleurs. *Voyez l'article* LITHOPHYTE *à la suite du mot* CORALLINE, *vol. III, page 13 de cet Ouvrage.*

PALMIER, *palma*. C'est ou un arbre ou un arbrisseau, également vivaces, & ayant depuis deux jusqu'à cent pieds de tige, & dont les feuilles sont ramassées en faisceau au sommet des tiges; les racines forment une masse de fibres communément simples. Les jeunes pousses de la plupart de ces plantes forment, à leur sortie de la terre, comme une bulbe conique, totalement couverte d'écailles imbricées qui ne sont autre chose que des appendices de feuilles imparfaites. La tige est ordinairement simple, non rameuse, cylindrique, remplie d'un suc vineux & entiérement composée de fibres longitudinales très-grossieres, sans écorce apparente; la partie supérieure de la tige, qui porte le nom de *chou*, est ordinairement bonne à manger; les feuilles

sont

sont alternes, divisées en éventail ou en parasol, ou ailées & portées sur un pédicule ou branche feuillée, dont l'origine embrasse souvent la plus grande partie de la tige, mais sans faire gaîne : elles sont toutes d'abord recouvertes d'une poussiere brune & grossiere comme celles des fougeres. Les fleurs sont communément ou toutes mâles ou toutes femelles sur le même pied; quelques-unes sortent d'une gaîne qu'on appelle *spathe*, les autres sont accompagnées d'écailles ; mais elles sont toutes disposées en panicule. Les fleurs, soit mâles, soit femelles, ont chacune un calice à six feuilles. La poussiere fécondante est composée de grains ovoïdes, jaunâtres & transparens ; le fruit qui vient par *régime*, est arrondi ou ovale, charnu & recouvert d'une peau coriace, souvent comme écailleuse, contenant des osselets. La famille des palmiers ne laisse pas d'être nombreuse, & toutes les especes peuvent être élevées de graines. Enfin, quand on examine le palmier en Naturaliste, l'on apperçoit qu'il mérite à tous égards l'attention du Physicien. On peut même dire avec M. *Guettard*, que la classe des palmiferes est une de celles qui ont le plus fourni aux Indiens, aux Asiatiques, aux Américains pour leurs habillemens, pour les cordages, les voiles des navires & autres ustensiles.

PALMIER DE L'AMÉRIQUE ou A PAPIER. C'est le même que l'*arbre de la Nouvelle Espagne*. Voyez ce mot.

PALMIER AOUARA. Espece de chou palmiste qui naît à Cayenne; il croît aussi au Sénégal, au Brésil & aux Indes Orientales: il est fort haut & épineux le long de sa tige. Son fruit vient par bouquets dans une espece de gousse, qui se fend lors de la maturité. Ces fruits sont gros comme des œufs de poule, charnus & de couleur jaune dorée, &c. Les Indiens en mangent : sa chair renferme un noyau gros comme des noix de noyer, ayant trois trous, dont deux sont plus petits. L'écorce de ce noyau a deux lignes d'épaisseur, & est assez dure pour être travaillée au tour : l'amande est blanche & d'une très-grande dureté ; étant mâchée elle a d'abord un goût agréable, qui devient bientôt âcre, semblable à celui d'un fromage rance. Les ha-

bitans de la Guiane s'en servent pour engraisser leurs bestiaux; mais une autre utilité bien plus grande, c'est qu'on tire de cette amande par décoction ou par expression une huile épaisse comme du beurre, de couleur jaune dorée & d'un goût assez doux.

Dès qu'on a récolté la noix d'aouara, qu'on ramasse au pied de l'arbre, on la met par tas qu'on couvre de feuilles & qu'on charge de bois, pour la garantir du grand air & du soleil: elle est pourrie au bout de quinze jours: on la pile alors dans un canot (espece d'auge qui ne sert qu'à cet usage), afin de séparer toute la chair d'avec le noyau. On acheve avec la main ce que le pilon n'a pu faire. On jette cette chair dans une chaudiere placée sur le feu; & quand elle fume fortement, on la met sous une presse; l'huile qui en sort est reçue dans un vase & mise tout de suite dans des pots. Quand toute la récolte est finie, on fait rebouillir cette huile pour la purger de ses parties aqueuses; alors elle est de garde: on s'en sert pour éclairer dans les maisons; elle brûle en entier sans la moindre perte. Les Negres de l'Amérique & de l'Afrique en mangent comme du beurre: ils en assaisonnent leurs mets. Les Blancs s'en servent aussi pour le même usage, quand ils n'en ont point d'autre. Cette graisse s'appelle *huile de Sénégal* ou *de Quioquio*, ou *de Pumicin* ou *de palme des Iles*. Etant extérieurement appliquée, elle est propre pour adoucir la goutte & les rhumatismes, pour les douleurs de coliques & celles d'oreilles, & pour fortifier les nerfs. Cette huile de palme est différente de celle du Commerce, qui communément est falsifiée.

L'amande du fruit aouara est adoucissante & astringente. Le noyau qu'on a séparé du fruit, se conserve pendant un année, au bout de laquelle on le casse pour en tirer l'amande. Il ne faut prendre de ces amandes que trois ou quatre poignées, qu'on jette dans une chaudiere moyenne mise sur un feu modéré, pour pouvoir les brasser à son aise. L'huile surnage peu-à-peu: on l'enleve à mesure avec une cuiller: on a grand soin de la passer avant que de la mettre dans un vase, parce qu'elle se fige presqu'aussi-tôt. Si on la veut employer en friture, on la fait bouillir auparavant avec un peu de

cassave ; ce qui acheve de lui ôter un goût aromatique qui lui est naturel. Huit cuillerées de cette huile dans quatre d'eau de pourpier, purgent fortement, mais sans tranchées, le Negre le plus robuste. *Mais. Rust. de Cayenne.*

PALMIER A COCO. En parlant des cocos de mer des Maldives à deux lobes, nommés ainsi parce qu'on les trouvoit flottans sur le rivage de ces îles, où ils étoient portés par les courans, nous avons omis de dire que la découverte du palmier qui les produit dans l'île des *Trois Freres* (aujourd'hui l'*île Sechelles*), située presque sous l'Equateur dans l'Océan Indien, en a été faite par M. *Marion*, Capitaine de vaisseau de la Compagnie des Indes. *Voyez* COCO.

PALMIER DATTIER. Nous avons parlé de cet arbre célebre à l'article DATTES.

PALMIER ÉVENTAIL. *Voyez* LATANIER.

PALMIER HUILEUX ou OLÉAGINEUX, *palma foliorum pediculis spinosis, fructu pruni-formi, lacteo, oleoso.* Il ressemble beaucoup au *palmier aouara.* Il est fort commun sur la côte de Guinée & dans les îles du Cap Vert, où il s'éleve beaucoup. Cet arbre a merveilleusement réussi à la Jamaïque & aux Barbades. Les Negres tirent de son tronc une liqueur enivrante, une espece d'huile ou de beurre de la pulpe de son fruit, & emploient l'écorce du tronc à en faire des nattes pour se coucher dessus.

PALMIER DU JAPON ou D'AMBOINE ÉPINEUX. C'est le *palmier à sagou.* Voyez SAGOU.

PALMIER DES INDES, *palmites.* Son tronc est fort gros ; ses feuilles sont très-longues ; son fruit est un peu plus gros qu'un pois, rond, fort dur, couvert d'une petite écorce grise, facile à séparer, sous laquelle il est lisse, compacte & marbré : on en fait des chapelets.

PALMIER MARIN. C'est un animal marin que M. *Guettard* a vu à Paris dans le cabinet de feue Madame de Bois-Jourdain. Par le dessin exact qu'il en a fait tirer, ainsi que par l'examen qu'il en a fait, il prétend avoir découvert quelle étoit la véritable origine de divers corps fossiles, qui avoit été inconnue jusqu'à

préſent. Ces foſſiles ſont les *encrinites*, les *pierres étoilées* ou *aſtéries*, les *trochites* & les *entroques*, dont il eſt parlé d'une maniere fort obſcure dans les Auteurs. Il eſt bon de prendre une idée de ces différens foſſiles que l'on voit aujourd'hui dans quantité de cabinets d'Hiſtoire Naturelle.

Les pierres étoilées ou *aſtéries* ſont des corps plats à cinq rayons, ſur le plat deſquels on apperçoit deux lignes courbes comme burinées, ſe réuniſſant aux extrémités, & qui, par leur concours au centre, forment une eſpece d'étoile. Pluſieurs de ces aſtéries, miſes les unes ſur les autres, forment une colonne pentagone, à laquelle on donne le nom d'*aſtérie* ou *colonne en étoile*.

Les *trochites* different des aſtéries en ce qu'elles n'ont point de pointes & qu'elles ſont circulaires: on obſerve ſur leur plat des rayons partant du centre & allant à la circonférence. Les colonnes, compoſées de celles-ci, ſont cylindriques & ſe nomment *entroques*.

Les trochites, ainſi que les colonnes qui en ſont compoſées, ſont percées dans leur milieu d'un petit trou qui forme un canal dans l'axe de la colonne: on obſerve de petites dentelures à la circonférence de toutes ces pierres.

Les *encrinites* ſont des amas de petits corps de différentes figures, qui forment par leur réunion des lames longues & ſillonnées en travers, dont l'aſſemblage a quelque reſſemblance avec la fleur d'un lis: c'eſt le *lilium lapideum*. Quelquefois l'encrinite ſe trouve ſoutenue par une de ces colonnes formées d'aſtéries ou de trochites dont nous venons de parler, & alors on la nomme *encrinite à queue*. On va voir, par la deſcription du palmier marin, le rapport qu'il a avec ces foſſiles que l'on trouve abondamment en Suiſſe, en Allemagne & en France.

Qu'on imagine une colonne pyramidale, compoſée de pierres étoilées à cinq pans, miſes les unes ſur les autres, on aura une idée aſſez juſte de ce qui compoſe le corps de cet animal. Cette colonne a, d'eſpace en eſpace, des renflemens, d'où partent cinq pattes, com-

posées de plus ou moins de vertebres, suivant leur longueur, & qui finissent par un crochet pointu. M. *Guettard* compare l'ensemble de cet animal à la plante qu'on nomme *prêle* ou *queue de cheval*, qui offre des verticilles semblables, & rangées de même par étages décroissans. La colonne qui, dans la planche gravée, est de six pouces de longueur, est surmontée par une espece d'étoile composée de cinq pattes, mais qui se subdivisent communément trois fois en deux branches. Ces pattes sont garnies de doigts crochus, & de mamelons qui peuvent concourir avec ces doigts à retenir la proie de l'animal, & peut-être à la sucer.

Il est aisé de voir que les encrinites & les pierres étoilées ont été produites par les débris de la charpente osseuse de cet animal, qui ont formé les cavités où se sont depuis moulés ces fossiles. On sera moins surpris du nombre que l'on trouve de ces pétrifications, lorsqu'on saura qu'un seul palmier marin contient près de vingt-six mille vertebres, nombre d'articulations prodigieux, & qui doit donner à cet animal une grande souplesse, favorable pour exécuter les mouvemens nécessaires pour s'emparer de sa proie. M. *Guettard* apprit, lors de la lecture de son Mémoire, que M. *Ellis*, de la Société de Londres, avoit reçu un animal du même genre, quoique différent à beaucoup d'égards, qui avoit été pêché dans les mers du Groënland à une très-grande profondeur; il le rangeoit au nombre des étoiles de mer, connues sous le nom de *tête de Méduse*. *Voyez ce qu'il en est dit à la suite du mot* ZOOPHYTE. Que de conjectures différentes n'avoit-on pas données sur l'origine de ces corps fossiles! conjectures qui sont devenues plus vraisemblables lorsqu'on a consulté l'observation, & que l'inspection seule de l'animal même a changées en certitude.

L'Auteur de l'Histoire de l'Académie observe très-bien, dans l'Extrait qu'il a donné du Mémoire curieux de M. *Guettard*, pour l'année 1755, & dont nous avons tiré cet article; il observe, dis-je, que c'est le sort ordinaire de toutes les questions physiques : on dispute, tant qu'on ne fait qu'imaginer; l'observation seule peut lever les doutes & conduire à la vérité.

PALMIER DE MONTAGNE, *yecolt*, est un fruit de l'Amérique, long & couvert de plusieurs écailles brunâtres, un peu semblables à la pomme de pin, de différentes figures & grandeurs, renfermant une chair qu'on mange avec plaisir. Les Américains l'appellent *guichelle popotli* : l'arbre qui le produit pousse d'une seule racine deux ou trois troncs, qui portent des feuilles longues, étroites & épaisses comme celles de l'iris, mais beaucoup plus grandes. Ses fleurs sont en rose, disposées par grappes. On fait avec les feuilles de ce palmier un fil très-délié, très-fort, & propre à fabriquer de la toile.

PALMIER NAIN ÉPINEUX, *palma minor*. Il est commun en Espagne & en Portugal ; il n'a pas plus de quatre pieds de hauteur ; mais ses racines s'étendent fort loin, & se multiplient si facilement, qu'un grand pays qui n'est pas cultivé en est couvert au bout de vingt ans. Ses feuilles servent à faire des balais de jonc. Il y a aussi le palmier nain sans épines, à feuilles en éventail & à racines multipliantes.

PALMIER ROYAL. *Voyez à l'article* PALMISTE.

PALMIER A SAGOU. *Voyez* SAGOU.

PALMIER SANG-DRAGON. *Voyez à l'article* SANG-DE-DRAGON.

PALMIER VINIFERE de Thevet, *palma vinifera Theveti*. Ce palmier est célebre par sa verdure perpétuelle & est précieux aux Ethiopiens qui percent son tronc à deux pieds de terre, & en tirent une liqueur qui a, dit-on, le goût du vin d'Anjou.

PALMIPEDE, *palmipes*. Se dit de tout oiseau qui a le pied plat, & dont les pieds sont joints par une membrane comme dans les oies ; ce qui facilite les oiseaux aquatiques à nager.

PALMISTE, *palma altissima non spinosa, fructu pruniformi, minore, racemoso sparso*. SLOANE. Dans quelques contrées de l'Amérique on donne ce nom à une sorte de palmier, dont la principale se nomme PALMISTE FRANC, *palma dactylifera latifolia*. Sa tige n'a qu'un pouce de bois en rond, mais brun, pesant, compacte & si dur, que la hache y a prise difficilement : le dedans est molasse, spongieux : cette tige est droite,

& haute assez souvent de plus de trente pieds. Il n'a qu'une racine de médiocre grosseur qui s'enfonce en terre, & qui ne seroit pas capable de le soutenir, si elle n'étoit pas aidée & comme nourrie par une infinité d'autres petites racines rondes, flexibles, entrelacées de maniere à faire une grosse motte ou bourrelet au pied de l'arbre à raz de terre; du sommet de la tige, sortent des branches fort longues, qui sont garnies de deux rangs de feuilles vertes, longues & étroites: au bout du tronc il se forme une espece d'étui, d'où sort un épi de petites fleurs, au-dessous desquelles naissent des fruits de la grosseur d'une petite balle de paume, & dont on retire, ainsi que de son amande, une huile bonne pour éclairer. Quand le palmiste est abattu, on coupe sa tête à deux pieds ou deux pieds & demi au-dessous de l'endroit où les branches feuillées prennent naissance; & après qu'on a ôté l'extérieur, on trouve le chou; ce sont des parties comme feuillées, arrangées en éventail non déplié, blanches, tendres, délicates, & d'un goût approchant de celui des culs d'artichauts: on les appelle en cet état, *choux palmistes*. On les lave & on les mange en salade, ou bien on les fait bouillir dans l'eau avec du sel; puis on les met, tout égouttés, dans une sauce blanche: on les met aussi dans la soupe. Enfin, de quelque maniere qu'on les mange, ils sont très-bons; c'est une nourriture légere & de facile digestion, mais comme pour l'avoir il faut sacrifier l'arbre entier, on en mange moins souvent qu'on ne feroit sans cela.

Le tronc des palmiers est excellent pour faire des tuyaux & des gouttieres: il sert aussi aux usages du tour & de la menuiserie. Entre plusieurs especes de palmistes, on en distingue une si épineuse, que les Sauvages sont obligés, avant de s'en servir, de brûler les épines, en faisant du feu autour de l'arbre: le chou de cette espece est un peu jaune, d'un goût de noisette & incomparablement meilleur que celui du palmiste franc, dont les feuilles servent aux Sauvages à couvrir leurs cases.

Ray cite d'après *Ligon* & quelques autres Voyageurs, un palmier appelé *palmiste royal* aux Antilles de l'Amé-

rique, dont le tronc, qui a à peine demi-pied de diametre, a jusqu'à trois cents pieds de longueur. Un tel arbre, s'il existe, est sans contredit un prodige; mais M. *Adanson* dit que ces Voyageurs veulent sans doute parler du *rotan*, qui, en serpentant, entrelace tous les arbres d'une forêt; car les plus grands palmistes que cet Auteur a vus dans l'île de Gorée en Afrique, ne passent guere cent pieds, quoiqu'ils ayent plus de deux pieds de diametre, ils n'ont ordinairement que soixante à quatre-vingts pieds de tige.

Les Malabares & autres peuples de l'Inde Orientale, se servent aussi des feuilles d'une espece de palmiste différent de celui d'Amérique, assez semblable à celui qui se voit au jardin du Roi. Le *palmiste de l'Inde* est infiniment plus fort & plus élevé; ses feuilles sont à l'extrémité de la branche, & disposées en éventail. C'est sur ces feuilles ou *olles*, plus consistantes que celles du cocotier, que les Indiens écrivent; ils en prennent une entre le doigt index & le pouce de la main gauche: il y a une petite échancrure à l'ongle de ce pouce, qui sert de point d'appui à un stilet de fer qu'ils tiennent de la droite, & avec lequel ils gravent avec une vîtesse surprenante ce qu'ils veulent écrire dans la longueur de cette feuille, qui a assez d'épaisseur pour que les traits ne paroissent point du côté opposé: aussi quand l'un est rempli, se sert-on de l'autre. Le fruit de ce palmier est de la grosseur d'une poire de coing, quand il est vert & peu avancé; son écorce, qui a près d'un pouce d'épaisseur, renferme une pulpe moelleuse d'assez bon goût, qui fond en un instant dans la bouche, & y laisse une grande fraîcheur: l'écorce alors n'est bonne à rien; mais quand il est mûr, c'est tout le contraire: on ne suce que l'écorce, & l'on jette le dedans qui s'est changé en un noyau très-dur. Le tronc de ce palmier sert aux mêmes usages que celui du cocotier. L'on peut dire aussi que le vin du palmiste est encore plus estimé pour sa douceur, que celui du cocotier. Il peut se conserver potable jusqu'au troisieme jour; plus il est récent, frais, & plus il est agréable; après ce temps, il devient aigre. Il se tire au moyen d'une incision faite à l'arbre.

Presque tous ces arbres lorsqu'ils sont abattus, attirent de fort loin une multitude de gros scarabées noirs, qui s'introduisent sous l'écorce, dans la partie la moins dure, y déposent leurs œufs & produisent des larves ou vers gros comme le pouce, dont les Créoles & les habitans des Antilles se régalent, après les avoir fait rôtir dans des brochettes de bois. *Voyez* VER PALMISTE *& l'article* CAUMOUN.

PALMISTE. Nom donné à des oiseaux du genre du merle qui nichent dans les arbres palmistes; il y en a de différentes couleurs.

PALO DE CALENTURAS, est le nom que les Espagnols du Pérou donnent à l'arbre du *quinquina*. *Voyez ce mot.*

PALO DE LUZ. *Voyez* BOIS DE LUMIERE.

PALOMARIA. *Voyez à l'article* BAUME VERT.

PALOMBE. *Voyez* PIGEON RAMIER.

PALOURDE ou PELOURDE. Coquillage bivalve, assez commun sur les côtes du Poitou, d'Aunis, de Saintonge & de Provence, & de la famille des cames à bases ovales régulieres. *Voyez à l'article* CAME. La couleur de sa coquille est d'un blanc sale, tirant sur le jaunâtre; en quelques endroits elle est large d'un pouce, & longue d'un pouce & demi. M. *d'Argenville* dit que c'est une came à réseaux fins & serrés, rayonnée du centre à la circonférence, traversée de cercles, avec de grandes taches blanches, plus foncées que la couleur principale. Les valves sont ordinairement dentelées & cannelées. Cet animal fait sortir comme la boucarde, du côté le plus alongé de sa coquille, un corps membraneux & lisse, qui se divise en sortant en deux tuyaux faits en croissant, minces & blancs, avec une ouverture garnie de petits poils blancs, qui, en se repliant sur eux-mêmes, servent à sceller la bouche de l'animal, & à retenir l'eau dont il est rempli: ces deux tuyaux se communiquent intérieurement, de maniere que l'eau de la mer, qui s'insinue, soit par le canal supérieur, soit par le canal inférieur, se vide tout d'un coup, quand l'animal veut se remplir de nouvelle eau. Au moyen de cette opération réitérée, l'animal peut jeter de l'eau à près

de quinze pieds de distance. Tout son mouvement consiste à porter en ligne droite une jambe triangulaire, de couleur blanche, dans l'endroit où la coquille est située, & à l'opposite des deux tuyaux, sans la replier sur elle-même. Comme cette coquille est ordinairement dans un fond vaseux, elle ne tend qu'à s'ensevelir & à se cacher dans la vase ; elle tâte d'abord le terrain à gauche & à droite, & à force de mouvement elle s'y enfonce, en repliant sa jambe sous la valve qui touche à terre. *Voyez les Mém. de l'Acad. des Sciences, année 1710.* On en mange beaucoup à Marseille & à Toulon.

PALTAS ou AGUACATE. *Voyez* AVOCAT.

PAMBE, *pambus.* Poisson plat qui a quelquefois douze à quinze pouces de long, sur huit à dix de large : sa couleur est d'un vert changeant ; il est garni d'aiguillons tournés vers la tête, au dessous desquels il y a une longue pointe, tant sur le dos qu'au ventre, à laquelle sont attachées ses nageoires, qui s'étendent jusqu'à la queue. Le pambe est fort estimé, & l'on en fait beaucoup d'usage dans toutes les Indes Orientales, sur-tout dans l'île d'Amboine & à la côte de Coromandel. Pour le conserver long-temps, il suffit de le dessécher au soleil, & quand on veut le manger, on le laisse quelque temps tremper dans l'eau pour l'attendrir. On a encore une autre méthode de le dessécher, c'est de le couper par tranches & de le mettre ainsi dans une espece de saumure faite avec le tamarin : c'est du poisson confit de cette maniere que les Portugais appellent *pesce-para.* Les vaisseaux exposés à des voyages de long cours, en font de grandes provisions.

PAMPELMOUSE. C'est le nom que les Siamois donnent à une espece d'orange de la grosseur d'une tête humaine, dont la chair est excellente & d'un goût de fraise ; entre cette chair pulpeuse & la peau est une substance épaisse comme le doigt, blanchâtre & fort amere : le jus de ce fruit est très-rafraîchissant. La pampelmouse n'est pas rare aux îles de France & de Bourbon, & dans plusieurs autres de l'Océan Oriental. Elle est encore assez commune à Surinam, où elle a plus de douze pouces de diametre ; sa chair est un peu

aigrelette, avec un véritable goût de raisin. Ce fruit se trouve aussi à Cayenne, où il a été apporté du Brésil; il ne ressemble pas mal à une très-grosse poire; on nous a fait manger de ce fruit à différentes tables de Londres.

PAMPRE. Nom que les Anciens ont donné à un *sarment de vigne*, communément orné de ses feuilles & de son fruit; *pampinus aut capreolus vitis.*

PANACÉE. *Voyez* GRANDE BERCE.

PANACHE. Nom d'un petit coléoptere. Cet insecte vient d'un ver qui se loge dans le bois & les troncs d'arbres, tels que le saule où il fait des trous ronds & profonds, se métamorphose en insecte ailé, prend son essor & vole sur les fleurs. On le distingue par ses antennes pectinées d'un côté, d'où lui vient le nom de *panache.*

PANACHE ou PANESSE. *Voyez* PAON.

PANACHE DE MER. Espece de lithophite. *Voyez* PALME MARINE.

PANACOCO, est un très-grand arbre qui passe à Cayenne pour l'ébene noire. Son aubier, dit M. *de Préfontaine*, est aussi compacte que son cœur, ou son bois proprement dit; il sert à faire des pilons si durs qu'ils émoussent le fer: chaque graine de cet arbre est comme un pois parfaitement rouge, avec une petite tache noire. Les Négresses en font des colliers, des chapelets, &c. Il y a un petit panacoco qui est une liane, dont on se sert en tisane; ses fleurs sont jaunes; le fruit est petit, rouge, marqueté de noir.

PANAIS ou PASTENADE, *pastinaca*, est une plante dont on distingue plusieurs especes.

1°. Le PANAIS ORDINAIRE DES JARDINS ou PASTENADE, ou le GRAND CHERVI CULTIVÉ, *pastinaca sativa latifolia.* Cette plante, fort en usage dans la cuisine, est cultivée dans les jardins potagers, & dans les terres grasses. Il paroît, dit M. *Deleuze*, qu'elle n'est qu'une variété de la suivante. Sa racine est longue, quelquefois grosse comme le poignet, charnue, jaunâtre, ayant au milieu une corde ou nerf qui parcourt sa longueur: elle est d'une assez bonne odeur & d'un goût agréable; elle pousse une tige à la hauteur de

trois ou quatre pieds, groſſe, droite, ferme, cannelée, vide & rameuſe; ſes feuilles ſont amples, compoſées d'autres feuilles ſemblables à celles du térébinthe, oblongues, dentelées, velues, d'un vert brunâtre, rangées par paires, d'un goût aſſez agréable & aromatique. Les ſommités ſont terminées par des parafols qui ſoutiennent de petites fleurs jaunes, diſpoſées en roſe, auxquelles ſuccedent des ſemences jointes deux à deux, grandes, ovales, minces & bordées d'un feuillet. Cette plante fleurit en Juillet & Août, la ſeconde année après qu'elle a été ſemée. Les racines de panais ſont plus nourriſſantes que les carottes. *Boerhaave* en employoit la graine dans les coliques néphrétiques & les abcès de la veſſie.

Les Anglois prétendent que les panais trop vieux cauſent le délire & la folie, ce qui fait qu'ils les appellent *panais foux*.

2°. Le PANAIS SAUVAGE ou le PETIT PANAIS, *paſtinaca ſylveſtris*. Cette plante differe de la précédente non-ſeulement en ce que ſes feuilles ſont plus petites, mais auſſi en ce que ſa racine eſt plus menue, plus dure, blanche & moins bonne à manger: elle croît aux lieux incultes, dans les prés ſecs, ſur les collines & ailleurs parmi les plantes ſauvages: quoique ce panais ſoit moins recherché pour la cuiſine, on peut le ſubſtituer au précédent dans l'uſage médicinal: ſa fleur paroît en été: on prétend que par la culture & une ſemaille réitérée de ſa graine on lui fait produire le panais cultivé, de même qu'avec la carotte ſauvage on fait naître la carotte cultivée.

3°. Le PANAIS SAUVAGE ÉTRANGER, *panax coſtinum*. Sa tige s'éleve beaucoup plus que les précédentes: ſes racines ſont vivaces, d'une odeur forte, & ſes feuilles recompoſées: il en ſort dans le pays une gomme-réſine jaunâtre, ſemblable à l'*opopanax*; voyez ce mot. Ses racines s'emploient pour purger: c'eſt un faux *coſtus*.

La racine de la premiere eſpece de panais eſt la plus tendre, d'une odeur & d'un goût beaucoup plus agréable & plus facile à digérer qu'aucune autre eſpece: elle eſt diurétique, hyſtérique & fébrifuge; la mar-

melade de panais, légérement sucrée, excite l'appétit & est très-propre pour les convalescens.

Jean Bauhin avertit avec raison de prendre garde de confondre les racines de panais avec celles de la ciguë, qui ont beaucoup de ressemblance, tant par le goût douceâtre que par la figure: la mépriſe a, dit-on, occasionné des accidens funestes.

PANAPANA. Nom que les Marins du Brésil donnent à une espece de chien de mer connu sous le nom de *marteau*. Voyez ce mot.

PANAVA ou PANOMA. *Voyez* Bois des Moluques.

PANGOLIN ou PANGGOELING. Nom que les Indiens de l'Asie méridionale donnent à une espece d'animal que les François habitués aux Indes Orientales appellent improprement *lézard écailleux;* car cet animal dont il y a deux especes, l'une que les Indiens nomment dans leur Langue *pangolin*, & l'autre *phatagin*, est un quadrupede vivipare, au lieu que les lézards sont des *reptiles ovipares*. Ce sont, dit M. *de Buffon*, deux especes extraordinaires, peu nombreuses, assez inutiles & dont la forme bizarre ne paroît exister que pour faire la nuance de la figure des quadrupedes à celle des reptiles; on les trouve aussi en Afrique.

Le pangolin & le phatagin ont, il est vrai, au premier coup d'œil quelque ressemblance avec le lézard; mais ils ont d'autres caracteres très-distinctifs. Le *pangolin* est de la longueur de trois pieds, sa queue est à-peu-près de la même longueur: le *phatagin* est plus petit. Ils ne vivent que de fourmis: ils ont la langue très-longue, la gueule étroite & sans dents apparentes; le corps très-alongé; ils ont cinq ongles à chaque pied. Tous les lézards sont recouverts en entier, & jusques sous le ventre d'une peau lisse & bigarrée de taches qui représentent des écailles; mais le pangolin & le phatagin sont recouverts de véritables écailles, excepté sous la gorge, sous la poitrine & sous le ventre. Le phatagin, comme tous les autres quadrupedes, a du poil sur toutes ces parties inférieures du corps; le pangolin n'a qu'une peau lisse & sans poil dans ces

endroits-là. Les écailles qui revêtent & couvrent toutes les autres parties du corps de ces deux animaux, ne sont pas collées en entier sur la peau; elles y sont seulement fortement adhérentes par leur partie inférieure: elles sont mobiles comme les piquans du porc-épic: & elles se relevent ou se rabaissent à la volonté de l'animal; elles se hérissent lorsqu'il est irrité; elles se hérissent encore plus lorsqu'il se met en boule comme le hérisson. Ces écailles sont si grosses, si dures & si piquantes qu'elles rebutent tous les animaux de proie, c'est une cuirasse offensive, dit M. *de Buffon*, qui blesse autant qu'elle résiste; les animaux les plus cruels & les plus affamés, tels que le tigre, la panthere, ne font que de vains efforts pour dévorer ces animaux armés; ils les foulent, ils les roulent; mais en même temps ils se font des blessures larges & douloureuses dès qu'ils veulent les saisir; ils ne peuvent ni les violenter, ni les écraser, ni les étouffer en les surchargeant de leur poids. Ce sont de tous les animaux, sans en excepter même le *porc-épic*, ceux dont l'armure est la plus forte & la plus offensive; ensorte qu'en contractant leur corps & présentant leurs armes, ils bravent la fureur de tous leurs ennemis.

Lorsque le pangolin & le phatagin se resserrent, ils ne prennent pas comme le hérisson, une figure globuleuse & uniforme; leur corps en se contractant se met en peloton; mais leur grosse & longue queue reste au dehors, & sert de cercle ou de lien au corps. Cette partie extérieure par laquelle il paroît que ces animaux pourroient être saisis, se défend d'elle-même; elle est garnie dessus & dessous d'écailles aussi dures & aussi tranchantes que celles dont le corps est revêtu, & les côtés de la queue sont revêtus d'écailles tranchantes qui ôtent toute prise à leurs ennemis les plus voraces. Mais l'espece humaine triomphe par force & par adresse de toutes les especes d'animaux. Les Negres mangent la chair du pangolin & du phatagin qu'ils trouvent délicate & saine, & ils se servent de leurs écailles à plusieurs petits usages.

Le pangolin & le phatagin n'ont rien de rebutant que la figure; ils sont doux, innocens, & ne font au-

un mal; ils ne se nourrissent que d'insectes; ils courent lentement, & à l'approche du danger se retirent quand ils peuvent dans des trous de rochers, ou dans les terriers qu'ils se creusent & où ils font leurs petits: on voit deux pangolins dans le cabinet de Chantilly. On nomme aussi cet animal *diable de Java*, ou de *Tayoyen*, ou de *Tayven*.

PANICAUT, & PANICAUT DE MER. *Voyez* CHARDON ROLAND.

PANIS ou PANIZ, *panicum*, est une plante que *Dioscoride* compte parmi les especes de blé, & *Galien* parmi les légumes: selon *Lémery*, le panis ressemble en tout au millet, excepté que ses fleurs & ses graines naissent dans des épis fort serrés; au lieu que celles du millet naissent en bottes & en bouquets. Les graines du panis sont en grand nombre, plus petites & plus rondes que celles du millet, luisantes, enveloppées de follicules blanches, jaunâtres ou purpurines. Le calice des panis, dit M. *Adanson*, a deux balles & renferme deux fleurs, dont l'une est hermaphrodite & l'autre est mâle ou avorte; (selon d'autres Auteurs, le calice ne renferme qu'une fleur & est formé de trois balles, dont une plus petite que les autres) & il est accompagné d'une enveloppe composée d'une jusqu'à dix écailles en forme de soies, où d'une seule piece découpée en dix à trente piquans. Toutes les especes de panis ont trois étamines, deux styles & deux stigmates en pinceau. La gaîne de leurs feuilles est aplatie par les côtés avec ou sans couronne de poils.

On seme le panis dans les champs en Allemagne, en France, en Italie: il demande une terre légere, sablonneuse, humide. On faisoit autrefois beaucoup plus d'usage du panis dans la boulangerie qu'aujourd'hui: on voit cependant encore dans la Hongrie, dans la Boheme, & en quelques autres lieux de l'Allemagne, des personnes qui font avec la semence mondée de son écorce des bouillies & des crêmes qui ne sont pas désagréables; on la fait cuire dans du lait comme du riz; elle est astringente, elle nourrit peu, & se digere difficilement. Les oiseaux sont assez friands de cette graine.

PANORPE, *panorpa*, *aut muſca ſcorpiura*. Nom que divers Naturaliſtes donnent à la *mouche ſcorpion*, appellée ainſi de ſa partie antérieure, faite comme celle du ſcorpion : c'eſt la fauſſe guêpe de *Swammerdam*, qui infeſte les raiſins ; elle fréquente auſſi les prairies. *Voyez* MOUCHE-SCORPION.

PANTAGA, eſt l'arbre du ſantal rouge. *Voyez au mot* SANTAL.

PANTHERE, ONCE & LÉOPARD. Nous allons réunir ſous cet article, d'après l'illuſtre M. *de Buffon*, ces trois eſpeces d'animaux, qui non-ſeulement ont été pris les uns pour les autres par les Naturaliſtes, mais qui même ont été confondus avec les eſpeces du même genre qui ſe ſont trouvées en Amérique. Ces animaux ſont propres à l'ancien Continent, & ſur-tout aux climats chauds ; ils ne ſe ſont jamais répandus dans les pays du Nord, ni même dans les régions tempérées.

La premiere eſpece de ce genre, eſt la grande panthere, que nous appellerons ſimplement *panthere*, *panthera*.

Le corps de cet animal, lorſqu'il a pris ſon accroiſſement entier, a cinq ou ſix pieds de longueur, en le meſurant depuis l'extrémité du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, laquelle eſt longue de deux pieds. Sa peau eſt pour le fond du poil, d'un fauve plus ou moins foncé ſur le dos & ſur les côtés du corps, & d'une couleur blanchâtre ſous le ventre : elle eſt marquée de taches noires en grands anneaux, ou en forme de roſe ; ces anneaux ſont bien ſéparés les uns des autres ſur les côtés du corps, évidés dans leur milieu, & la plupart ont une ou pluſieurs taches au centre, de la même couleur que le tour de l'anneau ; ces mêmes anneaux, dont les uns ſont ovales, & les autres circulaires, ont ſouvent plus de trois pouces de diametre : il n'y a que des taches pleines ſur la tête, ſur la poitrine, ſur le ventre & ſur les jambes.

La ſeconde eſpece eſt l'*once*. Cet animal eſt beaucoup plus petit que la panthere, n'ayant le corps que d'environ trois pieds & demi de longueur : il a le poil plus grand que la panthere, la queue de trois pieds de longueur, & quelquefois davantage. Le fond du poil de l'once

l'once est d'un gris blanchâtre sur le dos & sur les côtés du corps, & d'un gris encore plus blanc sous le ventre ; les taches sont à-peu-près de la même forme, & de la même grandeur que celle de la panthere.

La troisieme espece est le *léopard*. C'est un animal du Sénégal, de la Guinée & des autres pays Méridionaux du vieux Continent. Il est un peu plus grand que l'once, mais beaucoup moins que la panthere, n'ayant guere plus de quatre pieds de longueur : la queue a deux pieds ou deux pieds & demi : le fond du poil sur le dos & sur les côtés du corps est d'une couleur fauve, plus ou moins foncée : le dessous du ventre est blanchâtre : les taches sont en anneaux ou en roses ; mais ces anneaux sont beaucoup plus petits que ceux de la panthere ou de l'once, & la plupart sont composés de quatre ou cinq petites taches pleines ; il y a aussi de ces taches pleines, disposées irrégulièrement.

Ces trois animaux sont, comme l'on voit, très-différens les uns des autres. Les Fourreurs appellent les peaux de la premiere espece, *peaux de panthere ;* ils appellent ceux de la seconde espece, *peaux de tigre d'Afrique ;* enfin, ils appellent improprement *peaux de tigre*, celles de l'animal que nous appelons *léopard*.

La panthere que nous avons vu vivante, continue M. *de Buffon*, a l'air féroce, l'œil inquiet, le regard cruel, les mouvemens brusques, & le cri semblable à celui d'un dogue en colere. Elle a la langue rude & très-rouge, les dents fortes & pointues, les ongles aigus, tranchans & durs, la peau belle, d'un fauve plus ou moins foncé, semée de taches noires arrondies en anneaux. La panthere est de la taille & de la tournure d'un dogue de forte race, mais moins haute de jambes.

La panthere, cet animal qui habite les climats brûlans de l'Asie & de l'Afrique, & qui repaire dans les forêts les plus épaisses, paroit être d'un naturel fier, sauvage & peu flexible ; l'industrie humaine la dompte plutôt qu'elle ne l'apprivoise : jamais elle ne perd en entier son caractere féroce, sanguinaire ; cependant on s'en sert pour la chasse, mais il faut beaucoup de soin pour la dresser, & encore plus de précautions pour la conduire & l'exercer. On la mene sur une charrette,

enfermée dans une cage de fer, dont on lui ouvre la porte, lorsque le gibier paroît; elle s'élance avec impétuosité vers la bête, l'atteint ordinairement en trois ou quatre sauts, la terrasse & l'étrangle: mais si elle manque son coup, elle devient furieuse, & se jette quelquefois sur son maître, qui d'ordinaire prévient ce danger, en portant avec lui des morceaux de viande, ou des animaux vivans, comme des agneaux, des chevreaux, & lui en jette un pour opposer à sa rage & calmer sa fureur.

L'once au contraire, s'apprivoise aisément, on la dresse à la chasse; elle est assez douce pour se laisser manier & caresser à la main. Il y en a de si petites, qu'un cavalier peut les porter en croupe. Aussi-tôt que le Chasseur apperçoit une gazelle, il fait descendre l'once, qui est si légere, qu'en trois bonds elle saute au cou de la gazelle, quoiqu'elle courre fort vîte: si la gazelle lui échappe, elle demeure sur la place, honteuse & confuse.

L'espece de l'once paroît être plus nombreuse & plus répandue que celle de la panthere; on la trouve très-communément en Barbarie, en Arabie, & dans toutes les parties Méridionales de l'Asie; elle s'est même étendue jusqu'à la Chine, où on l'appelle *Hinen-pao*.

Ce qui fait qu'on se sert de l'once pour la chasse, dans les climats chauds de l'Asie, c'est que les chiens y sont très-rares; il n'y a, pour ainsi dire, que ceux qu'on y transporte, & encore perdent-ils, en peu de temps, leur voix & leur instinct. En Europe, nos chiens n'ont pour ennemi que le loup; mais dans un pays rempli de tigres, de lions, de pantheres, de léopards & d'onces, qui sont tous plus forts & plus cruels que le loup, il ne seroit pas possible de conserver des chiens. Au reste, l'once n'a point l'odorat aussi fin que le chien, elle ne sent pas les bêtes à la piste; il ne lui seroit pas possible non plus de les atteindre dans une course suivie, elle ne chasse qu'à vue. Souvent elle grimpe sur les arbres, pour attendre les animaux au passage, & se laisser tomber dessus: cette maniere

d'attraper la proie est commune à la panthere, au léopard, à l'once & au carcajou.

Le léopard a les mêmes mœurs & le même naturel que la panthere, & je ne vois nulle part, dit M. *de Buffon*, qu'on l'ait apprivoisé comme l'once, ni que les Negres de Guinée & du Sénégal, où il est très-commun, s'en soient jamais servis pour la chasse. L'espece du léopard paroît être sujette à plus de variétés que celle de la panthere & de l'once; cependant dans toutes les peaux de léopard, les taches sont chacune à-peu-près de la même grandeur, & c'est plutôt par la force de la teinte qu'elles different, étant moins fortement exprimées dans quelques-unes de ces peaux, & beaucoup plus fortement dans d'autres.

La panthere, l'once & le léopard, se plaisent en général dans les forêts touffues, & fréquentent souvent les bords des fleuves & rodent autour des habitations isolées, où ils cherchent à surprendre les animaux domestiques & les bêtes sauvages qui viennent avec sécurité chercher les eaux. Ils se jettent rarement sur les hommes, quand même ils seroient provoqués, il faut cependant en excepter les grands accès de colere: la seule vue d'un homme met ordinairement le léopard en fuite. Ils grimpent avec beaucoup d'adresse & d'agilité sur les arbres, où ils suivent les chats sauvages, & les autres animaux qui ne peuvent leur échapper; nous avons dit qu'il leur arrive quelquefois de rester sur les arbres & de guetter au passage les animaux, alors ils se laissent tomber dessus, les déchirent cruellement avec leurs griffes, leurs dents, & les dévorent. Quoiqu'ils ne vivent que de proie, & qu'ils soient ordinairement fort maigres, les Voyageurs prétendent que leur chair n'est pas mauvaise à manger; les Indiens & les Negres la trouvent bonne, mais il est vrai qu'ils trouvent celle du chien encore meilleure, & qu'ils s'en régalent comme si c'étoit un mets délicieux. A l'égard de leurs peaux, elles sont toutes précieuses, & font de très-belles fourrures. La plus belle & la plus chere est celle du léopard: une seule de ces peaux coûte huit ou dix louis, lorsque le fauve en est vif & brillant, & que les taches en sont bien noires & bien terminées.

Dapper (*Descript. du pays des Negres, page 257*) dit que quand on a pris quelque léopard dans un des villages où le Roi du pays des Negres ne demeure pas, on est obligé de le porter au lieu de sa résidence. Ils regardent le léopard comme le roi des forêts; ce qui a produit une plaisante coutume. Les habitans du village royal vont au devant des porteurs du léopard pour se battre avec eux, croyant qu'il leur seroit honteux qu'un autre Roi que le leur entrât dans la place sans avoir résisté auparavant: on en vient d'abord aux mains; enfin le combat cesse à l'arrivée d'un Député du Roi Negre, qui introduit les athletes dans le village; on les mene en triomphe sur le marché, où tout le peuple est assemblé: là on écorche le léopard; on lui arrache les dents: c'est le lot du Roi Negre; puis on fait cuire sa chair, on la distribue au peuple, qui passe tout ce jour-là comme si c'étoit une fête solennelle. Le Roi ne mange point de cette chair; parce que, dit-il, *nul animal ne mange son semblable:* il ne veut pas même s'asseoir sur sa peau, ni marcher dessus. Pour éviter ce malheur il la fait vendre aussi-tôt. Quant aux dents il en fait présent à ses femmes, qui les pendent à leurs habits ou en font des colliers mêlés de corail.

PANTOUFLIER. *Voyez* MARTEAU.

PAON, *pavo.* C'est un oiseau connu de tout le monde (c'est le *thuchim* des Hébreux) & distingué de tous les autres bipedes ou oiseaux par la longueur de sa queue & par les yeux brillans dont elle est ornée. Le paon est du genre des poules & grand comme une dinde médiocre: le mâle a la tête, le cou & le commencement de la poitrine d'une couleur bleue foncée; la tête petite à proportion du corps, ornée de deux taches grandes, oblongues, dont l'une passe par-dessus les yeux; l'autre plus courte, mais plus épaisse, est située au-dessous des yeux, puis suivie d'une troisieme marque noire: il porte au sommet de la tête une huppe qui n'est point entiere comme dans quelques autres oiseaux; mais composée en quelque sorte de vingt-quatre tiges nues, foibles, verdâtres, qui portent en leurs sommités des especes de fleurs de lis bleuâtres. Le paon a le bec grisâtre, très-ouvert, courbé comme

dans tous les oiseaux qui vivent de grain, avec des narines fort larges: l'iris des yeux est jaunâtre: le cou est un peu long & fort menu à proportion du corps; le dos est d'un blanc tiqueté de fauve & de taches noires transversales; les ailes sont pliées, noires en-dessus du côté du dos, & rousses en-dessous du côté du ventre, ainsi qu'en dedans: la queue disposée de façon qu'elle est comme divisée en deux; car lorsqu'elle s'étend en forme de roue, il y a des plumes plus petites, brunâtres, qui semblent composer la queue entiere: elles ne sont pas roides comme les plus longues, mais étendues comme dans la plupart des oiseaux; de sorte qu'il faut nécessairement que les plus longues s'inserent dans un muscle, au moyen duquel elles puissent se redresser & s'étendre. *Belon* dit que ces dernieres naissent du croupion, & que les premieres sont faites pour les soutenir. Le croupion est d'un vert foncé, & l'oiseau le dresse avec sa longue queue: les plumes du croupion sont courtes & comme tuilées; elles dérobent la vue d'une partie des longues plumes de la queue, qui étant étendues sont toutes de couleur de châtaigne, ornées de lignes dorées très-élégantes, qui vont de bas en haut, & terminées par d'autres plumes fourchues, d'un vert très-foncé, qui ressemblent à des queues d'hirondelles. Les ronds, ou comme le dit *Pline*, les *yeux des plumes* ont l'éclat de la chrysolite, & des couleurs d'or & de saphir. Ces mêmes yeux sont composés de quatre cercles, dont le premier est d'or, le second châtain, le troisieme vert, & celui du milieu est bleu ou de saphir, à-peu-près de la figure & de la grandeur d'une féverole. Ces couleurs ont la beauté majestueuse de l'arc-en-ciel & les reflets pétillans des pierreries. Les cuisses, les jambes & les pieds sont d'un cendré parsemé de taches noires, & armés d'éperons ou d'ergots très-forts, à la maniere des coqs: le ventre près de l'estomac est d'un bleu verdâtre, noirâtre ou du moins brunâtre vers l'anus. C'est ainsi que la Nature a réuni sur le plumage du paon toutes les couleurs du ciel & de la terre, pour en faire le chef-d'œuvre de sa magnificence: elle les a mêlées, assorties, nuancées, fondues de son inimitable pinceau, & en a fait un tableau unique où elles tirent

de leurs mélanges avec des nuances plus ſombres & de leurs oppoſitions entr'elles un nouveau luſtre & des effets de lumiere ſi ſublimes, que notre art ne peut ni les imiter ni les décrire.

La femelle qui s'appelle *paoneſſe* ou *panache*, n'a pas les couleurs du plumage ſi brillantes que le mâle: elle eſt d'un gris cendré, tirant ſur le brunâtre; le ſommet de la tête & la huppe ſont de même couleur, tachetés cependant de points verdâtres; l'iris des yeux eſt tout-à-fait plombé; le menton tout blanc; les plumes du cou ondées, vertes, blanches aux extrémités près de la poitrine. Sa queue n'a pas le beau pennage du mâle.

La Nature a pourvu le paon de très-grandes ailes, afin qu'il puiſſe s'élever en l'air & aller ſe percher ſur les toits, dans les arbres & ſur les lieux élevés où il ſe plaît, mais il dégrade les tuiles & autres eſpeces de couvertures des bâtimens; les paons cauſent auſſi beaucoup de dégâts aux jardins. Comme l'oie, il ſert de garde aux maiſons où il eſt; c'eſt une ſentinelle vigilante qui crie ordinairement quand elle voit quelqu'un, mais ſon cri eſt triſte & déſagréable.

Le paon ſe nourrit des mêmes alimens que les poules, il aime ſur-tout l'orge: il a la lubricité du coq; il peut ſatisfaire à ſix femelles; ſon ardeur le porte à attaquer même celle qui couve, & à caſſer ſes œufs, à moins qu'il n'en trouve d'autres qu'il puiſſe cocher à diſcrétion: auſſi ſa femelle cache-t-elle ſon nid autant qu'elle le peut dans un lieu retiré. Elle pond douze œufs à chaque couvée, mais la premiere couvée n'eſt que de ſix; ces œufs ont la coque dure, griſâtre & joliment tachetée: les petits ſont difficiles à élever, on les nomme *paonneaux*. Dès l'âge de trois ans ils ſont en état de ſe reproduire; ils s'accouplent au printems. On obſerve que juſqu'à ce qu'ils ſoient un peu forts, ils portent mal leurs ailes, les ont trainantes & ne ſavent pas encore s'en ſervir. Dans ces commencemens, dit M. *de Buffon*, la mere les prend tous les ſoirs ſur ſon dos & les porte l'un après l'autre ſur la branche où ils doivent paſſer la nuit; le lendemain matin elle ſaute devant eux du haut de l'arbre en bas, & les accoutume à en faire autant pour la ſuivre, & à faire uſage de leurs ailes. Lorſque

les petits ont quarante jours d'âge, l'aigrette commence à leur pousser, & alors ils sont malades comme les dindonneaux lorsqu'ils poussent le *rouge* : ce n'est que de ce moment que le coq paon les reconnoît pour les siens ; car tant qu'ils n'ont point d'aigrette, il les poursuit comme étrangers.

L'on prétend que ces oiseaux sont étrangers d'origine, & qu'ils ont été apportés des Indes en Europe où ils se sont bien naturalités ; ils sont à présent communs par-tout : ils tiennent le premier rang parmi les oiseaux domestiques, comme l'aigle entre les oiseaux de proie ; mais ils étoient autrefois si rares qu'on n'en voyoit que dans les Cours des Princes à cause de leur beauté ravissante : on les appeloit *oiseaux de Médie* ou *de Perse*.

Le paon est le seul des oiseaux, à l'exception du coq d'Inde, de l'outarde, qui ait la faculté d'étendre sa queue en rond, comme s'il se plaisoit à en faire voir les yeux rayonnans. (On connoît aussi une espece de pigeon qui porte sa queue étendue en rond, & qu'on appelle *pigeon paon.*) M. *Pluche* observe que le paon est à la vue ce qu'est le rossignol à l'oreille : cet oiseau, dit-il, l'emporte sur le coq, les canards, le martin-pêcheur, le chardonneret, les perroquets, le faisan, &c. Au milieu de tous ces oiseaux dont la parure est magnifique, on distingue le paon, les yeux se réunissent sur lui. M. *de Buffon* dit dans son *Histoire Naturelle des Oiseaux*, que si l'empire appartenoit à la beauté & non à la force, le paon seroit sans contredit le roi des oiseaux : il n'en est point sur qui la Nature ait versé ses trésors avec plus de profusion ; la figure noble, l'air de sa tête ornée d'une aigrette mobile & légere, la légéreté ou l'élégance de sa taille, sa démarche grave & majestueuse, les couleurs de son corps, les yeux & les nuances de sa queue, l'or & l'azur dont il brille de toutes parts, couleurs qui changent à différens aspects ; cette roue qu'il promene avec pompe, sa contenance pleine de dignité & de fierté, l'attention même avec laquelle il étale ses avantages aux yeux d'une compagnie que la curiosité lui amene ; tout en est singulier & ravissant : mais fier de tant d'appas lorsqu'il voit les yeux toujours fixés sur lui, il marche en face du soleil,

se mire dans sa queue, alors il semble enfler d'orgueil. C'est aussi sous cet aspect éclatant que, dans la saison du printems, il se présente aux yeux de sa femelle pour la séduire.... Cet oiseau est tout seul un spectacle éblouissant, & sa beauté a été cause qu'il a été consacré à la Déesse *Junon*.

Voici ce que dit M. *de Buffon* concernant les amours du paon. Si la femelle vient tout-à-coup à paroître devant le paon; si les feux de l'amour se joignant aux secretes influences de la saison, le tirent de son repos, lui inspirent une nouvelle ardeur & de nouveaux désirs, alors toutes ses beautés se multiplient, ses yeux s'animent & prennent de l'expression, son aigrette s'agite sur sa tête & annonce l'émotion intérieure. Les longues plumes de sa queue déploient en se relevant leurs richesses éblouissantes, sa tête & son cou se renversant noblement en arriere, se dessinent avec grace sur ce fond radieux, où (dans un beau jour de printems) la lumiere du soleil se joue en mille manieres, se perd & se reproduit sans cesse, & semble prendre un nouvel éclat plus doux & plus moelleux, de nouvelles couleurs plus variées & plus harmonieuses; chaque mouvement de l'oiseau produit des milliers de nuances nouvelles, des germes de reflets ondoyans & fugitifs, sans cesse remplacés par d'autres reflets & d'autres nuances toujours diverses & toujours admirables. Le paon ne semble alors connoître ses avantages que pour en faire hommage à sa compagne, qui en est privée sans en être moins chérie, & la vivacité que l'amour mêle à son action, ne fait qu'ajouter de nouvelles graces à ses mouvemens qui sont naturellement nobles, fiers & majestueux, & qui dans ces momens sont accompagnés d'un murmure énergique & sourd qui exprime le désir. Mais ces plumes brillantes qui surpassent en éclat les plus belles fleurs, se flétrissent aussi comme elles & tombent chaque année. Le paon, comme s'il sentoit la honte de sa perte, craint de se faire voir dans cet état humiliant, & cherche les retraites les plus sombres pour s'y cacher à tous les yeux, jusqu'à ce qu'un nouveau printems, lui rendant sa parure accoutumée, le ramene sur la scene pour y jouir de l'hommage dû

à sa beauté. Nous avons dit ci-dessus qu'il est sensible à l'admiration; que le vrai moyen de l'engager à étaler ses belles plumes, c'est de lui donner des regards d'attention & des louanges; au contraire, si on paroît le regarder froidement & sans beaucoup d'intérêt, il replie tous ses trésors & les cache à qui ne sait point admirer.

On voit plus communément dans les pays septentrionaux des *paons blancs* que des paons colorés, & quoiqu'ils aient la même configuration & les mêmes caracteres que notre paon vulgaire, nous ne savons pas trop par quelle raison il y a des personnes qui les trouvent plus merveilleux que les nôtres; au reste les Russes & les Danois en disent autant des nôtres: c'est ainsi que l'on apprécie davantage ce qui naît chez l'étranger; cependant le paon coloré doit être le plus admirable. *Antoine Mizauld* rapporte, que si l'on veut produire une race de paons blancs, il n'y a qu'à tenir les femelles qui pondent & couvent, enfermées dans des lieux tendus en blanc de toutes parts; il prétend que leurs yeux étant continuellement frappés de cette couleur blanche, les petits en reçoivent l'impression. Notre Auteur avoue qu'il ne sait pas encore si ce secret a jamais été éprouvé; & nous n'y avons aucune foi. Le paon blanc a sur les longues plumes de sa queue les mêmes yeux ou ronds, & également conformés, à la couleur près. Ces paons ne sont que des variétés du paon ordinaire. M. *Brisson* fait mention du *paon panaché*, *pavo varius*, (c'est le produit du mélange du paon ordinaire & du paon blanc,) & de l'espece d'oiseau appelé *hocco*, voyez ce mot; & du *paon du Thibet*, *pavo Thibetanus*, c'est le *chin-tchien-khi* des Chinois; son plumage est par ondes blanches, bleues, violettes & dorées. *Voyez* CHIN-QUIS.

Aldrovande a représenté & décrit le *paon du Japon* mâle & femelle: cet oiseau est aussi d'une rare beauté; sa queue a cependant moins de plumes que celle des paons de France, la couleur en est plus brune; les yeux de la queue sont beaucoup plus grands; les plumes du dos sont vertes & bleues; celles de la poitrine sont d'un jaune doré, mêlé de vert & de bleu; le commencement des ailes est bleu & vert.

Le *paon de la Chine* eſt d'un brun châtain, le mâle a deux ergots dans la longueur de chaque jambe.

Aux environs de Barroche, ville du Royaume de Cambaye, il y a, dit *Tavernier*, quantité de paons diſperſés dans les champs par troupes; ils ſont très-ſauvages, & s'enfuient au travers des brouſſailles dès qu'ils apperçoivent le Chaſſeur. Ils ſe perchent la nuit ſur les arbres; on en approche avec une eſpece de banniere où des paons ſont repréſentés de chaque côté, on met des chandelles allumées au haut du bâton; la lumiere ſurprenant le paon, fait qu'il alonge le cou juſques ſur le bâton, où il ſe prend dans une corde à nœuds coulans que tire celui qui tient la banniere. Il ſe trouve auſſi des paons ſauvages à la côte de Coromandel. Le paon d'Afrique ou de Guinée, *avis Afra*, *aut pavo Africanus*, eſt la *Demoiſelle de Numidie*. Voy. ce mot.

Sur les confins d'Angola, on trouve un bois environné de murs, où l'on éleve des paons, dont les plumes ſervent à faire les paraſols & les enſeignes du Roi. Celui de ſes ſujets qui voleroit de ces plumes ſeroit puni par l'eſclavage.

Les Auteurs de la *ſuite de la Mat. Médic.* diſent que le paon eſt aujourd'hui un oiſeau de peu d'uſage en aliment: ſa chair dure, ſeche & difficile à digérer, le fait rejeter de toutes les bonnes tables; mais en Médecine, cette chair eſt eſtimée contre le vertige; les bouillons qu'on en fait ſont diurétiques: la fiente de cet animal paſſe pour être ſpécifique contre l'épilepſie: la doſe en eſt depuis un ſcrupule juſqu'à un gros: on eſtime l'uſage de ſes œufs propre à remédier à la goutte vague.

PAON. On donne auſſi ce nom à un grand & beau papillon, ſur les ailes duquel ſont peints des yeux chatoyans ſemblables à ceux de la queue du paon. *Voy.* au mot CHENILLES A TUBERCULES. Voyez auſſi *œil de paon* & *chenille épineuſe*.

PAON MARIN, *pavo marinus*, eſt un poiſſon à nageoires épineuſes, mis dans le rang des *labres*: il eſt orné des plus belles couleurs, vert, bleu, noir & rouge. *Voyez* TOURD.

PAON DE MER, petit insecte observé dans les Mers de Ceylan, par M. *Godeheu ;* le corps de ce petit insecte est d'une forme alongée, il porte sur la tête deux cornes terminées par quelques nervures très-déliées. Lorsqu'on observe cet insecte au microscope, on voit sa queue ornée d'un panache singulier, elle se termine en deux branches, de chacune desquelles sortent quatre véritables plumes couleur de rose, qui contrastent avec la couleur verdâtre de son corps. *Voy. le III. tom. des Mém. présentés à l'Académie Royale des Sciences.*

PAON DE MER, dit *l'oiseau de combat.* Voyez ce mot.

PAON DES ROSES, oiseau connu à Cayenne sous ce nom : il n'a de rapport avec le paon que par la maniere de soutenir sa queue : d'ailleurs il a le caractere & la forme du râle : il fréquente les prairies & suit le cours des ruisseaux : sa queue est longue & bien fournie. *Voy.* le *Journal d'Histoire Naturelle*, par M. l'Abbé *Rozier. Mars, 1772.*

PAPAICOT, arbre des Iles de l'Amérique, qui ne pousse aucune branche, & dont les feuilles qui ressemblent à celles du figuier, regnent le long du tronc, & font au sommet une espece de couronne : il porte sous ses feuilles des fruits orangés, de la grosseur d'une poire de coing, dont la chair est semblable à celle du melon, mais doucereuse & fade. On dit que dans l'île de la Guadeloupe, ils deviennent aussi gros que nos plus beaux melons. Le papaicot n'est peut-être qu'une sorte de *papayer.* Voyez *ce mot.*

PAPAROI. Nom donné à une espece de grenadier à fleurs doubles. *Voyez* les mots GRENADIER & BALAUSTIER.

PAPAS. *Voyez* BATATTE.

PAPAYER ou PAPAU, *papaya aut pinoguacu*, arbre de l'Amérique & des Indes orientales, dont on distingue deux especes, l'une mâle & l'autre femelle : la premiere, dit *Feuillée*, ne porte que des fleurs sans fruits, & la seconde ne fructifie point sans être fécondée par la premiere, ainsi qu'on l'a remarqué dans les papayers qui ont fleuri dans les serres chaudes du Jardin

du Roi, & qui étant tous de l'espece femelle n'ont point fructifié faute de mâles. *Pison* assure cependant que chaque individu porte des fleurs & des fruits, sans avoir besoin l'un de l'autre. La différence qu'on y remarque est que l'espece appelée mâle a les feuilles moins grandes que la femelle, & qu'elle est commune dans les forêts. L'espece femelle y est plus rare & se cultive dans les jardins; plus de la moitié inférieure de la tige dans l'une & l'autre espece est sans feuilles, (le reste en est garni tout autour), sans branches & couverte d'une écorce cendrée. Peut-être que ces différences ou distinctions de sexe dans les papayers ne proviennent que de leur fécondité, considérés les uns comme sauvages, les autres comme cultivés.

Le PAPAYER MALE, *pinoguacu mas*, croît à la hauteur de vingt pieds, & est de la grosseur de la cuisse; son bois est creux & spongieux en dedans, si tendre qu'on peut le couper entiérement en travers d'un seul coup de sabre: il s'éleve en peu de temps: ses feuilles sont à-peu-près grandes comme celles du figuier, découpées en six ou sept parties, attachées à des queues longues, grosses, rondes, creuses, rougeâtres & recourbées: ses fleurs sont longues, disposées en étoiles jaunâtres, inodores: elles sont, dit-on, stériles.

Le PAPAYER FEMELLE, *pinoguacu fœmina*, que l'on cultive dans les jardins au Brésil, aux îles Antilles & aux Indes orientales, est un peu plus élevé; ses feuilles sont bien plus grandes & attachées à des queues vertes. Lorsque cet arbre est voisin d'un papayer mâle, il porte toute l'année des fleurs & des fruits: ses fleurs sont grandes comme celles du glayeul, composées de cinq feuilles jaunes & d'une odeur de muguet: son fruit que l'on nomme *papaie* & qui est suspendu au haut de la tige, près de l'endroit où les tiges & les feuilles prennent naissance, a la figure & la grosseur d'un melon médiocre, verdâtre d'abord, & ensuite jaune, mais il contient un suc laiteux, d'un goût fade, moins exquis que la chair du melon; on s'en sert pour effacer les taches de la peau produites par la chaleur du soleil: le milieu de la chair est d'un beau jaune, garni d'un grand nombre de semences grosses comme des grains de co-

flandre, ovales, cannelées, rougeâtres en deſſus, blanchâtres en dedans, d'un goût aigrelet. Chacune de ces ſemences miſes en terre produit, dans l'eſpace d'une ou deux années, un arbre papayer portant fruit; mais ſa durée n'eſt que de quatre ou cinq ans, après quoi ſa ſommité ſe pourrit & fait périr le reſte de l'arbre. *Lémery* dit que, quoique ce fruit ſoit très-bon étant mangé crud, il eſt encore meilleur quand il a été cuit avec de la viande, ou confit en marmelade avec du ſucre & de l'écorce d'orange: c'eſt un bon ſtomachique; ſes ſemences ſont eſtimées propres pour le ſcorbut, diurétiques & hyſtériques.

On lit dans la *Maiſon Ruſtique de Cayenne*, que les ſemences du papayer commun, dont les Créoles mangent le fruit, ont un goût de poivre; & qu'un ſcrupule de ces ſemences en poudre, pris pendant quelques jours, fait mourir les vers.

Le fruit du papayer ſauvage ne ſe mange point. Cet arbre eſt plus gros que le papayer ordinaire, & il ne rapporte des feuilles qu'au haut de la tige. Il n'eſt pas rare de rencontrer vers le pied de ces arbres, de petits ſerpens cachés, que les Portugais appellent *cobre de Capello*. Voyez *ce mot*.

PAPE, *fringilla tricolor. Catesbi* donne ce nom à un bel oiſeau de la Caroline, qui eſt de trois couleurs & gros comme un ſerin; on le trouve auſſi à la Louiſiane, *chloris Ludoviciana*, *vulgò papa dicta*: on le rencontre encore en Canada. Il a la tête & le deſſus du cou d'un bleu d'outre-mer; la gorge, la poitrine & le ventre ſont d'un rouge brillant, le dos eſt vert; le bas du dos de même que la queue, ſont d'un rouge foncé; le dos, en approchant des ailes, eſt d'un jaune verdâtre; les plumes de l'aile qui ſont près du dos, ſont de couleur rouge; les ailes ſont violettes, les cuiſſes rouges & les pieds griſâtres.

PAPECHIEN, c'eſt le *vanneau*. Voyez *ce mot*.

PAPEGAI ou PAPEGAUT, eſt le gros perroquet que les Portugais appellent *papagayos*; ſelon *Oviedo*, on trouve cet oiſeau dans l'île de Cuba à la nouvelle Eſpagne: on le rencontre auſſi à la Jamaïque. *Voyez* à l'article PERROQUET.

PAPIRACÉE. Les Naturaliſtes donnent ce nom à une eſpece de nautile blanc, qui ſe trouve dans la Méditerranée, & même à pluſieurs autres ſortes de coquilles, dont la robe eſt mince comme du papier, au lieu que les autres coquilles de la même famille & eſpece ſont épaiſſes & peſantes.

PAPIER DU NIL, *papyrus Nilotica*, eſt, ſelon *Lémery*, une plante qui reſſemble au ſouchet. Ses tiges croiſſent à la hauteur de neuf à dix pieds: elles ſont groſſes, de couleur pâle ou cendrée. Ses feuilles ſont longues comme celles du roſeau. Ses fleurs ſont à pluſieurs étamines, diſpoſées en bouquet aux ſommités des branches, comme au ſouchet; ſes racines ſont grandes, groſſes, ligneuſes, nouées, d'une odeur & d'un goût foibles. Cette plante croît en Egypte le long du Nil & en Sicile; les Anciens en ſéparoient l'écorce, & la poliſſoient pour leur ſervir de papier à écrire. Le même Auteur ajoute que ſes feuilles étoient autrefois employées par les Chirurgiens, pour faire ſuppurer & pour déterger les ulceres.

Nous avons ſur le papier une diſſertation très-ſavante, par feu M. le Comte *de Caylus* (en 1758), dans laquelle cet Académicien, auſſi éclairé que bon Citoyen, prouve que le *papyrus* ou papier d'Egypte, dont il eſt ſi ſouvent fait mention dans les ouvrages modernes, & qui a ſervi à nous tranſmettre les Auteurs anciens, eſt une matiere encore aſſez neuve pour être examinée de nouveau. A l'aide des idées que les Auteurs anciens lui ont données, & des ſecours qu'il a tirés d'un des plus grands Botaniſtes de l'Europe (M. *de Juſſieu*) M. *de Caylus* a diſcuté ce que *Guilandin* & *Pline* avoient dit ſur le *papyrus*. L'on voit que cette plante naît dans les marais de la baſſe Egypte, ou même au milieu des eaux dormantes que le Nil laiſſe après ſon inondation. Sa racine eſt tortueuſe, rampante, & de la groſſeur du poignet; la tige eſt triangulaire, & ne s'éleve pas à plus de ſept à neuf coudées: elle eſt remplie d'une ſubſtance fongueuſe; elle va toujours en diminuant, & ſe termine en pointe. Cette eſpece d'arbre porte une chevelure, un panache en paraſol, & un épi qui forme un thyrſe. Ses feuilles

qui sortent immédiatement de la racine, ressemblent à celles du *sparganium* ou *ruban d'eau*. Les habitans du pays mangent la partie inférieure & succulente de la tige, mais on a cessé de faire du papier avec le *papyrus*.

Ainsi le *papyrus* ou *herd des Egyptiens*, est une plante aquatique, qu'il ne faut pas confondre avec le figuier d'Adam, appelé *musa*; c'est le *cyperus Niloticus, vel Syriacus maximus, papyraceus*, lequel paroît être le même que le *sanga-sanga* qui croît à Madagascar, dans la riviere que les Malgaches appellent *Tartas*, & qui est voisine de Foulepointe : on y emploie l'écorce du *papyrus* pour faire des nattes, des cordes pour les filets, & des cordages pour les bateaux de pêche; ils en font aussi des voiles. On soupçonne aussi que le *papero* de Sicile est une espece de *papyrus*. Les habitans du Nil employoient les racines du *papyrus* pour brûler & pour faire différens vases à leurs usages. On entrelaçoit la tige en forme de tissu pour construire des barques que l'on goudronnoit; & de l'écorce intérieure ou *liber*, on faisoit des voiles, des nattes, des habillemens, des couvertures de lit & pour les maisons, des cordes, des especes de chapeaux & du papier à écrire. Ce papier étoit anciennement appelé *sacré* ou *hiératique*; il ne servoit que pour les livres de la Religion Egyptienne. Porté à Rome & différemment préparé, lavé, battu & lissé, ce papier prit le nom d'*Auguste*, de *Livie*, même celui du Papetier *Fannius* qui excella dans l'art de *fanner* le papier, c'est-à-dire de le coller.

Le papier se préparoit en Egypte avec les fortes tiges du *papyrus*: à l'aide d'une aiguille on en séparoit les membranes circulaires; on les divisoit en vingt lames fort minces : on les étendoit sur une table, & on les arrosoit avec de l'eau; on les faisoit dessécher ainsi au soleil; puis on les croisoit en différens sens, & on les mettoit à la presse. On faisoit aussi du papier avec les feuilles. On appeloit *papier lénéotique* l'espece de gros papier emporétique, qu'on faisoit avec les parties qui touchoient le plus près l'écorce du *papyrus*; car le beau papier étoit fait avec la matiere qui est au-dessous de l'écorce & de la lame qui la touche immédiatement. Il étoit très-léger, comme calandré, & d'une assez

mauvaise odeur ; mais il se perfectionna sous l'Empereur Claude.

Après avoir détaché & enlevé l'écorce de la tige de cette plante, on employoit encore la partie intérieure moelleuse & spongieuse, pour en faire les mêches des flambeaux qu'on portoit dans les funérailles, & qu'on tenoit allumés tant que le cadavre restoit exposé. *Antipater* dit que ces mêches de *papyrus* étoient enduites de cire ; au reste, elles ressembloient assez à cette mêche de jonc que nous avons vu il y a quelques années à Paris, & qu'on présentoit aux passans, en la décorant du titre de *mèche perpétuelle*. Tel est l'Extrait du Mémoire de M. *de Caylus*. Mais il y a trop à perdre de ne pas lire cette Dissertation en entier : elle est pleine des recherches les plus instructives.

L'usage du papier d'Egypte paroît avoir succédé à celui de plusieurs autres substances, dont se sont servis les Anciens pour se communiquer leurs idées lorsqu'ils étoient éloignés les uns des autres, pour fixer la mémoire des faits & immortaliser les hommes ; car on écrivoit sur la pierre, sur des peaux d'habillement, sur des tablettes de cire, sur des coquilles, sur des métaux, sur l'écorce intérieure des arbres, (*corticea charta*, ce que font encore quelques habitans de l'Amérique), sur des boyaux, sur l'ivoire, sur l'écaille de tortue, sur les feuilles de palmier, sur l'amiante, sur la toile de lin & de coton, & ensuite sur du parchemin, &c. On lit dans les *Mémoires de l'Académie des Sciences*, *an. 1751*, qu'avant l'invention de notre papier, on en faisoit en Orient avec les chiffons de toile de coton ; & avant celui-ci, les Egyptiens préparoient la deuxieme écorce d'une espece de chiendent, connu aussi sous le nom de *papyrus*, dont ils tiroient du papier, & dont le nôtre a retenu le nom. Quelques-uns disent que l'époque du papier de chiffon est de 1470, mais M. *Haller* observe que cette époque est plus ancienne. *Coster*, dit-il, imprimoit en 1440 sur du papier de chiffons, & on a des titres même beaucoup plus anciens.

Les Japonnois font leur papier avec l'écorce de *canschy* ou *kaadsy*, arbre très-gros qui ressemble au mûrier, & qui croît dans leur pays. Voici comment ils s'y prennent.

nent. On coupe l'arbre à ras de terre; il continue à pousser de petits rejetons : quand ils sont de la grosseur du doigt on les coupe, on les fait cuire dans un chaudéron jusqu'à ce que l'écorce s'en sépare, on seche cette écorce & on la remet cuire encore deux fois, en remuant continuellement, afin qu'il se forme une espece de bouillie; on la divise & on l'écrase encore plus dans des mortiers de bois; on met cette bouillie dans des boîtes carrées, sur lesquelles on met de grosses pierres pour en exprimer l'eau : on porte la matiere sur des formes de cuivre, & on procede de la même maniere que font les Papetiers.

On trouve, de temps immémorial, du papier chez les Chinois, & de très-beau : ils y employoient le chanvre, le coton, les écorces d'arbres, dont la principale est celle du bambou. Le P. *Parennin* en a envoyé de plus de quarante sortes, toutes curieuses par quelques circonstances particulieres. Leur papier est doux & uni, d'une grande beauté, fort, & les feuilles sont d'une grandeur à laquelle toute l'industrie de nos ouvriers n'a encore pu atteindre. Souvent on l'appelle *papier de soie*, quoiqu'on y emploie rarement les chiffons de soie. On sait que les chiffons sont débarrassés par les lessives de la partie spongieuse, nommée *parenchyme*; mais on n'auroit pas cru que la filasse, simplement battue, pût produire une pâte dont on a formé un papier assez fin, & qui paroît se perfectionner. Il est plus que probable que les filasses d'aloès, d'ananas, de palmier, d'ortie, & d'une infinité d'autres plantes ou arbres, même la chenevote du chanvre, seroient susceptibles de la même préparation. Nous ne sommes point aussi riches en plantes & en arbres dont on puisse détacher les fibres ligneuses, que les Indiens de l'un & de l'autre hémisphere. Nous avons cependant l'aloès sur certaines côtes. En Espagne, on a une espece de sparte ou de genêt, qu'on fait rouir pour en tirer la filasse, & dont on fabrique ces cordages, que les Romains appellent *sparton*; on en pourroit donc tirer du papier. On voit plusieurs titres anciens écrits sur du papier de jonc, aux archives de la Cathédrale de Vicque en Espagne. Nous avons dans notre cabinet plusieurs écorces intérieures du

bouleau de Canada, liſſes, fines, taillées en papier à lettres, & auſſi ſouples. On écrit deſſus ce papier comme ſur du parchemin. M. *Guettard* a fait du papier avec nos orties & nos guimauves des bords de la mer; & il ne déſeſpere pas qu'on n'en puiſſe faire avec quelques-unes de nos plantes & de nos arbres mêmes, ſans les réduire en filaſſe. Le raiſonnement qui avoit conduit cet Académicien à fabriquer du papier immédiatement avec la filaſſe, lui a fait eſſayer d'en faire avec du coton, à l'exemple des Chinois, & il a réuſſi. Il vouloit s'aſſurer ſi ce duvet étranger donneroit une bonne pâte, pour travailler avec plus de ſureté ſur le duvet de nos chardons, & ſur celui de l'apocin de Syrie, qui quoique étranger, vient bien chez nous. Enfin M. *Guettard*, dont le zele & la ſagacité ſont très-connus, a voulu nous faire voir les avantages que nous pourrions tirer à cet égard d'une infinité de ſubſtances que nous rejetons comme inutiles: on en trouve le détail dans ſon Mémoire, & dans le Journal Economique, au mois de Juillet & d'Août 1751, ou dans un Ouvrage de ſa compoſition qui a pour titre; *Mémoires ſur différentes parties des Arts & des Sciences, vol. 1. p. 227.* MM. *de Réaumur, Gleditſch, Schæffer* & *Séba* ont donné auſſi de bonnes obſervations ſur le papier de notre pays. M. *Haller* obſerve que M. *Schæffer* a employé un grand nombre de plantes pour en faire du papier, en y ajoutant une certaine portion de chiffons, & il y en a eu qui ont très-bien réuſſi. On a fait en Angleterre du papier avec des navets, des panais, des feuilles de choux, &c. *Voyez* HOUGHTON *Collections, n°. 360. T. II, pag. 418, &c.*

A l'égard du papier Européen qui eſt notre papier ordinaire, on le fait avec de vieux drapeaux ou chiffons de linge de chanvre ou de lin, blanchis, hachés & briſés au moulin en parties très-menues, humectées avec de l'eau, & tellement délayées, qu'elles ne paroiſſent que comme une eau remplie de petits flocons viſqueux & collans. On leve cette liqueur par parties, prenant toujours la ſuperficie avec un châſſis garni de fils de laiton très-ſerrés, & qui eſt de la grandeur de la feuille qu'on veut faire. On met enſuite égout-

ter ces feuilles ; on les passe à la colle, pour que le papier destiné à l'écriture & à l'impression ne boive point, & enfin on le met en presse. Le papier gris ou brouillard n'a point été collé : il est fait de chiffons plus grossiers, moins lavés, &c. il boit les liqueurs, sert même à les filtrer. Le papier bleu a reçu la teinture du tournesol. Le papier marbré de diverses couleurs se fait en appliquant une feuille de papier sur différentes couleurs, détrempées en huile & mêlées avec de l'eau, qui en empêche la liaison ; & selon la disposition ou l'arrangement qu'on donne ensuite à ces couleurs, on forme, dit *Lémery*, des ondes & des panachures.

Presque tout le papier d'Hollande a la finesse, le corps, la blancheur, le lissé & le poli ou le luisant au-dessus du nôtre ; ce qui dépend de la pureté de l'eau, du choix des chiffons & de plusieurs autres circonstances. On a encore l'art d'amincir le papier par la presse & à coups de marteau. *Voyez le Dictionnaire des Arts & Métiers.*

Quelques personnes ont reconnu que quatre feuilles de papier fin, coupées par morceaux & bouillies dans une pinte de lait de vache jusqu'à ce que le papier soit réduit en bouillie, on en obtenoit une boisson qu'on passe par un linge & édulcore avec le sucre, & qui est spécifique pour la dysenterie. C'est de la colle du papier que dépend la principale vertu de ce remede.

PAPIER FEUILLE D'ARBRE. Nom donné à la feuille de L'ARBRE DE LA NOUVELLE ESPAGNE, & mieux encore à celle d'un PALMISTE. *Voyez ces mots.*

PAPIER FOSSILE. *Voyez* CUIR FOSSILE.

PAPIER NATUREL. On a découvert depuis peu en Italie, aux environs de la ville de Cortone en Toscane, une nouvelle espece de papier fossile. On pense qu'il est formé d'un mélange de plantes écrasées & pourries, & qui dans leur état de corruption forment une pâte capable de flotter sur l'eau, & dont les parties, malgré leur dissolution, restent unies entr'elles au moyen d'une substance visqueuse. M. *Strange* prétend avoir reconnu plusieurs plantes propres à se convertir en un papier fossile, entr'autres le *conferva*

qui eſt abondant dans pluſieurs marais ou lieux marécageux de la Toſcane. *Voyez* CONFERVA.

Au reſte, ce papier naturel de couleur brune, n'eſt point une découverte particuliere à l'Italie : on en a trouvé en pluſieurs endroits de la France, de l'Allemagne & en différens autres pays. M. *Linnæus*, qui en a trouvé dans la Province de Dalekent en Suede, prétend que ce papier eſt formé du *biſſus* qu'il appelle *flos aquæ*, & qui ſe blanchit aux rayons du ſoleil. M. *Matani*, Profeſſeur de Médecine à Piſe, penſe que toutes les plantes filamenteuſes & membraneuſes, lorſqu'elles ſont dépouillées de leur ſubſtance viſqueuſe & entiérement diſſoutes dans l'eau, peuvent ſe transformer en toute eſpece de papier.

Les plantes les plus propres à produire le *papier naturel*, ſont les mauves, les algues marines, le chiendent, les orties, les joncs, le panais, les carottes, le lupin, le genêt, le glayeul, le foin, le lin, la paille, les plantes marécageuſes, les différens biſſus & conferva, tant de marais que de riviere, les fleurs des arbres, &c. Plus le tiſſu de ces plantes eſt lâche & délicat, plutôt elles ſont détrempées & diſſoutes. C'eſt ainſi qu'il s'éleve du fond des marais une matiere viſqueuſe formée de corps diſſous de pluſieurs petits animaux, & notamment de végétaux qui ayant croupi & s'étant corrompus dans la bourbe, ſont devenus très propres à fournir le papier foſſile dont il eſt mention. Voyez la *lettera ſopra l'origine della carta naturale di Cortona.*

PAPILLON, *papilio*, petit inſecte qui a ſix pieds, quatre ailes, des yeux & des antennes. L'hiſtoire des papillons eſt néceſſairement liée avec celle des chenilles, puiſque tous les papillons ont été originairement des chenilles, qui ont ſubi les métamorphoſes qui les ont amenés à l'état de chryſalide, & enfin à celui de papillon ; ainſi on trouvera réunis ſous ces trois mots de *chenille*, de *chryſalide* & de *papillon*, l'hiſtoire complette des papillons dont la vie eſt la plus remplie de phénomenes ſinguliers.

Il convient de parler d'abord du premier eſſor de cet inſecte ; ſpectacle trop peu connu du grand nombre des

hommes ; mais que le Naturaliſte ne ſe laſſe pas d'admirer. Quelle matiere ſublime de réflexion pour l'obſervateur qui étudie l'organiſation des êtres de la nature ! La chenille nous apprend de quelle maniere elle ſe prépare au ſommeil léthargique qui doit ſervir de paſſage à ſa métamorphoſe. Le terme de ſa vie rampante eſt-il accompli, elle change de forme pour devenir habitant de l'air. La chryſalide eſt tout à la fois le tombeau de la chenille & le berceau du papillon. C'eſt dans ces coques ſoyeuſes, ou ſous un voile de gaze, que s'opere tous les jours ce grand miracle de la nature : tâchons d'expliquer ceci.

Le nouveau papillon, averti par l'inſtinct, qu'il a acquis aſſez de force pour rompre ſes fers, fait un puiſſant effort qui lui ouvre une ſeconde fois les portes de la vie ou plutôt de la lumiere qu'il va voir avec de nouveaux yeux. Tous ſes organes deviennent plus ſenſibles & plus parfaits ; ſes ailes, qui d'abord ne paroiſſent pas ou qui ſont ſi petites, qu'on les prendroit volontiers pour celles d'un papillon manqué, ſont encore couvertes de l'humidité du berceau, &c. mais auſſitôt qu'elles ſont à l'air & libres, les liqueurs qui circulent dans leurs canaux, s'élançant avec rapidité, les forcent à s'étendre & à ſe développer. Pour accélérer & donner plus de force à ce développement, le papillon nouvellement éclos & impatient de voler, les agite de temps en temps, & les fait frémir avec une douce viteſſe : en même-temps tous ceux qui ont une trompe (car tous n'en ont pas) qui étoit étendue & alongée ſous le fourreau de la chryſalide, la retirent & la roulent en ſpirale pour la loger dans le réduit qui lui eſt préparé. Si quelque cauſe, ſoit intérieure, ſoit extérieure, s'oppoſe à l'extenſion des ailes dans le temps qu'elles ſont encore auſſi flexibles que des membranes, la ſéchereſſe qui les ſurprend dans cet état arrête la ſuite du développement, les ailes reſtent contrefaites, incapables de lui ſervir, & le pauvre animal ſe voit condamné à périr, faute de pouvoir aller chercher ſa nourriture.

C'eſt ainſi que tous les papillons ſortent de leur état de nymphe ou de chryſalide, tant ceux qui viennent de chenilles qui font des coques, que ceux qui viennent

de celles qui se lient & qui se suspendent. Ces dernieres en sortant se trouvent d'abord à leur aise & en plein air. Mais comment les papillons foibles, sans armes, qui sont renfermés dans des coques d'un tissu si serré, que nous ne pourrions pas les déchirer avec nos doigts, telle, par exemple, que la coque du ver à soie, comment, dis-je, ces papillons auxquels nous ne connoissons aucun instrument capable de faire cette opération, s'y prendront-ils pour percer ces murs impénétrables qui servoient à les garantir de l'insulte pendant leur engourdissement ? On peut parvenir à voir cette industrie en enlevant avec des ciseaux, une partie d'une coque : l'ouverture étant faite, collez ensuite la coque contre un verre ; observez l'insecte, vous verrez les organes se développer sensiblement : suivez-le des yeux, il fait effort pour sortir de sa prison ; remarquez cette liqueur qu'il dégorge de sa bouche, (on connoîtra par la suite que c'est le seul usage pour lequel elle lui a été donnée) c'est une liqueur mousseuse qui humecte, amollit le bout de la coque ; alors à coups de tête donnés à plusieurs reprises contre cet endroit affoibli par la liqueur, il vient à bout de le crever, la barriere s'ouvre, le papillon sort en se glissant, le voilà entiérement formé. Dans toutes ces coques, on trouve toujours deux dépouilles, celle de la chenille & celle de la chrysalide.

D'autres papillons, qui ont encore des coques plus épaisses, se sont ménagés une ouverture, lorsqu'étant chenilles, ils ont filé leur coque. Telle est la chenille à tubercules, qui donne le papillon paon. *Voyez* CHENILLE A TUBERCULES.

Lorsque les ailes des papillons ont acquis assez de fermeté, les uns prennent leur vol dans le moment ; d'autres se contentent de marcher & d'aller se placer à quelque distance ; mais tous se purgent abondamment, les uns avant de s'éloigner de leurs coques, d'autres après. Cette évacuation est le superflu du corps graisseux, & de toute la matiere que la Nature a employée pour leur faire changer d'état. Ces restes sont liquides & assez ordinairement rougeâtres ; ceux de ces papillons qui firent autrefois si grande peur à la ville d'Aix en Provence, sont comme du sang ; *voyez l'exposé de*

cet événement au mot CHENILLE ÉPINEUSE. *Voyez aussi* PLUIE DE SANG.

Nous avons dit que le papillon au sortir de sa coque est entiérement formé : agréablement surpris de se voir rendu au jour, tandis qu'il s'occupe de son bonheur, qu'il se plaît à reconnoître les lieux qu'il a habités dans son enfance, il agite ses ailes avec un doux frémissement, il doit maintenant, & tout le reste de sa vie soutenir l'éclat de la lumiere & la vivacité de l'air : bientôt il prend l'essor, & d'un vol sinueux parcourt les prairies émaillées de fleurs, plonge sa trompe dans leur calice nectarifere. La douce liqueur dont il s'enivre, semble lui donner plus de gaieté, plus de feu, plus d'action, plus d'agilité. Heureux dans ses amours, il ne se repose que pour jouir. Ses ailes légeres le transportent de plaisirs en plaisirs ; dès qu'il en a cueilli la fleur, il s'élance & va goûter ailleurs les douceurs apparentes de l'inconstance & de la nouveauté. Au reste, nous verrons ci-après que l'animal agit en esclave de la nature.

Description des organes du Papillon.

On ne remarque plus dans l'intérieur du papillon, ce nombre de trachées que l'on voit le long des côtés de la chenille. De ces dix-huit stigmates, il n'en reste que deux qui sont sur le corselet ; mais l'on trouve dans la partie supérieure du ventre une vessie pleine d'air, d'une grandeur assez considérable. Cette vessie a un cou qui aboutit à la bouche ou à la trompe de ceux qui en ont une. C'est par ce canal, aussi bien que par celui des deux stigmates, que l'air entre & sort ; au lieu que dans l'état de chenille, les organes de la respiration étoient distribués des deux côtés de son corps. Ce changement jusques dans les organes de la respiration, fait juger de la prodigieuse révolution qui se fait dans l'intérieur de l'animal pendant qu'il nous paroît si tranquille sous la forme de chrysalide : c'est à la poitrine, que sont attachés les muscles qui font mouvoir les ailes.

Lorsqu'on ouvre le papillon, on découvre l'estomac, le cœur & la moelle épiniere, qui sont autant de canaux, dont une partie réside dans le ventre, & l'au-

tre en passant par la poitrine, va se terminer dans la tête. Le cœur du papillon est le même qu'étoit celui de la chenille, c'est-à-dire en quelque sorte un assemblage de cœurs qui regne dans toute la longueur du corps. Mais on peut remarquer que la circulation s'y fait dans un sens contraire à celui où elle se faisoit dans la chenille. Cependant cette circulation n'est pas toujours constante; je l'ai vu souvent changer, dit l'Observateur; cela venoit-il à l'occasion des douleurs que je lui faisois sentir? Mais quelle qu'en soit la cause, on voit toujours avec grand étonnement que cet insecte ait une si grande facilité de changer la circulation de son sang. La moelle épiniere est la même que celle qui étoit dans la chenille; elle remonte du bas ventre vers la tête: mais ce qu'elle fait voir de particulier, c'est qu'elle est dans un mouvement continuel & vermiculaire, mouvement qu'elle n'avoit point dans la chenille. On peut observer ce phénomene en faisant tomber le poil de dessus la peau du ventre de la femelle du papillon provenant de la chenille à oreille. La peau en est si transparente, qu'en la frottant d'un peu d'huile, on voit très-distinctement à travers de son épaisseur, tout le jeu de cette moelle épiniere, qui est fort vif.

Les organes des sexes dont on ne trouve aucune trace dans la chenille, se trouvent tout formés dans le papillon naissant, & situés comme la Nature a coutume de les placer dans les autres insectes. Les femelles se font reconnoître aisément à la grosseur de leur ventre, qui est si prodigieusement rempli dans certaines especes, qu'il en paroit prêt à crever; il arrive même quelquefois aux femelles de papillon de la chenille à oreille & de la chenille commune, de commencer à déposer leurs œufs avant qu'ils ayent été fécondés, tant elles sont pressées du besoin de pondre. Il y a des especes de papillons femelles qui pondent jusqu'à quatre, cinq, six & sept cents œufs de suite.

Beauté des Papillons.

Ces insectes semblent se disputer à l'envi la vivacité, la surprenante variété des couleurs, l'élégance de la forme, en tout ils font le charme des yeux; la légé-

reté, l'air animé, la course vagabonde & volage, tout nous plaît en eux. Une collection de papillons nous présente le plus beau & le plus brillant spectacle, tel qu'on le voit au Cabinet du Roi, & dans ceux de la plupart des Curieux; le seul aspect en est ravissant. Les papillons de la Chine, des Indes, sur-tout ceux de l'Amérique & de la riviere des Amazones, se font remarquer par leur grandeur, & par la richesse & le vif éclat de leurs couleurs les plus variées, ils s'offrent à l'œil surpris avec toutes les graces des nuances & du compartiment; c'est un spectacle à voir, & non point à être décrit. A la Chine on envoie les papillons les plus beaux & les plus extraordinaires à la Cour de l'Empereur; ils servent à l'ornement du Palais. Il n'est pas aisé d'attraper cet insecte volage: pour le prendre au vol, on se sert d'un filet d'un petit réseau de soie ou de gaze de huit pouces de large, monté sur un fil d'archal emmanché d'un bâton léger. On les fait mourir en leur comprimant légérement du bout des doigts le corselet, ensuite on les perce d'une épingle, & on les laisse mourir & dessécher fixés sur un carton. *Voyez à la fin de l'article* INSECTE, *la maniere de se procurer ces animaux, de les conserver & de les envoyer des pays plus ou moins éloignés.* On dit qu'il y a des Chinoises assez curieuses pour étudier la vie de ces sortes d'insectes: elles prennent des chenilles parvenues au point de faire leurs coques; elles les enferment plusieurs ensemble dans une boîte remplie de petits bâtons; & quand elles les entendent battre des ailes, elles les lâchent dans un appartement vitré & rempli de fleurs: c'est un moyen sûr & facile d'avoir de ces beaux insectes. Un Auteur moderne observe que nous avons aussi en France des Dames distinguées par leurs connoissances & leur goût pour l'Histoire Naturelle; puisse, dit-il, leur exemple & notre hommage respectueux bannir l'esprit de mode & de frivolité! il faut en convenir, les douceurs que procure l'étude de la Nature sont préférables au petit mérite d'avoir l'inconstance & la légéreté du papillon.

On prétend qu'on se procure rarement de plus beaux papillons & d'autres sortes d'insectes que ceux qu'on

obtient en nourrissant des vraies ou fausses chenilles pour en avoir les chrysalides, les nymphes, &c. ou lorsqu'on fait ramasser des nymphes, des chrysalides, soit à la suite du Laboureur, soit dans les terres des fossés qu'on remue ou qu'on releve, soit en défrichant ou arrachant des plants, soit en visitant les aisselles des branches d'arbres & les murs des jardins, où elles sont enveloppées ou nues, suivant leur espece : mais cette éducation exige beaucoup de soins ; car pour peu que les insectes dans cet état de coques, &c. soient blessés, ils ne subissent point leur derniere métamorphose. La nature ne souffre point de contraintes ou rarement : elle semble indiquer à l'individu les ressources de son salut, les moyens de son existence. On observe que les chrysalides des papillons de jour sont la plupart triangulaires & nues. Au reste, ceux qui veulent voir développer ces animaux, doivent tenir les chrysalides, les nymphes, &c. dans des boîtes spacieuses, couvertes de cannevas ou de gaze claire, ou dans un lieu clos; on pose sur de la terre celles qui ont été trouvées dans la terre, & on les couvre de mousse que l'on entretient dans un état de fraîcheur en l'humectant de temps en temps. On peut prendre facilement l'insecte quand on s'apperçoit qu'il est sorti de sa dépouille, qu'il s'est alongé, que ses ailes sont bien affermies, en un mot qu'il est bien conformé, & on le saisit pour le faire mourir & le conserver, suivant la maniere indiquée à l'article *Insecte*. Les chrysalides & nymphes que l'on trouve dans nos climats en automne, ne donnent guere leurs papillons qu'au printems suivant : pour transporter ces chrysalides, on peut les mettre dans des boîtes & entre des lits de coton, de maniere qu'elles ne puissent pas balotter & qu'elles ne soient pas trop serrées, de peur de les blesser : il faut observer que si la durée du voyage excédoit le terme de leur métamorphose, l'animal périroit au milieu de sa prison.

Lorsqu'on considere le papillon, quatre de ses parties paroissent mériter entr'autres une attention particuliere, savoir, les ailes, les antennes, la trompe & les yeux.

Les ailes, qui ſont toujours au nombre de quatre, lui conſtituent un genre particulier parmi les inſectes ailés, en ce qu'elles ne ſont point couvertes d'étuis, mais ſeulement d'une eſpece de pouſſiere farineuſe, opaque, qui s'attache facilement aux doigts imprudens ou indiſcrets qui les touchent; cette prétendue pouſſiere conſidérée au microſcope, eſt un aſſemblage très-régulier & organiſé de petites écailles colorées, taillées ſur différens modeles, couchées & implantées ſur un tiſſu de gaze ſolide, tranſparente & à rainures, quoiqu'extrêmement fine & légere. C'eſt la dureté & le poli de ces petites écailles qui les rend ſi brillantes. Le deſſus & le deſſous des ailes en ſont également couverts. Avec de grandes ailes légeres, la plupart des papillons volent de mauvaiſe grace, ils vont toujours par zigzags, de haut en bas, de bas en haut, de droite à gauche, effet qui dépend de ce que leurs ailes ne frappent l'air que l'une après l'autre, & peut-être avec des forces alternativement inégales. Ce vol leur eſt très-avantageux, parce qu'il leur fait éviter les oiſeaux qui les pourſuivent; car comme le vol des oiſeaux eſt en ligne droite, celui du papillon eſt continuellement hors de cette ligne.

Telle eſt la ſtructure la plus ordinaire des ailes des papillons: mais il y en a d'autres eſpeces que l'on a ſurnommées *papillons à ailes d'oiſeaux*, parce qu'effectivement leurs ailes paroiſſent diſpoſées comme celles des oiſeaux; ces ailes ſont cependant recouvertes d'écailles, taillées de maniere à en impoſer & à paroître comme des plumes. On voit voltiger quelquefois ſur le bord des ruiſſeaux, de ces petits papillons qui ſont blancs & des plus jolis: ils nous ont paru provenir d'une eſpece de chenille qui ſe nourrit de framboiſes où elle établit ſon domicile. Une autre eſpece porte des ailes vitrées, ainſi nommées, parce que n'étant pas entiérement couvertes d'écailles, les parties qui en ſont dégarnies, ſemblent autant de vitres; enfin la troiſieme eſpece, ſont les ailes d'un petit papillon provenant d'une teigne, qui vit dans l'épaiſſeur des feuilles d'orme & de pommier; ces ailes préſentent au microſcope tout ce qu'on peut imaginer de plus riche

en or, en argent, en azur & en nacre. On peut voir les figures différentes que plusieurs Auteurs, & en particulier, *Bonanni*, *Swammerdam* & M. *de Réaumur* ont données des écailles, des ailes & du corps des papillons.

Les papillons portent, comme la plupart des autres insectes, des antennes sur la tête : on peut voir *au mot* ANTENNE *& à l'article* INSECTE, de quel usage on croit que ces parties sont aux insectes. Comme les antennes sont très-apparentes dans les insectes, on s'en est servi pour diviser les papillons en classes & en genres, suivant leurs différentes formes.

La premiere division & la plus simple est celle qui distingue les papillons en papillons de jour & en papillons de nuit ou phalenes: ces derniers sont en bien plus grand nombre que les autres. *Swammerdam* en a observé cent quatre-vingt- treize sortes : savoir treize des plus grands, vingt-huit d'une moyenne grandeur, quatre-vingt-six plus petites, & soixante-six de la plus petite espece. Il en a décrit cent quatorze especes avec leurs nymphes dorées. *Aldrovande* en a fait mention de cent dix-huit sortes ; *Mouffet* en représente quatre-vingt-six & *Hoffnagel* cinquante. Ces papillons ne volent que la nuit: *Goëdard* n'a fait mention que de soixante-dix-sept sortes de papillons de jour.

Ces deux genres de papillons se distinguent par les *antennes*. Voyez ce mot. Ceux qui composent la classe des diurnes, ont des antennes de trois différentes formes. Il y a, 1°. celles que l'on appelle *antennes à masse* ou *à bouton*, *antennæ clavatæ*, parce qu'elles se terminent par un bouton, qui a le plus souvent la figure d'une olive, & quelquefois d'une olive tronquée. Le plus grand nombre des papillons que l'on voit pendant le jour se reposer sur les fleurs, portent des antennes de ce genre.

2°. Les *antennes en forme de massue*. Les papillons de cet ordre se soutiennent en volant en-dessus des fleurs sans qu'on les voie jamais s'appuyer dessus ; mais ils font un bourdonnement continuel avec leurs ailes.

3°. Celles qui sont tournées en forme de *cornes de beliers ;* elles ressemblent un peu aux *antennes en massue ;*

mais indépendamment de leur figure elles n'ont pas à l'extrémité le bouquet de poil de ces dernieres. Les papillons de cet ordre sont communs dans les prairies.

La classe des phalenes ou papillons nocturnes se distingue aussi par des antennes de trois formes différentes. La premiere est celle à qui on a donné le nom d'*antennes prismatiques* à cause de leur forme; la seconde comprend les *antennes à filets coniques* ou *grenées*, parce qu'ils sont formés d'une suite de grains disposés comme ceux d'un chapelet. La troisieme est celle des *antennes à barbes de plumes* ou *en plumes*, à cause de leur ressemblance avec une plume d'oiseau. Dans les différens genres de papillons qui portent de ces antennes, elles servent à distinguer les sexes; celles des mâles sont plus belles & mieux formées que celles des femelles: parmi ces papillons il y en a de tout unis, de velus & de colorés; ils volent rarement de jour; plusieurs d'entr'eux ont des heures déterminées pour voler; leur corps est plus gros que celui des papillons de jour. On les trouve dans des lieux obscurs, appliqués contre les murs, ou dans les creux des vieux arbres.

On peut distinguer encore les papillons en ceux qui sont pourvus de trompes & en ceux qui n'en ont pas. Tous les papillons diurnes en sont pourvus; mais parmi les phalenes plusieurs paroissent en manquer, d'autres en manquent tout-à-fait. Le véritable instant de distinguer la structure de la trompe des papillons qui en sont pourvus, c'est lorsque le papillon ne fait que quitter sa chrysalide: sa trompe est encore étendue sur l'estomac; elle se dégage, elle se roule en spirale; mais dans le premier instant les deux parties ne se dégagent pas toujours ensemble, & l'on apperçoit deux lames creusées en gouttiere, qui forment par leur réunion la trompe du papillon, c'est l'organe qui seul fait les fonctions de la bouche & du nez. Lorsque le papillon veut pomper le suc des fleurs, dont la consistance est quelquefois trop visqueuse pour pouvoir être attirée, sa bouche dégorge dans le fond de la fleur une liqueur qui rend l'extrait de la plante plus fluide: on peut voir cette manœuvre en présentant un morceau de sucre à un papillon diurne qui vient de paroître au jour. Quant

aux yeux des papillons ils ſont d'une ſtructure admirable. *Voyez au mot* INSECTE *l'article* YEUX A RÉSEAU.

On ſe fait ordinairement une idée agréable de la vie & des mœurs d'un papillon : on ſe le repréſente comme un animal toujours en joie, dont l'amour & la bonne chere font l'occupation, volant de fleurs en fleurs, de femelles en femelles ; mais il s'en faut bien que tout le peuple papillon jouiſſe d'un bonheur ſi complet. Si on conſidere les papillons de nuit, on voit que c'eſt à leur dernier changement que ſe terminent les deſſeins qu'avoit la Nature en les faiſant naître. La propagation de l'eſpece eſt le ſeul ſigne de vie qu'ils donnent ; c'eſt pour les amener là qu'elle les a fait paſſer par tant de métamorphoſes, de travaux & de dangers. Pluſieurs eſpeces n'ont point de trompe, ni aucun organe propre à prendre de la nourriture : auſſi n'eſt-ce point pour ceux-ci que les fleurs ont des ſucs. Pluſieurs ne font aucun uſage de leurs ailes pour voler, tels que le papillon mâle du ver à ſoie. Quoi qu'il en ſoit, on peut croire que ces ailes lui ſervent à animer ſes eſprits & à exciter le cours de ſes liqueurs ; car elles ſont dans une agitation prodigieuſe dans le temps de l'accouplement. Lorſque les mâles ont conſommé toutes leurs forces à s'acquitter de leur emploi, & les femelles à pondre & à mettre leurs œufs à couvert, tout eſt fini. Un épuiſement total dans les uns & dans les autres termine une vie qui ne leur avoit été donnée que pour aſſurer l'exiſtence de leur poſtérité. C'eſt ainſi que Vénus corrompt & épuiſe les forces. Une ſingularité remarquable, c'eſt que ces mâles qui ont obſervé un jeûne complet depuis le moment qu'ils ont commencé à faire leurs coques juſqu'à celui dont nous parlons, ſe trouvent encore avoir aſſez de vigueur pour ſe montrer les plus amoureux & les plus pétulans des animaux de leur eſpece.

Nous avons déjà dit que c'eſt parmi les papillons nocturnes que l'on trouve les grandes eſpeces, comme le *papillon à tête de mort*, les *papillons paon*, ceux *du tithymale*, &c. Ceux-ci reſtent ordinairement durant tout le jour appliqués contre des troncs d'arbres ou contre des murs ; mais la nuit les réveille & les rap-

pelle à l'usage de la vie. Comme les papillons nocturnes ou *phalenes* fuient la lumiere du jour, on voit avec étonnement que ce sont préciſément ceux qui ſe rendent auprès d'une lumiere qu'on porte dans un jardin. Voici la conjecture bien voiſine du vrai que l'on en donne. Il peut ſe faire que les femelles de ces papillons jettent une lumiere qui eſt imperceptible pour nos yeux, mais très-perceptible pour le papillon qui a, dit-on, plus de trente-quatre mille yeux. Cette conjecture eſt appuyée ſur un fait qui lui donne beaucoup de vraiſemblance; c'eſt que tous ces papillons qui viennent la nuit tourner autour de la lumiere & s'y brûler, ſont toujours des mâles. Ceci prouve auſſi que l'amour faſcine les yeux, même aux papillons.

PAPILLON DES BLÉS. C'eſt ſous ce nom qu'eſt connu dans l'Angoumois, parce que c'eſt ſous cette forme qu'il ſe manifeſte le plus ſenſiblement, un très-petit inſecte, qui juſqu'à préſent n'avoit été connu que des Naturaliſtes; mais qui vient de s'attirer l'attention du Gouvernement, par les ravages qu'il fait dans cette Province. Il faut bien diſtinguer ces *papillons de la chenille des grains*, des *papillons des fauſſes teignes*: ces derniers ſont très-communs dans toutes les Provinces de France; ils ont à l'extérieur, beaucoup de reſſemblance avec ceux de la chenille du grain; mais ils en different beaucoup par la maniere de vivre; & ceux-ci font un tort bien moins dangereux que les papillons de la chenille des grains. Comme on diſtingue mieux les choſes par la comparaiſon, nous donnerons l'hiſtoire du papillon de la fauſſe teigne, à la ſuite de celle-ci.

Quant aux papillons de la chenille des grains, depuis environ trente ans on s'étoit apperçu dans l'Angoumois, qu'en certaines ſaiſons il ſortoit des papillons des tas de blés: ces inſectes n'exciterent d'abord que la ſurpriſe; M. *de Réaumur* en donna une hiſtoire curieuſe. Depuis quelques années, cet inſecte s'y eſt multiplié au point de conſommer, en peu de mois, les récoltes les plus abondantes: il commence à dévorer les grains dans les épis flottans au milieu des champs; il continue ſes ravages dans les granges, & acheve de tout dévaſter dans les greniers. Le Cultivateur, qui ſe

voit fruſtré de ſes plus douces eſpérances, eſt découragé. L'Académie des Sciences envoya, par ordre du Gouvernement, des Académiciens pour obſerver ſur les lieux cet inſecte, pour oppoſer à ſes ravages les remedes les plus prompts & les plus efficaces, & pour faire les expériences néceſſaires, afin d'en détruire l'eſpece, s'il étoit poſſible. C'eſt dans ces vues, que M. *Duhamel* & M. *Tillet* ſe rendirent dans l'Angoumois, en 1760: ils y retournerent en 1761, ils trouverent plus de deux cents Paroiſſes déſolées par cet inſecte. Pluſieurs Curés & quelques Gentilshommes qui s'étoient appliqués à la deſtruction de ces inſectes, leur firent part de leurs conjectures ſur leur origine, & ſur les moyens d'en arrêter la multiplication. C'eſt du concours de toutes ces expériences, & des obſervations de nos Académiciens, dans leurs deux voyages dans cette Province, que réſulte un Ouvrage *in-12*, livre intéreſſant pour le Naturaliſte, utile au Citoyen, & néceſſaire au Cultivateur.

Nous penſons ne pouvoir rien faire de mieux, que de nous aider de l'extrait qu'ont donné de ce livre les Auteurs du Journal des Savans.

Le papillon auquel on attribuoit en Angoumois tout le mal fait aux grains, quoiqu'il ſoit deſtitué d'organes capables de leur nuire, eſt de la claſſe des phalenes: il a des antennes à filets grenés: il porte ſes ailes inclinées en forme de toît; elles ſont longues par rapport à leur largeur, de couleur de café au lait, brillantes au ſoleil, bordées d'une frange de poils, ſur-tout du côté intérieur: il a deux barbes qui partent de deſſus la tête; paſſent entre les antennes, ſe prolongent juſqu'au deſſus des yeux, où elles rencontrent un toupet de poils relevés en arriere. A la premiere vue, ce papillon paroît être aſſez ſemblable à celui des fauſſes teignes.

Ce papillon ne ſemble occupé que du ſoin de ſe multiplier, il s'accouple la nuit ou dans l'obſcurité; l'accouplement dure pluſieurs heures: le mâle & la femelle ſe réuniſſent quelquefois après s'être ſéparés. A peine les œufs ſont-ils fécondés, que la femelle s'en délivre: elle jette çà & là des paquets de quatre, cinq, trente œufs, en ſorte que chaque femelle produit depuis ſoixante juſqu'à

qu'à quatre-vingt-dix œufs. Les œufs sont imbibés d'une humidité visqueuse, qui les rend adhérens aux différens corps sur lesquels ils ont été déposés : ils sont de taille à passer par un trou fait dans une feuille de papier avec la pointe de la plus fine aiguille ; au microscope ils paroissent striés dans leur longueur, & comme chagrinés.

Quatre, six, ou huit jours après que l'œuf a été pondu, selon la température de la saison, il en sort une chenille grosse comme un cheveu, de la longueur d'un quart ou d'un cinquieme de ligne ; aussi-tôt elle travaille à s'introduire dans l'intérieur du grain, pour se nourrir de sa substance farineuse. Elle se glisse d'abord dans la rainure qui sépare les deux lobes : elle y file quelques fils de soie, puis elle déchire le son avec ses dents, qu'elle range de côté & d'autre, de façon que lorsqu'elle a pénétré dans l'intérieur du grain, le son retombe & ferme assez exactement l'ouverture.

Il en périt plusieurs avant qu'elles soient parvenues à s'introduire dans la substance farineuse, soit que la fatigue, l'épuisement ou la faim les fassent mourir, ou que, comme l'a soupçonné M. *de Réaumur*, elles s'entre-détruisent elles-mêmes dans des combats cruels qu'elles se livrent, pour s'assurer la possession d'un grain dans lequel elles veulent s'introduire.

Une chenille se contente d'un seul grain de blé, elle n'en sort point pour en attaquer un autre ; mais on n'en trouve jamais deux dans le même grain, une seule suffit pour en consommer toute la substance farineuse : elle ne laisse absolument que la pellicule du son. Lorsqu'elle a pris tout son accroissement, elle se dispose à filer sa coque ; la chenille peut avoir alors deux lignes & demie de longueur, sa grosseur peut égaler la moitié du grain de blé qu'elle a consommé ; son corps est ras, entiérement blanc : elle a deux especes de cornes sur la tête, qui se dirigent vers la partie postérieure ; elle en a deux autres plus longues dans la même direction, placées vers l'anus ; elle a seize jambes.

Comme si elle prévoyoit que sous la forme de papillon, il ne lui restera aucun organe avec lequel elle puisse entamer la pellicule du son qui la renferme, elle

prend la précaution de tailler avec ses dents, vis-à-vis l'endroit où doit être la tête de la chrysalide, une trappe assez large pour donner issue au papillon, & qui reste fermée jusqu'à ce que cet insecte ait quitté sa dépouille de chrysalide. Cette sage mesure étant prise, elle file une coque qui remplit exactement un des lobes du grain; l'autre est occupé par les excrémens. Le papillon étant dégagé de sa robe de chrysalide, perce la coque à coups de tête, leve la trappe faite à l'écorce du son, & sort de cette espece de tombeau, pour travailler à la propagation de l'espece.

Tel est le cercle de la vie & des développemens de cet insecte: les différentes températures des saisons en alongent ou racourcissent la durée. Il paroît que dans le temps le plus favorable, une génération s'accomplit en vingt-huit ou vingt-neuf jours, ainsi il s'en fait plusieurs dans une année. Sur la fin de Mai & au commencement de Juin, on trouve des œufs & de petites chenilles sur les épis de la campagne; en Juillet il en naît des papillons qui déposent sur les mêmes épis une nouvelle postérité; celle-ci peut en donner encore une autre dans la grange ou dans le grenier, vers la fin d'Août; si les premiers froids sont retardés, on en voit une nouvelle en Septembre; & enfin, une derniere en Novembre, si ce mois est encore chaud. Ce seroit cinq générations en un an: le concours de toutes ces circonstances est très-rare; mais il n'est pas nécessaire que cet insecte multiplie jusqu'à ce point, pour faire de grands ravages. Jusqu'aux premiers froids, on voit continuellement sortir des papillons des tas de grains, & chaque papillon vit encore un mois; mais il y a certain temps où on voit éclore presque à la fois une quantité prodigieuse de papillons qui couvrent le tas, & semblent lui communiquer une sorte de frémissement. Ce sont ces essaims que nos Auteurs appellent *une volée*. Cette volée est toujours précédée d'une chaleur considérable qui s'excite dans le tas, & fait monter le thermometre à vingt-cinq, trente, & quelquefois cinquante degrés, tandis que la température extérieure n'est qu'à treize ou quatorze degrés: une telle chaleur favorise considérablement les progrès des chenilles qui

se trouvent dans les grains voisins ; quand il ne doit pas y avoir de volée, la chaleur du tas n'excede pas sensiblement celle de l'air extérieur.

Il y a ordinairement trois volées bien sensibles ; celle du printems vers la mi-Mai, ou le commencement de Juin ; celle d'Août, & une autre dans quelques-uns des mois suivans. La volée du printems a une inclination décidée à sortir des greniers ; tous les soirs au coucher du soleil, on voit des essaims de papillons se répandre dans la campagne. Les volées des autres mois passent le jour en repos, s'agitent la nuit, voltigent sur les tas, sans qu'on voie aucun de ces insectes se montrer au dehors. Qui a appris aux papillons du printems qu'ils trouveront au milieu des champs un aliment plus tendre & plus propre à leur postérité que celui dont ils ont vécu, & à ceux de l'été que la famille qu'ils vont mettre au jour mourroit de faim par-tout ailleurs que dans l'endroit où ils sont nés ?

Nos Académiciens ont eu l'attention de chercher au printems, la lanterne à la main, ces papillons vagabonds ; ils les ont trouvés en grand nombre accouplés sur les épis encore verts, & y déposant leurs œufs. Ils ont eu la précaution de les montrer aux habitans de la province pour lesquels, alors seulement, l'origine des chenilles que l'on trouve en Juin dans les épis cessa d'être une énigme.

Cette découverte a encore expliqué une autre observation qui auroit pu embarrasser, c'est que les récoltes sont ordinairement d'autant plus endommagées, qu'elles sont plus près d'un hameau & d'un lieu habité. Ces papillons peuvent même se transporter assez loin.

Moyen de faire périr ces insectes & de conserver les blés.

Un certain degré de chaleur suffit pour faire périr les insectes, chenilles, chrysalides, papillons. Un autre degré de chaleur peut endommager le germe des grains, & les empêcher de lever. Il a fallu trouver un degré fixe, qui pût faire jouir de l'avantage du premier, sans entraîner l'inconvénient du second. Les étu-

ves, telles que celles décrites dans le *Traité de la Conservation des Grains*, produiroient tous ces avantages; mais la construction en est dispendieuse, ainsi on a eu recours à l'usage des fours, en remédiant aux inconvéniens qui s'y rencontrent.

Les expériences ont appris les faits suivans: une chaleur de soixante degrés suffit pour dessécher en onze heures les chenilles, les papillons, les chrysalides, & les chauffe tous au point de les rendre friables; cette même chaleur n'ôte point au blé la faculté de germer; & une chaleur de trente-trois degrés continuée pendant deux jours, suffit pour faire périr tous ces insectes. Comme la chaleur ordinaire des fours, deux heures après qu'on en a retiré le pain, est environ de cent degrés, on ne doit mettre dans le four le grain de blé que l'on veut étuver pour le conserver que cinq ou six heures après que le pain a été retiré du four; le grain y éprouve alors un degré de chaleur capable de faire périr les insectes en moins de quarante-huit heures, mais qui ne sauroit altérer le germe. Lorsqu'on veut se procurer une semence bien pure & bien nette, on trempe pendant deux minutes les paniers dans lesquels on a mis du blé, dans une forte lessive de cendres, à laquelle on a ajouté de la chaux vive; cette lessive acheve de faire périr les insectes qui peuvent avoir résisté à la chaleur, & de plus, elle sauve encore les moissons de la carie qu'on nomme *pourri* en Angoumois. Lorsqu'on veut garder les blés étuvés, un excellent moyen d'empêcher que d'autres papillons n'y viennent de nouveau déposer leurs œufs, c'est de couvrir le tas de blé de chaux en poudre d'un pouce d'épaisseur; il suffit même de le couvrir de cendres, ou de l'envelopper dans des sacs de toiles, ou de le mettre dans des tonneaux. Quand il ne s'agit que d'étuver le grain pour en faire du pain ou un objet de commerce, il y a fort peu de précautions à prendre du côté du degré de chaleur. Deux heures après que le pain a été retiré du four, on peut y introduire une grande masse de grains & l'y laisser deux ou trois jours, en le remuant de temps en temps. Une des précautions importantes, est de battre le blé le plutôt

qu'il eſt poſſible ; le fléau, le van, le crible détruiſent ou emportent toujours un grand nombre de chenilles.

Il ſeroit aiſé par ces moyens ſimples & peu diſpendieux de parvenir à la deſtruction totale de cet inſecte dans l'Angoumois, ou du moins d'en approcher beaucoup, il ne s'agiroit que de les appliquer pendant un an ou deux à toutes les récoltes de la province. Il y a ſur cela d'excellentes vues, qu'il faut voir dans l'Ouvrage même de Mrs. *Duhamel* & *Tillet*.

Papillon de la fauſſe teigne du blé.

Les papillons de la fauſſe teigne qui paroiſſent dans le courant du mois de Juin, ſont du genre des phalenes ; ils ont quatre ailes plus larges du côté de la queue que du côté de la tête ; la couleur des ailes ſupérieures eſt gris blanc, la ſuperficie en eſt aſſez brillante, & elle paroît au ſoleil comme argentée. On apperçoit ſur les ailes avec la loupe des taches de figure irréguliere & un peu plus brunes que le fond ; ces papillons portent leurs ailes en forme de toit, & les bords intérieurs ſont frangés ; leur tête eſt garnie de deux antennes aſſez longues, formées de grains articulés : entre ces antennes & les yeux il y a un toupet de poils.

Ces papillons viennent d'une fauſſe teigne, qui eſt une petite chenille dont le corps eſt ras & blanchâtre ; elle eſt pourvue de ſeize jambes : elle ne ſe loge point dans les grains, mais elle a l'adreſſe d'en lier pluſieurs enſemble avec de la ſoie qu'elle file, & dont elle ſe forme un tuyau comme celui des teignes ordinaires ; ce tuyau eſt ordinairement recouvert du ſon & de la farine que cet inſecte a broyés. C'eſt dans ce tuyau que la fauſſe teigne ſe loge au milieu du tas de grains qu'elle a choiſi pour ſa proviſion ; mais elle a la liberté de ſortir de ſon fourreau pour manger les uns après les autres, les grains qui l'entourent : cette manœuvre la diſtingue de la vraie teigne : ſouvent même elle en attaque pluſieurs à la fois & toujours ſans ordre, car elle ronge tantôt de l'un, tantôt de l'autre, ſans qu'aucun ſoit entiérement mangé.

Quand il se trouve une grande quantité de ces fausses teignes dans un grenier, on voit tous les grains de la superficie du tas, liés les uns aux autres par des fils de soie; ce qui forme une croûte qui est quelquefois de trois pouces d'épaisseur. Cette teigne se transforme en chrysalide dans un grain qu'elle a creusé, ou dans le tuyau qu'elle s'est formé; & vers le mois de Juin on l'en voit sortir en papillon. Lorsqu'on remue un tas de grain où il y a beaucoup de fausses teignes, elles montent aux murailles; mais elles ne tardent pas à rentrer dans le tas, qui se trouve dès le lendemain couvert d'une nouvelle nappe soyeuse.

PAPILLON DU CHOU. *Voyez* CHENILLE DU CHOU.

PAPILLON DE JOUR & PAPILLON DE NUIT. *Voyez leur différence à l'article* PAPILLON.

PAPILLON DE FAUSSE TEIGNE. *Voyez à la suite du mot* PAPILLON DES BLÉS, *& à la suite de l'article* TEIGNE.

PAPILLON PAON. *Voyez* CHENILLES A TUBERCULES.

PAPILLON FEUILLE MORTE, ou PAPILLON PAQUET DE FEUILLES SECHES. Ce papillon de nuit a été très-bien nommé à cause de sa forme & de sa couleur; il n'y a personne qui ne prît ce papillon lorsqu'il est en repos sur un arbre, pour un paquet de feuilles seches. Tout concourt à faire prendre cette idée à qui le voit pour la premiere fois: ses ailes supérieures qui couvrent tout le corps ont des nervures, qui par leur espece de relief & leur disposition imitent celles des feuilles; leur contour est dentelé comme est celui de plusieurs feuilles; les ailes inférieures qui débordent les supérieures, sont comme d'autres feuilles qui seroient mêlées confusément; une espece de bec qu'il porte au devant de la tête, formé par deux tiges barbues & appliquées l'une contre l'autre, semble être la queue d'une de ces feuilles.

Ce papillon provient d'une chenille commune dans nos vergers, & qui habite communément les pêchers, les poiriers, les pommiers, les amandiers; quoiqu'elle ne soit pas rare, elle est difficile à trouver, parce que

sa figure en imposé, ainsi que celle de son papillon. Cette chenille est de la classe des demi-velues, sa couleur est d'un gris brun, le dessous de son ventre est d'un jaune feuille morte; elle porte sur son pénultieme anneau une corne assez courte & de substance charnue, & deux autres à-peu-près semblables aux deux côtés de la tête; sa tête est bleuâtre. Cette chenille a quatre pouces de longueur quand elle a acquis toute sa grandeur; elle ne mange que la nuit, & se tient pendant tout le jour appliquée contre le tronc ou les grosses branches de l'arbre, mais si ramassée, qu'on ne lui voit ni tête ni queue; on la prendroit pour une de ces tubérosités ou bosses qui s'élevent souvent sur l'écorce des arbres, sa couleur grise donne d'autant plus lieu d'en imposer.

Elle se construit contre les branches ou contre le mur une coque grisâtre, d'un tissu peu serré, elle en tapisse l'intérieur avec les poils de sa robe. Aussi-tôt qu'elle s'y est renfermée, elle dégorge une bouillie blanche, qui se seche promptement, se réduit en poudre, & rend sa coque opaque. La chenille instruite que son papillon habillé en phalene, n'auroit pas la force de percer sa coque, pour sortir de ce logement, elle lui ménage une petite ouverture.

PAPILLON DE LA CHENILLE DU SAULE. Voyez son histoire à l'art. *Chenille du saule, à double queue, vol II. pag. 421.* Voici une anecdote sur cette chenille & le papillon qui en provient, elle nous a été adressée par Madame B* de F* l'une de nos disciples qui joint aux graces & à l'esprit le goût naturel de l'observation. « J'avois une chenille qui se trouve sur » le saule, elle avoit été prise à Luxeuil en Franche-» Comté; elle se mit en chrysalide le 3 Septembre » 1770. Je la portai à Paris, l'ai menée aux Pyrenées, » comptant qu'au mois d'Août elle deviendroit papillon, » apparemment que les neiges l'ont empêchée de suivre » l'ordre de la nature: je l'ai menée sur les frontieres » d'Espagne en octobre, je posai la boîte qui la conte-» noit sur le manteau d'une cheminée où j'avois bon feu, » même en août; elle a toujours gardé l'*incognito*; en-» fin le 21 Janvier 1772, j'ai trouvé un assez vilain

» papillon gris avec des filets noirs & jaunes, dont le » deſſin imitoit le point d'Hongrie ; calcul fait, ladite » chenille a été cinq cents ſix jours en chryſalide, elle » naquit chenille ſur les rives du *Breuchier*, & devint » papillon ſur celles de la *Charente*. Sont-ce les voya- » ges qui ont retardé ſa métamorphoſe ? » Je le crois ; d'ailleurs la chaleur abrege, de même que le froid pro- longe, l'état de chryſalide.

PAPILLON DES TEIGNES : *voyez à la ſuite du mot* TEIGNES.

PAPILLON A TÊTE DE MORT. Ce papillon, l'un des plus ſinguliers, & qui porte des caracteres uniques, vient de l'eſpece la plus grande de nos che- nilles. Lorſque cette chenille a acquis toute ſa grandeur naturelle, elle a quatre pouces & demi de longueur : ſa couleur eſt un jaune clair, pointillé de noir ſur cer- tains anneaux ; on obſerve ſur ſon dos comme des eſ- peces de chevrons. Cette chenille a cela de ſingulier qu'elle porte une corne à l'extrémité poſtérieure, con- tournée en ſens contraire de celle des autres : cette corne eſt rougeâtre & toute chargée de petits grains graveleux, qui imitent aſſez bien une rocaille : on trouve cette chenille principalement ſur le jaſmin, quoi- qu'elle s'accommode auſſi de feuilles de feves de marais & de celles de choux ; c'eſt dans le mois d'Août qu'il faut la chercher. Vers ce temps elle ſe creuſe un trou dans la terre ; c'eſt là qu'elle ſe change en chryſalide de laquelle, au mois de Septembre, ſort le papillon à tête de mort, qui a porté plus d'une fois l'allarme & l'effroi dans l'eſprit du peuple imbécille, & des gens foibles & ignorants. Ce papillon eſt très-grand, il a trois pouces de longueur de la tête à la queue ; c'eſt un phalene du genre des *ſphinx éperviers*. Ses ailes éten- dues ont juſqu'à cinq pouces de vol ; la couleur de ſes ailes eſt obſcure, d'un brun noir mêlé avec des taches de jaune feuille-morte ; ce jaune diviſé par quelques traits noirs, forme ſur ſon corſelet une figure qui n'i- mite pas mal une *tête de mort*, ce qui lui en a fait don- ner le nom. A cette image funebre, peinte ſur ſon corps, ſe joint encore une ſingularité unique dans ce papillon, le ſeul dans lequel on l'ait obſervée ; il fait

entendre un bruit fort aigu, qui approche un peu de celui d'une souris, mais qui a quelque chose de plus plaintif & de plus lugubre. En falloit-il davantage pour jeter l'effroi dans l'esprit du peuple qui a donné à ce papillon le nom d'*oiseau de mort ?* Aussi l'allarme se répandit-elle, il y a quelques années, dans certains cantons de la Basse-Bretagne, parce que ces papillons y furent plus communs que d'ordinaire, positivement dans un temps où il y avoit beaucoup de maladies. On leur attribuoit tout le mal, on ne les voyoit qu'avec frayeur, on les regardoit comme les sinistres avant-coureurs des malheurs; & même encore présentement le peuple s'allarme, dit-on, à leur présence : tant les préjugés populaires sont difficiles à déraciner. Le cri singulier que fait entendre ce papillon, sur-tout lorsqu'il est troublé dans sa marche ou renfermé, & qu'il redouble sans cesse lorsqu'on le tient entre les doigts; ce cri, dis-je, sujet de tant de frayeurs, est occasionné par le bruit que fait la trompe de ce papillon, qui est courte & écailleuse, en frottant contre deux lames mobiles & très dures entre lesquelles elle est logée. L'épreuve en est facile; que l'on écarte avec la pointe d'une épingle une des deux lames d'auprès de la trompe, l'animal ne rend que la moitié du son ordinaire; qu'on les écarte toutes deux, il est muet. C'est en Septembre & Octobre que l'on voit ces papillons en diverses provinces du Royaume : on le trouve aussi sous divers climats, en Angleterre, en Egypte.

Nous avons déjà eu occasion de dire que chaque plante a son insecte, & peut-être n'y a-t-il point d'arbres, d'arbustes, d'arbrisseaux & de plantes qui n'aient aussi leur chenille & son papillon : c'est pourquoi nous renvoyons, pour les papillons qui sortent des chenilles, *au mot même* CHENILLE, où nous avons décrit les principales. On trouvera à leur article, suivant l'ordre alphabétique, l'Histoire d'une quantité d'autres chenilles & de papillons célebres, sous les noms particuliers qu'ils portent. Nous terminerons cet article en disant que si les papillons des Indes sont plus grands & plus beaux que les nôtres, ils sont en plus petit nombre que ne le sont chez nous ces sortes d'insectes.

PAPILIONACÉES (Plantes). *Voyez* ce que c'eſt à la ſuite de l'article LÉGUMES.

PAPION ou BABOUIN, *papio*, eſpece de ſinge propre à l'ancien continent; il ſe trouve particuliérement aux îles Philippines & au Cap de Bonne-Eſpérance. On en diſtingue deux ou trois eſpeces pour la grandeur de la taille. Le papion a la queue très-courte; il marche plus ſouvent à quatre qu'à deux pieds: ſes griffes ſont des armes redoutables: les chiens n'ont gueres de priſe ſur lui que quand il s'eſt enivré de raiſin, mets dont il eſt très-friand. Sa femelle eſt ſtérile dans les climats tempérés; dans ſon climat natal, elle ne fait même qu'un petit qu'elle porte entre ſes bras & comme pendu à ſa mamelle. Ces animaux qui ſont forts & robuſtes tiendroient tête à pluſieurs hommes. Ils font de grands dégâts dans les vignes, les jardins & les vergers. Pour exercer leur brigandage, ils ſe réuniſſent en troupes; une partie entre dans l'enclos pour piller; le reſte forme une chaîne de communication depuis le lieu du pillage, juſqu'à l'endroit du rendez-vous. On cueille, on arrache, on jette de main en main, on reçoit avec une adreſſe ſinguliere: en un inſtant, un jardin eſt dévaſté, ravagé, & quelques-uns de ces individus placés en ſentinelle, avertiſſent au moindre danger, & la troupe s'enfuit en gambadant. Le naturel des papions & babouins eſt méchant & féroce; mais les traits principaux de leur caractere, ſont l'impudence & la lubricité. L'aſpect des femmes excite l'effronterie des mâles; de même, l'aſpect des hommes excite la laſciveté des femelles. Sur cet article ils ſont incorrigibles. *Voyez* ce qui en eſt dit à la ſuite de l'article SINGE.

PAPYRACÉ. Épithete qu'on emploie en Hiſtoire Naturelle, pour déſigner une coquille extrêmement mince.

PAPYRUS. *Voyez* PAPIER DU NIL.

PAQUERETTE ou PASQUETTE. *Voyez* MARGUERITE PETITE.

PARANACARE, eſpece de crâbe du Bréſil, qui, ſelon *Marcgrave*, n'eſt pas bon à manger. Il eſt long de trois doigts: il a deux bras garnis de pinces, quatre jam-

bes longues de trois doigts, & quatre autres qui sont très-courtes; une queue striée & longue d'un doigt & demi; deux yeux longs & élevés, & deux filets. Sa coquille est brunâtre, ainsi que les poils qui la recouvrent; toutes les parties inférieures sont bleuâtres, de même que les yeux & les filets ou antennules: on le trouve sur le rivage, proche du fleuve Paraïba. *Ruisch, exsang. p. 27.*

PARASILENE. C'est un météore dans lequel on apperçoit quelquefois l'image apparente de la lune: cet effet est occasionné par les mêmes causes que les *parhélies* du soleil. *Voyez* PARHÉLIE.

PAREIRA BRAVA ou BUTUA. C'est le nom d'une racine qui nous est apportée du Brésil par les Portugais: on ne connoît pas encore bien la plante dont on la retire: cependant on soupçonne que c'est la même que le *caapéba*. Voyez ce mot. Cette racine est ligneuse, dure, tortueuse, brune en dehors, d'un jaune grisâtre intérieurement; étant coupée transversalement, on y voit plusieurs cercles concentriques, traversés de plusieurs rayons qui aboutissent au centre: elle n'a point d'odeur, & est un peu amere; elle est de la grosseur du doigt, & quelquefois du bras d'un homme. Les Portugais & les habitans du Brésil la regardent comme une panacée souveraine. Ils font dans l'usage de la tremper dans l'eau, & de l'user sur une pierre à aiguiser; ils la délaient ensuite dans quelque liqueur appropriée, & la font prendre à leurs malades: nous l'employons aussi râpée. L'expérience a appris que son usage est spécifique dans la colique néphrétique & la suppression d'urine: la douleur est dissipée presque en un instant par un écoulement abondant d'urines. Cette racine produit son effet en divisant les matieres muqueuses qui engorgent les couloirs des reins. Elle a été employée avec succès dans un asthme humoral qui suffoquoit le malade: son usage a été suivi d'expectoration. Cette racine est fort utile dans la gonorrhée, & pour arrêter les hémorrhagies. On la donne en poudre à la dose de vingt à trente grains, trois à quatre fois le jour, dans la tisane de fleurs de mauve; & en décoction, à la dose de deux à trois gros. A Cayenne

on l'emploie en tisane au défaut du sassafras. *Pareira brava* est un nom Portugais, qui signifie *vigne sauvage* ou *bâtarde*. *Butua* est un nom Indien, qui signifie un bâton. (M. *Lochner* qui a écrit sur le *pareira brava*, le distingue du *butua*). Les Brasiliens donnent aussi le nom de *membrocq* à cette racine. M. *Amelot* Conseiller d'Etat, est le premier qui ait apporté le *pareira brava* en France, au retour de son Ambassade de Portugal, en 1688.

PARELLE : *voyez* PATIENCE.

PAREPOU : *voyez* PALIPOU.

PARESSEUX ou AI ou HAY. Quadrupede de l'Amérique & du Ceylan, dont on distingue deux especes; le grand & le petit. M. *Linnæus* les met dans l'ordre des *anthropomorphes*, ou animaux à figure humaine. Il nomme *bradype* celui d'Amérique. Cet animal habite les endroits les plus chauds de cette partie du monde. Il a trois doigts aux pieds de devant, & il est sans queue. C'est l'*ignavus gracilis aut agilis* de *Seba*. La grande espece a cependant une sorte de queue longue d'un demi-doigt, & ronde. L'animal est de la grandeur d'un renard de moyenne taille, & a des yeux noirs fort sombres ou endormis. Le même Auteur nomme le second *tardigradus Ceylanicus*. Ce grand *Aï* est l'*ignavus major hirsutus*, *pilis longis & griseis* des Auteurs.

M. *Klein* fait aussi une différence de l'*Ai* du Ceylan, d'avec celui de l'Amérique. Celui du Ceylan n'a que deux doigts aux pieds de devant, & trois à ceux de derriere, tous armés d'ongles forts & crochus. Ses oreilles, qui sont placées & appliquées contre la tête, sont cachées sous les poils. Il n'a point de queue : tout son corps est couvert de poils épais, roux ou de couleur incarnat par dessus le dos, & d'un cendré clair par dessous le ventre. Il a le museau un peu plus alongé que le paresseux de l'Amérique. On dit que les femelles de ces animaux ont deux mamelles entre les pieds de devant.

M. *Brisson* met le *paresseux* dans l'ordre second de la classe des quadrupedes velus, qui n'ont que des dents molaires. Ces dents ne sont point à lobes, comme celles

des autres quadrupedes: elles sont cylindriques, & terminées par un bout arrondi.

Le petit que la femelle de l'*Aï* met bas, naît sans poils; il ressemble au petit chien par l'ouverture de la gueule, & par tout le corps à l'espece de singe cynocéphale. Il n'a point de queue; ses oreilles sont courtes & rondes, collées contre la tête, comme sont celles des singes: ce qui fait que M. *Klein* le nomme *simia personata*. *Seba* fait mention d'un *paresseux de l'Amérique*, dont les poils sont très-épais, crépus & semblables à de la laine. Ces animaux, dit-on, rient & pleurent en même temps: *risum fletu miscent*. Leur voix est claire comme le cri d'un jeune chat, mais qui prononce gravement *i*, *i*, *i*, *i*, *i*, sur le ton des notes *la*, *sol*, *fa*, *mi*, *re*: ce cri a fait dire plaisamment à *Clusius* que l'*Aï* étoit l'inventeur de la Musique.

On trouve dans les *Observations d'Histoire Natur.* de M. *Gautier*, *T. I. Part. 2. p. 240. & suiv.* une description de l'extérieur & de l'intérieur de cet animal. *Voy.* aussi *Séba* pour les descriptions & les figures qu'il donne des différentes especes d'*Aï*.

Autant, dit M. *de Buffon*, la Nature nous a paru vive, agissante, exaltée dans les singes, autant elle est lente, contrainte & resserrée dans ces *paresseux*; & c'est moins paresse que misere, c'est défaut, c'est dénuement, c'est vice dans la conformation; point de dents incisives ni canines, les yeux obscurs & couverts; la mâchoire aussi lourde qu'épaisse, le poil plat & semblable à de l'herbe séchée, les cuisses mal emboîtées & presque hors des hanches, les jambes trop courtes, mal tournées & encore plus mal terminées; point d'assiette de pied, point de pouces, point de doigts séparément mobiles; mais deux ou trois ongles excessivement longs, carinés, pointus, recourbés en dessous, qui ne peuvent se mouvoir qu'ensemble, & nuisent plus à marcher qu'ils ne servent à grimper; la lenteur, la stupidité, l'abandon de son être, & même la douleur habituelle, resultans de cette conformation bizarre & négligée; point d'armes pour attaquer ou se défendre, nul moyen de sécurité, pas même en

grattant la terre ; nulle reſſource de ſalut dans la fuite ; confinés, je ne dis pas au pays, mais à la motte de terre, à l'arbre ſous lequel ils ſont nés ; priſonniers au milieu de l'eſpace ; ne pouvant parcourir qu'une toiſe en une heure, grimpant avec peine, ſe traînant avec douleur, une voix plaintive & par accens entrecoupés qu'ils n'oſent élever que la nuit ; tout annonce leur miſere, tout nous rappelle ces monſtres par défaut, ces ébauches imparfaites, mille fois projetées, exécutées par la Nature, qui ayant à peine la faculté d'exiſter, n'ont dû ſubſiſter qu'un temps, & ont été depuis effacés de la liſte des êtres ; & en effet ſi les terres qu'habitent les *pareſſeux* n'étoient pas des déſerts, ſi les hommes & les animaux puiſſans s'y fuſſent anciennement multipliés, ces eſpeces ne ſeroient pas parvenues juſqu'à nous, elles euſſent été détruites par les autres, comme elles le ſeront un jour.

Faute de dents, dit notre illuſtre & ſublime Écrivain, ces pauvres animaux ne peuvent ni ſaiſir une proie, ni ſe nourrir de chair, ni même brouter l'herbe ; réduits à vivre de feuilles & de fruits ſauvages, ils conſument du temps à ſe traîner au pied d'un arbre, il leur en faut encore beaucoup pour grimper juſqu'aux branches, & pendant ce lent & triſte exercice qui dure quelquefois pluſieurs jours ils ſont obligés de ſupporter la faim & peut-être de ſouffrir le preſſant beſoin ; arrivés ſur l'arbre ils n'en deſcendent plus, ils s'accrochent aux branches, ils les dépouillent par parties, mangent ſucceſſivement les feuilles de chaque rameau, paſſent ainſi pluſieurs ſemaines ſans pouvoir délayer par aucune boiſſon cette nourriture aride ; & lorſqu'ils ont ruiné leur fond, & que l'arbre eſt entiérement nu, ils y reſtent encore retenus par l'impoſſibilité d'en deſcendre ; enfin quand le beſoin ſe fait de nouveau ſentir, qu'il preſſe & qu'il devient plus vif que la crainte du danger de la mort, ne pouvant deſcendre ils ſe laiſſent tomber, & tombent très-lourdement comme un bloc, une maſſe ſans reſſort, car leurs jambes rondes & pareſſeuſes n'ont pas le temps de s'étendre pour rompre le coup.

A terre ils ſont expoſés à la merci & même livrés

à tous leurs ennemis : comme leur chair n'eſt pas abſolument mauvaiſe, les hommes & les animaux de proie les cherchent & les tuent. Il paroît qu'ils multiplient peu, ou du moins que s'ils produiſent fréquemment ce n'eſt qu'en petit nombre ; car ils n'ont que deux mamelles. Tout concourt donc à les détruire, & il eſt bien difficile que l'eſpece ſe maintienne : il eſt vrai que quoiqu'ils ſoient lents, gauches & preſqu'inhabiles au mouvement, ils ſont durs, forts de corps & vivaces ; qu'ils peuvent ſupporter long-temps la privation de toute nourriture ; que couverts d'un poil épais & ſec, & ne pouvant faire d'exercice, ils diſſipent peu & engraiſſent par le repos, quelque maigres que ſoient leurs alimens ; ces animaux ayant quatre eſtomacs comme les quadrupedes ruminans, peuvent compenſer ce qui manque à la qualité de la nourriture par la quantité qu'ils en prennent. Une ſingularité remarquable, c'eſt que leurs inteſtins, au lieu d'être longs comme ils le ſont dans les animaux ruminans, ſont au contraire très-petits & plus courts que ceux des animaux carnivores ; une autre ſingularité c'eſt qu'au lieu de deux ouvertures au dehors, l'une pour l'urine, l'autre pour les excrémens, au lieu d'un orifice extérieur & diſtinct pour les parties de la génération, ces animaux n'en ont qu'un ſeul, au fond duquel eſt un égout commun, un cloaque comme dans les oiſeaux.

Au reſte, dit M. *de Buffon*, avec cet eſprit philoſophique qui regne toujours dans ſes ouvrages, ſi la miſere qui réſulte du défaut de ſentiment n'eſt pas la plus grande de toutes, celle de ces animaux, quoique très-apparente, pourroit ne pas être réelle ; car ils paroiſſent très-mal ou très-peu ſentir : leur air morne, leur regard peſant, leur réſiſtance indolente aux coups qu'ils reçoivent ſans s'émouvoir, annoncent leur inſenſibilité ; & ce qui la démontre, c'eſt qu'en les ſoumettant au ſcapel, en leur arrachant le cœur & les viſceres, ils ne meurent pas à l'inſtant. *Piſon* qui a fait cette dure expérience, dit que le cœur ſéparé du corps battoit encore vivement pendant une demi-heure, & que l'animal remuoit toujours les jambes comme s'il

n'eût été qu'assoupi ; par ces rapports ce quadrupede se rapproche non-seulement de la *tortue*, dont il a déjà la lenteur, mais encore des autres reptiles & de tous ceux qui n'ont pas un centre de sentiment unique & bien distinct : or, tous ces êtres sont misérables, sans être malheureux ; & dans ses productions les plus négligées, la Nature paroît toujours plus en mere qu'en marâtre.

M. *Vosmaër*, Naturaliste Hollandois, vient de donner la description du *paresseux penta-dactyle* (à cinq doigts) *du Bengale*, & qui a vécu dans la chambre du Stadhouder. Sa longueur, depuis le sommet de la tête jusqu'à l'anus, est de treize pouces. Il a la tête presque ronde, n'ayant que le museau qui soit un peu pointu. Les oreilles sont fort minces, ovales & droites, mais presque entiérement cachées sous un poil laineux ; elles sont velues aussi en dedans. Les yeux gros, orbiculaires & placés sur le devant du front, immédiatement au-dessus du nez, & tout proches l'un de l'autre, de couleur brun-obscur. Quand on éveille l'animal pendant le jour, la prunelle est d'abord fort petite, mais elle grossit par degrés à un point considérable : lorsque cet animal, qui paroît être du sexe mâle, s'éveille le soir, & qu'on se présente à lui avec une chandelle allumée, on voit également cette prunelle s'étendre & occuper à-peu-près tout le rond de l'œil. Le nez est petit, aplati en devant & ouvert sur les côtés. La mâchoire inférieure a au-devant quatre dents incisives, étroites & plates, suivies des deux côtés d'une plus grande, & enfin de deux grosses dents canines : après la dent canine, sont de chaque côté deux autres dents rondes & pointues ; ce qui fait en tout douze dents. M. *Vosmaër* dit qu'il y a de chaque côté deux ou trois dents mâchelieres : la mâchoire supérieure n'a au-devant dans le milieu, que deux petites dents écartées ; un peu plus loin, deux petites dents canines, une de chaque côté ; ensuite deux dents plus petites encore, ce qui fait huit dents, sans compter les mâchelieres qui sont au nombre de deux ou trois. La langue est assez épaisse & longue, arrondie en devant & rude. Le poil long, fin, laineux, mais rude au toucher :

cher : sa couleur est grisâtre ou cendré-jaunâtre-clair, un peu plus roux sur les flancs & aux jambes ; autour des yeux, des oreilles, la couleur est aussi un peu plus foncée, & depuis la tête tout le long du dos regne une raie brune. Cet animal a une petite apparence de queue d'environ deux ou trois lignes de longueur. Les doigts des pieds antérieurs sont au nombre de cinq ; le pouce est plus long & plus gros que les autres doigts, dont celui du milieu est le plus long, & celui du devant le plus court ; les ongles sont comme ceux de l'homme ; les doigts des pieds postérieurs sont conformés de même, à l'exception que celui de l'index (premier doigt) est fort long & se termine en pointe aiguë. Tous les doigts, continue M. *Vosmaër*, paroissent avoir trois articulations ; ils sont seulement un peu velus en-dessus & garnis d'une forte pellicule brune en-dessous : la longueur des pieds antérieurs est de six pouces, celle des pieds postérieurs est de huit pouces.

A cette description du *paresseux penta-dactyle du Bengale*, M. *Vosmaër* joint l'histoire naturelle de cet animal, & ajoute quelques réflexions sur ce qu'a écrit M. *de Buffon*, concernant le paresseux. M. *de Buffon*, dit-il, *Hist. Nat. Tom. XIII. p. 34.* n'assigne pour patrie au paresseux que le nouveau monde ; c'est une créature si surprenante, par son incroyable lenteur, qu'il s'est attiré l'attention de tous ceux qui l'ont vu ; sa conformation, sa voix plaintive, son assoupissement continuel, tout en lui excite tour à tour des sentimens naturels d'horreur & de compassion ..... mais cet état, selon M. *Vosmaër*, n'est pas aussi misérable que son premier aspect l'annonce ; souvent nos premieres idées, dit-il, nous font illusion dans l'examen extérieur des êtres créés dont nous ignorons les rapports à la nature entiere ou à eux-mêmes. Notre Naturaliste Hollandois prétend avoir été détrompé à cet égard par des recherches plus exactes, & ces nouvelles observations le conduisant à des idées plus générales, plus sublimes, l'ont convaincu que chaque être, relativement à soi-même ou au tout pris ensemble, *étoit très-bien.* Il envisage sous une tout autre fin l'affreuse

mière que M. *de Buffon* attribue à cette créature. Le tableau le plus magnifique seroit plat & désagréable, sans les ombres, les dégradations & les autres secours de l'Art. Il en est de même de la nature, dit M. *Vosmaër*; son grand Architecte, qui a disposé toutes choses avec une sagesse impénétrable, n'a point jugé que toutes ses créatures brillassent d'une égale beauté de forme & de coloris, ni qu'elles fussent douées de la même intelligence, de la même force, du même naturel doux ou féroce, d'une même lenteur, ou d'une même agilité : que l'on compare le superbe paon avec le difforme dodo, le singe & le cheval, le mouton & le tigre, le paresseux & l'écureuil; que l'on parcoure tous les genres d'animaux en général, & qu'on descende de la contemplation de ces créatures terribles, telles que le crocodile, la baleine & l'éléphant, à celle de la puce aquatique, du puceron & des autres petits animaux microscopiques; qu'on lise enfin le grand livre de la nature, dans les œuvres de la création; qu'on observe le naturel, les propriétés & l'économie des créatures; que de tableaux admirables ne vont pas s'offrir à nos yeux! on y verra que la chétive taupe, qui habite dans des ténebres éternelles, y mene une vie heureuse; & qu'un animal comme le paresseux, destiné, pour ainsi dire, à ne vivre que la nuit, confiné à l'arbre sous lequel il est né, dormant sur ses branches, & suivant M. *de Buffon*, ne se nourrissant aussi que de feuilles & de fruits sauvages; qu'un tel animal, dis-je, est formé & disposé d'une façon analogue à sa maniere de vivre.

J'avoue, continue M. *Vosmaër*, qu'à l'égard du tableau de la nature entiere, le paresseux paroît en être une ombre, une tache obscure, & comme destiné à rehausser l'éclat des autres objets; mais considéré en lui-même, & par rapport à sa nature, de quoi lui serviroit une plus grande agilité? Pendant la nuit, lorsqu'il se traîne sur les branches des arbres, elle ne pourroit que l'exposer à mille accidens; malgré sa lenteur il a une force incroyable dans ses pattes, (si on lui laisse saisir une canne, il la serre peu à peu tellement, qu'il la fait fendre); cette force lui est néces-

faire, ainſi que la difforme ſtructure de ſes pieds poſtérieurs, pour ſe tenir la nuit & en dormant attaché aux branches & pour grimper d'un arbre ſur l'autre. M. *Voſmaër* prétend que ces animaux ne ſont pas obligés de ſe laiſſer tomber comme un bloc lorſqu'ils ſont ſur un arbre & qu'ils veulent être à terre, & il dit encore que quant à leur anéantiſſement total, on ne le doit pas craindre : ils ſe ſont conſervés depuis tant de ſiecles ; d'ailleurs la vigilante nature paroît y avoir ſuffiſamment pourvu de toutes parts. Cet Obſervateur remarque avec M. *Daubenton*, que cet animal a les mâchoires garnies de dents canines, (M. *de Buffon* dit qu'ils n'en ont pas) ; le nombre des dents canines & mâchelieres eſt dans l'*aï* ou pareſſeux le même que dans l'*unau* : voyez ce mot. M. *Voſmaër* avoue que le pareſſeux ſe trouve dans le Nouveau Monde, mais il ſoutient qu'il s'en trouve auſſi une eſpece dans l'Ancien Monde, & qui a ſa demeure en Aſie ; c'eſt le *pareſſeux penta-dactyle du Bengale* que nous avons décrit ci-deſſus. *Valentin* avoit déjà dit que le pareſſeux ſe trouve aux Indes Orientales, & *Séba* en avoit reçu deux qui lui avoient été envoyés du Ceylan.

M. *Voſmaër* dit que le pareſſeux de Bengale paroît former une eſpece intermédiaire, (eu égard uniquement à la figure extérieure) entre les pareſſeux vulgaires & connus des Indes Occidentales, & ces animaux ſinguliers, que *Séba* nomme *pareſſeux fluets de Ceylan*, & auxquels M. *de Buffon* donne le nom de *loris*. Voyez ce mot.

Le pareſſeux de Bengale que M. *Voſmaër* nourriſſoit dans ſa chambre, avoit une odeur déſagréable ; il dormoit tout le jour, c'étoit en été, il ne s'éveilloit qu'à huit heures & demie : il dormoit conſtamment aſſis ſur ſon derriere, la tête penchée en avant entre les pattes antérieures, repliées contre le ventre : dans cette attitude, il ſe tenoit toujours en dormant très-fermement attaché au treillis de fer de ſa cage par les deux pattes de derriere, & ſouvent encore par une des pattes antérieures : cette étrange propriété ſuppoſe que l'animal dort ordinairement ſur les arbres, & ſe tient attaché aux branches qui l'environnent : ſon mouvement,

étant éveillé, étoit extrêmement lent, se traînant de barre en barre qu'il saisissoit avec ses pattes antérieures : s'il rampoit à terre sur le foin, il se mouvoit & traînoit avec la même lenteur : si on le chassoit avec un bâton, il n'alloit pas plus promptement, il ne lâchoit pas prise, il mordoit le bâton, c'étoit là toute sa défense : dès qu'il s'éveilloit il mangeoit, & ensuite il rendoit ses excrémens : son urine avoit une odeur forte, désagréable ; il étoit friand de riz, de fruits, de pain, de biscuit sec ; il flairoit l'eau sans la boire ; il aimoit beaucoup les œufs & portoit sa nourriture à sa bouche à la maniere des écureuils & des souris. M. *Vosmaër* lui présenta un moineau, ensuite un hanneton, un pinçon qu'il avala fort goulument & en entier : quoique lent dans sa démarche, cet animal étoit adroit à saisir une proie vivante, & elle ne pouvoit plus échapper de sa griffe : son cri continuel étoit *aï*, *aï*, *aï*, traînant fort long-temps chaque *aï* d'un ton plaintif, langoureux & tremblant.

PARESSEUX. Nom que *Goëdaert* donne aussi à un ver qui se trouve dans les lieux d'aisance, & se nourrit de l'excrément de l'homme : sa marche est très-lente. Il se métamorphose en une petite mouche, qui ne se nourrit aussi que de nos excrémens.

PARESSEUSE. Le même Auteur appelle ainsi une fausse chenille que l'on trouve souvent sur les feuilles du rosier, où elle se nourrit pendant la nuit : elle marche très-lentement, & quand on la presse, sa défense ne consiste qu'à faire de son corps un petit monceau. Cette larve se fait une maisonnette transparente & tissue comme un filet, pour y attendre sa métamorphose, qui se fait depuis le mois de Septembre jusqu'en Mai. Alors elle en sort dans l'état de mouche.

PARETURIER ou PARETUVIER. *Voyez* PALETUVIER.

PARFUM. Nom donné à l'odeur aromatique, plus ou moins subtile & suave, qui exhale d'une substance quelconque. Les parfums solides ou secs & les plus estimés sont ceux de l'Arabie ; qui sont, l'encens, la myrrhe, le benjoin, le storax, le labdanum, le baume blanc, le styrax liquide, le *thymiama* ou narcaphte,

la graine d'ambrette, le *costus* odorant; ensuite les parfums de l'Inde, qui sont pour l'ordinaire, des pots-pourris composés d'écorce de citron, de bois d'aloès, de girofle, de santal citrin, de macis, de muscade, de cannelle, d'ambre, de musc & de civette. Nos parfums d'Europe ne sont peut-être pas moins agréables; on les compose avec les fleurs de lavande, de jasmin, de thym, de romarin, de roses, de tubéreuses, un citron piqué de clous de girofle, des bois de rhode & de cedre, & de l'iris de Florence: on aromatise ce mélange d'un peu d'huile essentielle de bergamotte. Les parfums liquides sont en général les esprits & essences des plantes très-odorantes. Souvent les fleurs qui ornent les parterres de nos jardins communiquent à l'atmosphere une vapeur aussi douce, aussi délicieuse, que les odeurs qu'un vent chaud fait exhaler des plaines aromatiques de l'Arabie.

Telle est communément la base de nos *pots-pourris* & de nos *cassolettes*. On sait que ce nom a été donné à une composition odoriférante, formée de l'amas de tout ce qui rend une odeur agréable; observant toutefois qu'il y ait une certaine analogie entre les odeurs, car il peut arriver, ou qu'elles soient rendues plus suaves, ou qu'elles se corrompent par le mélange: on renferme ces aromates tantôt dans de petites boîtes d'or ou d'argent portatives & bien fermées, mais qu'on ouvre à volonté, tantôt dans des vases de faïence ou de porcelaine garnis de baguettes en maniere de pied de réchaud, & dont le couvercle est percé de part en part, afin que les odeurs passent & se répandent dans l'appartement où les *cassolettes* sont déposées. *Voyez l'article* ODORAT *dans le chapitre des* SENS, *inséré à la suite du mot* HOMME.

L'usage des *cassolettes* est fort ancien. Les Indiens ont de tout temps brûlé des parfums dans des especes de réchauds, pour recevoir plus magnifiquement leurs convives: l'encensoir fumant est dans la main du Prêtre une cassolette. L'*acerra* des Anciens étoit un vase ou coffret destiné aux parfums. Ces instrumens de sacrifices se voient très-souvent dans les anciens monumens, & quelques-uns sont ornés de figures symbo-

liques. A quel degré les Romains n'ont-ils pas pouſſé leur luxe dans les odeurs, ſoit pour l'uſage des ſacrifices, ſoit pour donner une marque de leur reſpect envers les hommes conſtitués en dignité? on s'en ſervoit encore aux ſpectacles, dans les bains; les roſes y étoient prodiguées, & la profuſion des parfums devint ſi exceſſive dans la célébration des funérailles, que l'uſage en fut défendu par les lois des douze Tables. Par quel contraſte les Dames Romaines ont-elles aujourd'hui de l'averſion pour les odeurs? & pourquoi les Poëtes ne chantent-ils que la douceur de l'haleine de leur maîtreſſe, ſans chanter auſſi le muſc & l'ambre dont elles ſont parfumées par l'action de ces corps odoriférans? *Voyez* AROMATES.

Les Sculpteurs ſont auſſi dans l'uſage d'imiter ces caſſolettes en faiſant des eſpeces de vaſes iſolés de peu de hauteur, du ſommet & ſouvent des côtés deſquels s'exhalent des flammes ou des parfums affectés: ces vaſes ſervent ſouvent d'amortiſſement à l'extrémité ſupérieure d'une maiſon de plaiſance, ou bien ils couronnent les retables d'autels; on les emploie auſſi dans la décoration des catafalques, des arcs de triomphes, feux d'artifice, &c.

PARHÉLIES ou FAUX SOLEIL. C'eſt un météore dont l'aſpect a quelque choſe de fort étonnant: on apperçoit un ou pluſieurs faux ſoleils ſous la forme d'une clarté brillante, qui paroiſſent à côté du ſoleil, & qui ſont formés par la réflexion des rayons du ſoleil. Ces parhélies ne paroiſſent jamais qu'au lever & au coucher du ſoleil, parce qu'alors les rayons de cet aſtre ont à traverſer une plus grande quantité de vapeurs, & que ces apparences ſont l'effet de la lumiere réfléchie par les vapeurs.

Ces apparences s'offrent quelquefois avec un très-grand appareil, quelquefois elles ſont plus ſimples; mais toujours effrayantes pour le peuple: quelquefois on n'en voit qu'une partie, parce que la totalité dépend d'un grand nombre de circonſtances qui ne ſe rencontrent pas toujours à la fois. L'agitation de l'air cauſée par le vent, des nuages qui paſſent au deſſous interceptent le ſpectacle ou en rompent le cours; leurs figures ne

ſont pas auſſi parfaitement rondes que celles du ſoleil ; on leur remarque ſouvent des angles ; elles ne brillent pas non plus autant que le ſoleil, quoique leur lumiere ne laiſſe pas d'être quelquefois auſſi grande que celle de cet aſtre. Lorſqu'il en paroît pluſieurs à la fois, quelques-unes ont moins d'éclat & ſont plus pâles que les autres. Les cercles des parhélies different tant en nombre qu'en grandeur, ils ont cependant tous le même diametre, lequel eſt égal au diametre apparent du ſoleil ; il ſe trouve des cercles qui ont le ſoleil dans leur centre ; ces cercles ſont colorés, & leur diametre eſt de 45 degrés & même de 90 : plus les couleurs de ces cercles ſont vives, plus la lumiere du véritable ſoleil paroît foible. On voit ordinairement les parhélies en hiver lorſqu'il fait froid ou qu'il gele un peu, tant qu'il regne en même temps un petit vent du nord. Lorſque les parhélies diſparoiſſent, il commence à pleuvoir ou à neiger, & on voit alors tomber une eſpece de neige oblongue, faite en maniere d'aiguilles.

PARIÉTAIRE, *parietaria*. Cette plante connue également ſous les noms de *paritoire*, *vitriole*, *caſſe-pierre*, ou *perce-muraille*, croît abondamment dans les vieux murs, quelquefois le long des haies ou des maſures : ſa racine eſt fibreuſe & rougeâtre, elle pouſſe pluſieurs tiges à la hauteur d'environ deux pieds ; ces tiges ſont rondes, rougeâtres, fragiles & rameuſes : les feuilles de cette plante ſont oblongues, velues, pointues, & s'attachent facilement aux habits ; ſes feuilles en ſe ſéchant deviennent preſque tranſparentes : ſes fleurs ſont petites, elles ſortent par tas des aiſſelles des feuilles le long de la tige ; elles ſont compoſées ordinairement chacune de quatre étamines, dont les ſommets ſont d'un blanc purpurin ; elles ſont auſſi ſi élaſtiques, que dès qu'on y touche avec un ſtilet, elles ſe développent ſubitement & ſecouent fortement leur pouſſiere rouſſâtre : à ces fleurs fertiles & différentes pour la figure des fleurs ſtériles, il ſuccede des ſemences oblongues & luiſantes, renfermées dans des capſules rudes au toucher.

Les feuilles de cette plante ſont d'un grand uſage en Médecine ; elles ſont apéritives, émollientes &

rafraîchiſſantes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On vante cette plante pour les maux de reins, & on rapporte des exemples où elle a ſuſpendu pendant des années entieres les douleurs de la pierre. Pluſieurs Médecins aſſurent avoir guéri des hydropiſies rebelles avec la décoction de ce diurétique. Les Payſans ſe ſervent de la plante pour nétoyer les verres.

PARŒTONIUM. Des Naturaliſtes modernes croient que le ſel dont les Anciens ont parlé ſous ce nom, eſt un ſel marin tiré par l'évaporation des eaux de la mer. Le *parætonium* a une ſaveur muriatique & la lucidité de l'alun. Quelques Auteurs prétendent cependant que le *parætonium* des Anciens étoit tiré des murailles.

PAS. *Voyez* DÉTROIT.

PASAN. C'eſt l'*antilope bezoartica* de M. *Pallas*. Voyez à l'article GAZELLE.

PAS D'ANE. *Voyez* TUSSILAGE.

PAS DE POULAIN, *paſſus equinus*. Quelques Naturaliſtes donnent ce nom à deux coquillages multivalves du genre des ourſins de mer: l'un eſt connu ſous le nom de *ſpatagus*, & l'autre ſous celui de *bryſſus* ou *œuf marin*. Le premier, dit M. *d'Argenville*, reſſemble à un petit tonneau garni de ſpatules; l'ouverture de ſon dos a la figure d'un cœur, au lieu que le bryſſus qui n'a point cette ouverture, eſt toujours de figure ovale avec des ſillons crenelés & ponctués au ſommet. On prétend qu'ils n'ont point de dents ni l'un ni l'autre, ils ont une mâchoire pour prendre l'eau & le ſable, & en dedans un ſeul inteſtin rempli d'eau qui leur tient lieu de chair & d'œufs. Le compartiment de l'*ourſin bryſſus* en étoile percée à jour, & tous ſes points ſaillans ſont agréables à la vue; ſa couleur eſt griſe ou blanche, avec une ouverture dans le haut & une autre vers le milieu dans la partie de deſſous; c'eſt par ces trous que l'animal reſpire & vide ſes excrémens: la partie inférieure, qui eſt le ventre, eſt toute chagrinée. Les autres ourſins ſont ouverts dans le milieu. L'*ourſin ſpatagus* reſſemble communément au *bryſſus* pour la couleur & les ouvertures, mais ſon compartiment eſt différent, il eſt échancré, ſemé d'a-

pophyſes très-fines & garnies de ſpatules, & comme nous l'avons dit ci-deſſus, l'ouverture de ſon dos repréſente la figure d'un cœur. On en voit quelquefois, mais rarement d'une couleur violette. *Voyez* OURSIN DE MER.

PASSE ou PASSERILLES, *paſſulæ*. On donne ce nom à des raiſins muſcats ſéchés au ſoleil : on en fait un grand commerce à Frontignan, à Damas, à Smyrne & en Candie. *Voyez* RAISIN.

PASSE-BUSE. C'eſt la *fauvette de haie*. Voyez FAUVETTE.

PASSEFLEUR. On donne ce nom à la COQUELOURDE DES JARDINS & à l'ŒILLET DE DIEU. *Voyez ces mots*.

PASSE-MUSC, petit animal, dont il eſt mention dans les *Tranſact. Philoſoph. n. 137* : ſes teſticules quoique long-temps gardés, & même deſſéchés juſqu'à devenir noirs, exhalent une odeur de muſc, qu'on préfere au muſc des boutiques.

PASSE-PIERRE ou PERCE-PIERRE, BACILE, CRISTE ou CRÊTE-MARINE, ou FENOUIL MARIN ou HERBE DE ST. PIERRE, en latin *crithmum*. Plante maritime ou eſpece de pourpier de mer, dont on diſtingue deux eſpeces, ſavoir, la grande & la petite. C'eſt preſque la ſeule différence qu'on y remarque : nous ne parlerons que de la petite *paſſe-pierre*. C'eſt une plante qui pouſſe des tiges longues d'environ un pied, rampantes pour l'ordinaire à terre : ſes feuilles ſont découpées, étroites, fermes, charnues, ſubdiviſées trois à trois, d'un vert brun, & d'un goût ſalé : ſes fleurs ſont jaunes, mais dans la grande eſpece elles ſont blanches, toutes deux en ombelles, & diſpoſées en roſe. Sa graine reſſemble à celle du fenouil, elle eſt ſeulement plus grande. Le goût en eſt agréable, piquant & aromatique. Cette plante, qui croît naturellement dans les lieux maritimes & pierreux, meurt tous les ans au commencement de l'hiver, & renaît vers la fin de Juin ou le commencement de Juillet ; on la nomme *paſſe-pierre*, parce qu'elle ſort d'entre les fentes des pierres : on l'éleve cependant dans les jardins, le long des murailles. La cueillette de la *perce-pierre* eſt permiſe à tout

le monde ; néanmoins il n'y a guere que les femmes, les filles & les enfants des riverains qui en font la récolte : ceux-ci la portent par sacs & paniers dans les villes voisines, où ils la vendent pour être salée & servir aux salades d'hiver. Il faut la saler avec un vinaigre foible & un peu de sel. Lorsqu'elle a resté environ un mois dans cette premiere saumure, on la transvase, soit dans des barils ou des pots de terre, où l'on met de nouveau vinaigre plus fort. On prétend que le vinaigre blanc de la Rochelle est celui qui y convient le mieux. L'on ajoute au sel du gros poivre, quelquefois aussi des clous de girofle, quelques feuilles de laurier, & même un peu d'écorce de citron. On a observé que la *crête-marine* qui croît sur les bancs de terre que la mer couvre journellement, est la plus tendre & la meilleure ; celle qui vient au bord des marais & que l'eau de la mer mouille plus rarement, est seche & dure. Il n'en croît pas sur les sables purs : il y a des endroits où l'on ne confit que les feuilles de la passe-pierre, & on les mêle avec les cornichons dont il est parlé à l'article *concombre*. Voyez ce mot. Les feuilles de la passe-pierre sont estimées apéritives, lithontriptiques & propres à réveiller l'appétit.

PASSE-RAGE ou CHASSE-RAGE VULGAIRE, *lepidium vulgare*, est une plante qui croît abondamment aux lieux ombrageux, dans les pierrailles, les masures & près des jardins où on la cultive. On la trouve aussi sur les Alpes. Sa racine est grosse comme le doigt, blanchâtre, rampante sous terre & d'une saveur fort âcre : elle pousse plusieurs tiges, hautes de trois pieds, rondes, moelleuses & rameuses, couvertes d'une poussiere d'un vert de mer, qui s'emporte aisément : ses feuilles sont alternes, & ressemblent à celles du citronnier ; elles sont dentelées en leurs bords : on trouve ses fleurs au sommet des tiges & des rameaux, elles sont petites, en croix, & blanches : elles sont suivies par de petits fruits, formés en fer de lance, qui se divisent en deux loges, remplies de menues semences, oblongues & rousses.

Toute la plante est d'une saveur âcre, aromatique, qui approche de celle du poivre & de la moutarde : c'est

un bon antiscorbutique : si on mange ses feuilles à jeûn elles excitent l'appétit. *Simon Pauli* dit qu'en Danemarck les Cuisiniers mêlent avec le vinaigre le suc que l'on a exprimé de la passe-rage, pour en faire des sauces aux viandes rôties.

PASSE-RAGE SAUVAGE. *Voyez* CRESSON SAUVAGE *ou* DES PRÉS.

PASSEREAU, *passer*. C'est le nom donné aux différentes especes de moineaux. *Voyez ce mot & celui de* ROITELET.

PASSE-ROSE. *Voyez* MAUVE DES JARDINS *ou* ROSE TREMIERE *à l'article* MAUVE. Quelques-uns donnent aussi le nom de *passe-rose* à la passe-fleur, dite *œillet de Dieu*. Voyez ce mot.

PASSE-VELOURS. *Voyez* AMARANTHE.

PASTÉ. C'est le coq des jardins. *Voyez ce mot.*

PASTEL, GUESDE, *glastum seu isatis sativa, vel latifolia*, Plante que l'on cultive dans nos Provinces méridionales, en Provence & en Languedoc, pour l'usage de la teinture : on s'en sert pour teindre en bleu. On la cultive aussi en Normandie, & on dit qu'elle réussit en Allemagne ; mais le pastel de Languedoc est le plus estimé.

Cette plante pousse des tiges hautes de trois pieds, grosses comme le doigt ; elles se divisent par le haut en quantité de rameaux chargés de beaucoup de feuilles, rangées sans ordre. Ses feuilles sont lisses & d'un vert bleuâtre. Ses rameaux sont chargés de fleurs formées de quatre pétales jaunes, disposées en croix ; le pistil devient une capsule aplatie sur les bords : chaque capsule contient deux semences oblongues. La racine de cette plante est grosse, ligneuse & pénetre profondément en terre.

Le pastel demande à être semé dans une bonne terre, légere, noire, douce & fertile. Après avoir donné à la terre les façons nécessaires, on seme la graine en Avril : lorsque la plante commence à grandir, on arrache les mauvaises herbes, sans quoi les feuilles de pastel ne deviendroient point belles. On fait ordinairement deux récoltes de feuilles de pastel dans la même année ; quand la saison a été favorable, on en fait jusqu'à quatre : la

premiere se fait vers la fin d'Août, & la derniere vers la fin d'Octobre ; mais il faut avoir attention de faire cette derniere récolte avant les premieres gelées, autrement les feuilles qu'on recueilleroit ne vaudroient rien. Lorsque la plante est venue à sa maturité, on coupe toutes les feuilles, on les met en tas pour qu'elles se flétrissent, ayant soin de les tenir à l'abri du soleil & de la pluie ; ensuite on les broie sous la meule d'un moulin jusqu'à ce qu'elles soient réduites en pâte, puis on fait des piles de cette pâte au dehors du moulin : on presse bien la pâte avec les pieds & les mains ; on la bat & on l'unit, de peur qu'elle ne s'évente : quinze jours après l'on ouvre les petits morceaux, on les broie de nouveau avec les mains ; & l'on mêle avec le dedans la croûte qui s'étoit formée dessus, puis on fait de cette pâte de petites pelotes. Cette opération s'appelle *mettre en coque*, c'est à-dire qu'on les met dans de petits moules de figure ovale ; on les fait sécher de nouveau ; ces coques deviennent fort dures, & c'est en cet état qu'on les vend aux Marchands sous les noms de *pastel*, *cocagne*, *florée* & *vouëde*. Quand on veut en faire ce que les Teinturiers appellent la *cuve*, il faut les mettre long-temps tremper dans de l'eau.

Le pastel ainsi préparé fournit une excellente teinture bleue, très-solide, & dont on peut varier les nuances. Les anciens Bretons s'en servoient pour se colorer le corps. On emploie à présent beaucoup plus d'indigo que de pastel pour la teinture bleue, parce que la premiere de ces drogues fournit beaucoup plus de couleur, & qu'elle est plus facile à traiter que la seconde.

On a grand soin de recueillir de bonne graine de pastel, pour resemer l'année d'après. Outre les premiers froids, les mauvaises herbes, la sécheresse qui causent beaucoup de dommage aux champs de pastel, il arrive quelquefois que les sauterelles dévorent tout un champ dans une soirée ; quand ce cas arrive, il faut promptement couper toutes les feuilles, pour que les pieds en repoussent de nouvelles.

On ne doit point mettre de pastel dans le même champ l'année d'après, mais on pourra y mettre de

blé, l'année suivante du millet, & la troisieme année du pastel, dans la supposition que la terre ait été bien fumée. On donne particulérement le nom de *vouëde* au pastel petit & sauvage de Normandie. *Voyez* VOUEDE. M. *Marcgraff* vient de faire mention d'un ver qu'on trouve dans le *vouëde* lorsque cette plante est pilée, & qu'elle tombe en putréfaction. Ce ver dans son premier état a environ deux lignes de long; il se nourrit de la matiere de la plante, & en prend la couleur qui est bleue: dans l'état de nymphe il devient brun, & il se métamorphose en une mouche dont le corps est fort long.

PASTEL D'ÉCARLATE. *Voyez au mot* KERMÈS.

PASTEL ou FLORÉE D'INDE. *Voyez ci-dessus* PASTEL-GUESDE.

PASTENADE. *Voyez* PANAIS.

PASTENAQUE ou TARERONDE, *pastinax ou pastinaca*, poisson de mer dont on distingue trois especes qui sont de la classe des poissons à nageoires cartilagineuses: ce sont des especes de raies.

La premiere a une queue qui ressemble par sa couleur & sa rondeur à la racine nommée *pastenade*. Ses nageoires sont étendues comme les ailes de la tourterelle. Ce poisson plat & cartilagineux a la peau lisse: il n'a qu'un aiguillon long, pointu, dentelé comme une scie de côté & d'autre, & placé à la queue, qui est longue & flexible & va toujours en diminuant. Cet aiguillon est venimeux, même après la mort de l'animal. Ce poisson a le bec pointu, les yeux au-dessus de la bouche; & au-dessous, des trous, au lieu de narines, & d'autres trous devant les ouies: sa bouche, quoique petite & sans dents, ne laisse pas que d'être large en dedans. Ses mâchoires sont dures & rudes: il nage à plat; il n'a qu'une petite nageoire à la queue; il vit dans les lieux fangeux & peu éloignés des rivages, & se nourrit de poissons.

La pastenaque a pour ennemi le chien de mer. Les Pêcheurs du Languedoc mangent la chair qui est autour de la queue de ce poisson, quoique d'une saveur peu agréable; mais ils ont soin auparavant d'en ôter l'aiguillon. On prétend que cet aiguillon, réduit en

cendre, appliqué sur la plaie avec du vinaigre, est un remede à son venin même.

La seconde espece de pastenaque est celle que l'on nomme à Naples *altavela* (*altavelle*). Elle a la tête & toutes les autres parties plus petites que la précédente. Sa couleur est la même : sa queue n'est pas si longue que la moitié de son corps ; elle est aussi armée d'un aiguillon & quelquefois de deux, garnis de dents crochues : sa chair n'est pas désagréable.

La troisieme espece que l'on nomme aussi *aigle poisson*, *aquila marina*, & qui porte en Languedoc le nom de *glorieuse*, est en tout semblable à la premiere espece par sa maniere de vivre, par son aiguillon qui est venimeux, &c. Elle a cependant la tête plus grande, le bec moins pointu, rond, court, semblable à la tête d'un crapaud. Ses yeux sont grands, ronds & élevés : ses nageoires sont semblables aux ailes d'une chauve-souris. Ce poisson pique de son aiguillon les poissons qui nagent autour de lui : sa chair est molle, humide & de mauvais goût : on le pêche dans la Méditerranée ; il est très-commun à Naples. C'est le *rospo* des Génois.

Redi a observé que la chair de ce poisson *pastenaque* devient lumineuse lorsqu'elle commence à se corrompre, ainsi que les graisses, les chairs, les os huileux de l'hirondelle de mer, du dauphin, de la vipere marine, du brochet de mer. Il n'a jamais pu observer le même phénomene sur la chair des viperes & des serpens terrestres.

PASTEQUE. *Voyez* CITROUILLE & *le mot* MELON D'EAU.

PASTILLES D'ALLEMAGNE ou DU LEVANT, est le nom que l'on donne aux terres bolaires ou terres sigillées. *Voyez au mot* BOL.

PATACH est une espece d'algue d'une figure singuliere, laquelle croît abondamment aux environs des Châteaux des Dardanelles & sur les bords de la Mer Noire. Ses cendres entrent dans la composition du savon.

PATAGONS. Nom donné à des peuples d'une très-grande taille, qui habitent des îles vers le Pôle

Antarctique. Ce sont les géants de l'espece humaine : au contraire les Lapons qui habitent l'extrémité septentrionale de l'Europe, sont des pygmées par la petitesse de leur structure. Ainsi les Patagons & les Lapons paroissent les termes extrêmes de la race des hommes.

PATAGU ou PATAGAU. C'est une espece de *came* qui differe beaucoup de la *palourde* : voyez ce mot. Elle est moins grande, moins ronde, plus lisse, chargée de taches jaunes, blanches & noires. Les bords de sa coquille sont tapissés de deux membranes épaisses qui l'environnent. L'animal qui habite cette coquille n'a qu'une trompe qui est de différentes couleurs & d'environ quatre pouces de longueur. Cet organe prend toute sorte de mouvemens, & fournit à tous ses besoins, sans qu'elle puisse avancer ni reculer, mais seulement s'enfoncer dans la vase comme la palourde. Quoique cette trompe ne paroisse former qu'un tuyau, elle est cependant partagée en deux par une espece de cloison, & chaque tuyau a son trou particulier qui se voit à l'extrémité de la trompe. Le supérieur qui rejette l'eau à trois pieds de distance, est plus étroit que l'inférieur par où elle entre, & l'orifice des deux tuyaux est garni de deux petits poils blancs. Ainsi cette trompe sert à l'animal d'ancre contre le mouvement tumultueux des flots, de bras pour prendre sa nourriture, de bouche & d'estomac pour l'avaler & la digérer.

PATAOUA. Palmier très-commun dans la grande Terre, plus fort que le *maripa*, mais soutenant moins ses feuilles. Le fruit en est plus petit & plus rond. On tire de ce fruit une huile qui n'a aucun mauvais goût, & qui est bonne pour être mangée en salade : on la tire comme celle de l'*aouara*. Voyez au mot PALMIER AOUARA.

Les Negres marons subsistent en partie avec l'amande de ce palmier, qui est assez agréable lorsqu'on l'a fait passer au feu.

PATAS est le nom que les Negres du Royaume de Galam dans le pays de Bambouc, donnent à une espece de singes, d'un roux si ardent, qu'ils semblent être peints par l'art, en cette couleur : ils sont gros &

peu ingambes ou pesants ; mais leur génie est malin, hardi, moqueur & querelleur. Le P. *Labat* dit qu'à l'approche d'un vaisseau sur la côte, ils descendent du haut d'un arbre, tous à la file les uns des autres ; & que quand ils en ont examiné les hommes, ils se mettent à les huer, ou à leur faire des grimaces accompagnées de gambades, de gestes & de postures très-plaisantes : non contents de cette insulte, ils leur jettent au visage des morceaux de bois sec, ou des pierres qu'ils vont ramasser à terre, ou enfin leurs ordures, qu'ils font exprès dans leurs pattes : ils ne refusent pas même de se battre en duel, c'est-à-dire, contre autant de personnes qu'ils font de singes. Il n'y a gueres que les coups de fusils qui leur fassent sentir que la partie n'est pas égale. C'est ainsi qu'on les punit de leur témérité.

PATATTE ou PAPAS : *voyez* BATATTE.

PATELLE, *voyez* LÉPAS. On donne le nom de *patellites* ou de *lépadites* aux lépas fossiles.

PATIENCE, *lapathum.* On donne ce nom à plusieurs especes de plantes, dont nous rapporterons les plus usitées.

Les fleurs des plantes de ce genre ont, dit M. *Deleuze*, six étamines & trois pistils, un calice à trois feuilles & une corolle à trois pétales, qui s'agrandit & sert d'enveloppe à la graine qui est une semence lisse, pointue & à trois coins.

1°. La PATIENCE des jardins ou PARELLE, *patientia aut lapathum hortense, folio oblongo.* Cette plante que l'on cultive dans les jardins, a une racine droite, longue, fibreuse, jaune en dedans : elle pousse une tige noueuse, haute de quatre pieds & demi ; ses feuilles sont oblongues ; ses fleurs sont placées le long des rameaux & par anneaux. Sa graine est triangulaire ; elle est astringente & apéritive.

2°. LA PATIENCE AQUATIQUE ou PARELLE DES MARAIS, *hydro-lapathum.* Elle vient communément dans les lieux aquatiques, dans les marais & les fossés humides. Sa racine est très-fibreuse, noire en dehors, d'un jaune de buis en dedans, fort astringente & amere. Ses fleurs & ses graines ressemblent à celles de la

la patience sauvage ordinaire. Ses feuilles sont semblables à celles de la rhubarbe des Moines : elles sont légérement crépues à leur bord.

Cette sorte de patience est, selon *Muntingius*, la véritable *plante britannique* des Anciens : son suc est spécialement utile pour les ulceres qui rongent la bouche & les amygdales. Sa racine, de même que celle des autres patiences, amollit, lâche le ventre & purifie le sang. L'usage de cette racine est en tisane ; on en fait des cures de printems pour les maladies d'obstructions, celles de la peau, comme dartres, gale : elle convient dans la goutte & dans les maladies chroniques rebelles, même pour le scorbut ; elle arrête toutes les especes de flux ; enfin elle est très-utile pour les maux de gorge & le relâchement de la luette. M. *Bourgeois* a cependant observé qu'elle détruit & relâche les fibres de l'estomac, lorsqu'on en fait un long usage, & qu'il seroit utile d'y joindre quelque stomachique, comme la racine d'aunée qui est d'ailleurs très-bonne dans tous les cas où la racine de patience convient, & qui est un très-bon stomachique.

3°. La grande PATIENCE DES JARDINS, ou RHUBARBE DES MOINES, ou RHAPONTIC DES MONTAGNES, *rhabarbarum Monachorum*. On la cultive dans les jardins ; mais elle croit aussi dans les montagnes, notamment en Auvergne. Sa racine est garnie de plusieurs fibres : elle a intérieurement la couleur & presque les mêmes principes que la rhubarbe bâtarde, dont elle a aussi les vertus, principalement pour les diarrhées. Sa tige est rougeâtre, cannelée, fort rameuse & haute. Ses feuilles, qui sont portées sur de longues queues rougeâtres, sont longues de plus d'un pied, pointues, fermes, peu dures, mais roides, & d'un vert foncé : ses bords sont quelquefois repliés en dessus. Ses graines sont anguleuses, & ressemblent à celles de l'oseille. Cette plante est de l'espece du *rheum* ou rhubarbe, & a neuf étamines.

4°. La PATIENCE ROUGE ou SANG DE DRAGON, *lapathum sanguineum*, *aut folio acuto rubente*. On la cultive dans les jardins pour servir d'herbe potagere :

c'eſt la *bette ſauvage* de Galien. On la diſtingue facilement de toutes les eſpeces de patience, par ſon ſuc rouge, & par les nervures qui s'étendent & s'entrelacent dans les feuilles, & qui ſont de couleur de ſang, de même que les queues des feuilles; ce ſuc teint les mains & le chamois, d'abord de couleur purpurine, qui dégénere bientôt en une couleur bleue. Quelques-uns mangent ſes feuilles dans le potage: elles ſont laxatives & rafraîchiſſantes. Sa graine, qu'on appelle improprement *graine de ſang de dragon*, eſt aſtringente & anodine. Horace a célébré cette plante dans ſes *louanges de la vie ruſtique*.

5°. La PATIENCE SAUVAGE, *lapathum acutum*. On en diſtingue de trois ſortes; ſavoir, 1°. celles dont les feuilles ſont arrondies. Sa racine eſt plongée profondément en terre; ſes feuilles ſont larges d'une palme, & deux fois plus longues, ſinuées, comme crenelées, garnies de nervures, & d'un vert pâle. Ses tiges ſont hautes de deux pieds & moelleuſes. Ses fleurs ſont en épis, verticillées, & leurs graines ſont brunâtres & triangulaires: on trouve cette patience dans les environs de Paris, près de Montmorency. 2°. Celle qui eſt friſée, ne differe de la précédente que par ſes feuilles qui ſont crépues, plus petites, mais plus alongées; ſes fleurs ſont auſſi plus nombreuſes. 3°. La patience ſauvage ordinaire. Ses feuilles ſont plus courtes que celles de la précédente; ſes tiges ſont quelquefois tortueuſes; les anneaux des fleurs plus écartés, plus petits; ſes graines moins groſſes. On la cultive dans les jardins, & on la ſubſtitue ſouvent à la patience ſauvage friſée: on s'en ſert dans toutes les maladies qui viennent d'obſtruction. M. *Hellot* recommande l'emploi des racines de la patience ſauvage pour teindre en jaune.

6°. La PATIENCE VIOLON, *lapathum ſinuatum*. Sa racine eſt épaiſſe; ſes feuilles ſont nombreuſes, longues de deux pouces, & moitié moins larges, échancrées vers le milieu, & obtuſes aux deux bouts; de ſorte qu'elles ont la figure d'une table de violon. Les Provençaux cultivent cette patience parmi leurs plantes potageres, & en mangent pendant l'hiver. M. *Haller*

dit que les feuilles de cette plante deviennent très-dures en été.

L'oseille, le bon henri, les épinards, plantes dont nous avons parlé en leur lieu, sont regardés aussi, par la plûpart des Botanistes, comme des especes de patiences.

PATTE-DE-LION, *leontopodium*, est une plante qui croît sur le sommet des Alpes, & dont les feuilles sont oblongues & cotonneuses; ses tiges sont simples, hautes de quatre pouces; ses fleurs sont en rose. Il sort de leur centre quatre à six têtes noirâtres & écailleuses, qui renferment chacune plusieurs fleurons soutenus par des graines menues & aigretées: cette plante est desficative & astringente.

PATTE ÉTENDUE. *Voyez à l'art.* CHENILLE A BROSSES.

PATTE-D'OIE, *pes anserinus*, est une espece d'arroche sauvage à larges feuilles, *chenopodium stramonii folio*. Elle croît le long des vieilles murailles, sur les chemins & aux lieux incultes. Sa racine est ligneuse & fibreuse; elle pousse une tige haute d'un pied & demi; elle est assez grosse, rameuse; ses feuilles sont sinueuses, vertes brunâtres, luisantes & d'une odeur forte: elles ont une ressemblance grossiere avec la patte de l'oie. Ses fleurs naissent en grappes ou épis; elles sont suivies par de menues graines arrondies, & contenues dans une capsule comme étoilée, qui a servi de calice à la fleur. On prétend que cette plante seroit un poison, si on la prenoit intérieurement, & qu'elle fait mourir les cochons qui en mangent.

PATURAGE. *Voyez* PACAGE & PRAIRIE.

PATURE DE CHAMEAU, ou JONC ODORANT. *Voyez* SCHŒNANTE.

PAU, espece de léopard de Tartarie. Sa peau est blanchâtre, tachetée de rouge & de noir. Il a la tête & les yeux semblables à ceux du tigre, mais il est moins gros que cet animal, & son cri est différent.

PAVAME, est un assez bel arbre de l'Amérique. On l'appelle bois de cannelle, à cause de sa bonne odeur. On prétend que c'est le même que le *sassafras*: voyez *ce mot*.

PAVANE, *pavana*, est le bois du *pignon d'Inde*: voyez *ce mot à la fin de l'article* RICIN.

PAVATE, est un arbrisseau des Indes, haut de neuf pieds ou environ, peu rameux, grisâtre, portant quelques feuilles semblables aux petites feuilles de l'oranger. Ses feuilles sont sans queue, & d'une belle couleur verte; sa fleur est fort petite, blanche, de l'odeur du chevrefeuille: elle est, selon M. *Linnæus*, monopétale, en entonnoir, dont le pavillon est découpé en quatre quartiers, & contient quatre étamines & un pistil. Le germe placé sous la fleur, devient une baie monosperme: sa semence est grosse comme celle du lentisque, & noirâtre: sa racine est blanche & un peu amere. *Lémery* dit que cet arbrisseau croît le long des rivieres appellées *Mangate* & *Cranganor*. Les Indiens se servent du bois & de la racine du *pavate*, principalement pour guérir les éry sipeles. On en mêle la poudre dans une décoction de riz, on la laisse aigrir, puis on en fomente l'éry sipele. On en boit aussi pour guérir les fievres ardentes, le flux de ventre & les inflammations du foie.

PAVÉ, *lithostratum aut pavimentum*, est le nom vulgaire que l'on donne à la pierre sur laquelle on marche dans les rues. Le pavé varie pour la forme & la nature: à Paris c'est un grès que l'on taille en cubes; à Lyon, ce sont des cailloux roulés que l'on ramasse dans le Rhône, &c. Enfin l'on pave les villes & les grands chemins selon l'espece de pierre dure du pays. C'est ainsi que dans une partie de la France l'on ne se sert que de *granite*. A Shluysen en Zélande, le pavé est une espece de faux basalte, &c. à l'égard du *pavé des Géants*, voyez BASALTE.

PAVERACCIA. L'Auteur du Dictionnaire des Animaux dit que ce nom se donne aujourd'hui à Rimini, à Ravenne & à Ancône, à la premiere espece de *came*, coquillage bivalve que M. *Adanson* nomme *cloniſſe*, d'après *Belon* & *Rondelet*, & qui est le *piverone* des Vénitiens, l'*arſelle* des Génois, l'*armilla* des Espagnols, & le *boukch* des Sénégalois: *voyez* CLONISSE.

PAVIE. Espece de *pêche*. Voyez ce mot.

PAVILLON D'ORANGE. Coquille univalve du genre des *buccins à bouche échancrée dépourvue de queue*, suivant M. *de l'Isle*, & du genre des *cornets* suivant d'autres Naturalistes. Ce testacée rare est rayé par zones alternatives de blanc & d'orangé; sa tête est assez élevée, sa clavicule est blanche & finit en bouton.

PAVOIS ou BOUCLIER. *Voyez à l'art.* OURSIN.

PAVONITE. M. *Guettard* donne ce nom à des polypiers fossiles, dont le caractere générique est d'être composé depuis l'attache jusqu'à l'autre extrémité de couches de plus en plus grandes, comme ondées ou sans ondulations.

PAVOT, *papaver*. Genre de plante à fleur en rose, & dont M. *de Tournefort* compte quarante-quatre especes: nous en décrirons seulement cinq, le *blanc*, le *rouge*, le *noir*, le *jaune*, ensuite l'*épineux*.

PAVOT BLANC, *papaver hortense, semine albo, sativum*, est la plante qui donne l'*opium*. Sa racine est de la grosseur du petit doigt, empreinte comme le reste de la plante, d'un suc laiteux & amer. Elle pousse une tige haute de trois à quatre pieds, rameuse, garnie de feuilles oblongues, larges, dentelées, crêpées, d'un vert de mer très-tendre. Ses fleurs qui naissent en Juin aux sommités, sont en rose, composées le plus souvent de quatre pétales blancs, placés en rond: elles tombent promptement. Le calice est composé de deux feuilles; il en sort une petite tête entourée d'abord d'un grand nombre d'étamines, laquelle se change ensuite en une coque ovoïde, qui n'a qu'une seule loge, couronnée d'un chapiteau étoilé, elle est verdâtre d'abord, puis elle blanchit à mesure qu'elle mûrit; elle est de la grosseur d'une orange & garnie intérieurement de plusieurs lames minces, longitudinales, qui tiennent tout autour à ses parois. A ces lames est attaché un grand nombre de très-petites graines arrondies, blanches, d'un goût doux, huileux & farineux.

Cette graine est adoucissante, pectorale, & peu ou point somnifere. On tire par l'expression de cette semence une huile qui est propre à décrasser, à polir &

à adoucir la peau. Toute la plante eſt pleine d'un lait amer, dont l'odeur eſt fort déſagréable & mal-ſaine.

M. *de Tournefort*, qui a voyagé dans le Levant, dit que dans pluſieurs provinces d'Aſie, on ſeme les champs de pavots blancs comme nous ſemons le froment. Auſſi-tôt que les têtes paroiſſent, on y fait une légere inciſion & il en découle quelques gouttes de liqueur laiteuſe, qu'on laiſſe figer & que l'on recueille enſuite. Ce Naturaliſte rapporte auſſi que la plus grande quantité de l'*opium* ſe tire par la contuſion & l'expreſſion de ces mêmes têtes. *Belon* & *Kempfer* qui diſtinguent trois ſortes d'*opium* tirées ſeulement par l'inciſion, diſent que dans la Perſe on fait des plaies en ſautoir à la ſuperficie des têtes qui ſont près d'être mûres. Le couteau qui ſert à cette opération a cinq pointes, & d'un ſeul coup il fait cinq ouvertures longues, paralleles. Le lendemain on recueille avec des ſpatules le ſuc qui découle de ces petites plaies, & on le renferme dans un petit vaſe attaché à la ceinture; enſuite on fait la même opération de l'autre côté des têtes. La larme qui découle la premiere s'appelle *gobaar*, c'eſt la plus chere, elle paſſe pour la plus convenable à calmer le cerveau. Sa couleur eſt d'abord d'un jaune pâle, enſuite rouſſâtre. Après que l'on a ainſi recueilli l'*opium*, on lui donne une préparation en l'humectant avec un peu d'eau ou de miel. On remue long-temps ce mélange dans une aſſiette de bois plate avec une forte ſpatule juſqu'à ce qu'il ait acquis la conſiſtance de la poix; on manie enſuite cet *opium*, & l'on en fait de petites boules cylindriques que l'on met en vente dans le pays. Lorſque les Marchands n'en veulent que de petits morceaux, on le coupe avec des ciſeaux. Les Perſes appellent cet opium *theriaak malideh*, ou *afiuum*, c'eſt-à-dire, *thériaque opiée;* par-là ils la diſtinguent de la thériaque d'Andromaque, qu'ils appellent *theriaak faruuck*. Ces peuples regardent l'*opium* comme un remede qui procure la tranquillité, la joie & la ſérénité; éloge dont on honoroit autrefois l'antidote d'Andromaque.

Cette maniere de préparer l'*opium* eſt le travail perpétuel des revendeurs mercénaires qui ſont dans les

carrefours. Mais ce n'eſt pas là la ſeule maniere de préparer le ſuc de pavot : ſouvent on le charge d'une ſi grande quantité de miel pour tempérer ſon amertume, qu'on l'empêche de ſe ſécher, & c'eſt ce que l'on appelle ſpécialement *bæhrs*. L'opération la plus remarquable ſur l'*opium*, eſt celle qui ſe fait en mêlant exactement avec ce ſuc, de la muſcade, du cardamome, du ſafran, de la cannelle & du macis, réduits en poudre fine : c'eſt ce que l'on appelle *polonia* ou *philonium* de Perſe. Outre ces préparations, dont on ne fait uſage qu'en pilules, les Perſes font une liqueur d'*opium* fort célebre ſous le nom de *coconar*, & dont ils boivent en abondance par intervalles ; mais nous ne voyons guere ces ſortes d'*opium*.

L'*opium* ou *meconium* des boutiques eſt une ſubſtance réſino-gommeuſe, compacte, dure, d'un roux noirâtre, d'une odeur narcotique déſagréable, d'un goût amer, âcre, formée en gâteaux arrondis, aplatis, gros comme le poing, & enveloppés dans des feuilles de pavots. On nous envoie ce ſuc concret de la Natolie, de l'Egypte & des Indes. Les Médecins ont toujours fort célébré l'*opium de Thebes*, que l'on recueilloit en Egypte près de Thebes ; mais au reſte, de quelque endroit que vienne l'*opium*, pourvu qu'il ſoit de bonne qualité, l'origine en eſt aſſez indifférente. Il eſt formé en partie par le ſuc qui découle naturellement de l'inciſion faite aux têtes des pavots blancs, & en partie de celui que l'on tire par expreſſion ou par décoction, tant des têtes que des feuilles de pavot : on n'en trouve aucune autre eſpece chez les Turcs & à Conſtantinople, excepté celui qui découle à l'aide d'une ſimple inciſion. Les peuples en font une grande conſommation, parce qu'il leur cauſe une agréable ivreſſe. L'*opium* tiré par la ſeule expreſſion du pavot blanc, s'épaiſſit en un extrait réſineux qu'on appelle auſſi *gomme extractive*. On en fait des préparations avec différentes drogues que l'on y mêle pour fortifier & récréer les eſprits ; c'eſt pourquoi on en trouve différentes deſcriptions. La principale & la plus célebre eſt celle dont on eſt redevable à *Has-Jem-Beji*, (ce nom, ſelon M. *Haller*, paroît être celui de la dignité d'un

premier Médecin,) puiſque l'on dit qu'elle excite une joie ſurprenante dans l'eſprit de celui qui en avale, & qu'elle charme le cerveau par des idées & des plaiſirs enchantés. Seroit-ce dans cette eſpérance que quelques perſonnes mangent à leur deſſert les têtes de pavot les plus tendres & confites dans du vinaigre ? *Sylvius Deleboë*, Médecin, diſoit qu'il ne voudroit pas exercer ſon art ſi on lui ôtoit l'*opium*; on l'appeloit *Doctor opiatus*, le Docteur de l'*opium*. *Sydenham* n'y avoit pas moins de confiance.

Tout le monde ne donne pas tant d'éloges à l'*opium*. Combien de perſonnes ont éprouvé en avalant quelques grains de ce ſuc concret, qu'il appeſantit la tête, excite un ſommeil lourd & forcé, affoiblit la vue & l'organe de l'ouie, & cauſe une longue léthargie qui ſe termine par la mort ! Le paſſage en eſt ſi peu ſenſible, que l'on paroît toujours dormir très-tranquillement. C'eſt donc un ſomnifere dangereux, dont on ne doit ſe ſervir qu'avec prudence. Cependant lorſqu'un Médecin éclairé connoît bien la nature & les effets que produit l'*opium* dans les maladies, pourquoi ne s'en ſerviroit-il pas dans des cas particuliers, où ce ſuc peut faire le triomphe de ſon art ? Il eſt par exemple difficile, dit M. *Haller*, de guérir les dyſſenteries ſans *opium*. Mais examinons plus particuliérement l'effet de cette ſubſtance employée tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

L'*opium* appliqué extérieurement amollit, réſout & procure la ſuppuration. Appliqué très-long-temps ſur la peau, il en fait tomber les poils : lorſqu'on en met ſur le périnée, il réveille les ſens & excite quelquefois à l'amour ; d'autres fois il éteint cette paſſion en engourdiſſant le ſentiment dans l'organe de la génération. Quand on le met en trop grande doſe ſur les ſutures de la tête pour appaiſer les douleurs, il relâche les nerfs, il cauſe la ſtupeur & la paralyſie, & quelquefois la mort.

L'*opium* produit des effets admirables ſur-tout aux perſonnes qui ſont habituées à en faire uſage. Un grain pris intérieurement en ſubſtance ſelon l'âge & la force agit bientôt : il excite dans les entrailles une certaine

sensation agréable ; dissipe, ainsi que le vin, l'inquiétude & la tristesse, calme les maladies, soulage le corps accablé de lassitude, il donne de la vigueur à l'esprit des gens en santé. Aussi les Turcs en prennent-ils hardiment une grande dose (un gros) pour se préparer au combat ; ils prétendent qu'il leur donne du courage, de la confiance, de l'audace, enfin il leur inspire le mépris des dangers.

L'*opium* a plus d'effet dans les temps chauds & humides & dans les corps mollasses, comme dans les femmes & les enfans ; il excite les sueurs, augmente le lait des nourrices, cause le gonflement des mamelles, le priapisme, les songes amoureux accompagnés de pollution, il endort nos déplaisirs dans une douce ivresse. C'est ainsi qu'agit le plus communément ce suc narcotique, étant pris à dose convenable & dans des circonstances nécessaires ; car si l'on en prend trop, sur-tout après de grandes hémorrhagies, il rend d'abord de bonne humeur, ensuite il fait bégayer, donne le hoquet & excite graduellement l'anxiété, le vomissement, les syncopes, l'aliénation de l'esprit, les vertiges, le ris sardonique, la stupidité, la rougeur au visage, le gonflement des levres, la difficulté de respirer, la fureur, les sueurs froides, la défaillance, enfin un profond sommeil, & souvent la mort. Ceux que ces accidens ne font pas périr, sont délivrés le plus souvent par un abondant flux de ventre, ou par des sueurs copieuses qui ont l'odeur de l'*opium*, qui sont accompagnées d'une grande démangeaison de la peau. La moindre chose qui arrive à ceux qui font un usage trop continué & en doses trop fortes de l'*opium*, c'est la fainéantise, l'engourdissement du corps, une sorte d'ivresse habituelle, des dégoûts, différentes affections de nerfs, & une vieillesse prématurée.

Au reste les tempéramens varient suivant les climats. C'est ainsi que les Turcs éprouvent tous les fâcheux symptomes dont nous venons de parler, lorsqu'après un long usage de l'*opium* pris en forte dose, ils s'en abstiennent tout d'un coup. On croit que l'*opium* agit beaucoup sur le sang, parce que l'on a observé que le sang des Turcs & des Indiens qui sont tués dans les

combats après en avoir pris, eſt auſſi fluide un ou deux jours après leur mort, que s'ils ne venoient que de mourir. Les remedes qu'on fait à ceux qui ont trop pris d'*opium* & qui ont encore des forces, conſiſtent dans la ſaignée & les émétiques, enſuite il faut donner des ſucs acides, afin de réprimer la trop grande fluidité du ſang: on injecte des lavemens âcres, & l'on ſouffle dans les narines de forts ſternutatoires, afin de procurer une forte ſecouſſe ſur toutes les membranes nerveuſes. Les ſels volatils, les véſicatoires ſont encore très-utiles.

On trouve dans les pharmacopées différentes préparations d'*opium*, dans leſquelles il eſt ou purifié ou aſſocié avec pluſieurs autres médicamens qu'on a cru propres à corriger ſes mauvaiſes qualités. Mais M. *Tralles*, Docteur de Breſlau, qui a examiné la façon dont ce ſuc agit dans les mélanges, & le mécaniſme par lequel il produit les effets qu'on lui remarque dans le corps humain, eſt porté à conclure que la cauſe des effets de l'*opium* ne conſiſte que dans le principe volatil qui y eſt contenu. C'eſt ainſi qu'il attribue ſon effet immédiat ſur les nerfs, à la raréfaction qu'il cauſe dans le ſang: & lorſque le cas exige de l'*opium*, il faut le prendre pur & ſans correctif. On aſſure qu'il produit des effets merveilleux après les grandes veilles, dans les vomiſſemens énormes ou les déjections conſidérables, & dans les douleurs vives & longues. Quand les propriétés de l'*opium* ne ſeroient que paſſageres & palliatives, elles ſeroient toujours un grand bien au malade: c'eſt au Médecin ſavant & prudent à diſtinguer les cas où il convient d'adminiſtrer le médicament. D'après cet expoſé l'on doit ſentir le danger qu'il y a auſſi d'avaler des infuſions ou décoctions de têtes de pavot blanc en trop grande doſe, même de celui qu'on cultive dans nos climats, quoiqu'il n'ait pas une vertu auſſi ſomnifere que celui des pays plus chauds: le nôtre n'eſt en effet ni auſſi narcotique, ni auſſi amer: & M. *Bourgeois* eſtime qu'il a ſix fois moins de force. Mais ce qu'il y a de ſingulier, c'eſt que la graine de cette eſpece de pavot, qui ſeule eſt l'origine entiere de toute la plante, n'eſt pas ſomnifere, ſurtout dans ce pays: à la vérité il y a des nourrices qui

en mêlent quelquefois dans la bouillie de leurs enfans pour les endormir, mais elles ne leur procurent par ce moyen qu'une substance huileuse, nourrissante, qui en calmant leurs douleurs les laisse dans leur état naturel de l'enfance, c'est-à-dire dans le besoin de dormir. On faisoit autrefois du pain de la graine de pavot blanc & noir. *Mathiole* écrit que ceux qui habitent dans la vallée du Trentin, dans la Styrie & la haute Autriche, se nourrissent de gâteaux faits avec les graines de pavots blanc & noir, & avec de la farine. Il dit encore que nonobstant qu'ils usent de l'huile que l'on exprime de ces graines, cependant ils n'en dorment pas plus long-temps. C'est un usage très-commun en Pologne, que de manger à toute heure de ces mêmes graines. Les Romains avoient le même goût pour ce mets, comme il le paroît par les vers de *Virgile*. Les oliviers étant morts par le froid de 1709, on s'est servi ici d'huile tirée de deux sortes de pavots au lieu d'huile d'olives, sans qu'il en soit résulté rien de funeste : de plus *Tournefort* a remarqué qu'à Genes les Dames les plus nobles & les filles mangeoient beaucoup de graines de pavot couvertes de sucre, & qu'elles n'en étoient pas moins éveillées pour cela. En Perse, dit *Chardin*, les Boulangers en sement la graine sur le pain, parce qu'ils croient qu'elle provoque au sommeil qu'on prétend être salutaire en ce pays après le repas. L'huile de pavot est connue dans le Commerce sous le nom impropre d'*huile d'œillet ;* on s'en sert pour décrasser, polir & adoucir la peau : les Peintres en consomment une grande quantité. Cette huile est assez douce lorsqu'elle est récente, pour qu'on puisse la faire passer pour de l'huile d'olives commune. Pour éviter les tromperies qu'on pourroit faire à ce sujet, le Ministere avoit ci-devant ordonné que les Commis des barrieres de Paris verseroient une pinte d'essence de térébenthine dans chaque tonneau d'huile d'œillet, ou plutôt de pavot, qui entre dans cette ville. On fait beaucoup de cette huile à Strasbourg & en Flandres, dont on use dans les alimens : les pains qui restent après l'expression de cette huile, servent à nourrir les rossignols qu'on éleve en cage. M. l'Abbé *Rosier* enfin vient de démontrer dans son *Traité*

sur la culture de la navette, &c. que l'huile de pavot pure n'étoit ni somnifere, ni dangereuse: l'entrée & la vente en sont permises aujourd'hui.

Pavot cornu, Glaucium a fleur jaune, *papaver cornutum*, *luteum*. Cette plante dont on distingue plusieurs especes, croît aux lieux maritimes & sablonneux; on en trouve au bois de Boulogne près de Paris, devant le château de Madrid. Cette plante est plus commune en Angleterre & en Suisse qu'en France. Sa racine est grosse comme le doigt, longue, noirâtre, empreinte comme toute la plante d'un suc jaune, de mauvaise odeur & d'un goût amer; elle pousse des feuilles longues, larges, charnues, grasses, velues, découpées profondément, dentelées à leurs bords, comme crêpées, de couleur vert de mer; ces feuilles se couchent sur terre pendant l'hiver, & résistent au froid: sa tige ne s'éleve que la seconde année; elle est forte, dure, noueuse & rameuse, poussant de ses nœuds des feuilles plus petites que celles d'en-bas & moins découpées: ses fleurs sont grandes comme celles du pavot cultivé, composées chacune de quatre feuilles, disposées en roses & de couleur jaune, contenant plusieurs étamines & soutenues par un calice à deux feuilles. A ces fleurs succedent des especes de siliques longues de deux pouces, grêles, rudes au toucher & courbées, contenant des semences noires, à doubles rangs & rondes comme celles du pavot blanc. Si on seme cette graine dans les jardins en automne, elle vient au printems & fleurit en Juin & Juillet; ses gousses mûrissent en Août. Toute la plante est empreinte d'un suc jaune, & teint en jaune; elle est en même temps de mauvaise odeur, d'un goût amer.

En Portugal on fait boire à ceux qui sont sujets à la pierre un verre de vin blanc, dans lequel on a fait infuser des feuilles de cette plante. *Garidel* rapporte qu'en Provence les Payſans se servent de ses feuilles pilées pour déterger les ulceres qui succedent aux contusions & aux écorchures des bêtes de charge, notamment les enflures & engorgemens des jambes des chevaux, qui proviennent de foulures, quelque grosses & dures qu'elles soient; le suc de cette plante les gué-

rit infailliblement, pourvu que le mal ne soit pas trop invétéré. Cet Auteur dit qu'il a connu des personnes qui se sont bien trouvées d'en avoir appliqué de la même maniere sur des jambes ulcérées. Nous croyons qu'il est très-sage de ne point user intérieurement de cette plante, qui a paru fatale plus d'une fois en Angleterre. *Voyez Transf. Philos. n°. 242.*

Les deux autres especes de pavots cornus ont, l'un la fleur rouge & l'autre violette.

PAVOT NOIR CULTIVÉ OU DES JARDINS, *papaver hortense semine nigro.* Cette espece differe du pavot blanc en ce que sa fleur est rouge, tantôt simple, tantôt double & de différentes couleurs; en ce que sa tête ou coque est plus arrondie, & en ce que ses semences sont noirâtres: cette plante étant verte est, ainsi que sa fleur, empreinte d'un suc huileux, d'une odeur fétide: sa fleur orne beaucoup les jardins & les parterres, par ses agréables variétés: on la cultive aussi pour l'usage de la Médecine. Les sentimens sont assez partagés sur les propriétés de cette espece de pavot noir, cependant bien des Pharmaciens l'emploient avec le même succès que le blanc: c'est précisément de sa graine que l'on tire plus communément l'*huile d'œillet*, dont nous avons parlé; on s'en sert pour les lampes, pour les fritures, en un mot c'est l'huile d'olive du petit peuple dans les Provinces.

PAVOT ROUGE DES CHAMPS, ou PAVOT SAUVAGE, ou COQUELICOT, *papaver rhœas aut erraticum majus.* Sa racine, qui est moins grosse que celle des autres especes de pavots, est fibreuse & amere au goût: elle pousse plusieurs tiges à la hauteur d'un pied & demi; ses tiges sont rondes, fermes, hérissées de poils & rameuses: ses feuilles sont découpées çà & là, comme celles de la chicorée, velues, & d'un vert brun; ses fleurs sont composées de quatre feuilles larges, minces, d'un rouge couleur de feu très-éclatant; elles sont si peu adhérentes qu'elles tombent au moindre souffle: elles sont suivies de petites coques grosses comme des noisettes, oblongues, ressemblant assez à celles du pavot des jardins; renfermant dans plusieurs cellules de petites semences noirâtres.

Cette espece de pavot croît partout dans les champs, le long des chemins ; principalement parmi les lins, dont la belle fleur bleue fait un contraste très-agréable avec la fleur d'un rouge vif du coquelicot. On seme tous les pavots en automne ou au printems, afin qu'ils fleurissent durant tout l'été ; quand une fois il y en a eu de semé dans un jardin, on n'en manque plus, sur-tout du pavot noir, car il se seme de lui-même.

Dans le coquelicot, la fleur est la principale partie qu'on emploie en Médecine, elle est adoucissante & facilite l'expectoration dans le rhume & dans la toux seche : on l'emploie en infusion théiforme, en sirop, en conserve, en tisane pour la pleurésie. M. *Chomel* (dans son *Traité des plantes usuelles*) assure que c'est un sudorifique plus efficace que le sang de bouquetin même : la tête de ce pavot est légérement somnifere. M. Geoffroy *Mat. Med. Traduct. Franç. T. VIII. p. 17.* & l'*Hist. de l'Acad. des Sciences pour 1768*, rapportent les dangereux effets de sa semence mangée par les moutons.

Pavot épineux ou Argémone, *papaver spinosum*, *aut argemone Mexicana*. Plante dont la fleur est composée de cinq grands pétales arrondis, soutenus par un calice de trois feuilles concaves : le pistil qui est accompagné d'un grand nombre d'étamines, devient une capsule ovale, épineuse, & qui n'a qu'une loge relevée par cinq angles qui s'ouvrent par leur sommet. Chaque angle est garni d'un placenta étroit, auquel sont attachées des semences rondes & noires. La racine de l'argémone est fibreuse, & pousse une tige haute de six à huit pouces, rameuse, garnie de petites épines & remplie de moelle blanche : ses feuilles sont déchiquetées comme celles du pavot cornu, armées en leurs bords de pointes jaunâtres fort aiguës. Cette plante qui est le *chardon bénit des Américains*, est anodine & pectorale. On distingue aussi une espece d'argémone à fleur blanche : l'une & l'autre sont cultivées dans les jardins.

PAUXI. *Voyez* Pierre de Cayenne.

PAYCO. Plante du Pérou, fort âcre au goût, & assez semblable au plantain : on s'en sert dans l'Inde

Occidentale pour chaſſer les vents & pour guérir la néphrétique.

PEAU. Nom donné à l'enveloppe qui couvre ſuperficiellement la chair des animaux & la pulpe des fruits. Dans les animaux, & notamment chez l'homme, la peau, *pellis*, eſt le premier des tégumens : elle eſt compoſée de quatre parties, 1°. du *cuir* ou *derme* : cette partie intérieure de la peau eſt un tiſſu de nerfs & de tendons, mêlés avec les vaiſſeaux ſanguins & lymphatiques. 2°. Le *corps papillaire*, placé par deſſus le cuir ; c'eſt un compoſé d'éminences ou mamelons de différentes figures formées par l'extrémité des nerfs. Pour peu que l'on ſue, on connoîtra l'uſage de ces mamelons. 3°. Le *corps réticulaire* ou *muqueux* de *Malpighi* ; ce réſeau cutané paroît n'être que le deſſus de l'épiderme. 4°. L'*épiderme*, c'eſt la ſurpeau qui ſe reproduit continuellement ; c'eſt une membrane d'une grande fineſſe ; on la nomme auſſi *cuticule*. L'enſemble de la peau eſt un tiſſu très-fort, plus ou moins épais, & étendu par toute l'habitude du corps : elle eſt compoſée de fibres nerveuſes, tendineuſes, membraneuſes, d'arteres, de veines, tant ſanguines que lymphatiques, le tout entrelacé enſemble en tout ſens, & de maniere qu'elle prête de toute façon, & qu'elle peut s'étendre conſidérablement, même d'une maniere molle & élaſtique, comme on l'obſerve dans l'hydropiſie, les groſſeſſes, & qu'enſuite elle peut reprendre ſa premiere extenſion. La vue ſimple découvre ſur la peau un tiſſu cellulaire, garni dans certains endroits d'une ouatte graiſſeuſe qui fait l'embonpoint, & dont la juſte proportion contribue à la beauté de la peau & du ſujet même. L'Obſervateur armé du ſcalpel trouve ce tiſſu compoſé de lames très-fines, appliquées les unes contre les autres, & attachées par intervalles, de maniere qu'elles repréſentent un gâteau feuilleté. C'eſt dans les intervalles ou cellules de ce gâteau, que les extrémités artérielles dépoſent (dit M. *le Cat* dans ſon *Traité de la couleur de la peau humaine*) une huile qui, en ſe figeant, fait la *graiſſe* ; voyez ce mot. C'eſt auſſi dans ces mêmes cellules que les Bouchers font entrer l'air qu'ils ſont dans l'uſage de ſouffler ſous la

peau des bœufs, des moutons, &c. qu'ils préparent pour les cuisines.

La peau est sujette à recevoir les altérations causées par le tempérament & par le climat; l'on voit des personnes chez qui la peau est si fine, qu'on peut distinguer à travers le sang veineux & le sang artériel, ou ce qui revient au même, les veines & les arteres qui forment des traces bleues & rouges. Moins l'homme est exposé aux impressions de l'air ou à l'aspect d'un soleil brûlant, & plus sa peau est blanche: il suffit de voir la blancheur d'un Anglois, le roux d'un Chinois, le brun d'un Egyptien & le noir d'un Maure, pour juger combien la température du climat produit de différences dans la couleur de la peau. *Voyez aux articles* HOMME & NEGRE.

La peau est plus épaisse dans des endroits que dans d'autres: elle est très-épaisse au dos & à la plante des pieds; elle l'est moins à la paume des mains, très-mince au bas du ventre, extrêmement fine au bord des levres & aux parties de la génération. La peau qui a été pressée, foulée, endurcie par un exercice fréquent & violent, est pleine de durillons, c'est-à-dire de callosités saillantes. Les *durillons* viennent en plusieurs endroits du corps, sur-tout sous la plante des pieds, à la paume & aux doigts de la main; ce qui les distingue des *cors* qui naissent sur les doigts des pieds & entre les orteils. Cependant ces deux sortes d'excroissances sont de même nature, ont une même cause, & requierent les mêmes remedes: toutes deux ne sont autre chose que l'épaississement de divers feuillets de l'épiderme, & du tissu de la peau, étroitement unis les uns aux autres, mais dont les petits vaisseaux cutanés ont été détruits. Peu à peu ces callosités saillantes s'endurcissent comme de la corne; alors elles gênent beaucoup, parce qu'elles meurtrissent les chairs voisines par leur compression répétée. Le remede est de ramollir ces tubercules & de les couper. La peau ou l'épiderme de la peau, qui est autour de la racine des ongles, se détachant en petits lambeaux, notamment chez les adultes, forme ce qu'on appelle communément des *envies*.

La

La peau est percée de deux manieres différentes: les premieres ouvertures naturelles & qui sont sensibles, sont celles du nez, de la bouche, des oreilles, des yeux, de l'anus, &c. cependant il semble qu'il n'y a point de vrais trous, puisque nous observons que la peau ne perd point sa continuité, c'est-à-dire qu'étant parvenue à ces endroits, elle se confond avec la membrane sensible de ces cavités, en devenant, à mesure qu'elle en approche, d'une extrême finesse.

Les autres ouvertures, quoiqu'insensibles, sont de plusieurs especes; les unes donnent passage aux tuyaux excréteurs des glandes, qui répandent sur la surface de la peau l'humeur sébacée, aussi bien que la liqueur lymphatique qui établit la sueur ou la transpiration sensible: les autres, qui sont plus imperceptibles & plus nombreuses que les précédentes, sont celles qui laissent échapper à travers de la surpeau une vapeur appelée *insensible transpiration*; voyez à l'article *Economie animale*, au mot HOMME: d'autres enfin permettent aux poils de sortir. On peut encore mettre au rang des pores de la peau les orifices des conduits laiteux des mamelles, dont le volume varie suivant l'âge & le sexe.

Les usages de la peau sont, 1°. de former une enveloppe commune à tout le corps, & de mettre à l'abri des injures extérieures, autant qu'il est possible, les parties qui sont dessous: 2°. d'établir l'organe du toucher à la faveur de l'expansion des filets nerveux ou de leurs mamelons; car, comme l'on sait, ce sont ces houpes nerveuses qui nous font distinguer si facilement le froid d'avec le chaud, le dur, le mou, le poli, l'inégal, l'humide & la fluctuation, &c.

L'art du Tanneur & du Corroyeur, qui est celui de préparer les peaux des animaux, sur-tout des quadrupedes, est un des plus importans dans la société: c'est par l'industrie d'un tel art qu'on imite la peau du castor avec celle de la chevre & du bouc, elles sont corroyées à l'huile: on passe au lait & à la chaux la peau du veau & du mouton pour la rendre blanche, & on peut ensuite la chamarrer: on s'en sert pour faire des doublures. Le marroquin dont on fait des meubles,

des pantoufles, &c. n'eſt que de la peau de chevre : il y en a de toutes couleurs. Les cuirs nerveux de Sédan, celui de Colomiers & de Bourgogne, celui de Paris, ſervent à faire des ſemelles de ſouliers. Le cuir de vache ne ſe prépare qu'au tan, & ne ſert que pour les eſcarpins. Les rognures de peau de bœuf ſervent à faire de la colle forte. La peau de chien ſert pour les empeignes des gros ſouliers, ainſi que celle de chevre corroyée à l'huile de poiſſon. On prépare auſſi des peaux de veau pour les empeignes ; on les paſſe au tan & on les trempe dans de la biere aigrie, où on a macéré de la vieille ferraille, puis on les nourrit avec le dégras (huile de poiſſon). On corroie beaucoup de peaux au ſuif, de même qu'on en tanne avec le ſumach. Le faux chagrin des Gainiers ſe fait avec la peau de mouton, de la même maniere que le vrai *chagrin* ſe fait avec la peau de la croupe d'un âne. *Voyez ce mot.* La peau du veau mort-né ſert à faire le *vélin*, dont on ſe ſert pour peindre en miniature. M. *Sue*, célebre Chirurgien de Paris, a donné au cabinet du Roi une paire de pantoufles faites avec de la peau humaine tannée ou préparée comme celle des quadrupedes. On voit encore dans ce même cabinet un ceinturon fait auſſi avec de la peau d'humain. On diſtingue ſur ce ceinturon la marque du mamelon, & ſur un autre morceau en forme de courroie la peau des deux derniers doigts de la main droite avec leurs ongles. La préparation de cette peau conſiſte à la mettre pendant quelques jours dans une leſſive chargée d'alun, de vitriol romain & de ſel commun ; on la retire & on la fait ſécher à l'ombre, puis on la paſſe en mégie.

Dans quelques animaux la peau eſt fort ſinguliere : il y en a, telle que celle de l'anguille, qui eſt unie, gliſſante & qui ſert de fil ou de ficelle ; d'autres, comme celle du requin, ſont couvertes d'eſpeces de pointes qui ſervent à limer le bois & le fer ; d'autres, comme celles des poiſſons & des ſerpens, ſont couvertes d'écailles artiſtement arrangées, & ces peaux tombent fréquemment chez les ſerpens ; d'autres, comme celles des oiſeaux, ſont extrêmement poreuſes : il y en a de très-dures, comme celle du rhinocéros, du cheval de riviere, &c. enfin il ſemble que la peau eſt pour les in-

ſectes de la même utilité que les écailles ſont pour les poiſſons, les coquilles pour les animaux qui les habitent, les plumes pour les oiſeaux & le poil pour les quadrupedes. Quant à la maniere de préparer les peaux des animaux pour l'uſage des Naturaliſtes, voyez les articles *Quadrupede*, *Oiſeau*, *Poiſſon*, *Inſecte*, *&c.*

PÉCARI. Eſpece de ſanglier ou de cochon naturel à l'Amérique, où il eſt connu auſſi ſous le nom de *tajacu*. Voyez ce mot.

PÊCHÉ ou PÊCHER, *perſica*. Arbre originaire de Perſe, & qui s'eſt naturaliſé dans nos climats. La pêche eſt un des plus excellens fruits de l'Europe; en effet ce fruit ſavoureux flatte ſenſuellement les organes de la vue & du goût; mais c'eſt auſſi dans notre climat celui de tous qui coûte le plus de ſoin, & qui par conſéquent demande le plus d'intelligence pour être utilement cultivé. Tout le monde connoît les belles pêches que fourniſſent les terrains de Bagnolet & de Montreuil aux environs de Paris. Nous ferons uſage du *nouveau Traité de la Culture du Pêcher*, pour donner une idée de la maniere dont il faut gouverner cet arbre ſi intéreſſant.

Les fleurs du pêcher ſont en roſes; il leur ſuccede le fruit charnu qu'on nomme *pêche*, dont il y a beaucoup d'eſpeces: elles different par la forme, par la couleur, par le goût & par le plus ou le moins de temps qu'elles ſont à mûrir. Elles renferment un noyau gravé de profonds ſillons: ce noyau contient une amande compoſée de deux lobes, ordinairement amere. Les feuilles de pêcher ſe terminent en pointes: elles ſont dentelées ſur les bords & placées alternativement ſur les branches.

Parmi le nombre prodigieux de pêches, ou plutôt de variétés qu'on en compte, il n'y en a guere qu'une quinzaine qui méritent les ſoins du cultivateur: on peut cependant ſe procurer une ſuite non interrompue de bonnes pêches, depuis la fin de Juillet juſqu'à la mi-Octobre.

Les quinze ſortes de pêches qui ſe ſuccedent ſans interruption, & qui ſont ſans contredit les meilleures & les plus belles, ſont la *petite* & *groſſe mignonne*, la

magdelaine rouge, la *galante*, le *teton de Vénus*, la *pêche d'Italie*, la *violette hâtive*, le *bourdon*, la *chevreuse*, la *pourprée*, la *Persique*, l'*admirable*, la *bellegarde*, la *royale*, la *navette* & le *pavie de Pompone*. Cette derniere est estimée pour sa grosseur monstrueuse, pour son beau coloris, & parce qu'elle vient quand toutes les pêches finissent; de plus, elle a l'avantage de pouvoir être mangée toute l'année, confite au vinaigre comme les cornichons, & elle surpasse en bonne qualité tout ce qu'on a coutume de confire de cette maniere.

Il y a encore un petit pêcher nain qu'on éleve à Orléans, qui fait l'amusement de quelques Curieux; mais qui n'est bon que pour le plaisir des yeux: on l'appelle *parchemin d'Orléans*. On le cultive dans des vases de faïence, & on sert le fruit & l'arbre dans le vase sur la table: il rapporte quelquefois jusqu'à vingt & vingt-cinq pêches, mais elles sont insipides au goût. Les pavies, dans ce pays-ci, sont bien éloignés d'être aussi bons qu'en Italie & en Provence.

Le pêcher se greffe sur trois sortes de sujets, sur le noyau de la pêche même, sur l'amandier & sur le prunier: il s'en greffe peu de la premiere sorte, d'autant qu'elle est trop sujette à la gomme. On greffe sur amandier dans les terres légeres, parce que la racine de ce dernier pivote; mais on préfere dans les terres fortes les pêchers greffés sur le prunier, parce que la racine de ce dernier rampe davantage. Cette derniere espece de greffe est aussi beaucoup plus durable. En général tous les terrains qui sont propres à la vigne conviennent au pêcher.

Il est décidé par l'expérience que toutes nos pêches tendres ne peuvent guere réussir qu'en espalier, & même aux seules expositions du Midi & du Levant. Lorsqu'on se trouve dans le cas de renouveller un espalier, il faut, autant qu'il est possible, changer les especes, c'est-à-dire, remettre des fruits à noyau où il y avoit des fruits à pepin; & des fruits à pepin où il y avoit des fruits à noyau: les arbres profitent bien mieux. Les fruits mûrissent d'autant mieux que les murs sont

mieux recrépis, parce que la chaleur occasionnée par la réflexion des rayons, devient alors plus grande.

Un pêcher bien taillé & bien conduit dure très-long-temps en bon état; on en voit qui ont quarante ans, & qui s'entretiennent encore très-bien.

L'ébourgeonnement dans la culture du pêcher est, après la taille, l'opération la plus importante, & néanmoins la plus négligée. L'utilité de l'ébourgeonnement consiste en ce qu'il facilite toutes les autres opérations, & qu'il procure au fruit la sureté, la beauté & la bonté. L'ébourgeonnement se fait au mois de Mai; cette opération consiste à ôter les bourgeons d'où doivent pousser certaines branches, ou à retrancher les branches inutiles dont le pêcher fourmille. Par ce moyen la seve reflue dans les branches à fruit, & il en résulte tous les avantages dont nous avons parlé.

Les feuilles des pêchers sont sujettes à une maladie que l'on nomme *cloque*; c'est, dit-on, l'effet d'un mauvais vent qui fait crisper les feuilles: elles s'épaississent, deviennent jaunes, rouges, galeuses. On doit les retrancher, parce qu'elles enlevent trop de seve à l'arbre.

Les fourmis & les pucerons causent quelquefois le même désordre aux feuilles & aux branches. Les fourmis sur-tout causent un tort très-considérable aux pêchers, notamment à ceux en espaliers; ils se logent & nichent dans les feuilles des bouts des branches qu'ils entortillent, d'où on les voit bientôt sortir par milliers, & se répandre sur ces arbres dont ils font périr le fruit, & même souvent l'arbre entier. Dès qu'on s'en apperçoit, il faut aussi-tôt enlever ces feuilles entortillées, & les brûler: il faut en outre attacher à l'arbre plusieurs bouteilles remplies à moitié d'eau miellée, pour attirer & faire périr les fourmis répandues sur les branches de l'espalier.

Autant il est nécessaire de tenir les fruits à couvert sous leurs feuilles avant leur maturité, puisque les feuilles elles-mêmes absorbent l'humidité de l'air, & portent ainsi de la nourriture à l'arbre; autant il est nécessaire de les découvrir lorsqu'ils sont en maturité, pour perfectionner leur goût, & leur donner cette

belle couleur qui fait leur plus grand ornement ; mais il eſt bien eſſentiel de ne le faire que petit à petit, ſans quoi les fruits ſe deſſécheroient & périroient.

On ſait combien il eſt important de garantir les fleurs du pêcher des gelées du printems ; mais comme on a obſervé que ces gelées ne tomboient que perpendiculairement, ainſi que les pluies froides, on en garantit facilement les pêchers, en ſcellant au haut des murs, des bâtons qui ſoutiennent des planches en ſaillie, qui tenant ainſi les arbres à l'abri de ces inconvéniens, les mettent en ſureté. On ſent de quelle importance eſt le labour aux pieds de ces arbres pour les faire profiter.

La plupart des pêches ont la peau velue, mais pluſieurs eſpeces, qu'on nomme *pêches violettes*, l'ont très-liſſe. Il y a des pêches velues qui quittent le noyau, & d'autres dont le noyau eſt adhérent à la pêche ; celles-ci ſe nomment *pavies*. Il y a auſſi des pêches violettes ou liſſes qui quittent le noyau, & d'autres qu'on nomme *brugnons*, dont la chair eſt adhérente au noyau.

Il ne faut pas être étonné, dit M. *Duhamel*, ſi M. *Linnæus* ne fait qu'un ſeul genre du pêcher & de l'amandier ; car nous en avons une eſpece qui a les feuilles toutes ſemblables à celles de l'amandier : ſes fleurs ſont d'un rouge très-pâle, & auſſi grandes que celles de l'amandier : le noyau du fruit n'eſt preſque point fillonné, mais uni & percé de pluſieurs trous ; enfin les amandes en ſont douces, au contraire de celles des autres pêchers, qui ſont ameres. Les fruits de cet arbre ſont quelquefois ſecs, peu charnus, & d'autres fois ils deviennent gros & ſucculens, d'un goût amer & déſagréable, mais bons à faire des compotes ; en un mot ces fruits qu'on nomme *pêches amandes*, ſont un compoſé des qualités des fruits de ces deux genres. Il y a toute apparence que ce genre vient originairement d'une amande fécondée par un pêcher, d'autant plus que M. *Duhamel* en a cultivé un qui provenoit d'un noyau levé de lui-même dans un petit jardin où il n'y avoit que des pêchers & des amandiers. C'eſt-là ſans doute l'origine de la grande variété des fruits.

L'eſpece de pêcher à fleurs doubles fait un très-bel

effet à la fin d'Avril. Il orne très-bien les bosquets du printems. Le pêcher nain d'Afrique, à fleurs incarnates & doubles, est un arbuste charmant par la quantité des fleurs doubles dont il est chargé. Comme cet arbre ne porte point de fruit, on doute encore s'il est du genre des pêchers ou de celui des pruniers. Cependant M. *Bernard de Jussieu* soupçonne que cet arbre est un véritable prunier, parce qu'il a observé que dans le développement de ses boutons les feuilles sont pliées l'une dans l'autre, comme celles des pruniers; au lieu qu'aux pêchers & aux amandiers elles sont placées à côté l'une de l'autre.

Il y a une autre espece de pêche que l'on nomme *sanguinole*, qui est curieuse par la couleur de sa chair, laquelle est rouge comme la racine de betterave.

Les fleurs & les feuilles de pêcher ont une certaine amertume aromatique, qui n'est pas désagréable; elles sont purgatives. M. *Bourgeois* a observé que les feuilles de pêcher ne sont purgatives que lorsqu'on les cueille au commencement du printems, avant qu'elles soient ouvertes, mais alors elles ont une vertu purgative très-marquée. Il a aussi reconnu qu'elles sont plus purgatives que les fleurs, & qu'on devroit faire usage de ces bourgeons préférablement aux fleurs, sur-tout pour les adultes, & se servir des fleurs pour les enfans.

Il est constant que la pêche est une nourriture assez innocente, savoureuse, délicate, rafraîchissante & saine, lorsqu'elle est mangée mûre & en petite quantité; on en fait des compotes. Mais la pêche veut être mangée crue, elle perd de sa qualité en passant sur le feu; aussi n'en conserve-t-on guere dans les offices, qu'à l'eau-de-vie; d'ailleurs ces fruits se corrompent aisément.

Les noyaux de pêche, dit M. *Bourgeois*, nous fournissent aussi d'excellens remedes dans la Médecine: on en fait une eau de noyaux de pêches, distillée avec l'eau commune, qui est stomachique, carminative, hystérique & très-agréable. Une douzaine d'amandes de pêches, mangées à jeun, guérissent les vertiges qui proviennent de foiblesse d'estomac & d'indigestion. On fait aussi avec ces noyaux, en y joignant les amandes

douces, le sucre, la cannelle & les jaunes d'œufs, des bouillons qui sont très-bons pour rétablir les malades convalescens, & fortifier & nourrir les femmes en couche & les vieillards. Enfin ils entrent dans la composition d'un grand nombre de sucreries, & font la base d'un excellent ratafia connu sous le nom de *perricot* ou de *noyau*. On tire de l'huile des noyaux de pêche; elle est amere.

Quant aux pêches de Perse, que les Voyageurs disent être un poison, il ne faut regarder cette assertion que comme relative & non absolue : elles ne font point de mal aux Naturels du pays, qui en mangent en petite quantité; mais elles occasionnent la constipation aux Européens, à cause de leur qualité acerbe.

PÊCHE-MARTIN. A la Louisiane, on donne ce nom à une espece d'oiseau de Paradis : son plumage a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel : il vole toujours contre le vent.

PÊCHETEAU. *Voyez* BAUDROIE.

PÊCHEUR. *Voyez* MARTIN-PÊCHEUR.

PÊCHEUR. Dans les Antilles on donne ce nom à un puissant oiseau de proie qui ressemble à l'aigle, il est un peu plus petit. Il n'en veut ni aux oiseaux qui peuplent l'air, ni aux animaux qui sont sur la terre; il est seulement l'ennemi des poissons qu'il épie de dessus une branche, ou de dessus la pointe d'un roc : lorsqu'il les voit à fleur d'eau, il fond promptement dessus, les enleve avec ses griffes, & les va manger paisiblement sur le lieu d'où il s'est élancé. Il est étonnant que cet oiseau de proie, qui laisse en paix tous les autres oiseaux, soit obligé de changer de quartier, par la guerre que ceux-ci lui font; détesté par ces persécuteurs qui le poursuivent, il ne trouve de tranquillité que sur les rochers solitaires. Les enfans des Sauvages prennent plaisir à élever cet oiseau, quand il a été pris petit, & ils s'en servent pour la pêche; il est fort exact à revenir à son maître quand il n'a rien trouvé; mais quand il a fait capture, il s'enfuit souvent avec sa proie dans des lieux inacces-

sibles. Pour prévenir cette fuite, on le tient attaché au moyen d'une ficelle.

PÊCHEUR DU SÉNÉGAL. *Voyez* KURBATOS.

PECTINITES. Ce sont des coquilles du genre des peignes, devenues fossiles. On donne le nom de *pectonculites* aux peignes à oreilles inégales que l'on trouve aussi en terre. Les *pectinites* sont communs dans les Pays-Bas Autrichiens. *Voyez* PEIGNE.

PECTONCULITES. *Voyez* PECTINITES.

PÉDICULAIRE, *pedicularis*. Le genre de la *pédiculaire* a pour caractere, dit M. *Deleuze*, un calice d'une seule piece fendue en cinq pointes inégales: la corolle en mufle a deux levres, dont la supérieure est arquée, creuse, ordinairement comprimée par les côtés, & terminée en pointe; elle renferme deux paires inégales d'étamines & un pistil. Le fruit est une capsule ovale & pointue. Ce genre a plusieurs belles especes, la plupart naturelles aux pays froids & habitantes des hautes montagnes: celle qu'on va décrire est la plus commune.

PÉDICULAIRE DES PRÉS, *pedicularis pratensis purpurea*, est une plante qui croît dans les prés, dans les marais & autres lieux humides: sa racine est grosse comme le petit doigt, ridée, blanche, divisée en plusieurs grosses fibres, d'un goût un peu amer; elle pousse des feuilles semblables à celles de la filipendule, mais plus petites & crêpées: ses tiges s'élevent à la hauteur de six pouces, elles sont anguleuses, creuses, foibles; les unes rampantes à terre, les autres droites, portant des fleurs en tuyaux, terminées comme par un mufle à deux mâchoires, elles sont de couleur purpurine ou blanche; leur calice n'a que deux segmens bordés de dentelures: à ces fleurs succedent des fruits aplatis qui se divisent en deux loges, & renferment des semences plates, noirâtres, & bordées d'une aile membraneuse. Cette plante est vulnéraire & astringente; elle est très-propre pour arrêter toute espece de flux: on la dit bonne aussi pour les fistules. En topique elle guérit les ulceres sanieux.

PEGAFROL. *Voyez à l'art.* COLIBRI.

PEGOUSE, *solea oculata*, espece de sole qui se pê-

che à Marseille : ses écailles sont tellement adhérentes, qu'il faut tremper le poisson dans l'eau chaude pour les ôter. Ce poisson a sur le corps de grandes taches faites en forme d'yeux. RONDELET, *Hist. Nat. des Poiss. I. Part. Liv. XI. Chap. XI.*

PEIGNE, *pecten*, est un genre de coquillage bivalve, dont la forme est très-connue, parce qu'une des especes de ce genre sert d'ornement aux Pélerins de S. Jacques ou de S. Michel : on l'appelle *fourdon* en Poitou, & presque par-tout la *pélerine*. Quelques Naturalistes appellent *peigne* ceux de ces coquillages qui sont grands, & *pétoncle* les petits. Cependant M. *Adanson* donne, d'après *Belon*, *Rondelet* & *Lister*, le nom de *pétoncle* à un coquillage fort différent du *peigne*, tant par l'animal que par la charniere & la forme renflée de sa coquille : *voyez* l'*Histoire des Coquilles du Sénégal.*

Le peigne, dit M. *de Réaumur* (*Mém. de l'Académ.* 1711, *page 137 & suiv.*) est fort commun & fort recherché : on le mange cuit & crud. Sa coquille est composée de deux pieces. Le ligament à ressort, qui les assemble & qui sert à les ouvrir, est au milieu du sommet. Depuis ce sommet sa coquille va en s'élargissant insensiblement, & prend une figure arrondie : précisément au sommet, elle est comme coupée en ligne droite ; chaque piece de la coquille forme un ou deux appendices, qui sont appelées les *oreilles de la coquille.* La coquille ferme exactement de tous côtés : elle est rayée en forme d'un peigne ; elle est plate d'un côté, élevée de l'autre, garnie de deux oreilles égales comme le bénitier, la coquille de S. Michel, & le *peigne orangé* de la Mer Caspienne ; ou à oreilles inégales, à valves supérieures & inférieures, convexes & sont nommés *pétoncles* : telle est la *coraline* & la *gibecière.* Il y en a qui paroissent n'avoir qu'une oreille, tels que les *peignes épineux* ou *tuiles ;* d'autres ne paroissent point avoir d'oreilles. La charniere de ceux-ci est aplatie ; l'on y voit un petit ligament & plusieurs petites dents rangées de part & d'autre en forme d'arc, dans les deux valves qui elles-mêmes sont arrondies & bombées.

Il y a une très-grande variété dans la couleur & la figure des peignes. Les uns sont entiérement blancs : d'autres sont rouges ou violets ; & d'autres ont toutes ces couleurs distribuées avec symétrie ; telle est la coquille appelée le *Manteau Ducal* : il y en a de cannelées simplement, telle est la *coquille de S. Jacques* : souvent les intervalles qui séparent ces cannelures, ressemblent, en quelque façon, aux dents d'un peigne, chargées de pointes, ou plutôt de tuiles ou écailles, comme celles qu'on appelle la *ratissoire* ou la *râpe* : d'autres sont plates, unies en dehors & cannelées intérieurement, comme la *sole* ou l'*éventail* : enfin le caractere spécifique fait voir une grande échelle dans le caractere générique. Nous avons dit que parmi ces coquilles, il y en a qui n'ont qu'une valve de plate ; l'autre est convexe en dehors & concave en dedans, tel est le *bénitier* ; d'autres sont convexes des deux côtés ; d'autres ont les deux valves assez plates.

Ces coquillages s'attachent aux pierres ; leurs fils n'ont aucun usage connu : ils sont plus gros & plus courts que ceux des moules ; souvent après une tempête, on trouve de ces coquillages, dans des endroits où il n'y en avoit pas auparavant, comme on le remarque sur les côtes d'Aunis. M. *d'Argenville* dit que, quand ce coquillage est à sec, & qu'il veut regagner la mer, il ouvre ses deux valves de plus d'un pouce de large ; ensuite il les ferme avec tant de vîtesse, qu'il communique aisément à sa valve inférieure un mouvement de contraction ou de balancier, par lequel elle acquiert assez d'élasticité pour s'élever & perdre terre de cinq à six pouces. Tel est son mouvement progressif sur terre pour regagner la mer & avancer du côté où l'animal veut : mais celui qu'il a dans l'eau est bien différent, car il commence par en gagner la surface sur laquelle il se soutient à demi-plongé ; il ouvre alors un peu ses deux valves, auxquelles il communique un battement si prompt & si accéléré, qu'il acquiert un second mouvement ; on le voit du moins, en réunissant ce double jeu, tourner d'abord sur-lui même de droite à gauche avec une

célérité étonnante, & voler ensuite au niveau des flots. *Rondelet* dit que par ce moyen, l'animal agite l'eau avec une si grande violence, qu'elle est capable de l'emporter & de le faire courir sur la surface des mers.

On trouve dans la Manche, sur les côtes de la Bretagne, quantité de *pétoncles* striés ou tuilés, dont la marbrure ou les couleurs sont admirables & très-variées, vert & bleu, brun & blanc, jaune & rouge, aurore pur, &c. Les Mers du Nord en offrent de papyracés, nués de zones, de diverses teintes; les peignes les plus rares nous viennent des deux Indes; telle est la *sole Chinoise*, &c.

PEIGNE DE VÉNUS ou AIGUILLE DE BERGER, *scandix semine rostrato vulgaris*, est une plante qui croît abondamment & presque par-tout parmi les blés, dans les champs & les vignobles. Sa racine est unique, blanche, grosse comme le petit doigt, fibreuse, annuelle, & d'un goût doux mêlé d'acerbe: elle pousse plusieurs tiges hautes d'un pied, menues, rameuses, velues, vertes en haut, rougeâtres en bas. Ses feuilles sont découpées à-peu-près comme celles de la coriandre, d'un goût douceâtre & un peu âcre. Aux sommités sont des ombelles qui soutiennent de petites fleurs à cinq feuilles, & disposées en fleur de lis: à ces fleurs succedent un fruit composé de deux graines longues, semblables à des aiguilles, convexes & sillonnées.

Cette plante contient beaucoup de sel essentiel: elle est estimée apéritive, vulnéraire, résolutive & propre pour les maladies de la vessie. Quelques personnes mangent cette plante tendre & crue en salade, ou cuite avec du beurre & de l'huile.

PEINTADE, oiseau. *Voyez* PINTADE.

PEKAN. Espece d'animal qui se trouve dans l'Amérique septentrionale, & dont la pelleterie est d'usage dans le commerce. Ce quadrupede ressemble tellement à la marte par la forme du corps & par le naturel, qu'on peut la regarder comme de la même espece; son poil est seulement plus lustré, plus brun & plus soyeux, qualités occasionnées par le climat & qui se trouvent

toujours d'une maniere bien sensible dans les especes d'animaux qui sont communs au climat du Nord & au nôtre. Le pékan fait la guerre au porc-épic.

PELA, est un serpent de l'Amérique qui, selon *Séba*, pourroit être nommé le *pouilleux*. Sa couleur est fauve; il a les écailles du ventre jaunes, la tête petite & les yeux étincelans. Ces sortes de serpens sont couverts de poux, semblables à de petits escarbots munis sur le dessus du corps de petits boucliers; ils se cramponent avec leurs pieds nombreux entre les écailles de ces animaux, pénetrent la peau qu'ils sucent pour se nourrir, & désolent ainsi ces serpens.

PELA. *Voyez au mot* ARBRE DE CIRE.

PÉLAMIDE. En Languedoc on donne ce nom au *glaucus* ou *liche*, espece de *chien de mer*. Voyez ces mots.

PÉLERINE, est le nom qu'on donne aux coquilles de S. Jacques, que l'on appelle *sourdon* en Poitou. *Voyez* PEIGNE.

PÉLICAN ou ONOCROTALE ou GRAND GOSIER, ou OISEAU GOITREUX ou LIVANE, *onocrotalus aut pelicanus*. C'est un genre d'oiseau dont on distingue plusieurs especes, & dont le caractere est d'avoir quatre doigts à chaque pied, & qui tiennent ensemble par des membranes; le bec est droit, aplati horizontalement, & formant un petit crochet à la pointe; au gosier pend une bourse susceptible de s'enfler. Le PÉLICAN VULGAIRE, *onocrotalus*, est beaucoup plus gros qu'un fort cygne; son bec qui ressemble à une coignée, en ce qu'il est plat, & qu'il conserve presque une même largeur dans toute son étendue, a neuf à dix pouces de longueur; il est courbé au bout, très-gros vers la tête, où il a neuf pouces de circonférence; les côtés de ce bec sont tranchans, le dessous est creusé de quatre cannelures dont les bords font cinq côtes; savoir, les deux qui font les côtés du bec, une au milieu, & les deux autres entre celles des côtés & celles du milieu: la côte du milieu est tranchante, ainsi que les deux côtés du bec; celles d'entre deux sont mousses & doubles, faisant une rainure; les côtes du bec inférieur sont doubles aussi, & ont une rainure

dans laquelle entrent les côtés tranchans du bec supérieur : la couleur du bec supérieur est d'un rouge de chair ; le bec inférieur est composé à l'ordinaire de deux parties jointes par le bout, laissant entr'elles une ouverture d'environ trois lignes, qui répondent à la poche ; elles sont flexibles comme de la baleine. Toute la face de cet oiseau est d'un bleu obscur, & cette couleur s'étend jusqu'à un pouce au-delà de l'œil : sous la mâchoire inférieure il a une poche ou un sac qui pend sur la gorge ; il a le derriere de la tête & le cou entiérement blancs, le plumage des ailes presque bleuâtre, la queue est noire, courte & carrée par le bout ; tout le reste du plumage est blanchâtre nué de rose : les jambes sont noires & fort longues ; les pieds ont quatre doigts qui sont palmés comme dans le cormoran, l'ergot du derriere est très-long ; en général, c'est un oiseau très-grand, très-fort, & qui vit long-temps.

Entre tous les oiseaux dont les Anciens ont parlé, il n'y en a point qui aient de si grandes ailes, ni qui volent si haut que le pélican ; l'envergure est souvent d'onze pieds ; l'on en a vu de tellement élevés dans les airs, qu'ils ne paroissoient pas plus gros que des hirondelles. On lit dans une lettre de *Culmannus* à *Gesner*, qu'un *onocrotale* privé dans le palais de l'Empereur *Maximilien*, a vécu quatre-vingts ans, & qu'il accompagnoit l'Empereur, même à l'armée, il le suivoit au vol. L'on a des preuves que cet oiseau peut soutenir par son vol bien au-delà de sa propre pesanteur. *Sanctius*, dans *Aldrovande*, cite un onocrotale qui laissa tomber un enfant Ethiopien qu'il avoit enlevé bien haut en l'air. De plus, le pélican qui fait son nid sur terre quelquefois à quarante lieues éloigné de la mer, est néanmoins obligé d'aller y pêcher, & de faire magasin de poissons qu'il rapporte dans la poche de son bec. On le trouve aussi sur les bords des grands fleuves & des lacs.

Le pélican est un oiseau étranger ; on en voit en grand nombre en Afrique & en Amérique, il s'en trouve aussi à la côte de Coromandel & dans plusieurs autres parties des Indes Orientales. *Pierre Martyr* dit

que la maniere dont il prend le poiſſon, eſt toute particuliere : ces oiſeaux ne l'attrapent point par la viteſſe avec laquelle ils le pourſuivent, comme font les oiſeaux plongeurs, &c. mais volant fort haut, dès qu'ils apperçoivent du poiſſon proche des bords de la mer & de rivieres, ils fondent tout-à-coup dans l'eau qu'ils agitent par la peſanteur de leur corps & le mouvement de leurs ailes, d'une telle maniere, que le poiſſon étourdi ſe laiſſe prendre ; & alors il faut ſuppoſer, dit M. *Perrault*, que le poiſſon étant ſerré par le bec ſupérieur, fait lui-même élargir les deux branches du bec inférieur auquel la poche eſt attachée, dans le cas où le poiſſon eſt plus grand que n'eſt ordinairement l'ouverture des deux branches. Le même Académicien dit auſſi que cette dilatation qui paroît ne pouvoir ſe faire que difficilement par des muſcles, a beſoin de quelque autre moyen qui la rende auſſi ample qu'il eſt néceſſaire pour recevoir les grands poiſſons que le pélican avale.

L'onocrotale garde toujours quelque temps ſa nourriture dans ſa poche avant que de la recevoir dans ſon ventricule ; cela eſt commun à la plupart des oiſeaux qui ont un jabot, dans lequel ils réſervent la nourriture dont ils prennent une grande quantité quand l'occaſion s'en préſente, pour l'avaler à loiſir ou pour la porter à leurs petits : c'eſt ce que le pélican a de particulier & ce qui le diſtingue des autres oiſeaux de proie, qui ne portent la nourriture à leurs petits que dans leur bec & dans leurs ſerres.

Le Pere *Labat* dit que le pélican ou *grand goſier d'Amérique* reſſemble auſſi à nos oies d'Europe. Il a, dit-il, la tête aplatie de deux côtés & fort groſſe, en un mot, telle qu'il convient pour porter un bec de deux à trois pouces de large, ſur un pied & demi ou environ de longueur ; mais ſes yeux ſont très-petits par rapport à ſa tête. Il dit auſſi que le bec, tant ſupérieur qu'inférieur, eſt garni de petites dents en forme de ſcie, fort menues & tranchantes, ainſi qu'on l'obſerve dans le pélican à bec dentelé du Mexique ; ce que M. *Perrault* n'a point reconnu dans les deux pélicans d'Afrique morts à la ménagerie de Verſailles,

& dont il a fait la dissection. (Voyez *Mémoires pour servir à l'Hist. natur. des Animaux, par M.* Perrault, *Tom. III. part. 3.*) Les pieds, les membranes, les doigts & le bec du pélican du Mexique sont comme de couleur safranée. Le sac tombe sur l'estomac de l'oiseau, où il est encore attaché, ainsi que le long du cou, par de petits ligamens, afin qu'il n'aille point de côté & d'autre : ce sac est composé d'une membrane épaisse & grasse, assez charnue & souple comme un cuir; il est couvert d'un petit poil très court, fin & doux comme du satin; sa couleur est un beau gris de perle, avec des pointes, des lignes & des ondes de différentes teintes qui font un bel effet. Lorsque ce sac est vide, il ne paroit pas beaucoup; mais quand l'oiseau trouve une pêche abondante, il est surprenant de voir la quantité & la grandeur des poissons qu'il y fait entrer; car la premiere chose qu'il fait en pêchant; est de remplir son sac, après quoi il avale à loisir ce qu'il juge à propos, & il retourne remplir ce sac lorsqu'il est vide & que la faim le presse. Il nourrit ses petits, en dégorgeant dans leur bec une partie de son butin déjà échauffé dans son havresac. Le pélican est un oiseau triste & mélancolique; il est aussi lent & paresseux à se remuer, que l'oiseau appelé *frimand* est vif & alerte. *Labat* dit avoir trouvé une femelle qui couvoit cinq œufs à plate terre, & qu'elle ne se donnoit pas la peine de se lever pour le laisser passer.

La chair du pélican est dure, sent l'huile & le poisson pourri. Qui croiroit, dit le Pere *Labat*, que ces grosses bêtes, avec leurs larges pattes d'oies, s'avisassent d'aller prendre leur repos, perchées sur des branches d'arbres? Elle passent tout le jour, hors le temps de leur pêche, ensevelies, selon toutes les apparences, dans le sommeil, ayant la tête appuyée sur leur long & large bec, qui porte ou à terre ou sur un autre corps; elles ne changent de situation, que quand la faim les presse. Il dit aussi que la vie de ces oiseaux est partagée en trois temps; 1°. à chercher leur nourriture; 2°. à dormir; 3°. à faire à tous momens des tas d'ordures larges comme la main. Le Pere *Raymond* rapporte, dans son *Dictionnaire Caraïbe*, qu'il a vu un

pélican

pélican si privé & si bien instruit par les Sauvages, qu'après qu'il avoit été peint de roucou le matin pour le reconnoître, il s'en alloit à la pêche, d'où il revenoit le soir, ayant sa besace bien garnie de poisson qu'il partageoit, malgré lui, avec ses maîtres, parce qu'on lui passoit un anneau au cou pour l'empêcher de l'avaler. Les Américains tuent beaucoup de ces oiseaux, non pas pour les manger, mais pour avoir leur *blague* ou poche. La plupart des Fumeurs se servent de ce sac pour mettre leur tabac haché; on s'en sert encore pour mettre de l'argent: on étend les blagues dès qu'on les a tirées du cou de l'oiseau, & on les saupoudre de sel battu avec de la cendre ou avec de l'alun, afin d'emporter l'excès de la substance grossiere qui s'y trouve; après quoi on les frotte entre les mains avec un peu d'huile, pour les rendre souples & très-maniables: quelquefois on les fait passer à l'huile, comme les peaux de moutons; alors elles en sont bien plus belles & plus douces; elles deviennent de l'épaisseur d'un bon parchemin, mais extrêmement souples & douces. Les femmes Espagnoles les brodent d'or & de soie, d'une maniere très-fine & très-délicate. Il y a de ces ouvrages qui sont d'une grande beauté.

Le pélican dont le plumage est brun, se trouve en Amérique; il est un peu plus gros que l'oie domestique; son bec est d'un vert-cendré.

Le *pélican des Philippines* est plus gros que le pélican brun; son plumage est cendré & tacheté de blanc: semblablement au grand pélican, le sommet du cou est garni de plumes très-flexibles, qui lui forment une espece de huppe.

Dans le Royaume de Loango en Afrique, on voit un oiseau plus gros qu'un cygne, & d'une forme assez semblable à celle du héron; il a les jambes & le cou fort long; le plumage noir & blanc. Il a toujours sur la région de l'estomac une place sans plumes; & l'on suppose qu'il les arrache avec son bec, pour nourrir ses petits de son propre sang dans les momens où il ne trouve rien pour leur donner à manger: c'est un véritable pélican. Les Negres de Congo & d'Angola se servent de la peau des pélicans pour se couvrir la poitrine.

Kolbe dans sa *Description du Cap de Bonne-Espérance, Tom. III, chap. 19, pag. 198*, dit qu'on voit dans ce pays une sorte de pélican, qu'on nomme *mange-serpent* dans les Colonies. Il se nourrit ordinairement de vers, de grenouilles, de moules, de crapauds, de serpens & d'autres bêtes venimeuses: ce même oiseau est fort commun dans la Baie d'Hudson & dans les parties Septentrionales de la Russie. Celui qu'on a fait voir à Paris en 1750, & qui venoit d'Afrique, étoit deux fois plus fort qu'un gros cygne : la poche de son bec étoit d'une si grande largeur, que l'homme qui montroit cet oiseau, y mettoit fort aisément la tête.

Albin donne la description d'un pélican d'Allemagne appelé en latin, *anas clypeata*. Ses mâchoires sont dentées ; son bec est plus large à l'extrémité qu'au commencement ; il est plus petit qu'aucune des especes de pélicans. *Voyez l'article* CANARD. On dit que le cri du pélican imite assez le braire d'un âne. Les Siamois donnent au pélican le nom de *noktho :* ils font avec sa nasse des cordes pour les instrumens. On lit dans les *Mémoires de l'Académie des Sciences, ann. 1663, en Décembre*, un Mémoire de M. *Méri* sur le pélican, où il rapporte, qu'en faisant la dissection de cet animal, il s'apperçut qu'il en sortoit une grande quantité d'air par les vésicules de la peau, par la trachée artere, & par les poches du ventre. Cet air sert, dit-il, à enfler la peau de l'oiseau au défaut des muscles. C'est dans ce Mémoire qu'il faut lire l'effet de l'inspiration dans ce genre d'animaux, qui peut de beaucoup augmenter leur volume & non leur pesanteur : c'est ce qui les rend si légers ou plutôt si propres à demeurer fort élevés dans les airs. *Voyez aussi le mot* NOKTHO, *dans le troisieme volume du Dictionnaire des Animaux.*

PELLETERIE. Se dit de toutes sortes de peaux de quadrupedes garnies de leur poil destinées à faire des fourrures, dont les peuples font usage dans la saison de l'hiver. Les habitans du Nord qui éprouvent des hivers plus longs & plus rigoureux, regardent les fourrures comme un objet de luxe & d'utilité : le prix considérable qu'y mettent chez eux certains Seigneurs,

est toujours relatif à la beauté réelle de la fourrure, & à la difficulté de se la procurer : or cette beauté consiste dans la longueur du poil de l'animal, sa douceur, son épaisseur & sa couleur. Ces différentes qualités se trouvent généralement réunies dans les poils du dos ; ceux du ventre sont par conséquent peu ou moins recherchés.

Les fourrures les plus estimées sont, la pointe de queue de marte zibeline, nommée *soble ;* la sur-queue ou cette petite portion de fourrure qui est antérieure relativement au bout de la queue, &c. *voyez à l'article* ZIBELINE : le dos des martes, sur-tout de celles qui sont noires : *voyez à l'article* MARTE ; le renard noir, le renard blanc ; l'hermine ; le loup blanc & le loup gris ; le *barancki* ou agneau mort-né, venant d'Astracan, noir, gris, argenté ou blanc, *voyez à l'article* AGNEAU ; le *poplieski* ou petit-gris très-foncé ; le *piesacki* ou gorge de chien de Sibérie ; le *rosomack* & le lievre de Moscovie nommé *slami-mokeski ;* la peau d'ours, qui est la moins estimée dans le Nord. Comme les martes sont les fourrures les plus communes parmi celles du premier rang, les Juifs qui font le commerce de la pelleterie, s'attachent singuliérement à les déguiser ; 1°. ils les mouillent avec une légere eau seconde, qui attaque le poil de la marte & l'amincit pour les rendre plus douces & plus fines ; 2°. ils les suspendent dans une cheminée, pour que la fumée donne à l'extrémité de ces poils cette couleur noirâtre dont font tant de cas les peuples du Nord ; 3°. ils les plongent enfin dans une teinture : on doit donc sentir les fourrures précieuses pour reconnoître si elles n'ont point été fumées, & en ouvrir le poil, pour observer s'il est noir par-tout ; ce qui indiqueroit la teinture. D'autres quadrupedes nous fournissent aussi des fourrures, tels que le *tigre*, l'*once*, la *panthere*, la *fouine*, le *putois*, le *chat-genette*, le *lapin*, le *riche*, &c. *Voyez ces mots.*

Les peaux de plusieurs animaux plus ou moins amphibies, sont encore au nombre des fourrures, le *castor*, la *loutre*, le *phocas*, &c. *Voyez ces mots.*

Enfin certains oiseaux offrent aussi leurs peaux em-

plumées qui entrent dans la liste des fourrures ; le *coq*, le *toucan*, le *cygne*, le *grebe*, l'*eider-don*, &c. *Voyez ces mots.*

En général les fourrures des pays chauds ne sont pas estimées ; il n'y a que celles des pays froids : lorsque les froids sont excessifs, les peuples Septentrionaux portent volontiers leurs fourrures en dehors ; celles de loup & de renard sont les plus chaudes, & les dernieres les plus légeres.

Quant à la conservation des fourrures, le meilleur moyen est de les bien battre à l'entrée du printems & dans le milieu de l'été ; quelques personnes sont dans l'usage de les enfermer exactement dans un linge ou un étui, & d'y semer des morceaux de cuir neuf ; d'autres y mettent du poivre : il faut sur-tout prendre garde aux *mittes* & aux *dermestes* qui les rongeroient.

PELORE. Plante assez semblable à la linaire. M. *Zyoberg* découvrit pour la premiere fois cette plante en 1742 dans une île de la mer du Nord, environ à sept milles d'Upsal, sur un terrain graveleux, tout couvert de linaires. M. *Ludolf* en a découvert depuis aux environs de Berlin, & M. *Linnæus* dans plusieurs endroits de la Suede. Nous disons que la pelore ressemble à la linaire commune avant l'épanouissement de ses fleurs, même port, couleur & odeur, même feuille, calice, fruit & graine ; il n'y a uniquement que la corolle qui en differe ; elle est en tube fort long, terminé par un pavillon à cinq crenelures & entouré au bas de cinq éperons. M. *Linnæus* croit que la pelore vient de la linaire par une génération métive. *Voyez l'article* FLEUR *au mot* PLANTE.

M. *Daniel Rondberg* a publié une Dissertation Botanique sur la plante *pelore* : sa racine est fibreuse, blanche, vivace : sa tige est simple, droite, haute d'un pied, jetant rarement une ou deux branches, ronde, de la grosseur d'une plume de pigeon, verte & annuelle : ses feuilles sont nombreuses, éparses, pointues, aplaties, unies, vertes, de la grandeur des feuilles de sapin, longues d'un pouce, droites & naissantes de tous côtés, presque sans queue : des embryons de rameaux à plusieurs petites feuilles sortent

des aiſſelles des feuilles ſupérieures : l'épi ou bouquet eſt de neuf ou douze fleurs, tout au plus de ſeize : le calice ou périanthe eſt diviſé en cinq parties juſqu'à la baſe : il eſt court, régulier, uni, vert & durable : la corolle eſt en forme d'entonnoir, longue, cylindrique, rétrécie vers le bas, un peu ventrue au milieu, droite, jaune, plus pâle vers la baſe, garnie au dedans de poils fauves : le bord eſt ouvert, découpé en cinq parties, obtus, régulier, plus jaune que le tube & plus court : de la circonférence du tube naiſſent à angle aigu cinq nectaires égaux, en forme d'alêne, ſans pédicule, creux, jaunes, & preſque auſſi longs que le tube ; cette fleur eſt à cinq étamines vertes, dont les ſommets ou antheres ſont jaunes & ovales & attachés par le côté ; dans le piſtil le germe eſt vert & poſé ſur la baſe de la fructification. Le ſtyle eſt long comme les étamines, filiforme, verdâtre : le ſtigmate eſt un peu gros : le péricarpe eſt en forme de capſule à deux loges, qui s'ouvre par deux endroits : les ſemences ſont angulaires & en grand nombre.

PELOTE DE MER, *pila marina*. Nom donné à une balle arrondie ou oblongue que l'on trouve ſur les rivages de la mer, parmi les algues : cette pelote eſt communément de la groſſeur d'une orange, de couleur fauve, & compoſée de fibres entrelacées & comme agglutinées enſemble : elles proviennent de la deſtruction de pluſieurs plantes marines, dont l'intérieur eſt tout rempli de fibres iſolées, ſeches & faciles à déſunir. Nous avons ramaſſé beaucoup de ces pelotes de mer dans les anſes de la Méditerranée, principalement près de Marſeille. Comme ces pelotes ne reſſemblent pas mal aux égagropiles des animaux ou bézoards de poil, on les a auſſi appelés *égagropiles de mer* ou *bézoards marins*. Voyez EGAGROPILES & BÉZOARD.

PELOTE DE NEIGE. *Voyez* OBIER.

PELOUSE ou TAPIS DE GAZON. *Voyez* GAZON.

PELURE D'OIGNON, eſt une eſpece de petite huître très-légere, & dont la nacre eſt fort belle.

Cette coquille est mince & transparente, un peu raboteuse. La valve inférieure est blanche sur les bords; le reste est ou jaunâtre, ou rouge-violet, ou vert-d'eau. La valve supérieure est ordinairement blanche & remarquable par un trou ovale qui est proche de la charniere. Sa charniere est formée d'une petite patte ovale située au-dessus du trou de la valve supérieure, & correspondant à une cavité de même forme de la valve inférieure. On trouve communément cette huître à Cette en Languedoc.

PEMINA, est l'obier de Canada. *Voyez* OBIER.

PENATES. *Voyez l'art.* LARES.

PENDULINO. Nom donné à un très-petit oiseau dont le volume n'excede pas celui du roitelet sans crête, du moineau troglodite, ou de la mésange appelée *petit charbonnier*. Ce petit bipede ressemble assez bien aux mésanges par son port & la forme de son bec: ce bec est court, pointu, un peu épais à sa base, d'une couleur plombée. La partie postérieure de la tête, la nuque, le cou, la gorge, la partie supérieure du dos jusqu'à la naissance des ailes, sont couverts de plumes cendrées, mais un peu plus blanches auprès de la gorge. De chaque côté, depuis la fente du bec jusqu'à l'occiput, en passant par les yeux, s'étend une tache très-noire; l'espace contenu entre ces deux taches, au-dessus de la base du bec jusqu'au sommet de la tête, est roux dans le mâle, & ce sommet est cendré. Le dos est roux, ainsi que les aisselles & les plumes qui couvrent les ailes; ces plumes sont légérement nuées de verdâtre vers leur extrémité: les plumes des ailes ou ramieres, *remiges*, sont d'un noir plus ou moins foncé, & couvertes d'autres plumes plus petites & roussâtres. La poitrine, le ventre, les cuisses & la partie supérieure du croupion ont une couleur moyenne sur le cendré & le roux. Les jambes, les pieds, les ongles ont une couleur plombée.

La femelle differe peu du mâle. La couleur de ses ailes, de son dos, est un roux un peu clair, & elle n'a autour de son bec aucune plume qui porte la même couleur; mais toute sa tête est cendrée, à l'ex-

ception des deux taches noires dont il eſt fait mention ci-deſſus. Tout le deſſous de ſon corps eſt cendré. M. *Sonnerat* ayant diſſéqué le géſier de cet oiſeau, n'y trouva que quelques inſectes broyés.

M. *Sonnerat* penſe que le *pendulino* n'eſt pas du nombre de ces oiſeaux qui changent de climat aux approches de l'hiver. Il ne paroît pas craindre le froid, puiſqu'il habite de préférence les pays du Nord, tels que la Pologne, la Wolhinie & la Lithuanie qui eſt entourée de forêts glacées; dans l'été, tout le monde voit les nids qu'il conſtruit dans nos contrées. Le *pendulino* niche deux fois dans l'année; ſavoir, au printems & en été. L'induſtrie qu'il montre dans la conſtruction de ſon nid eſt tout-à-fait ſinguliere. En effet, pour ménager à ſes petits un domicile auſſi ſûr, auſſi commode qu'il eſt poſſible, il ne fait point ce nid ouvert en forme de coupe, comme le commun des oiſeaux, mais fermé par en haut, preſque terminé en pointe & ayant la figure d'un ſac fermé ou d'une beſace; & il le ſuſpend à l'extrémité d'une branche de quelque arbre qui donne ſur l'eau; en l'entortillant avec des brins d'herbes menues, à la maniere des nids penſiles. Il laiſſe à côté, pour y entrer, une porte ronde qui ſe prolonge en un tuyau court. La matiere dont le *pendulino* forme ce nid, eſt un duvet mollet & blanc qu'il arrange avec ſon bec, & auquel il donne la forme d'un drap ſerré & épais: il a ſoin de le munir ou fortifier en dehors par quelques fibrilles, & de garnir le dedans d'une quantité de duvet non ouvré, afin que ſes petits y repoſent mollement. La femelle pond dans ce nid quatre ou cinq œufs dont la coque eſt blanche, & quand les petits ſont éclos, elle les nourrit avec des inſectes de marais.

Les plantes & les arbres qui croiſſent au bord des marais, fourniſſent abondamment à ces oiſeaux la matiere cotonneuſe pour la conſtruction de leurs nids. Les ſaules, les peupliers fleuriſſent dès le commencement du printems, & produiſent bien-tôt des tiges à fruit qui mûriſſent peu de temps après; ſavoir, aux mois d'Avril & de Mai, & répandent avec leurs

graines, une quantité étonnante d'une matière cotonneuse qui voltige dans les airs à une très-grande distance. *Voyez* SAULE & PEUPLIER. Quelques semaines après (un ou deux mois) on voit pousser vigoureusement & fleurir dans ces lieux la masse-d'eau, plante très-commune dans les marais, & dont les feuilles servent à faire des nattes en Italie. Les Habitans des pays marécageux se servent encore de l'espece de bourre, de duvet qui enveloppe l'épi de cette plante, pour en remplir des matelas & des oreillers. *Voy.* MASSE-D'EAU *à l'article* ROSEAU. Le *pendulino* emploie l'une & l'autre de ces matieres pour la construction de son nid; mais plus ordinairement celles que fournissent les saules & les peupliers. La couleur & la nature des nids suffisent pour reconnoître la matiere dont ils sont composés: la matiere de ceux faits avec le duvet des saules & des peupliers, est plus blanche que celle que produit la masse-d'eau.

Quoique le nid de la mésange à longue queue, *parus caudatus*, *sive monticola*, ait quelquefois une sorte de ressemblance avec celui du *pendulino*, qu'il soit également fermé par en haut & comme voûté, laissant pareillement par le côté une ouverture ronde pour y entrer, il en differe en ce qu'il n'est point suspendu comme celui du *pendulino*; la mésange le place seulement dans la bifurcation des branches de quelqu'arbre; elle lui donne une forme arrondie ou ovale, sans en prolonger l'ouverture en un tuyau proéminent en dehors; elle le compose en outre de matieres différentes, dans lesquelles il entre à la vérité beaucoup de duvet, soit du saule, soit du peuplier; & elle ne lui donne pas une consistance aussi serrée; elle l'enveloppe extérieurement de brins d'herbes, de petites feuilles, de lichen & de mousse seche, sans qu'on y distingue le duvet.

M. *Sonnerat* vient de donner, dans le journal de M. *l'Abbé Rozier*, la description d'une mésange du Cap de Bonne-Espérance: elle est plus petite que notre mésange d'Europe: elle a toute la tête, le cou, le dos, la partie inférieure du corps & les petites plumes des ailes d'un gris cendré clair; les grandes plumes des

ailes sont noires, bordées en dehors par une raie longitudinale blanche ; la queue est noire en dessus & blanche en dessous ; le bec, l'iris & les pieds sont noirs. Cette mésange que quelques Naturalistes regardoient improprement comme une espece de *pendulino*, place son nid dans les buissons les plus épais, & le fait avec une espece de coton qui n'est point connu dans le pays. Il ressemble assez à une bouteille; le cou en est étroit ; sur le côté en dehors, il y a une profondeur qui sert de logement au mâle, pendant que la femelle couve les œufs. Lorsque la femelle est sortie du nid, le mâle, en suivant sa compagne, frappe avec force de ses ailes sur les côtés du nid ; & les bords, en se touchant, se lient ensemble, & ferment entiérement l'entrée : c'est ainsi que par une industrie singuliere tous les êtres cherchent à mettre leurs petits à l'abri de la voracité des insectes & des autres animaux qui peuvent leur nuire.

Le *pendulino* paroît être le *rémiz* des Polonois. Le nom *pendulino*, qui approche du latin, exprime assez bien l'instinct de cet oiseau pour suspendre son nid à un arbre.

Le P. *Bonanni*, dans son *Musæum Kirkerianum*, a parlé de cet oiseau. *Cajetan Monti* a consigné dans les *Mémoires de l'Académie de Bologne*, que le *pendulino* se trouve aussi dans le territoire de Bologne, & qu'il surpasse de beaucoup les autres oiseaux par l'industrie qu'il fait paroître dans la maniere de construire & de suspendre son nid ; qu'il est rare de trouver cet oiseau, parce qu'il se cache aisément entre les roseaux & les saules des marais. Le peuple Bolonnois, dit ce même Observateur, le regarde comme un oiseau sacré, & n'ose le toucher, dans la crainte d'attirer sur lui, par sa mort, des dangers ou des malheurs. Il s'imagine encore que ce nid singulier, suspendu sur la porte de la maison, la préserve de la foudre. L'oiseau *pendulino* paroît plus multiplier dans les environs marécageux de la Toscane, que dans ceux du Bolonnois.

PENGUIN ou PINGOUIN, animal bipede, nommé ainsi *propter pinguedinem*. C'est un oiseau d'un genre particulier, & qui se trouve sur plusieurs côtes d'Afri-

que, & notamment dans la baie de Saldagne ; il s'en trouve aussi dans les îles Falkland, à la hauteur du Détroit de Magellan. Il est de la grosseur d'une poule d'Inde ; il a les plumes du dos noires, celles de dessous le ventre sont blanchâtres ; il a le cou ovale, gros & ceint comme d'un collier de plumes blanches : sa peau est rude & aussi épaisse que celle du pourceau. Il a pour ailes deux ailerons, comme de cuir, qui lui pendent des deux côtés en façon de petits bras. Ces especes d'ailes sont courtes & couvertes en haut de petites plumes souvent aplaties, blanches & entremêlées de noires. Ces ailerons lui servent à nager & non à voler. Toutes les autres plumes sont plus longues, barbues, presque molles comme de la soie. Les *penguins* ont la queue très-forte ; ils sautent la plupart du temps dans l'eau, & ne viennent à terre que pour creuser sur le rivage des terriers ou trous assez profonds, où ils nichent trois ou quatre ensemble, & dans lesquels ils pondent, & font éclore leurs petits. Leurs œufs sont bariolés de taches noires ; leur bec est étroit, comme denté, crochu par le bout & plus grand que celui du corbeau : ils ont la queue courte, pointue ; les pieds noirs & plats & de la forme de ceux des oies, quoiqu'un peu moins larges : chaque pied a uniquement trois doigts antérieurs & palmés. Ces oiseaux ne sont point farouches. Ils marchent la tête élevée & droite, laissent pendre leurs ailerons le long de leurs côtés, comme si c'étoit des bras : ils tiennent aussi leur corps droit presque verticalement, & non en situation à-peu-près horizontale, comme font les autres oiseaux ; en sorte qu'à les voir de loin, on les prendroit pour des pygmées ou de petits hommes. On prétend qu'ils ne vivent que de poissons ; cependant leur chair n'en a pas l'odeur, & est d'un assez bon goût : leur peau est si dure, qu'à peine, d'un coup de sabre peut-on leur trancher la tête. L'Auteur de l'*Histoire des Voyages*, *Tome VIII. in-4°. page 76.* dit que le *penguin* tient de l'homme, de l'oiseau & du poisson, étant droit sur ses pieds, ayant des ailerons sans plumes, qui lui pendent & lui servent à nager, & étant garni de manches barrées & rayées de blanc, mais ne volant point. On distingue trois especes de

penguins; 1°. le *grand penguin* qui pese quinze ou seize livres & qui se trouve dans les Mers Septentrionales, tel est celui qui est décrit ci-dessus; 2°. le *penguin vulgaire* & qui se trouve quelquefois sur les côtes de nos Mers, il niche dans les trous des rochers escarpés; ses œufs sont blanchâtres & tachetés de noir; le bout de son bec est peu ou point crochu, ainsi que celui du petit *penguin*; ces deux dernieres especes sont de la grosseur du canard domestique, sur-tout le petit *penguin*. *Voyez* MANCHOT & GORFOU.

PENINSULE, *peninsula*: voyez PRESQU'ILE.

PENNACHE DE MER, est, selon *Rondelet*, un *zoophite marin*, semblable aux pennaches qu'on portoit autrefois aux chapeaux; cependant nos pêcheurs, dit-il, à cause de la ressemblance qu'il a avec le bout de la partie naturelle de l'homme, découverte de son *prépuce*, lui ont donné le nom de cette partie; l'autre bout ressemble à un panache; les franges en sont phosphoriques pendant la nuit. C'est une espece de *mentula marina* ou de *penna marina*, dont *Gesner* a parlé d'après *Aristote*. M. *Vosmaër*, Directeur des cabinets du Prince d'Orange & Stathouder &c. à la Haye, a fait aussi mention d'une nouvelle espece de *penna marina* ou *penne marine*, ou *plume de mer*: on en trouve l'observation dans les *Mémoires des Savans étrangers, présentés à l'Académie des Sciences en 1759*.

PENNAGE: se dit de toutes les plumes qui couvrent le corps de l'oiseau de proie; & même des autres oiseaux. On dit: cet oiseau a le *pennage* blond, roux, noir, cendré, &c. *Voyez à l'article* OISEAU.

PENNATULE. On donne ce nom à l'empreinte de la *plume marine* qui est quelquefois devenue fossile: *voyez* PLUME MARINE.

PENO-ABSOU: *voyez* PINÉ-ABSOU.

PENSÉE ou HERBE DE LA TRINITÉ, *viola tricolor aut herba trinitatis*, espece de violette inodore, que l'on cultive dans les jardins pour la beauté de sa fleur, dont chaque feuille est de trois couleurs, pourpre ou bleu, jaune & blanc. Sa racine est fibreuse: elle pousse de petites tiges rampantes, rameuses, portant des feuilles, les unes arrondies, les autres oblon-

gues & dentelées autour. Ses fleurs sont comme veloutées, & paroissent au printems : il leur succede une coque qui contient des semences menues. Cette plante est détersive, vulnéraire & sudorifique. *Voyez* VIOLIER.

On seme sur couche les graines de pensée : on les transplante dans les plates-bandes le long des terrasses, & on en forme les massifs & les corbeilles des grands parterres. Cette plante croît naturellement & en abondance aux environs de Rouen.

PENTACRINITES. Quelques Lithographes donnent ce nom à l'*encrinite*, dont il est parlé au mot PALMIER MARIN. M. *Bertrand* soupçonne que ce pourroit être une coralline vésiculeuse, contractée avec son polype.

PENTISULCE. *Voyez au mot* QUADRUPEDE.

PEPIN. Se dit de la graine des arbres fruitiers, comme le poirier, le pommier, le coignassier, le cormier, l'oranger, &c. *Voyez l'article* GRAINE.

PÉPINIERE. Semis & plants d'arbres qu'on tient fort serrés sur une même ligne ou sur plusieurs, distans de trois pieds au plus les uns des autres, pour être greffés, levés dans le besoin & ensuite placés à demeure dans un autre terrain.

Une pépiniere est la ressource du verger, du jardin coupé & du potager : c'est dans un tel terrain qu'on seme les noyaux, les pepins, les noix, les amandes, & généralement toutes les graines qui doivent servir à la multiplication des diverses especes d'arbres fruitiers & des diverses sortes d'arbres qui sont propres à peupler les forêts, à planter les possessions rurales, & à embellir les parcs, les jardins & les approches des châteaux & maisons de plaisance : c'est là enfin qu'on éleve une multitude de jeunes sujets destinés à remplacer tout ce qu'il faut arracher. De ces jeunes plantes les unes sont des arbrisseaux venus de pepins ou de noyaux, & qui, malgré l'excellence du fruit dont ils proviennent, ne laissent pas d'être sauvages & d'avoir besoin du secours de la greffe. D'autres sont des boutures, c'est-à-dire, des rejetons qu'on a détachés dans les bois sur des sauvageons, qui sont des plantes

dont les fruits ſont d'une ſaveur auſtere; d'autres enfin ſont des ſauvageons greffés. On peut les tenir enterrés dans des paniers, & par ce moyen on a un arbre tout formé pour être mis à la place de celui qui vient à manquer.

Il faut que la terre d'une pépiniere ne ſoit ni trop graſſe ni trop maigre. Au reſte il n'y a pas de danger que ce ſol ſoit d'une qualité un peu inférieure à celui où on tranſplantera le jeune ſujet. Plus le jeune plant eſt ſerré dans la pépiniere, plus il pouſſe droit. (Il faut cependant obſerver une certaine diſtance, afin de pouvoir arracher le plant ſans couper, ni meurtrir ſes racines, ni celles des arbres voiſins deſtinés à n'être pas arrachés en même temps.) Après la contrainte de cette premiere éducation, on le voit mieux proſpérer au ſortir de la pépiniere lorſqu'il eſt tranſplanté dans un ſol convenable. Ce que nous diſons ici pour les pépinieres particulieres doit auſſi s'appliquer aux pépinieres publiques, dont l'établiſſement eſt des plus ſages & des plus utiles.

PEPITES D'OR. *Voyez au mot* OR.

PERCE-BOIS, *ligni-perda.* Indépendamment des *abeilles perce-bois*, dont nous avons fait mention au mot ABEILLE pag. 51 du premier volume de cet Ouvrage, il y a une autre ſorte d'inſecte qui porte auſſi, mais moins à juſte titre, ce nom. Ce petit *perce-bois* que *Pline* a rangé dans le genre des *teignes*, ſe fait un fourreau de ſoie, qu'il recouvre enſuite par dehors de petits brins de bois pour lui donner plus de conſiſtance. On ne peut trop admirer cet étui qui eſt fait de brins de bois, hachés menu avec les dents & aſſemblés les uns avec les autres comme les poutres des maiſons de Moſcovie; c'eſt la chenille perce-bois qui le conſtruit. Elle loge toujours dedans, & le porte par-tout ſur ſon dos comme une pyramide. Ces chenilles ſe changent en papillons, dont les mâles ſeuls ont des ailes; la plupart d'entre elles ont la peau jaunâtre, tiquetée de brun.

Il y a auſſi des teignes aquatiques qui portent le même nom de *perce-bois* ou *ligni-perdes*, mais celles-ci ſe changent en mouches à quatre ailes, qui ont l'air de

papillons. *Voyez* TEIGNES LIGNI-PERDES. On n'auroit dû ne donner le nom de *perce-bois* qu'à l'insecte appelé *vrillette*, qui taraude réellement le bois. *Voyez* VRILLETTE.

PERCE-BOSSE. *Voyez* CHASSE-BOSSE.

PERCE-FEUILLE, *perfoliata*. On distingue sous ce nom deux especes principales de plantes d'usage en Médecine.

1°. La PERCE-FEUILLE ANNUELLE ou la VRAIE PERCE-FEUILLE, *perfoliata vulgaris*, *aut buplevrum perfoliatum*, *rotundifolium annuum*. Cette plante qui croît dans les champs parmi les blés & les vignes, a une racine grosse comme le doigt, simple, ligneuse, blanche, ayant le goût de la raiponce; elle pousse une seule tige, haute d'un pied ou environ, grêle, ferme, ronde, cannelée, creuse, nouée, rameuse, d'une odeur un peu aromatique. Ses feuilles sont alternes, simples, ovales, nerveuses, de couleur de vert de mer, & d'un goût âcre. Ses fleurs qui paroissent en Juin & Juillet, sont jaunes, en ombelles, composées chacune de cinq feuilles disposées en rose: (M. *Deleuze* observe que les ombelles partielles sont garnies d'une fraise, *involucrum*, de trois à cinq feuilles grandes & larges:) il leur succede des semences jointes deux à deux, oblongues, cannelées & noirâtres. Cette plante est nommée *perce-feuille*, à cause de ses feuilles qui sont comme percées & enfilées par la tige & par les branches: elle est annuelle & se multiplie de graine; au lieu que la suivante est vivace & ne périt point.

Cette perce-feuille est estimée vulnéraire, astringente. Prise en forme de thé ou en poudre, elle est bonne pour ceux qui par quelque chûte ou contusion violente pourroient s'être rompu quelque vaisseau dans le corps: elle convient aussi dans les hernies.

2°. La PERCE-FEUILLE VIVACE ou l'OREILLE DE LIEVRE, *auricula leporis*, *aut buplevrum vulgatissimum folio subrotundo*. Elle croît abondamment aux lieux montagneux, le long des haies & parmi les brousailles. Sa racine est petite, ridée, verdâtre, fibrée & d'un goût âcre: sa tige a quelquefois deux pieds de hauteur, tantôt rougeâtre & tantôt verdâtre; ses feuil-

les sont étroites & nerveuses, ayant à-peu-près la figure d'une oreille de lievre étendue; elles ne tombent point pendant l'hiver: ses fleurs qui paroissent en été, sont jaunâtres, semblables à celles du fenouil; elles sont remplacées par des semences oblongues, assez semblables à celles du persil, cannelées & grises, & d'un goût âcre: elles mûrissent en automne.

Cette plante se plaît dans un terroir gras. Ses feuilles sont détersives, dessicatives & vulnéraires: sa semence est échauffante & apéritive, étant mâchée elle excite à cracher.

PERCE-MOUSSE, *muscus capillaceus major, pediculo & capitulo crassioribus*, (*adiantum aureum.*) Cette plante croît dans les bois, contre les vieilles murailles crevassées & humides, entre la mousse des vieux arbres. Elle est de la longueur du doigt; elle porte beaucoup de feuilles d'un beau jaune, mousseuses, & déliées comme des cheveux vers le bas, unies vers le haut: ses tiges portent à leurs sommets de petites têtes longuettes, pleines d'une fine poussiere qui tombe dans la suite, lorsque ces têtes panchent & s'ouvrent à la maniere de plusieurs especes de mousses. Les Botanistes regardent cette poussiere comme la graine. Ses racines sont filamenteuses. Cette plante est un puissant sudorifique; on en fait usage en forme de thé dans les pleurésies, & pour faciliter l'expectoration, comme des capillaires dont elle est une espece: *voyez ce mot.* Elle est beaucoup plus en usage en Allemagne qu'en France.

PERCE-MURAILLE. *Voyez* PARIÉTAIRE.

PERCE-NEIGE, *narcisso-leucoium.* Cette plante que l'on appelle aussi *violette de Février, violier bulbeux, campane blanche, baguenaudier d'hiver*, croît naturellement dans des prés humides, dans les forêts ombragées, sur certaines montagnes & dans les haies. Sa racine est bulbeuse, composée de plusieurs tuniques blanches, excepté l'extérieure qui est brune, garnie en dessous de fibres blanchâtres, d'un goût visqueux, peu âcre: elle pousse trois, quatre ou cinq feuilles semblables à celles du poireau; ces feuilles sont fortes, lisses, luisantes & verdâtres: du milieu

de ces mêmes feuilles s'éleve une tige à la hauteur de plus d'un demi-pied ; elle eſt anguleuſe, cannelée, creuſe, revêtue avec ſes feuilles juſqu'à la moitié d'une eſpece de fourreau blanc : elle ne porte ordinairement qu'une ſeule fleur à ſa ſommité, quelquefois deux, rarement trois : cette fleur a ſix ou huit feuilles, ſelon la bonté du terroir ; elle eſt en cloche panchée, blanchâtre, avec une tache verdâtre & d'une odeur peu agréable : à cette fleur ſuccede un fruit membraneux, relevé de trois coins, & diviſé intérieurement en trois loges remplies de ſemences arrondies, dures & d'un blanc jaunâtre. Sa racine eſt un émétique doux.

Cette plante fleurit en Février, & diſparoît au mois de Mai, mais ſa racine ſubſiſte en terre comme celle du narciſſe. C'eſt par ſes bulbes qu'on la multiplie ; car on la tranſplante volontiers dans les jardins pour l'y cultiver à cauſe de ſa fleur qui eſt des plus hâtives ; elle orne nos parterres dans la ſaiſon la plus triſte : c'eſt l'avant-coureur du printems.

PERCE-OREILLE ou FORBICIN ou OREILLERE, *forficula ſeu auricularia.* Eſpece d'inſecte différent de l'eſpece appelée *forbicine*, voyez ce mot ; il eſt hémiptere, longuet, fort agile & court vîte. Il a deux petites cornes à la tête, ſes antennes ſont longues & filiformes : l'extrémité de ſon ventre eſt armée de deux pinces ; ſon corps eſt aplati, liſſe & brunâtre ou noirâtre. Cet inſecte pullule beaucoup ; il habite ſouvent ſur les feuilles des choux, dans les creux d'arbres, dans les tiges des plantes, comme celles des panais ſauvages, de l'angélique & des plantes férulacées, dans les trous des murailles, dans le fumier & dans la terre. Il y en a deux ou trois ſortes qui different en groſſeur, en longueur & en couleur : les plus gros ſont jaunâtres, les médiocres & en même temps les plus communs ſont de couleur de châtaigne, & les plus petits ſont noirs & blancs. Les larves de ces inſectes ſe métamorphoſent en nymphes, & enſuite paroiſſent avec des ailes à étuis.

On a nommé *perce-oreille* cet inſecte, parce qu'il recherche avidement les oreilles, où il ſe gliſſe avec viteſſe.

viteſſe. Il mord & il pince les endroits où il s'attache ; ce qui cauſe en cet endroit une douleur que la crainte & le préjugé, ſuite d'erreurs populaires, augmentent beaucoup, & l'on croit quelquefois que le cerveau même en eſt attaqué. Je me ſouviens que dans mon enfance l'un de mes freres me fit entrer un de ces inſectes dans l'oreille & que j'en fus comme fou pendant quatre jours, ce qui ſe termina par un léger mal de tête. Pour me venger je jouai le même tour à ce frere, qui en fut beaucoup plus affecté que moi ; car il y avoit des momens où il couroit ſe plonger la tête dans un ſeau d'eau ; dans d'autres momens il ſaignoit du nez, & il croyoit voir un arc-en-ciel. Ce frere avoit ainſi que moi beaucoup de peur d'en mourir, & nous n'étions pas un inſtant ſans gratter dans notre oreille avec un inſtrument, qui probablement y produiſit tout ou la plus grande partie du mal ; car il faut en convenir, les pinces du perce-oreille ne ſont aucunement redoutables, à peine font-elles une impreſſion ſenſible aux doigts qui en ſont ſaiſis.

Voici un autre fait à-peu-près ſemblable au précédent, & qu'on lit dans le *II. Tom. des Ephémer. d'Allemagne, ann. 1672, Obſ. 266.* Une femme qui demeuroit à cinq milles de Nuremberg, portant un fagot d'herbes, & ſe ſentant fatiguée, après avoir mis ſous ſa tête le linge qui enveloppoit ſa charge, ſans s'appercevoir qu'il étoit rempli d'inſectes, s'étoit endormie. Des *perce-oreilles* entrerent dans ſon oreille droite : un Chirurgien lui tira ſur le champ un de ces inſectes, mais les autres y reſterent, malgré tout l'art des Médecins qu'elle courut conſulter. Ces inſectes multipliés à l'infini, & dont le nombre augmentoit chaque jour, s'étant logés entre le crâne & le cerveau, rendirent la vie inſupportable à cette pauvre femme, qui reſſentoit des douleurs juſqu'à l'extrémité des pieds & des mains dès que ces inſectes changeoient de place. Elle ne pouvoit faire aucun mouvement de la tête, ſans qu'il ſe fît à l'intérieur un certain bruit ou craquement, qui étoit même entendu diſtinctement par ceux qui ſe trouvoient alors autour d'elle. Au bout de vingt ans cette femme, alors âgée de ſoixante-huit ans, fut trouver

le célebre Phyſicien *Volckamer* de Nuremberg. Il fit tout ce qu'il put pour lui procurer quelque ſoulagement : il lui fit injecter dans l'oreille le baume de ſoufre fait avec la térébenthine, qui ne put faire ſortir qu'un ſeul de ces inſectes, encore étoit-il mort; il y a lieu de croire qu'avec le temps ils avoient obſtrué le conduit auditif. La malade uſoit fréquemment & avec confiance, d'une fumigation faite avec la gomme ammoniaque, parce qu'elle s'appercevoit que chaque fois les *perce-oreilles* accouroient à l'orifice de l'oreille, & paroiſſoient prêts à ſortir; mais voyant enfin que rien ne pouvoit la délivrer, elle prit le parti de ſupporter cette incommodité juſqu'à la mort. Un pareil exemple, indépendamment de bien d'autres rapportés par les Phyſiciens, par les Médecins & par les Naturaliſtes, doit faire connoître combien il eſt imprudent de dormir ſur l'herbe & ſous les arbres dans les beaux jours, temps où toute la Nature fourmille d'inſectes toujours dangereux, quand ils s'introduiſent dans les oreilles, ou qu'ils attaquent quelques autres parties délicates de notre corps. Il ne faut cependant pas croire que l'inſecte puiſſe pénétrer dans l'intérieur du crâne, attendu qu'il n'y a point d'ouverture qui y communique.

Le *perce-oreille* cauſe auſſi un grand dommage aux fleurs, ſur-tout aux œillets, dont ils détruiſent entiérement la fleur, en coupant les feuilles au fond du calice. Pour détruire ces inſectes, les Jardiniers fleuriſtes fichent des baguettes aux pieds des fleurs. Au haut de ces baguettes, on met des ongles de pied de mouton: les *perce-oreilles* qui aiment à ſe nicher dans les trous, ne manquent pas de s'y retirer dans les temps humides & pendant la nuit; de ſorte que le matin, en les viſitant, on les y trouve encore, & on les noie dans l'eau, ou on les écraſe : les poules les avalent avec plaiſir. On peut encore détruire ces inſectes en mettant de petites planches ou des tuiles dans les allées des plate-bandes plantées de fleurs : ils s'y cachent pendant le jour, & il eſt facile de les écraſer en levant ces tuiles.

PERCE-PIERRE, *percepier Anglorum*: voyez PASSE-PIERRE. On donne auſſi le nom de *percepier* au

petit pied de lion de montagne, *alchimilla montana minima.*

PERCE-PIERRE ou SINGE DE MER, *alauda non cristata.* C'eſt un poiſſon de la Manche & de la Méditerranée, qui ſe cache entre les pierres, & qui eſt de la claſſe de ceux qui ont les nageoires épineuſes. Il a la tête faite comme celle d'un ſinge, petite & ronde. Ce poiſſon a le corps petit, ainſi que la bouche & les yeux; les dents de la mâchoire ſupérieure ſe trouvent entre celles de la mâchoire inférieure quand la bouche eſt fermée. Il a les nageoires petites, deux près des ouies, deux au-deſſous, une autre qui commence près de la tête & va juſqu'à la queue; & une autre ſous le ventre, qui commence à l'anus, & va pareillement finir proche de la queue; ſa peau eſt mouchetée, liſſe & gliſſante. Il mord les Pêcheurs: ſa chair eſt molle & n'eſt pas d'un goût fort exquis.

PERCERAT. Nom donné au poiſſon nommé *aiglé de mer*, qui eſt une eſpece de paſtenaque. *Voyez le dernier article du mot* PASTENAQUE.

PERCHE, *perca.* Poiſſon de riviere & de mer. Les poiſſons de ce genre ont, dit M. *Deleuze*, ſept côtes à la membrane des ouies, & ſur le dos deux nageoires ou diſtinctes ou continues, mais dont l'antérieure ſeule eſt à rayons épineux.

1°. La PERCHE DE MER, *perca marina.* C'eſt un poiſſon ſaxatile, couvert d'écailles de couleur rouſſe. Il eſt long d'un pied; il a la bouche petite, des dents pointues, pluſieurs traits au dos qui deſcendent juſqu'au ventre; les uns ſont noirs, les autres ſont rouges. Cette perche par ſes ouies, par ſes nageoires & par ſa queue, eſt ſemblable aux autres poiſſons ſaxatiles, mais elle a le ventre plus large; l'anus eſt placé au milieu du corps; il y a enſuite une longue nageoire; ſon ventre eſt de couleur blanche, nuancée de rouge; la chair en eſt tendre, & beaucoup meilleure que celle de la perche de riviere. *Rondelet* dit qu'il l'eſtime mieux farinée & frite ou grillée, que bouillie.

On dit que la perche de mer n'entre jamais dans les rivieres, & que celle de riviere n'entre point dans la mer.

2°. La PERCHE DE RIVIERE, *perca fluviatilis*. Celle-ci, dit *Rondelet*, n'a que le nom de celle de mer : elle en differe par la figure & par la substance de sa chair ; celle de mer est molle, tendre, de facile digestion, & de bon suc. Ces bonnes qualités, dit-il, ne se trouvent point dans celle de riviere, dont la chair est dure, gluante & difficile à digérer ; cependant M. *Andry*, Médecin, & tout le monde la trouve excellente à manger, & *Ausone* l'appelle *les délices de la table*. Cette perche a des traits qui descendent du dos vers le ventre : ces traits sont ou rouges ou rougeâtres, ainsi que ses nageoires & sa queue. La perche du lac de Lausanne & de plusieurs autres endroits, a le fond de couleur cendrée, les taches latérales brunes, de même que le dos : les nageoires du ventre & celles de l'anus sont safranées, les autres grises ; la premiere de celles du dos a quatorze épines, & la postérieure seize rayons non épineux ; son dos est un peu aigu ou bossu ; son ventre est large & plat ; la tête est aplatie sur les côtés ; l'ouverture de la bouche est fort ample, garnie de plusieurs petites pointes ou dents attachées aux os maxillaires, & trois rangées d'autres petites dents rudes au palais, &c. elle a les narines grandes, plus proche des yeux que du bec ; l'iris d'un jaune foncé ; les couvercles des ouies sont composés de part & d'autre de quatre lames osseuses & de sept épines ; la ligne latérale du corps est courbée près du dos.

On met ce poisson dans les petits lacs, les viviers & les réservoirs avec les *tanches*, les *brochets* & les *carpes*. Il n'y a point de poisson de riviere plus plat : ses écailles sont petites, blanches au ventre, jaunes aux côtés, grisâtres ailleurs ; elle a deux nageoires au dos, dont la premiere est la plus grande ; elle en a deux autres au ventre, & une près de l'anus, laquelle est garnie d'un aiguillon : sa bouche est petite & sans dents. On distingue ce poisson, qui a peu d'arêtes, en grande & petite espece. La perche ordinaire a environ huit à dix pouces de longueur ; mais on en prend en grande quantité dans le lac de Neufchatel qui pesent jusqu'à quatre livres, & qui ont un pied & demi de longueur. La pêche s'en fait pendant le courant des mois de Mai

& de Juin : c'eſt un bon poiſſon d'eau douce : ſes écailles ſe ſechent plus vîte que celles des autres poiſſons de riviere. Il y a beaucoup de perches dont les lignes tranſverſales, qui ſont au nombre de ſix, ont une couleur noirâtre : ce poiſſon eſt vorace & très-avide de vers de terre : on le prend aiſément à l'hameçon. *Swammerdam* dit que dans la perche, l'ovaire tient lieu de la matrice & de ſes cornes ; & que ſi l'on examine l'uſage & la ſtructure des laitances de ce poiſſon, on jugera qu'elles reſſemblent exactement à des véſicules, au défaut de teſticules & de proſtates.

La perche nage avec beaucoup de facilité & de vîteſſe : elle eſt armée de certaines arêtes pointues & perçantes, dont la piqûre eſt dangereuſe & difficile à guérir. C'eſt avec ces pointes qu'elle ſe défend contre les poiſſons plus grands & plus forts qu'elle : dès qu'elle voit venir le brochet, elle ſe hériſſe, & de cette maniere elle l'empêche d'approcher : cela n'empêche pas que le brochet n'avale les petites perches, dont les nageoires ſont encore trop molles pour pouvoir lui nuire, & les Pêcheurs ſavent que c'eſt une des meilleures amorces pour le prendre. La perche ſe nourrit de poiſſons, d'écreviſſes ; elle mange auſſi les petits de ſon eſpece. Elle jette ſes œufs en Mars & en Avril : ces œufs ſont liés & enfilés comme ceux de la grenouille, auſſi quelquefois les Pêcheurs les ramaſſent facilement parmi les roſeaux pour les jeter dans les étangs & les viviers ; car ce frai devient quelquefois la proie d'une autre perche ou d'un brochet, ou de quelqu'autre poiſſon. On fait rôtir ſur le gril les œufs de la perche femelle ; ce qui fait encore un aſſez bon manger.

On emploie en Médecine les os qui ſe trouvent dans la tête de ce poiſſon, vers l'origine de l'épine du dos : on les appelle dans les boutiques PIERRES DE PERCHES, *lapides percarum*. On réduit ſur le porphyre ces pierres en poudre ſubtile, & on les donne au poids d'un à deux ſcrupules, pour diſſoudre la pierre des reins. Mais nous n'avons guere de foi à ce remede : quelques anciens Médecins le recommandent dans la pleuréſie, en place des *mâchoires de brochet*. Toutes ces préparations ne conviendroient-elles pas mieux dans les den-

tifrices pour blanchir les dents, ou comme abſorbans?

Ruiſch donne la notice de pluſieurs eſpeces de *perches des Indes*, où l'on voit que celle d'Amboine differe peu de la nôtre, ſa queue eſt fourchue & marquée de deux taches noires. La *perche* de Ternate & celle de Rode-Baars, n'ont de commun avec notre *perche*, que la couleur de leurs écailles & le goût de la chair.

PERDRIX, *perdix*. C'eſt un genre d'oiſeau que des Naturaliſtes méthodiſtes ont rangé dans l'ordre des gélinotes. On diſtingue pluſieurs eſpeces de perdrix, qui toutes ſont bonnes à manger: elles ne ſe perchent point ordinairement ſur les arbres; elles font du bruit en volant; leur vol eſt bas, dure peu, & a peu d'étendue: elles ont quatre doigts, dont trois devant & un derriere; leur queue eſt courte.

1°. La PERDRIX GRISE ou PERDRIX GOUACHE, *perdix cinerea*. C'eſt la perdrix ordinaire, on la nomme auſſi *perdrix cendrée*; elle habite les champs & les prés. Selon *Willughby* & *Albin*, le mâle peſe quatorze onces ou environ. Cet oiſeau a depuis le bout du bec juſqu'au bout des ongles quatorze pouces de longueur, & près de vingt pouces d'envergure; ſon bec eſt brun d'abord, enſuite blanchâtre; ſes yeux ont l'iris jaunâtre; la poitrine eſt marquée d'une tache rouſſe en forme de fer à cheval, ce que n'a point la femelle: on voit certaines excroiſſances rouges au deſſous des yeux: le menton & les côtés de la tête ſont safranés d'abord, puis d'un bleu cendré, tacheté de lignes noires tranſverſales, enſuite griſes-jaunâtres: le deſſus du corps eſt varié de roux, de cendré & de noirâtre: le pennage contient vingt-trois grandes plumes à chaque aile, brunâtre, puis d'un blanc jaunâtre: la queue eſt longue de trois pouces & demi, & compoſée de douze plumes jaunâtres & à pointes cendrées: les jambes ſont nues au deſſous des jointures, & n'ont aucun veſtige d'éperon, excepté le mâle qui a un ergot obtus à la partie poſtérieure du pied: les pieds ſont verdâtres, & blanchâtres dans un âge avancé; les doigts ſont liés enſemble à l'enfourchement par une eſpece de membrane, comme dans les coqs de bruyere.

Cet animal encore jeune, a une chair ſi ſavoureuſe

& si saine, qu'on la préfere, sur-tout en été & en automne, à celle de tous les autres oiseaux. Il se nourrit de fourmis & de leurs œufs, de limaces, de grains de blé, de baies, de chatons de coudrier & de bouleau, & même de feuilles vertes. La perdrix produit beaucoup de petits, car elle pond à chaque couvée seize à dix-huit œufs : son nid est une petite fosse presque à fleur de terre, où se trouvent quelques brins de paille ou d'herbe seche mis au hazard ; les vieilles perdrix y portent plus d'attention. Ces œufs ont la coque assez ferme, & d'un gris jaunâtre : le temps de l'incubation est de vingt-deux jours ; pendant ce temps le mâle reste aux environs du nid, & accompagne sa femelle lorsqu'elle releve pour chercher à vivre. Comme la femelle est seule chargée du soin de couver, elle éprouve pendant ce temps une mue considérable ; car presque toutes les plumes du ventre lui tombent : on prétend encore qu'elle ne quitte jamais ses œufs sans les couvrir de feuilles. Les Italiens, chez qui cette espece de perdrix est plus rare que la perdrix rouge, l'appellent *starna perdice*, perdrix étrangere : elle ne soutient pas long-temps le vol, à cause de la pesanteur de son corps & de la petitesse de ses ailes ; elle court mieux qu'elle ne vole : cependant la petite perdrix grise nommée *roquette*, très-commune en Normandie, a le vol plus léger, moins bas, & se laisse difficilement approcher des Chasseurs. En hiver les vieilles & les jeunes perdrix se réunissent en société, elles se trouvent toujours ensemble ; c'est ce qu'on appelle *couvée* ou *volée* ou *compagnie de perdrix* : mais au commencement du printems lorsque le mâle cherche à s'accoupler avec la femelle, l'amour qui avoit formé la volée, la divise pour en unir les membres plus étroitement : c'est alors qu'elles volent deux à deux ; celles mêmes dont par quelque accident les pontes n'ont point réussi, se rejoignent ensemble & aux débris des compagnies qui ont le plus souffert, forment sur la fin de l'été des compagnies souvent plus nombreuses que les premieres, & qui subsistent jusqu'à la pariade de l'année suivante.

Les perdrix, généralement parlant, sont d'un tem-

pérament fort chaud, auſſi ſentent-elles les influences du premier printems ; c'eſt la ſaiſon de leurs amours. Leurs chants amoureux charment le ſilence de la campagne pendant le crépuſcule du matin & du ſoir. Ce couple emplumé ne ſe quitte plus, il ſe joue dans les prairies ; les mâles dont les teſticules reſtent cachés l'hiver, ou peu apparens dans cette ſaiſon, ſe montrent au printems & en été avec un appareil de ces organes qui eſt d'une groſſeur très-conſidérable, eu égard à la proportion du corps : tout chez eux annonce à leurs femelles le déſir & le beſoin de multiplier. Les mâles les plus empreſſés ſe battent quelquefois vigoureuſement pour une femelle, qui en paroît bientôt plus docile. On faiſoit autrefois des combats de perdrix, & ces combats étoient fort vifs : quelquefois auſſi les femelles ſe diſputent entre elles le choix du nouvel arrangement, & ſe battent à outrance. Faire la guerre & l'amour, dit M. *de Buffon*, ne ſont preſque qu'une même choſe pour la plupart des animaux, & ſur-tout pour ceux en qui l'amour eſt un beſoin auſſi preſſant qu'il l'eſt pour la perdrix : auſſi les femelles de cette eſpece pondent-elles ſans avoir eu de commerce avec le mâle, comme les poules ordinaires. Ces oiſeaux ont l'odorat fin, & aiment à faire la poudrette : ils ſe trouvent preſque par toute l'Europe ; on les prend avec le chien couchant & le fuſil, rarement elles échappent au plomb meurtrier. On pourroit les apprivoiſer & les faire habiter pêle-mêle avec la volaille de baſſe-cour : *voyez ce qui en eſt dit à l'article* FAISAN. Les perdrix recherchent la compagnie de preſque tous les quadrupedes, comme chevaux, bœufs, cerfs, chevreuils, &c. & cette ſociété leur eſt ſouvent fatale. Les gens de la campagne dans les pays où il eſt défendu de chaſſer, ſavent s'en dédommager au moyen d'une perdrix femelle nommée *chanterelle*, qui par ſon chant & enfermée dans une cage attire les mâles des environs le ſoir à la brune, ſur-tout dans le temps que ces oiſeaux s'apparient : c'eſt ainſi qu'on vient aiſément à bout de les ſurprendre en plein champ : cette chaſſe ſe fait au filet, elle eſt même amuſante pour les Dames. La vie de ces oiſeaux eſt de ſeize ans ; les femel-

les vivent jusqu'à vingt ans & plus. Les perdrix ont beaucoup de fumet, & les chiens, pour peu qu'ils aient de nez, les sentent de loin.

Nous avons dit que le mâle n'a point pris de part au soin de couver les œufs, il se tient ordinairement à portée du nid, attentif à sa femelle, & toujours prêt à l'accompagner lorsqu'elle se leve pour aller chercher de la nourriture, & son attachement est si fidele & si pur, qu'il préfere ces devoirs pénibles à des plaisirs faciles que lui annoncent les cris répétés des autres perdrix, auxquels il répond quelquefois, mais qui ne lui font jamais abandonner sa femelle pour suivre l'étrangere. Au bout du temps marqué lorsque la saison est favorable & que la couvée va bien, les petits percent leur coque assez facilement, & à peine sont-ils éclos, souvent encore couverts des débris de leur coquille, qu'ils courent à la suite de la mere & du pere, qui les appellent sans cesse, les promenent, leur montrent les insectes, les graines, en un mot, la nourriture qui leur convient, & leur apprennent à la chercher, soit dans les prés, soit dans les bois, &c. à se la procurer en grattant la terre avec leurs ongles. A leurs cris les poussins se rassemblent; il n'est pas rare de trouver le pere & la mere accroupis l'un auprès de l'autre, & couvrant de leurs ailes leurs enfans qui se réchauffent, se reposent, & dont les têtes sortent de tous côtés avec des yeux fort vifs. Dans ce cas le pere & la mere se déterminent difficilement à partir, & un Chasseur qui aime la conservation de son gibier, se détermine encore plus difficilement à les troubler dans une fonction si intéressante. L'histoire des oiseaux fournit des exemples de tendresse & d'un instinct admirables: chez les perdrix ces qualités éclatent autant dans les alarmes que dans les soins d'une paisible éducation; en effet, lorsque quelqu'un, ou si un chien s'emporte & s'approche trop près de leur nid, en un mot, que le péril vienne à menacer la famille, c'est toujours le mâle qui part le premier en poussant des cris particuliers, réservés pour cette seule circonstance; il ne manque guere de se poser à trente ou quarante pas, & on en a vu plusieurs fois revenir sur le chien en battant des

ailes, tant l'amour paternel inspire de courage aux animaux les plus timides : mais quelquefois il inspire encore à ceux-ci une sorte de prudence & des moyens combinés pour sauver leur couvée ; on a vu le mâle après s'être présenté, prendre la fuite, mais fuir pesamment & en traînant de l'aile, ou courir en boitant comme pour attirer & engager adroitement l'ennemi par l'espérance d'une proie facile, & fuyant toujours assez pour n'être point pris, mais pas assez pour décourager l'avide Chasseur à le suivre. C'est ainsi qu'il l'écarte de plus en plus de la couvée ; d'un autre côté, la femelle qui part un instant après le mâle, s'éloigne beaucoup plus rapidement au vol, plus loin & dans une autre direction ; à peine s'est-elle abattue, qu'elle revient sur le champ en courant le long des sillons & s'approche de ses petits qui, tout foibles qu'ils sont alors & quoiqu'incapables de voler, sont déjà si rusés, qu'il est comme impossible de les trouver ; ils se sont blottis chacun de son côté dans les herbes & dans les feuilles : là ils ne font pas le moindre bruit, ni le plus petit mouvement, ils se laisseroient plutôt écraser sous les pieds du Chasseur que de remuer de place. La mere rassemble promptement ses petits, & avant que le chien qui s'est emporté après le mâle ait eu le temps de revenir, elle les a déjà emmenés fort loin : la ruse cesse quand tout est tranquille, & le mâle revient aussitôt au cri de sa femelle.

C'est une remarque assez généralement vraie parmi les animaux, que l'ardeur qu'ils éprouvent pour l'acte de la génération est la mesure des soins qu'ils prennent pour le produit de cet acte : tout est conséquent dans la Nature, & la perdrix en est un exemple ; car il y a peu d'oiseaux aussi lascifs, comme il en est peu qui soignent leurs petits avec une vigilance plus assidue & plus courageuse. Cet amour de la couvée dégénere quelquefois en fureur contre les couvées étrangeres, que la mere poursuit souvent & maltraite à grands coups de bec. On nomme *perdreaux* les petits dès qu'ils commencent à voler. On a observé qu'il naît ordinairement dans l'espece des perdrix un tiers de coqs ou mâles plus que de femelles.

On préfere communément les perdreaux rouges aux gris, mais sans fondement; car les bons connoisseurs trouvent plus de fumet dans les gris, sur-tout quand on les laisse faisander pendant quelques jours à l'air. La vieille perdrix est excellente en ragoût ou en pâté. Cet oiseau fournit un bouillon d'un bon suc, très-restaurant & très-utile aux convalescens d'un tempérament pituiteux & mélancolique. Le perdreau rôti & assaisonné d'un suc d'orange aigre ou de citron, est très-bon dans les diarrhées qui viennent de la dépravation du suc stomacal & du relâchement des intestins: on se sert encore en Médecine du sang & du fiel des perdrix pour les plaies & les ulceres des yeux, & pour les cataractes: on y instille ces liqueurs toutes chaudes & sortant de l'animal qu'on vient de tuer. Les plumes de cet oiseau brûlées, semblablement à celles de toutes les autres especes, sont utiles contre l'épilepsie & les suffocations hystériques.

2°. La PERDRIX ROUGE ou PERDRIX FRANCHE ou PERDRIX GAILLE, *perdix rufa*. C'est un oiseau fort connu dans nos provinces méridionales & ailleurs; il s'apprivoise plus aisément que la perdrix grise ordinaire. Il est aussi d'un cinquieme plus grand; il a l'iris, le bec, les jambes rouges, les serres sont brunes; cette perdrix a de petits ergots; la plante du pied est d'un jaune sale; la tête, le cou, la poitrine, le croupion & le dehors des cuisses sont de couleur de frêne; le bas du cou & du dos est teint d'un brun jaunâtre; le dessous des oreilles & le menton jusqu'au milieu de la gorge sont blancs, il se trouve cependant dans le coin de la même mâchoire une tache noire, cet espace blanc est entouré d'un bord noir; les plumes des côtés sont joliment colorées de noir, de jaune pâle, de rouge brun & de cendré. Ces perdrix ont l'instinct moins social que les grises; chaque famille ne vit point toujours réunie en une seule bande ou volée.

Le chant des perdrix rouges est différent de celui des autres; elles paroissent se plaire davantage dans les lieux montagneux remplis de pierrailles, de buissons & de bruyeres: elles ne partent pas toutes ensemble, mais les unes après les autres, & quoiqu'elles

ſoient dans le même canton, elles ſont toujours ſéparées. Lorſque la femelle couve, le mâle la quitte & la laiſſe ſeule chargée du ſoin de ſes petits. Quand un oiſeau ou un Chaſſeur ou un chien les pourſuivent, elles ſe retirent dans les trous de lapins, ou ſe perchent ſur les arbres ſelon l'ennemi qu'elles ont à éviter. Quand les femelles ont des petits nouvellement éclos, & qu'elles voient que le Chaſſeur s'approche d'elles avec les chiens, elles s'enfuient en faiſant de petits vols comme ſi elles étoient eſtropiées ou avoient une aile rompue; c'eſt ce que les Chaſſeurs appellent *traîner*. Cette ruſe de la part des perdrix rouges a le même but que celle des perdrix griſes, dont nous avons parlé ci-deſſus. On en a vu, après s'être enfui en traîneuſes, revenir à plein vol vers leur nid, & avoir la hardieſſe de ſe défendre contre les chiens qui mangeoient leurs petits; tant eſt grand l'amour des femelles des animaux pour leurs enfans. On trouve quelquefois de ces eſpeces de perdrix blanchâtres, mais le bec & les pieds reſtent toujours rouges. Les perdreaux rouges ſont difficiles à élever; il faut des ſoins, leur donner à manger des fourmis ou leurs nymphes, & renouveller ſouvent leur eau: à ſix ſemaines ſi on ne leur donne la liberté des champs, ils ſont attaqués d'une maladie contagieuſe, accompagnée d'enflure & d'une ſoif dangereuſe à ſatisfaire.

3°. La PERDRIX BLANCHE ou LAGOPEDE ou POULE DE NEIGE, *lagopus avis*. C'eſt l'oiſeau que nous avons décrit au mot ARBENNE: les Suédois l'appellent *ſnoeripa*, les Lapons *cherupa*, & les Griſons *rabolane*. On en voit beaucoup dans les forêts de Northland & de la Laponie; c'eſt une eſpece de gélinote, & M. *Briſſon* l'a décrite ſous le nom de *gélinote blanche*.

Nous avons dit au mot *arbenne* que le caractere diſtinctif du lagopede ou de la perdrix blanche, & qui eſt un attribut unique parmi ces oiſeaux, c'eſt d'avoir, comme le lievre, le deſſous des pieds velus. Les lagopedes volent par troupes, & ne volent jamais bien haut; car ce ſont des oiſeaux peſans; lorſqu'ils voient un homme, ils reſtent immobiles ſur la neige pour n'être pas apperçus; mais ils ſont ſouvent trahis par leur blan-

cheur, qui a plus d'éclat que la neige même. Au reste, soit stupidité, soit inexpérience, ils se familiarisent assez aisément avec l'homme : souvent pour les prendre, il ne faut que leur présenter du pain, ou même faire tourner un chapeau devant eux, & saisir le moment où ils s'occupent de ce nouvel objet pour leur passer un lacet dans le cou, ou pour les tuer par derriere à coups de perche : on dit même qu'ils n'oseroient jamais franchir une rangée de pierres alignées grossiérement, comme pour faire la premiere assise d'une muraille, & qu'ils iront constamment le long de cette humble barriere, jusqu'aux pieges que les Chasseurs leur ont préparés. Ils vivent des chatons, des feuilles & des jeunes pousses de pin, de bouleau, de bruyere, de myrtille & d'autres plantes qui croissent ordinairement sur les montagnes : c'est sans doute à la qualité de leur nourriture qu'on doit imputer cette légere amertume qu'on reproche à leur chair, qui d'ailleurs a le goût de celle du lievre.

Les perdrix de l'Islande, dont *Anderson* donne la description dans son *Hist. Nat. du Groënland*, sont des especes de perdrix blanches, semblables à celles des Alpes & de la Laponie. Il dit qu'elles amassent dans leurs nids leur nourriture pour l'hiver, en la rangeant par petits tas : elles ont cette précaution, parce qu'elles passent l'hiver dans le pays qui est alors terrible par le froid & la stérilité, & par la chute continuelle des neiges. On prétend que les perdrix grises & rouges ne se mêlent point ensemble : quelquefois les mâles semblent se donner l'échange de leurs femelles, les suivre constamment & témoigner de l'amour ; mais on ne les a point vu s'appareiller. Cet amour étranger n'a d'effet que la jalousie ; il trouble seulement le ménage, & ces soins assidus ne produisent qu'une importunité sans fruit.

4°. La PERDRIX DE LA NOUVELLE ANGLETERRE, *perdix novæ Angliæ*. Elle est plus petite que notre perdrix ordinaire ; son bec est noir, & le plumage assez semblable à celui de la bartavelle, excepté le dos qui est bigarré de noir ; sa queue est courte, les jambes & les pattes sont d'un brun clair. On trouve cet oiseau

à la nouvelle Angleterre & à la Jamaïque. *Klein* croit que c'eſt la même que la perdrix du Bréſil, *perdix Braſiliana jambu dicta Piſoni ;* c'eſt l'*ococolin :* ſes œufs ſont d'un très-beau bleu. La groſſe perdrix du Bréſil, *gallina ſylveſtris macucagua Braſilienſibus dicta*, eſt la perdrix de la Guiane ; elle eſt, dit-on, plus groſſe qu'une poule, ſes œufs ſont bleuâtres & plus gros que ceux d'une poule. On croit que c'eſt l'*oiſeau trompette* de quelques Voyageurs.

5°. La PERDRIX DE GRÈCE, *perdix Græca.* C'eſt la *bartavelle*, elle a le bec & les pieds rouges ; on en trouve beaucoup dans les iles Cyclades & de Candie, & dans les hautes montagnes, ſur-tout dans les Alpes : elle fait beaucoup de bruit en criant & en pondant. On dit que dans les temps qu'elle eſt en amour, elle articule en chantant par pluſieurs fois *chacabis.* Elle pond & couve dans les plaines contre une groſſe pierre ; ſes œufs ſont tiquetés de rouge & de la groſſeur des œufs de jeunes poules. La vraie *bartavelle* eſt beaucoup plus groſſe que la perdrix rouge ; l'iris, le bec & le deſſus des doigts ſont rouges. *Duloire*, pag. 19, dit d'après *Buſbequius* en parlant de cette perdrix, que les perdrix de Scio ſont plus privées que les poules de France, & ne ſont pas en moindre nombre dans les maiſons. Mais ce qui eſt ſingulier, c'eſt qu'un Pâtre public donnant de grand matin un coup de ſifflet, auſſitôt ces oiſeaux accourent & ſe rangent autour de lui pour le ſuivre aux champs, d'où elles reviennent le ſoir au même ſignal.

6°. La PERDRIX DE DAMAS ou DE SYRIE, *perdix Damaſcena.* C'eſt la *gélinote des Pyrenées* de M. *Briſſon*, *Bonaſa Pyrenaïca.* Elle eſt plus petite que la perdrix griſe : ſur le cou & ſur le dos elle a le plumage de la bécaſſe ; le pennage des ailes eſt mélangé de blanc, de brun & de fauve ; elle a un cercle au bas du cou comme le merle à collier : ce cercle eſt fauve, jaune & rouge, le reſte du plumage eſt comme dans nos perdrix ordinaires : elle a les jambes couvertes de plumes comme les perdrix blanches : elle a un caractere ſi ſauvage qu'on ne peut l'apprivoiſer : ſa chair eſt plus délicate que celle de nos perdrix.

7°. La PERDRIX DE MONTAGNE, *perdix montana*, reſſemble aſſez à notre perdrix griſe avec qui elle ſe mêle lorſqu'elle deſcend dans les plaines. La perdrix rouſſe des Antilles, eſt le *pigeon violet de la Martinique*. Les perdrix de la Guadeloupe, ſont des eſpeces de *tourterelles* : voyez ce mot. Celles de la Baie d'Hudſon ſont des coqs de bruyeres ; celles de la Virginie, de la Côte d'Or, de la Gambra, ſont toutes différentes des nôtres ; leur chair eſt d'un goût exquis : elles ſont peu farouches ; leur plumage eſt fort varié : elles ont beaucoup plus de viteſſe dans leur courſe, & en courant elles retrouſſent la queue comme font les poules : les perdrix ſont auſſi fort communes à Congo, à la Chine, à Madagaſcar & à la Louiſiane : leur chair a peu de fumet.

PERDRIX, eſt le nom que les Amateurs donnent à une eſpece de coquille univalve du genre des *conques ſphériques* ou *tonnes*, & M. *Adanſon* met ce coquillage parmi les coquilles operculées du genre des pourpres à canal court, échancré & ſimple : il donne le nom de *teſan* à l'eſpece qu'il a obſervée ſur les côtes du Sénégal.

PERDRIX DE MER. *Voyez* SOLE. On donne auſſi le nom de PERDRIX DE MER, *glareola*, à un genre d'oiſeau qui fréquente les bords des mers, des fleuves & des étangs, & dont on diſtingue quatre eſpeces : ces oiſeaux ont trois doigts antérieurs & un poſtérieur. La partie ſupérieure du bec eſt convexe & comprimée latéralement vers la pointe. La perdrix de mer eſt de la groſſeur du merle, l'eſpece à collier pond ſept œufs oblongs : celle du Sénégal eſt toute jaune.

PERDRIX DES PRAIRIES. *Voyez* FRANCOLIN.

PERDRIX DU SÉNÉGAL. *Voyez* BIS-ERGOT.

PERDRIX DES TERRES NEUVES. *V.* PINTADE.

PERE DE FAMILLE. Nom que l'on donne, d'après *Swammerdam*, à un papillon nocturne, à cauſe de l'aſſiduité qu'il marque à ſa femelle, & du ſoin qu'il a de la venir retrouver pour féconder ſes œufs. C'eſt le papillon de la *chenille à broſſe du prunier*. *Voy. le ſecond volume de cet Ouvrage, p. 402.* On ne découvre les ailes de ſa femelle qu'à la loupe ; en revan-

che ſes ſix jambes ſont très-viſibles, au lieu que dans le mâle elles ſont tellement cachées ſous les ailes, que l'on ne peut appercevoir que les deux de devant entre les antennes & les ailes ſupérieures. La femelle eſt extrêmement féconde, tout ſon ventre eſt plein d'œufs que l'on diſtingue très-bien à travers la peau qui eſt très-mince, & qui s'inſinue dans toutes les ſéparations des œufs, de ſorte que le ventre de cet inſecte reſſemble en quelque ſorte à une petite grappe de raiſin. Cette femelle colle ſes œufs à la ſurface de la coque où elle eſt née, ſans jamais la quitter; ces œufs ſont ronds, perlés & cerclés de pourpre, très-durs & ne s'affaiſſent point en ſe deſſéchant, comme ceux des abeilles & des autres inſectes: ce papillon provient d'une chenille d'une rare beauté. *Voyez l'article cité ci-deſſus.*

PERE NOIR, *paſſer niger.* On donne ce nom à un moineau franc, qui ſe trouve à la Jamaïque, au Mexique, à la Martinique, dont le bec & le plumage ſont d'un beau noir, & qui a la gorge rouge; on en voit aux Indes une eſpece dont le plumage tire ſur la couleur d'acier poli, ſes yeux ſont noirs & entourés de blanc.

PERELLE, ou ORSEILLE D'AUVERGNE, ou ORSEILLE DE TERRE, *perella.* C'eſt une ſubſtance fongueuſe, terreuſe & ſeche, en petites écailles griſâtres, qu'on nous apporte de Saint-Flour en Auvergne: on la retire de deſſus les rochers, où elle a été formée en lichen verreux, ſemblable à un amas de poudre que les vents y auroient porté. Le ſol qui produit cette ſorte de lichen, eſt une eſpece de granite, & ſouvent une pierre de volcan: avec de l'urine & de la chaux, on parvient à développer les couleurs rouges qu'elle contient. *V.* ORSEILLE. On prétend qu'elle entre auſſi dans la compoſition du tournéſol en pâte.

PÉRÉNOPTERE. Cet oiſeau paroît faire le dernier degré de nuance entre les vautours & les aigles, tenant infiniment plus aux vautours qu'aux aigles; il a la tête d'un bleu clair, le cou blanc & nu, c'eſt-à-dire couvert comme la tête d'un ſimple duvet blanc, avec un collier de petites plumes blanches & roides au-deſſous du cou en forme de fraiſe; l'iris des yeux eſt d'un jaune-

jaune-rougeâtre, le bec & la peau nue qui en recouvre la base sont noirs, l'extrémité crochue du bec est blanchâtre, le bas des jambes & les pieds sont nus & de couleur plombée; ses ongles sont noirs, moins longs & moins courbés que ceux des aigles; cet oiseau est sur-tout fort remarquable par une tache brune en forme de cœur qu'il porte sur la poitrine au-dessous de sa fraise; & cette tache brune paroît entourée ou plutôt liserée d'une ligne étroite & blanche : cet oiseau est en général d'une vilaine figure & mal proportionné; il est même dégoûtant par l'écoulement continuel d'une humeur qui sort de ses narines, & des deux autres trous qui se trouvent dans son bec par lesquels s'écoule la salive : il a tous les vices de l'aigle, sans avoir aucune de ses qualités, se laissant chasser & battre par les corbeaux, étant paresseux à la chasse, pesant au vol, toujours criant, lamentant; toujours affamé & cherchant les cadavres. Cette espece d'oiseau est plus rare que celle des vautours : on la trouve, mais en petit nombre, dans les Pyrénées, les Alpes & les montagnes de la Grece.

PERIDOT. Les Joailliers François donnent ce nom à une pierre précieuse d'un vert un peu jaunâtre : il y a le peridot Oriental très-net & foncé en couleur; le peridot Occidental n'a pas tant d'éclat ni une couleur aussi pure. *Voyez l'article* ÉMERAUDE.

PÉRIGORD ou PIERRE DE PÉRIGUEUX. *Voyez à la suite du mot* FER.

PÉRINE VIERGE. *Voyez au mot* PIN.

PERLE, *perla*. Insecte à antennes longues & filiformes, & de la classe de ceux qui ont quatre ailes nues. On distingue quatre barbillons à sa bouche & trois petits yeux lisses sur la tête. La perle vient d'une larve aquatique, longue & à six pieds, & ressemble beaucoup à la frigane (*phrygane*). Cependant la perle en differe, sa queue étant terminée par deux longues appendices fort menues; de plus ses ailes croisées sont couchées le long de son corps.

On reconnoîtra sans peine la larve de la perle, lorsqu'on saura qu'elle habite dans l'eau & qu'elle est renfermée comme la teigne aquatique dans une espece de

tuyau, dont l'intérieur est de soie filée par le petit animal, & dont l'extérieur est recouvert, tantôt de sable, tantôt de morceaux de coquilles, tantôt de parties de plantes que l'animal a fortement attachées avec des fils à son fourreau. Il y a de ces fourreaux ou tuyaux qui sont très-jolis, suivant les différentes especes de ces insectes; car on en voit qui étant métamorphosés, sont bruns à raies jaunes, d'autres n'ont que les pattes jaunes, ou les ailes pâles, &c. On trouve fréquemment dans les eaux dormantes de ces vers aquatiques qui s'habillent avec la lentille d'eau, taillée, coupée en carrés réguliers & ajustés bout à bout. Lorsque le ver ou larve, qui est hexapode, veut se changer en nymphe, il bouche l'ouverture de son fourreau avec des fils d'un tissu lâche par lequel l'eau pénetre, mais qui défend l'entrée aux insectes voraces; sa chrysalide est légérement gazée; c'est une nymphe, à travers de laquelle on découvre aisément alors la nouvelle forme de l'insecte. La perle sur le point de changer d'élément, vient à fleur d'eau, quitte son fourreau, s'éleve dans l'air, va jouir des douceurs de la campagne, voltige sur les fleurs & les arbres, mais bientôt elle s'accouple & est rappelée sur le bord de l'eau pour y déposer ses œufs, d'où l'on voit naître sa postérité.

PERLES. *Voyez à l'article* NACRE DE PERLES.

PEROOLE, est le *bluet* ou *aubifoin*: voyez BLUET.

PEROUASCA, nom donné à un petit quadrupede très-joli, qui se trouve en Russie, en Pologne & sur-tout en Volhinie; il est nommé par les Russes, *perewiazka*, & par les Polonois, *prezewiaska*, noms qu'on peut rendre par la dénomination de *belette à ceinture*. Cet animal est plus petit que le putois; il est couvert d'un poil blanchâtre, rayé transversalement de plusieurs lignes d'un jaune roux, qui semblent lui faire autant de ceintures. Le *perouasca* demeure dans le bois & se creuse un terrier. Sa peau est recherchée & fait une très-jolie fourrure.

PERRIERE. *Voyez à l'article* CARRIERE.

PERROQUET, *psittacus*, est un genre d'oiseaux Indiens, mis par *Linnæus* dans l'ordre des oiseaux de proie, quoiqu'ils soient moins carnivores que frugi-

vores. Le caractere générique du perroquet, eſt d'avoir quatre doigts aux pieds, dont deux ſont dirigés en avant & deux en arriere, garnis d'ongles crochus; le bec court & épais; la mâchoire ſupérieure eſt crochue & pointue; la partie inférieure de leur bec eſt ronde, tranchante & beaucoup plus courte que la ſupérieure qui eſt terminée en bec de plume à écrire; &, ce qui eſt remarquable & unique chez ces oiſeaux, c'eſt qu'ils ont le deſſus du bec un peu mobile, du-moins cette mâchoire s'articule par ſynchondroſe avec le crâne: leur mâchoire inférieure ſe meut comme dans les autres oiſeaux; elle eſt fort large, & ſon articulation eſt telle qu'elle peut s'avancer en avant & reculer en arriere. Une autre ſingularité du *perroquet* regarde ſes paupieres dont la ſupérieure eſt mobile comme chez le chat-huant; elle s'abaiſſe en même temps que la paupiere inférieure s'éleve, mais beaucoup moins que la paupiere inférieure ne s'abaiſſe. Dans le *perroquet* mort, les deux paupieres ſe trouvent jointes enſemble ſur la cornée; elles ont fait chacune la moitié du chemin pour s'y rencontrer. Dans tous les autres oiſeaux, c'eſt la paupiere inférieure qui s'éleve dans le moment qu'ils meurent, & elle va joindre la paupiere ſupérieure qui ne s'abaiſſe en aucune maniere.

Les *perroquets* ont les pieds & les doigts charnus, la tête groſſe, le bec & le crâne durs, les narines rondes. En général les perroquets ſont dociles & s'attachent plus ou moins aux hommes & aux femmes: il eſt rare qu'ils n'en préferent l'un à l'autre: ceci proviendroit-il de la modification des paſſions ou des organes diverſement agités par la diverſité de leur ſexe, lorſqu'on leur parle ou qu'on les regarde? J'ai vu & entendu à Paris un *perroquet* cendré jurer toujours & hériſſer ſes plumes à l'aſpect de ſon maître, mais changeant de ton à l'arrivée d'une Dame, rire, chanter les principaux airs de la *Serva Padrona*, (Servante Maîtreſſe): quelquefois il accompagnoit de ſon chant ſa maîtreſſe qui jouoit du clavecin ou de la harpe, & exécutoit comme un perſonnage de théâtre, avec elle, différens airs avec l'inflexion de la voix, d'une ma-

niere & d'une précision vraiment surprenantes. M. *Vosmaër* dit en avoir vu un à Rotterdam qui avoit les mêmes talens. Combien d'autres *perroquets* ne pourroit-on pas citer en exemple ? Il faut en convenir, la vie privée, les leçons, l'éducation, l'industrie humaine ont adouci les mœurs de ce bipede, & ont développé en lui l'organe de la voix & en ont perfectionné la souplesse. A la vérité ces oiseaux ont la langue large & faite comme une graine de calebasse, ce qui joint à la disposition du larinx & de la glotte, leur donne beaucoup de facilité pour articuler des mots, parler distinctement, chanter des chansons, siffler des airs, contrefaire des animaux, sur-tout le chien & le chat, imiter le bruit d'un tambour, &c. Tous tiennent leur mangeaille avec un pied élevé en l'air qu'ils portent à leur bec, comme font les oiseaux de proie ou du genre corbin : en cette attitude, on observe que la masse du corps gravite vers le centre de la patte qui les porte. L'adresse & la force qu'ont ces oiseaux dans leur bec, semble indiquer que cet instrument est approprié à casser les écorces ou coques dures de certains fruits qu'ils mangent volontiers, à briser & déchirer des corps qui offrent plus de résistance que la pulpe des fruits tendres. Ce bec leur sert encore de troisieme pied pour marcher, pour monter aux arbres, se pendre aux branches, & à se défendre contre divers animaux carnassiers qui grimpent de nuit sur les arbres dans les contrées naturelles aux *perroquets*. Cet oiseau a-t-il émoussé son bec, il se retire à l'écart, cesse de babiller, & en silence il semble aiguiser son bec en frottant & ratissant la mâchoire inférieure contre la supérieure, ce qui fait un bruit désagréable. Ajoutez aux avantages que la nature leur a donné, des pattes, dont les doigts, pour se mieux percher, sont partagés autrement que dans la plupart des autres oiseaux qui en mettent toujours trois devant & un derriere. Le *perroquet* est un oiseau d'une longue vie, quoique sujet au mal caduc ; il a la propriété de ruminer. Presque tous les *perroquets* sont ornés de belles & riches couleurs, & aiment à être caressés.

Les Anciens ne connoissoient qu'une espece de *per-*

roquet, dont le plumage étoit entiérement vert, & qui avoit un collier d'un rouge de vermillon ; mais depuis la découverte de l'Amérique, on en a trouvé dans ce nouveau Continent une grande quantité d'especes. On peut faire trois divisions principales des *perroquets* : savoir, en *grands*, en *moyens*, en *petits* ou *perriques*. Dans cette division l'on trouve les *arras* ou les *macaos*, les *kakatous*, les *lorys*, les *perroquets* proprement dits ou *parrots*, les *perruches*.

Entre les premiers, sont les *perroquets* de la grandeur d'un grand corbeau & plus : tels sont les *macaos* ou les *arras*. Ils ont la queue très-longue ; leur tête est grande, large & plate en dessus. Les *kakatous*, vulgairement appelés *catacouas*, ont la queue courte.

Dans le GRAND MACAO les yeux ont l'iris de couleur blanche, & il y a communément autour un grand espace blanc dégarni de plumes. La mâchoire supérieure qui a près de trois pouces de longueur, est de couleur de chair ; celle de dessous est d'un brun sombre ; les jambes & les pieds sont de la même couleur que le bec : le plumage de la tête entiere, du cou, de la poitrine, du ventre, des cuisses, du dessous de la queue, de même que le milieu du dessus des ailes, est d'un rouge charmant ; le dessous de l'aile est embelli d'un jaune éclatant. Au dessous du rouge des ailes, on voit un rang de plumes vertes, & le bout des grandes plumes est d'un outremer luisant. Il en est de même du dessus de la queue & du croupion ; la queue qui s'étend bien au-delà des ailes, a dix pouces de longueur : ce *perroquet* se trouve dans les deux Indes. Sa femelle est d'un beau bleu d'azur en dessus, & en dessous d'un jaune charmant ; sa queue a un pied & demi de longueur, l'animal a en tout trente pouces de long ; ses pattes sont ornées de grandes serres, noires & recourbées : c'est le *perroquet* que l'on nomme *macao bleu & jaune*, *psittacus maximus cyano-croceus*, & qu'on nomme au Brésil *ararauna* : on le vend communément dix guinées à Londres.

Le PERROQUET ARRAS, *ara*, est le plus gros & le plus grand de tous les *perroquets*, soit des Iles, soit de Terre-ferme ; on en distingue deux especes ou deux

variétés : savoir, l'*ara bleu* & l'*ara couleur de feu*; plus communément le plumage de la tête, du cou, du dos & du ventre, est de couleur de feu : les ailes sont mêlées de bleu, de rouge & de jaune. Sa queue qui est ordinairement toute rouge, a quinze ou vingt pouces de longueur. Son œil est assuré, son bec gros : il marche gravement, il vit très-long-temps ; il apprend très bien à parler dans sa jeunesse : son naturel est assez docile. Il est familier & aime à être caressé : il s'attache à son maître, & en est même jaloux : on nous l'apporte de la Guadeloupe. L'*ara du Brésil*, est le grand *perroquet* de Macao.

Le *perroquet papegai* est remarquable par la variété de ses couleurs : il est rare. Le mâle est plus gros que la femelle, il a du jaune & du rouge au-dessus du bec : il est moins méchant que les précédens, & apprend mieux à parler : on a plus de peine à instruire les rouges. On voit de ces gros perroquets en quantité dans le Brésil, dans la Jamaïque, dans la Guiane; ils fréquentent tous les endroits où croissent le poivre de la Jamaïque, le bois d'Inde, le riz, &c. dont ils font un grand dégât. Ils font leurs nids dans des lieux de difficile accès : ils ne pondent que deux œufs. Les Sauvages du Brésil qui savent tirer fort adroitement de l'arc, se servent de fleches très-longues, au bout desquelles ils mettent un bourrelet de coton, afin qu'en tirant aux papegais ils les abattent sans les blesser.

Les perroquets de moyenne grandeur sont à-peu-près de la taille de nos pigeons domestiques : ils ont la queue courte ; tels sont les *parrots* & les *poppiniays* des Anglois.

Le PERROQUET BLANC CRÊTÉ, *psittacus albus cristatus*, est de très-belle figure; ses pieds, ses jambes & ses cuisses sont jaunâtres; ses ongles sont petits, noirs & à peine crochus : il porte sa queue retroussée comme un coq : tout le champ de son plumage est blanc, le bec est d'un cendré noirâtre, le cercle des yeux jaune, le sommet de la tête garni de plumes grandes, blanches & pointues, qui pendent en arriere en formant l'arc. Les Naturels des Moluques les appellent *cachi*, c'est-à-dire *précieux*. Ce perroquet est une espece de *kakatoës*

ou *kakatou*. Il y a encore le *kakatou à huppe jaune* d'Amboine ; le *kakatou à huppe rouge ;* le *kakatou à ailes & queue rouges ;* le *petit kakatou* des Philippines.

Le PERROQUET VERT, *psittacus viridis Amazonicus*, a les plumes des ailes rougeâtres par la partie supérieure, ainsi que celles de la queue ; son bec supérieur est rougeâtre, & l'inférieur est blanc ; l'iris d'un jaune rouge, le sommet de la tête jaune ; tout le reste du plumage est d'un vert nuancé de bleu ; sa queue est très-courte ; ses jambes & ses pieds sont cendrés. On en trouve beaucoup le long de la riviere des Amazones : cette espece de perroquet qu'on voit communément à Londres, est très-criarde. Les Indiens en font de belles ceintures ou des bandelettes de plumes, dont ils ceignent leurs têtes aux jours de réjouissance. On distingue plusieurs sortes de *perroquets Amazones*.

Parmi les perroquets verts il y en a quelques-uns qui ont sur la tête une nuance bleue, & sous le ventre une tache jaune ; mais le bas du croupion est d'un rouge écarlate. On trouve en Ethiopie un PETIT PERROQUET VERT, *psittacus pusillus viridis Æthiopicus*, qui n'est pas plus gros qu'un pinçon, ainsi il appartient aux perroquets de la troisieme division : le champ de son plumage est d'un beau vert ; les plumes de sa queue sont d'abord jaunes, ensuite rouges, puis noires & vertes au bout : sa gorge est rouge, son bec gros & dur, les ongles sont blancs. *Ray* dit avoir remarqué que quand les femelles sont vieilles, les mâles sont obligés de leur présenter une nourriture avalée & broyée, comme font les pigeons à leurs petits.

Le PERROQUET DIVERSIFIÉ, *psittacus varius*, a le plumage agréablement mélangé, sur-tout aux ailes & à la queue ; son bec est souvent de différentes teintes : il a le haut de la tête de couleur d'or ; le reste du corps mêlé de vert, de couleur d'améthyste, de noir, d'un vermillon obscur & safrané : ses jambes sont courtes, d'une couleur plombée, & ses ongles noirs. D'autres ont le front blanchâtre, ainsi que le bec : le derriere de la tête, du cou & des ailes est brunâtre ; le gosier couleur de cinabre ; la poitrine & les cuisses verdâtres, l'entre-deux des cuisses couleur de terre d'ombre ; les

grandes pennes des ailes sont d'un bleu mêlé de blanc; l'extrémité du ventre jaunâtre; la queue d'un rouge mêlé tantôt de jaune & tantôt de bleu : en un mot on y distingue sept couleurs, parmi lesquelles cependant la verte est la dominante. Cet oiseau est nommé dans le Dictionnaire de Trévoux, *perroquet gris diversifié.*

Le PERROQUET CENDRÉ, *psittacus cinereus*, *seu subcæruleus*, est de la grandeur d'un pigeon de voliere: son bec est noir: la teinte de son corps est d'un cendré obscur ou ardoisé: il a la queue très-courte & d'un beau rouge de cinabre. Cette espece de perroquet, qui est fort commune à Paris, vient de Mina, ville de Saint-George-aux Indes: on les trouve aussi dans les royaumes de Congo & d'Angola, dans la Guinée, même aux Iles: ce sont de grands parleurs: ils sifflent très-bien différens airs: élevés de jeunesse ils s'apprivoisent facilement, ils ont beaucoup de mémoire, prononcent à merveille ce qu'on leur apprend, & leur attachement est extrême à l'égard de ceux qu'ils ont pris en amitié. J'en ai un, qui peut avoir vingt ans, qui ne peut souffrir d'être en cage; il mange de tout à ma table, rit avec la société, & s'est rendu propres les passions humaines, la gourmandise, la jalousie, la colere, la liberté, le bavardage, &c.

Le PERROQUET D'UN GRIS BLANC, *psittacus subalbus*, égale en grandeur le plus petit de la grande espece des perroquets: sa queue est courte: son corps est d'un blanc si sale, qu'il en paroît cendré: son bec est noir: il a le derriere du dos, le croupion, toute la queue & les plumes des ailes d'un beau rouge.

Le PERROQUET ÉCARLATE, *psittacus coccineus aut purpureus Orientalis*, se trouve aux Indes Orientales; il est bien moins gros qu'un pigeon: il a le corps tout rouge; les plumes qui couvrent les ailes, vertes; les côtés jaunes; le dessous de la queue fauve au milieu, & le dessus d'un roux vert: au-dessus des genoux il a un cercle de plumes vertes: il a le bec & l'iris jaunes: ses jambes sont noires & très-courtes. On voit beaucoup de ces perroquets à Londres. C'est le *lory de Ceram*, l'une des îles Moluques. *Voyez* LORY.

Le BEAU PERROQUET DE CLUSIUS, *psittacus elegans Clusii*, est de la grandeur du pigeon : sa poitrine, son cou & son ventre sont de diverses couleurs, & les bords sont d'un beau bleu. Dès que cet oiseau entre en colere, ses plumes se redressent & forment une espece de huppe ; (ce phénomene qui paroît dépendre de la contraction des muscles de la peau, est assez commun à toutes les especes de perroquets) : il a le dos vert, les plumes des ailes bleues & la queue verte. C'est le *perroquet varié des Indes*.

Le PERROQUET A COLLIER DES INDES ORIENTALES, *psittacus torquatus Orientalis*, est beaucoup plus grand que le perroquet vert : le sommet de sa tête est d'un vert bleuâtre ; sa mâchoire supérieure est orangée, celle de dessous est noire ; il a l'iris jaunâtre : il porte sous le cou une bande noire, & dessus une de couleur de pourpre, qui toutes les deux s'étendent longitudinalement : le plumage de sa poitrine est d'un rose pâle, celui du dos, des ailes, du ventre, de la queue & des cuisses est d'un vert jaunâtre : sa queue a environ vingt pouces de longueur, & se termine en pointe : c'est une espece de *lory*.

Le PERROQUET A TÊTE JAUNE, *psittacus icterocephalos*. Sa poitrine est jaune aussi, son dos est vert mêlé de jaune, le dessus de la tête & la gorge sont bleus, la base des ailes est rouge, son bec & ses ongles sont noirs, les pattes sont jaunâtres : c'est le perroquet de la Jamaïque.

Le PETIT PERROQUET D'ANGOLA, *Angolensis psittacus minor*, est de la grandeur d'une tourterelle ; son bec est fauve ; le plumage de la tête, du dos, de la poitrine, ainsi que les plumes scapulaires des ailes, sont d'une belle couleur d'or, ombrée d'un rouge brillant, le reste des ailes est vert & bleu ; sa queue est longue, fourchue & d'un vert jaunâtre ; les jambes & les pieds sont d'un rouge bleuâtre.

Le PETIT PERROQUET DE BENGALE, *Bengalensis psittacus minor*, est de la grandeur d'un pigeon ordinaire : sa mâchoire supérieure est roussâtre & l'inférieure noirâtre ; le derriere de sa tête est d'un rouge pâle, nuancé de pourpre ; sa gorge est noire, & son cou

est entouré d'un petit cercle de la même couleur; le plumage de la poitrine, du ventre & des cuisses est d'un vert pâle & jaunâtre; les plumes du dos & celles des ailes sont d'un beau vert d'herbe; la queue n'est composée que de quatre plumes, dont les deux du milieu sont les plus longues, le dessus en est vert & le dessous est d'un jaune pâle.

Le PERROQUET DU BRÉSIL, *Brasilienſis psittacus*, est le *laurey* des Anglois: il est plus grand que le précédent; il a le bec d'un fauve pâle, l'iris jaune & la paupiere noire; il porte sur le sommet de la tête une huppe d'un beau bleu, le reste de la tête est écarlate, & au dessous on voit un beau cercle jaune; la poitrine & le dessus du dos sont d'un rouge vif; le dessous des ailes est jaunâtre, les plus longues plumes des ailes sont d'un beau bleu d'azur: le dessus du cou, du ventre & des cuisses est blanc, entremêlé de couleur de rose, se terminant près de la queue en un mélange d'écarlate; la queue est d'un pourpre nuancé de brun. Les nuances aurores du dos qui se confondent imperceptiblement dans le bleu céladon, rendent cet oiseau peut-être le plus beau des perroquets. *Albin* dit en avoir vu vendre à Londres vingt guinées. *Voyez* LORY.

Le PERROQUET DES BARBADES, *psittacus Barbadenſis*, est de la grandeur de celui de Bengale; son bec est de couleur de corne, il a l'iris safrané; le plumage du devant de la tête est d'un fauve pâle, & entouré d'un beau jaune qui s'étend jusques sous la gorge; les plumes scapulaires du dessus des ailes sont d'abord d'un beau bleu & ensuite rouges; la queue est composée de douze plumes d'un beau vert; les jambes sont emplumées jusqu'aux pieds, d'une couleur cendrée. Ce perroquet est très-doux, très-beau, & articule distinctement les mots qu'on lui a appris.

Le PERROQUET COULEUR DE FRÊNE, *psittacus Guineenſis cinereus*, est, selon l'Ornithologiste *Albin*, de la grandeur d'un pigeon; son bec est noir, ses narines sont fort voisines l'une de l'autre; tout son corps est d'une couleur uniforme, excepté vers la queue, où la teinte est plus foible; la queue est d'une couleur rouge & vermeille & très-courte; les plumes de la tête & du

cou sont très-courtes & grisâtres, ainsi que celles du ventre.

On distingue encore plusieurs autres *perroquets*, qui appartiennent à la classe des *perroquets* de moyenne grandeur ; mais nous en avons parlé à chacun de leurs noms. On distingue entr'autres celui du Para, près de la riviere des Amazones : il est d'un très-beau jaune.

Le PERROQUET MASCARIN, *psittacus mascarinus*, est d'une couleur obscure.

Les *perroquets* de la troisieme division ne sont pas plus grands que des merles & des alouettes ; ils ont la queue très-longue. Les François nomment *perruches* les mâles, & *perriches* les femelles de tous ces petits *perroquets*, *psittaca*.

Le PERROQUET A COLLIER DES ANCIENS, *psittacus torquatus macrouros Antiquorum*, est la premiere espece de perroquet qui ait été apportée des Indes en Europe : sa queue est longue : il a l'iris jaune, le plumage vert & foncé sur le dos : son collier est d'un beau vermillon ; son bec est incarnat & assez gros : son ventre est nuancé d'un vert si tendre, qu'il en paroît jaunâtre : les dernieres plumes des ailes, ont, vers la partie d'en haut, une tache rouge remarquable : la queue est d'un jaune verdâtre, les pieds & les jambes sont cendrés : au-dessus du bec, il y a une ligne noire qui va de part & d'autre jusqu'au collier. C'est une *perruche*.

Le PETIT PERROQUET TOUT VERT, *psittacus minor macrouros totus viridis*, se voit très-communément dans les maisons en France ; il n'est pas plus gros qu'un étourneau : il a le bec couleur de chair, ainsi que les pieds & les jambes, ce qui ne se voit pas dans les autres *perroquets* : l'iris est de couleur de safran : tout le corps est d'un beau vert de pré, le ventre est un peu plus clair : sa queue est étroite, longue de huit pouces ou environ, & finit en pointe. Bien des personnes lui accommodent le bec, au moins deux fois l'an, ainsi qu'au papegai. Il parle un peu, mais son cri ne plaît pas à tout le monde. On le nourrit de chenevis, de fruits, de biscuit, de sucre & de pain trempé dans

de l'eau & du vin, &c. on l'apporte de Saint-Domingue; on l'appelle auſſi *perruche de la Guadeloupe*: il en vient auſſi d'Egypte, qui ſont moins beaux. Ce petit *perroquet* fait ſon nid dans les écueils.

Le PETIT PERROQUET VERT DES INDES ORIENTALES, *pſittacus viridis minor Indus Orientalis*, eſt un peu plus grand que l'alouette ordinaire; ſon bec eſt de couleur fauve; le plumage du devant de la tête & de la gorge, eſt d'un rouge d'écarlate; celui de derriere la tête, du dos, de la poitrine & des ailes, eſt d'un beau vert, ainſi que les plumes du croupion, qui ſont un peu nuancées de bleu: la queue eſt courte; les trois plumes avancées en dehors, à droite & à gauche, ſont d'un beau rouge, bordées de noir, & leurs pointes ſont vertes: les jambes & les pieds ſont griſâtres. Ce *perroquet* eſt fort doux, & vit volontiers en cage avec ſa femelle.

Le PERROQUET ROUGE ET VERT, *pſittacus Japonicus, Aldrov.* eſt de la grandeur du petit *perroquet* tout vert: ſon bec eſt court, rouge, & médiocrement courbé: il a le champ de ſon plumage compoſé de quatre couleurs; celles qui paroiſſent le plus ſont le rouge & le vert: le dos, le deſſus de la tête, & les grandes plumes des ailes ſont d'un vert très-éclatant; les plumes ſcapulaires ſont bleues; deux des grandes plumes de dehors ſont vertes, & les autres ſont d'un bleu très-couvert: l'iris eſt rouge; devant & derriere les yeux il a des taches bleues; le deſſus du menton eſt couleur de rouille ſafranée: la poitrine & le ventre de ce perroquet ſont d'un beau rouge, & ornés de petites lignes tirées en long: la queue eſt plus longue que tout le corps, elle eſt verdâtre en deſſus & rouge en deſſous: les jambes & les pieds ſont très-noirs.

Le PERROQUET ROUGE ET CRÊTÉ, *pſittacus ruber & viridis criſtatus*, a l'iris rouge & la prunelle noire; les ailes, la queue & la crête de couleur rouge, le reſte de ſon plumage eſt vert. Sa crête reſſemble à celle du perroquet blanc & crêté: cette crête eſt compoſée de ſix plumes, trois grandes & trois petites.

Le petit PERROQUET DE BONTIUS, *pſittacus minor*

Bontii, n'eſt pas plus grand qu'une alouette : il a le bec & le goſier grisâtres, l'iris argenté : ſes ailes ſont vertes, mais mêlées de quelques plumes rouges : il porte ſur la tête de belles plumes qui s'élevent en forme de crête : le bas du ventre, la crête, le cou & le deſſus de la queue qui eſt très-longue, ſont de couleur incarnate ; ſes plumes finiſſent par un beau mélange de vert & de blanc. C'eſt la *perruche rouge* & *hupée* de Java.

La *petite perruche aux ailes d'or*, *pſittacula alis deauratis*, ſe trouve aux Indes Orientales.

Les Ecrivains font mention de plus de cent eſpeces de perroquets, dont nous parlons en partie dans le cours de cet Ouvrage, à chacun des noms qu'ils portent. (M. *Briſſon* ſeul comprend quatre-vingt-quinze ſortes dans ce genre d'oiſeaux, entre leſquels il s'en trouve peut-être quelques-uns qui ne different que par le ſexe. Conſultez l'*ornithologie* de cet Auteur.) Ceux dont nous n'avons point décrit particuliérement l'hiſtoire, peuvent être rapportés aux eſpeces que nous avons citées. On ſait aujourd'hui que chaque île Orientale, & chaque contrée de la terre ferme, excepté l'Europe, produit ſes perroquets, que l'on diſtingue par le plumage. *Labat* dit que tous les petits perroquets de la Guadeloupe, ſont de la groſſeur d'un merle, entiérement verts, à la réſerve de quelques petites plumes rouges qu'ils ont ſur la tête ; leur bec eſt blanc : ils ſont doux, careſſans, & ils apprennent facilement à parler, cependant ils ſont moins ſuſceptibles d'éducation. Ceux du Bréſil ſont totalement verts ; leurs plumes ſemblent couvertes d'un petit duvet blanc & très-fin, qui les fait paroître d'un vert argenté. Ces perroquets ſont d'ailleurs fort vifs, très-privés ; ils ſemblent aimer à s'entretenir avec les hommes : il eſt rare qu'ils gardent le ſilence ; car quand ils entendent parler, ſoit de jour ou de nuit, ils ſe mettent de la converſation, & crient toujours plus fort que qui que ce ſoit. Les perroquets noirs ſont communs dans l'île Maurice : ils reſſemblent, au bec près, à des corbeaux. Les *perroquets tapirés* ſont ceux qui doivent à l'art une belle partie de la couleur de leur plumage. Les Indiens de la Guiane ſont habiles dans cet art : pour cela ils arrachent des plumes

des perroquets dans les endroits où ils savent qu'en la place des vertes, ils peuvent en faire venir de rouges ou de jaunes, & ils frottent les chairs qu'ils ont mises à découvert avec du sang de grenouille.

Les perroquets volent en troupe & cherchent les grains & les fruits à mesure qu'ils mûrissent. Rien d'aussi singulier que de les voir & de les entendre quand ils sont sur les arbres : les Chasseurs ont peine à les attraper, car ils ne restent pas long-temps en place; dès qu'ils ont becqueté un fruit ils volent à un autre. Quand le Chasseur en a tué un d'un coup de fusil, ils regardent ce camarade tomber, & se mettent à crier tous ensemble de toute leur force. Il y a différentes façons de prendre ces oiseaux : ceux qu'on veut garder en vie pour leur apprendre à parler sont tirés fort jeunes de leurs nids au mois d'Août. Au Brésil on abat les vieux de dessus les arbres avec des fleches dont la pointe est bien enveloppée de coton pour qu'elle ne les blesse pas. Les Caraïbes portent de nuit des charbons autour des arbres sur lesquels se tiennent les perroquets, & jettent sur ces charbons une gomme résine avec du piment vert, dont la fumée étourdit ces oiseaux, & les fait tomber à terre devant eux. Les Indiens qui habitent les bords de la riviere de Berbice, les prennent avec des lacets attachés à des bâtons qu'ils jettent à la tête des oiseaux. Leur chair est assez grasse & de bon goût, sur-tout dans la saison des graines de bois d'Inde. La saveur de la chair de ces oiseaux tient toujours de l'espece de nourriture qu'ils prennent: quand ils mangent de la graine d'acajou, ils sentent l'ail; s'ils se nourrissent de piment, leur chair a un goût de girofle & de cannelle fort agréable. Quand ils se nourrissent de prunes de Mombin, de cachimans & de goyaves, ils deviennent comme autant de pelotons de graisse : la graine de coton les enivre & leur cause les mêmes symptomes que l'excès du vin fait voir dans l'homme; on les prend alors très-facilement. Dans tous les pays, ces oiseaux gâtent tellement les grains, qu'on est obligé de faire garder les moissons par des enfans. Les perroquets se plaisent aussi beaucoup sur le muscadier : ils mangent de la graine de carthame,

sans en être incommodés, quoique ce soit un purgatif pour l'homme.

Ce que *Pistorius* dit dans sa *Description de la Colonie de Surinam, pag. 68. Amst. 1763. in-4°.* est remarquable & semble prouver que les perroquets, quoiqu'ils multiplient à Surinam, y sont autant d'oiseaux de passage. « Aux mois d'Août & de Septembre des années » 1750 & 1751, temps auquel on fait la récolte du » café, l'on vit à Surinam, une prodigieuse quantité » de perroquets de toutes especes, qui fondoient en » troupes sur le fruit du cafeyer, dont ils détachoient » & mangeoient la capsule rouge, en rejetant à terre » les fèves. L'an 1760 vers le même temps, on vit » de nouveau d'aussi nombreux essaims de perroquets, » qui s'étendirent tout le long de la Côte, & y firent » un dégât affreux, sans qu'on ait pu découvrir d'où » venoient ces oiseaux en si grand nombre ».

Les perroquets ont beaucoup d'adresse à construire leur nid; ils ramassent quantité de joncs & de petits rameaux d'arbres, dont ils forment un tissu qu'ils ont l'art d'attacher à l'extrémité des plus foibles branches des arbres les plus élevés; de sorte qu'y étant suspendus ils sont agréablement balancés par l'animal: ce jeu est une des voluptés de cet oiseau, même lorsqu'il est détenu en cage. La forme de ce nid est celle d'un ballon, & il est de la longueur d'un pied: ils n'y laissent qu'un seul trou pour leur servir de passage: peut-être que ces oiseaux, dans les mains de la nature, choisissent ces branches foibles pour se garantir des serpens, à qui leur pesanteur ne permet pas de les attaquer dans cette retraite. Souvent aussi ils choisissent des trous dans les arbres pour faire leurs nids; & pour peu qu'un trou de branche rompue soit commencé, ils l'ont bientôt agrandi avec leur bec: puis ils s'arrachent quelques plumes qu'ils mettent au fond. Le mâle & la femelle couvent tour à tour les deux œufs que la femelle pond: ces œufs sont blancs, à-peu-près de la grosseur de ceux d'un pigeon, quelquefois tiquetés comme ceux de la perdrix.

Les perroquets font rarement des petits dans nos climats: on n'en cite même que trois exemples; 1°. chez

la veuve de M. Auger, Gouverneur de S. Domingue; en 1707; 2°. chez un Chanoine d'Angers en 1740; mais on ne put les élever, vraisemblablement faute de nourriture convenable à cette espece de jeunes oiseaux: 3°. un chez M. *Mesnard*, Contrôleur-Général des Fermes du Roi, à Villeneuve-lès-Avignon: ce Propriétaire mit ensemble, en 1773, deux perroquets, l'un mâle, l'autre femelle, & il en provint deux œufs qui furent couvés, mais sans succès: M. *Mesnard* ne se rebuta point; au printems suivant il a réuni ces deux mêmes oiseaux, & deux œufs ont encore été le fruit de leur union. L'un n'a pas réussi par le défaut de germe; l'autre après vingt-cinq jours d'incubation, a donné le 11 Juin un petit perroquet vivant qui promettoit beaucoup.

M. Anderson (*Hist. Nat. de Groenland, p. 55.*) dit qu'il y a un oiseau dans cette contrée que les Marins nomment *perroquet* à cause de la forme de son bec. Le perroquet d'Allemagne est le *geai*. Voyez ce mot.

PERROQUET D'EAU ou MONOCULE, ou MONOCLE, *monoculus*. Insecte aquatique nommé *perroquet* à cause de son bec réfléchi en dessous: on en distingue plusieurs especes. Nous avons parlé au mot BINOCLE, de ces vers-insectes, qui donnent une couleur apparente de sang à l'eau, ce qui fait croire quelquefois au peuple que l'eau est changée en sang.

M. *Linnæus* a fait mention d'une espece de monocule, qui se trouve aussi dans les rivieres & dans les marais, & qui a une coquille bivalve, un peu plus grosse qu'une semence de chou, oblongue, égale de chaque côté, bossue par devant, un peu émoussée: elle ne s'ouvre que dans l'eau; car quand elle en est sortie elle ressemble à une semence de plante: cette espece de perroquet d'eau nage avec vîtesse, comme les autres especes; sa coquille est cendrée: quand elle s'ouvre, l'insecte fait sortir par une de ses extrémités beaucoup de petits filets égaux en longueur, & blancs: en remuant ces filets, il est porté sur l'eau, & il ne s'arrête point que sa coquille n'ait trouvé quelque chose de solide.

PERROQUET DE MER, *labrus psittaco-rostratus*. En Amérique on donne ce nom à certains poissons qui

qui ressemblent assez à nos carpes ; leur véritable dénomination est prise dans la configuration de leurs dents, qui imitent assez bien par leur forme celle du bec d'un perroquet. La peau & les écailles de ce poisson sont d'un vert foncé sur le dos, mais qui s'éclaircit à mesure qu'il approche du ventre. *Labat* dit qu'il a deux empanures sur le dos & quatre à ses côtés ; qui aussi bien que sa queue sont colorées de bleu, de jaune & de rouge, d'une beauté inimitable : cette belle peau couvre une chair excellente ; elle est blanche, grasse, ferme, d'un bon suc, & facile à digérer. Il se trouve aussi de ces poissons à l'île de France. *Voyez à la fin du mot* VIEILLE.

Le poisson perroquet de l'île de Tabago est aussi couvert d'écailles d'un beau vert-jaune brillant : il a la tête faite effectivement comme un perroquet : sa chair est d'un goût admirable ; sa taille égale celle d'un maquereau.

PERROQUET DE MER. *Voyez* MACAREUX.

PERROQUET PLONGEUR. Oiseau qui ne ressemble en rien au perroquet, excepté par la forme de son bec qui a trois pouces de long ; ses pieds sont palmés & rouges, ses jambes sont courtes ; son plumage est noir sur le dos & blanc au ventre. Cet oiseau plonge souvent & long-temps : sa chair est délicate.

PERRUCHE. Nom qu'on donne à la plus petite espece du genre des perroquets à longue queue ; c'est un genre d'oiseau extrêmement diversifié. On le nomme aussi *perroquet-moineau* ; en général, leur cri est perçant & fort incommode. *Voyez* PERROQUET.

PERSICAIRE, *perficaria*. Plante dont M. *de Tournefort* distingue dix-neuf especes : nous parlerons ici des deux qui sont d'usage en Médecine.

1°. La PERSICAIRE DOUCE, TACHÉE & ORDINAIRE, *perficaria mitis & maculosa*. Cette plante n'est point âcre au goût comme la suivante, mais elle a une saveur un peu acide ; elle croît par-tout aux lieux aquatiques : sa racine est grêle, oblique, fibrée, ligneuse & seche : elle pousse des tiges à la hauteur d'un pied, rondes, creuses, rougeâtres, rameuses & nouées ; chaque nœud accompagné d'une gaine membraneuse blanchâ-

tre, bordée de cils, portant des feuilles semblables à celles du pêcher ou du saule, marquées quelquefois au milieu d'une tache plombée : ses fleurs sortent dans l'été en épi des aisselles des feuilles d'en haut, attachées à de longs pédicules ; chacune de ces fleurs est monopétale, de couleur ordinairement purpurine & luisante, quelquefois blanchâtre, divisée profondément en cinq segmens ovales, & contenant cinq, six ou sept étamines & deux pistils : à ces fleurs succedent des semences ovales, aplaties, pointues & noirâtres. M. *de Tournefort* a remarqué que cette plante étant mâchée & goûtée laisse de l'astriction, & qu'elle rougit un peu le papier bleu : elle est estimée vulnéraire & astringente : la décoction en est bonne pour le cours de ventre, pour la dysenterie, sur-tout lorsqu'on soupçonne quelque ulcere dans les intestins, & pour les maladies de la peau ; ainsi l'on en fait boire utilement la tisane à ceux qui ont la gale ou d'autres éruptions cutanées. On lit dans les *Mém. de l'Acad. des Scienc. ann. 1703, pag. 304*, que le même M. *de Tournefort* assure que cette espece de persicaire est un des plus grands vulnéraires qu'il connoisse, & que sa décoction dans du vin arrête la gangrene d'une maniere surprenante ; ce que ne fait pas la persicaire âcre. Le même Auteur a donné dans les Mémoires cités la description de la *persicaire du Levant* ; qu'il nomme *persicaria Orientalis, nicotianæ folio, calice florum purpureo ;* c'est la plus grande & la plus belle espece de persicaire.

2°. La PERSICAIRE ACRE ou BRULANTE, ou PIMENT D'EAU, ou POIVRE D'EAU, ou CURAGE, *persicaria urens, seu hydropiper.* Elle differe de la précédente en ce que ses tiges sont plus hautes & moins rameuses, en ce que ses feuilles sont plus étroites, mais un peu plus longues, plus vertes, sans taches, d'un goût poivré ou brûlant : ses semences sont triangulaires & luisantes : on les mêle quelquefois dans la *maniguette* : voyez ce mot.

Toute la plante a un goût âcre & mordicant : elle est annuelle & croît dans tous les lieux aquatiques, principalement dans ceux où l'eau a croupi durant l'hiver : on regarde cette sorte de persicaire comme dé-

tersive, vulnéraire & utile dans les lavemens contre le ténesme & la dyssenterie : (il faudroit y mêler des adoucissans) c'est en outre, disent les *Continuateurs de la Matiere Médicale*, un bon fondant & un apéritif qui convient dans les obstructions : il y a des Paysans qui en portent dans leurs souliers pour la jaunisse & l'hydropisie. Ce remede populaire est un pur effet de la crédulité, ou de la charlatanerie médicale. Son eau distillée est assez bon spécifique pour les glaires de la vessie, & pour tuer les vers. Dans certains pays on s'en sert pour la vérole & la lepre. Les feuilles de cette plante écrasées & appliquées, soulagent dans la douleur de la goutte ; c'est une plante d'un grand usage dans la Chirurgie, pour les tumeurs œdémateuses des jambes, des cuisses, &c. Appliquée sur les vieux ulceres, elle en mange les chairs baveuses & en nétoie la pourriture. Quand on baffine les plaies des chevaux avec le suc ou la décoction du curage, jamais les mouches n'en approchent, même dans les grandes chaleurs.

PERSIL DE BOUC. *Voyez* BOUCAGE.

PERSIL DES FOUX. *Voyez à l'article* CIGUE.

PERSIL DE JARDIN ou PERSIL VULGAIRE, *petroselinum vulgare*, est une plante que l'on cultive dans les jardins potagers : sa racine est simple, grosse comme le doigt, fibreuse, blanchâtre & plongée profondément en terre ; elle est bonne à manger : elle pousse des tiges à la hauteur de trois pieds & davantage, grosses comme le pouce, rondes, cannelées, nouées, vides & rameuses : ses feuilles sont subdivisées, découpées, vertes, attachées à de longues queues ; ses fleurs naissent aux sommets des branches en ombelles, composées chacune de cinq feuilles, disposées en rose : à ces fleurs succedent des semences jointes deux à deux, cannelées, grises, arrondies & d'un goût âcre.

Cette plante soutient assez aisément le froid & le chaud, pourvu qu'on la seme dans un terroir gras, ou un peu humide, voilà pourquoi elle vient si bien auprès des fontaines ; elle pousse sa tige à la seconde année, elle fleurit en été ; ses semences mûrissent dès le mois d'Août : on distingue encore d'autres especes ou va-

riétés de persil commun, qu'on cultive aussi dans les jardins, savoir le *persil frisé*, dont les feuilles crêpées sont très-belles: on dit qu'il croît naturellement en Sardaigne; & le *gros persil*, *apium hortense lactifolium*, dont les racines sont vivaces, bonnes à manger comme celles du céleri, on l'appelle *persil d'Angleterre*.

L'usage du persil est d'une très-grande antiquité: il est vanté comme une des meilleures plantes potageres: il est très-apéritif; il leve les obstructions & provoque les menstrues: son usage est très-familier en cuisine & en Pharmacie: sa racine se met dans le potage, & est au nombre des cinq grandes racines apéritives: ses feuilles par leur saveur aromatique & agréable, relevent plusieurs sortes de nos alimens, & rendent les bouillons diurétiques: sa décoction est un bon sudorifique; sa semence est bonne pour la néphrétique, & pour faire mourir les poux: elle est une des quatre semences chaudes mineures, qui sont celles d'*ache*, de *persil*, d'*ammi* & de *daucus*.

Le persil ne convient pas à tous les tempéramens: on dit qu'il est très contraire à ceux qui tombent du haut mal, parce qu'il rend les accès plus fréquens; *Voyez* les *Ephémér. d'Allem. Décurie 3, art. III.* Le persil est pour plusieurs oiseaux un poison, dont le lait paroît être l'antidote. L'on a aussi observé que par son huile aromatique & exaltée il enflamme le sang des hommes, & cause des maux de tête, sur-tout aux bilieux. Mais l'on ignore par quelle vertu le persil fait casser un verre à boire qui auroit été frotté ou rincé du suc de cette plante.

Quelques Economes modernes conseillent de faire des prairies artificielles avec le persil de jardin pour en nourrir des moutons en vert: ils assurent d'après l'expérience, qu'ils aiment beaucoup cette plante, qu'elle les engraisse, les fait prospérer, les préserve des especes de vers qui attaquent & rongent leur foie quand ils ont mangé l'espece de renoncule appelée *douve*, & qui les font périr pendant l'hiver, sur-tout dans les années humides & pluvieuses.

PERSIL DE MACÉDOINE, ACHE ou PERSIL DES ROCHERS, *petroselinum Macedonicum*. C'est une

plante qui croît naturellement en Macédoine, où elle vient entre les pierres & les rochers. Sa racine est comme la précédente : elle pousse une tige haute d'un pied & demi, assez grosse, velue & rameuse. Cette plante ressemble assez d'ailleurs à notre persil ; ses feuilles sont cependant plus amples, un peu plus découpées, & d'une saveur moins âcre. Sa semence est beaucoup plus menue & plus oblongue, plus pointue & plus aromatique ; d'un goût âcre & chaud, qui approche de celui du cumin.

Ce persil est le vrai *petroselinum* des Anciens, & differe absolument du persil de nos potagers. *Galien* dit que tout le monde fait cas du persil de Macédoine, & l'achete bien plus cher, comme étant le plus exquis ; cependant le lieu où il croît naturellement est escarpé, & a trop peu d'étendue pour en donner la quantité qui se distribue dans le commerce. Ainsi ce qui arrive à l'égard du miel Attique & du vin de Falerne, est arrivé pareillement à l'égard du persil de Macédoine, c'est-à-dire, qu'on en vend beaucoup qui croît ailleurs qu'en Macédoine. On cultive avec succès cette sorte de persil dans les jardins : il aime un terrain sablonneux ; il ne craint que le trop grand froid. On ne se sert guere que de sa semence, dont la vertu est réputée très-alexipharmaque : on l'emploie dans la thériaque ; on s'en sert aussi comme d'un hystérique & d'un bon carminatif.

Il est mention du gros persil de Macédoine sous le nom de *maceron*. Voyez ce mot.

PERSIL DE MARAIS ou ENCENS D'EAU, *thyselinum palustre*. Cette plante differe peu du persil de montagne, excepté qu'elle rend du lait, & qu'elle croît aux lieux marécageux & près de tous les endroits aquatiques : elle fleurit en Juin & Juillet. On ne se sert que de sa racine qui est incisive, pénétrante & apéritive, & on la mâche pour provoquer les crachats & soulager le mal de dents.

PERSIL DE MONTAGNE, *oreoselinum*. On en distingue deux sortes principales :

1°. Le GRAND PERSIL SAUVAGE ou DE MONTAGNE, *oreoselinum majus*. Cette plante que l'on trouve aux

lieux montagneux parmi les pâturages, aux environs de Fontainebleau & dans plusieurs autres lieux élevés & sablonneux, a des racines attachées plusieurs ensemble à une tête chevelue, comme dans le *meum*. Elles sont longues, grosses comme le petit doigt, traçantes, noires en dehors, blanches en dedans, empreintes d'un suc mucilagineux, d'un goût résineux, mais aromatique & agréable, approchant de celui du panais. (M. *Haller* dit que cette racine paroît avoir des vertus, mais elle n'a pas été adoptée en Médecine). Ses tiges sont férulacées, hautes de quatre à cinq pieds, cannelées & divisées en ailes. Ses feuilles sortent les unes de sa racine, les autres de ses tiges : elles sont grandes, amples, semblables à celles du persil de Macédoine, mais plus fermes, bleuâtres & d'un goût plus doux que la racine. Ses fleurs naissent sur de grands parasols aux sommets des tiges & des branches : elles sont petites, blanches, composées chacune de cinq feuilles, disposées en rose. A ces fleurs succedent des semences jointes deux à deux, larges, ovales, aplaties, rayées sur le dos, bordées d'une membrane & de couleur rougeâtre.

2°. Le PETIT PERSIL SAUVAGE ou DE MONTAGNE, *oreoselinum minus*. Cette plante aime les lieux montagneux & sablonneux : on la trouve communément sur le Mont-Valérien, près de Paris. Sa racine est très-grosse, molle, chevelue, blanche & vivace, d'un goût âcre & désagréable, empreinte d'un suc laiteux & visqueux. Sa tige est haute de deux pieds, cannelée, nouée, rougeâtre & rameuse. Ses feuilles sont couchées à terre, semblables à celles du persil des jardins, mais plus noirâtres & plus fermes; ses fleurs qui paroissent en Juillet & en Août, sont grandes, en forme de parasol : elles laissent après elles des semences arrondies, très-âcres.

La semence de ce persil de montagne est excellente pour provoquer les regles qui coulent difficilement : elle est diurétique. La racine de cette plante est salivaire & propre pour la gravelle.

PERSONNÉES, *personatæ*. Les Botanistes donnent avec *Tournefort* ce nom à une famille de plantes, dans

lesquelles les divisions inégales & irrégulieres de leur corolle représentent pour l'ordinaire le muffle ou la tête d'un animal, en un mot un masque. Cette famille réunit beaucoup de grands arbres qui ont les mêmes caracteres. Quelques-unes des plantes qui y sont subordonnées, sont parasites ; leurs racines sont fichées dans d'autres plantes, telle est l'*orobanche*. Les tiges & les branches sont communément cylindriques ; les feuilles sont opposées deux à deux en croix dans le plus grand nombre, ou même verticillées depuis trois jusqu'à six. Il y en a qui n'ont d'opposées que celles d'en-bas, pendant que les supérieures sont alternes. Le feuillage est disposé en croix dans les plantes qui ont les feuilles opposées, & circulairement dans celles qui les ont alternes. Les molécules de la poussiere fécondante sont sphériques. Le fruit est ordinairement capsulaire. Ces plantes ont à-peu-près les mêmes vertus que les *labiées*. Voyez ce mot. On range parmi les personnées l'*orobanche*, la *graſſette*, la *véronique*, l'*eufraiſe*, la *pédiculaire*, la *gratiole*, la *linaire*, la *ſcrophulaire*, la *nicotiane* & les autres plantes qui ont leurs fleurs en masque. *Voyez ces mots.*

PERTURBATEUR DES POULES. C'est le nom, dit *Albin*, que les Anglois donnent au mâle de l'aigle à queue blanche, qui est une espece d'*épervier*. Voyez les mots AIGLE & ÉPERVIER.

PERVENCHE, *pervinca*. Plante dont on distingue deux especes principales :

1°. La PETITE PERVENCHE, *pervinca vulgaris anguſtifolia*, nommée aussi *pervenche à feuille étroite*, le *petit pucelage*, la *violette des forciers*. Cette plante est vivace, toujours verte, & se multiplie aisément d'elle-même, tant par ses racines que par ses semences, qui s'enracinent çà & là dans la terre : on la trouve par-tout dans les haies, parmi les broussailles, dans les bois, dans les fossés & autres lieux couverts, humides & ombrageux. Sa racine est fibreuse : elle pousse plusieurs tiges menues, longues, rondes, vertes, noueuses, qui serpentent sur la terre & s'attachent à ce qu'elles trouvent. Ses feuilles sont oblongues, vertes, lisses, de la consistance & de la couleur de celles du lierre, de la

figure de celles du laurier, mais infiniment plus petites, rangées deux à deux, l'une vis-à-vis de l'autre, d'un goût stiptique & amer. Sa fleur, qui paroît au commencement du printems, est en tuyau évasé, échancré, (dont le pavillon, dit M. *Deleuze*, est un limbe presque plat, divisé en cinq lobes); elle est bleuâtre, quelquefois blanche & rarement rouge, sans odeur, tantôt simple & tantôt double. Chaque fleur naît seule au bout d'un long pédicule. Après cette fleur, qui subsiste pendant long-temps, naît un fruit à deux siliques, dans lesquelles se trouvent des semences oblongues & un peu sillonnées.

M. *de Tournefort* dit qu'il n'a jamais vu en ce pays le fruit de cette plante, ni même en Provence, ni en Languedoc, où la petite pervenche est très-commune: il dit encore que de tous les anciens Auteurs de Botanique, *Césalpin* est le seul qui ait eu la satisfaction d'observer le fruit de la pervenche; & il ajoute que, pour en avoir du fruit, il la faut planter dans un pot où il y ait peu de terre; car alors la seve, qui ne sauroit se dissiper dans les racines, est obligée de passer dans les tiges, & fait gonfler le pistil qui devient le fruit: c'est ainsi, disent les *Continuateurs de la Matiere Médicale*, que l'on a beaucoup de fruits des figuiers, & de la plupart des plantes dont les racines tracent considérablement dans les pays froids.

La PETITE PERVENCHE, est d'un grand usage dans la Médecine: elle paroît astringente; elle entre aussi dans les vulnéraires de Suisse appelés *falltrancks*. Voy. *ce mot.*

2°. La GRANDE PERVENCHE ou le GRAND PUCELAGE, *pervinca latifolia*. Elle differe de la précédente, en ce qu'elle est beaucoup plus grande en toutes ses parties: on la cultive dans les jardins, où elle fait une agréable verdure, étant mise en espalier; mais comme elle est plus tendre que la précédente, elle périt quelquefois par le froid, quand l'hiver est trop rude. Dans les pays chauds, elle fleurit presque toute l'année. Elle croît naturellement aux lieux incultes, mais un peu gras, dans les haies & le long des chemins. Ainsi que la précédente, elle ne fructifie point, à moins

qu'on ne la tienne assujettie, & qu'on n'en coupe souvent les sarmens: elle a les mêmes vertus que la petite pervenche; elle est vulnéraire, astringente, fébrifuge, propre à modérer le flux immodéré des menstrues & des hémorrhoïdes. Le lait coupé avec la pervenche, est fort bon pour les phthisiques & les dyssentériques: elle arrête le saignement du nez, en mettant dans les narines un tampon de ses feuilles pilées; ce même remede fait, dit-on, revenir le lait aux Nourrices. M. *Bourgeois* assure que la décoction des deux especes de pervenche est excellente en gargarisme avec le miel rosat dans les esquinancies inflammatoires. Elles sont encore très-salutaires pour rétablir le ton & le ressort des poitrines foibles, & dissiper la toux seche habituelle, pourvu qu'on en fasse un long usage en tisane avec la réglisse. Enfin, *J. Bauhin* dit, d'après *Fragus*, que si l'on met une suffisante quantité de pervenche dans un tonneau de vin trouble, on le rétablira en quinze jours, sur-tout si on l'a soutiré auparavant.

Les Amateurs distinguent encore la *pervenche à fleur double*, d'une seule couleur ou jaspée; la *pervenche à feuilles panachées* de blanc, & la grande *pervenche de Madagascar*; petit arbrisseau précieux & charmant qui est pendant plus de six mois en fleur, mais qui est très-délicat; il faut le traiter comme les myrtes.

PESCHETEAU, ou PÊCHEUR-MARIN: *voyez* GALANGA.

PESSE: *voyez* au mot SAPIN.

PESSE-D'EAU: *voyez à l'article* PRÊLE.

PETASITE, ou HERBE AUX TEIGNEUX, OU A LA TEIGNE, ou GRAND PAS-D'ANE, *petasites*. Plante dont on distingue deux especes principales.

1°. Le GRAND PETASITE, *petasites major vulgaris*. Elle croît assez souvent sur les bords des lieux humides. Sa racine est très-vivace, grosse, longue, noire en dehors, blanche en dedans, un peu amere au goût, & d'une odeur suave, traçante dans la terre: elle pousse au printems plusieurs tiges à la hauteur d'un demi-pied, grosses, creuses, lanugineuses, garnies de quelques petites feuilles étroites, pointues, & portant à leurs sommités, avant que les autres feuilles paroiss-

sent, des fleurs disposées en bouquets à fleurons purpurins, & semblables, dit M. *de Tournefort*, à de petits godets découpés en quatre ou cinq parties. Ces fleurs se flétrissent en peu de temps, & tombent avec leur tige; elles sont suivies par des semences garnies chacune d'une aigrette; après que la tige est tombée, il s'éleve des feuilles fort grandes, arrondies, un peu dentelées en leurs bords, vertes-brunes en dessous, attachées par le milieu à une grosse queue longue de plus d'un pied: ces feuilles ont la figure d'un chapeau renversé, ou d'un grand champignon porté sur sa queue. Il y a des endroits où ces feuilles croissent à la hauteur d'un homme; ensorte que passant au travers, il semble qu'on se promene entre des arbres: elles durent jusqu'à l'hiver, après lequel il en repousse de nouvelles. Cette plante est le *tussilago scapo imbricato thyrsifero, flosculis omnibus hermaphroditis*, de *Linnæus*.

2°. Le PETIT PETASITE, *petasites minor*. Cette espece de petasite est à fleur blanche, plus petite que la précédente: elle fleurit également au printems, & avant l'apparition des feuilles: on la trouve plus rarement que le *grand petasite*: elle naît sur les montagnes humides & ombragées.

La principale différence entre ces deux plantes, consiste en ce que le grand petasite a tous ses fleurons hermaphrodites, & que le petit petasite a les siens femelles mêlés avec les hermaphrodites.

On se sert en Médecine de leurs racines, & rarement de leurs feuilles: elles sont hystériques, apéritives, vulnéraires & antivermineuses. Les Allemands appellent cette racine *antipestilentielle*, à cause de ses vertus: on l'emploie extérieurement pour résoudre les bubons, & pour mondifier les ulceres, même pour la teigne & les ulceres malins.

PETEUSE: *voyez* BOUVIER.

PETIT CEDRE: *voyez au mot* CEDRE.

PETIT CYPRÈS: *voyez* AURONE.

PETIT-GRIS, animal qui ressemble beaucoup à l'écureuil: on le trouve dans les parties Septentrionales de l'un & de l'autre Continent; sa peau est très-estimée & d'un grand usage pour les fourrures; mais

on doit le regarder comme une espece distincte & différente de celle de l'écureuil.

Le *petit-gris* est plus grand que l'écureuil: il n'a point le poil roux, mais d'un gris plus ou moins foncé; ses oreilles sont dénuées de ces longs poils, qui surmontent l'extrémité de celles des écureuils; il a la queue étendue en panache. Ces animaux different des écureuils, comme on le voit, non-seulement par la grandeur & par la couleur, mais aussi par les habitudes naturelles. On en trouve en grand nombre dans les forêts du Nord & de la Sibérie; ils se réunissent en troupes, voyagent de compagnie, & changent quelquefois de contrée. Il arrive qu'on n'en rencontre quelquefois pas un seul dans un pays où l'année précédente on en trouvoit des milliers.

Lorsqu'ils veulent passer dans un autre canton & qu'il se rencontre à leur passage quelque lac ou riviere, chaque voyageur prend, dit-on, une écorce de pin ou de bouleau qu'il amene sur le rivage; il se met dans ce petit canot, & s'abandonne ainsi au gré du vent; la flotte est nombreuse & vogue doucement au milieu des eaux, à moins qu'il ne s'éleve quelque petite tempête qui submerge les vaisseaux, les pilotes, en un mot la flotte entiere. Ces naufrages, qui sont souvent de trois ou quatre mille voiles, enrichissent quelques Lapons qui trouvent ces débris sur le rivage, & s'emparent des peaux de ces animaux, s'il n'y a point long-temps qu'ils soient sur le sable. Il y a quantité de ces flottes qui passent avec succès, arrivent à bon port & font une navigation heureuse lorsque le vent a toujours soufflé assez doucement.

Comme ces animaux donnent une fourrure douce, fine & estimée, les Lapons leur font une guerre cruelle qui en détruit beaucoup. Vers la S. Michel ils vont à cette chasse avec des chiens qui ont l'odorat & l'œil si exquis, qu'ils ne laissent passer aucun arbre sur lequel il y en ait, quelque élevé qu'il soit, sans avertir leur maître par leur aboiement. La chasse est quelquefois si heureuse, si abondante, que les Lapons en donnent quarante peaux pour un écu.

L'écureuil gris ou noirâtre de Virginie paroît être la

même espece que le *petit-gris* de Laponie dont nous venons de parler : il se tient ordinairement sur les arbres, & particuliérement sur les pins ; il se nourrit de fruits & de graines dont il fait provision pour l'hiver : il les dépose dans le creux d'un arbre où il se retire lui-même pour passer la mauvaise saison, & où il fait aussi ses petits ; on emploie également sa peau en fourrure sous le nom de *petit-gris*. Les Hollandois & les Anglois en tirent une grande quantité par la voie d'Archangel, de Hambourg & de Lubeck. Le petit-gris destiné pour la Turquie se vend en Moscovie par milliers de peaux assorties. Les habitans de Constantinople en consomment une prodigieuse quantité pour leurs vestes dont ils en font onze d'un millier de peaux entieres ; savoir cinq de l'échine qui est la plus belle & la plus chere, & six du ventre qui est le moins estimé. Les Pelletiers Anglois & François en fourrent des bas, des manchons, des aumusses, jupons, couvre-pieds, manteaux de lits, robes-de-chambres, vestes, justaucorps, &c.

PETIT-HOUX, ou HOUX-FRÊLON : *voyez au mot* HOUX.

PETIT ORGE : *voyez* CEVADILLE.

PETOLA. Espece de *serpent double marcheur*. Voyez ce mot. *Seba* donne aussi ce nom à une espece de serpent que M. *Linnæus* appelle *couleuvre*. On trouve le *petola* en Afrique & en Amérique.

PETONCLE, *pectunculus*. C'est une coquille bivalve. *Voyez ce que nous en avons dit au mot* PEIGNE.

PETREL, *procellaria*. Genre d'oiseau aquatique dont on distingue trois especes. Les trois doigts antérieurs sont palmés, celui du derriere est sans membranes, le bec arrondi, édenté. La mâchoire supérieure est crochue par le bout ; l'inférieure est comme tronquée. Le *petrel* est une espece d'*oiseau de tempête*, & peut-être le *pinçon de mer* du P. *Feuillée*, le *storm fink* de *Willughby*, & le *procellaria* des Actes de Stockholm. Cet oiseau, dit *Albin*, a le bec noir, de la longueur d'un pouce : ses narines sont placées dans une enflure au milieu de la mâchoire supérieure, qui est en bec de corbin. Il a une envergure de douze

pouces : la longueur du corps eſt de ſix pouces ; le deſſus de la tête & le dos ſont d'un brun noirâtre. Il a ſur le croupion une grande tache blanche ; le ventre & les ailes ſont d'une couleur claire ; les ailes plus longues que la queue de plus d'un pouce ; les plumes de la queue n'ont guere qu'un pouce & demi de long ; les jambes en ont autant : les pieds ſont bruns & palmés. On dit que quand ces oiſeaux approchent d'un navire en mer, c'eſt un augure de tempête. Ils ſe rangent derriere le gouvernail du vaiſſeau, & s'y tiennent à l'abri juſqu'à ce que le gros temps ſoit paſſé : quelquefois ils volent, d'autres fois ils courent ſur les flots d'une vîteſſe extrême. On les rencontre ſur les plages ſeptentrionales : ils nichent dans les rochers. Les autres oiſeaux de ce genre ſont le *petrel cendré* & le *petrel tacheté*, appelé vulgairement *damier*. Le premier eſt de la groſſeur d'une alouette, le deuxieme eſt du volume d'un canard, & le damier eſt de la groſſeur du pigeon romain : on trouve le damier au Cap de Bonne-Eſpérance. On leur a donné le nom de *petrel* par alluſion à SAINT PIERRE qui marchoit ſur les eaux. *Voyez* OISEAU DE TEMPÊTE. Les Anglois regardent ces oiſeaux comme les meſſagers des orages.

PÉTRIFICATIONS, *petrificata*. Les Naturaliſtes donnent ce nom à des reſtes de végétaux & d'animaux convertis en pierres, & que l'on trouve dans les couches du globe de la terre. Quand ces corps n'ont point ſubi de changement, qu'ils n'ont point été altérés, dénaturés ni minéraliſés, alors on les nomme ſimplement *foſſiles*. Voyez ce mot. Cependant pour que l'on puiſſe donner le nom de *pétrification* à un corps, & en déterminer la claſſe & le genre, ou même l'eſpece, il faut que le tiſſu, la forme primitive & une ſorte d'organiſation y ſoient encore reconnoiſſables. Ainſi l'on ne doit pas mettre au rang des pétrifications proprement dites les noyaux pierreux, moulés dans la cavité de quelque coquille ou d'un autre corps organiſé. *Voyez* NOYAUX.

Les *pétrifications* ſont donc des foſſiles étrangers à la terre (*heteromorpha*). Celles du regne végétal ſont preſque toutes ou graveleuſes ou ſilicées, & on les

rencontre dans les ravins, les fouilles, les lieux escarpés, &c. Celles qui font feu avec le briquet se trouvent principalement dans des fentes sablonneuses : celles qui font effervescence dans les acides proviennent communément du regne animal, & se rencontrent dans les couches horizontales de terre calcaire, quelquefois dans des lits d'argile ou de gravier ; alors la nature de la pétrification est différente. Quant aux fossiles qui se découvrent dans les pierres à plâtre, rarement ils sont altérés, soit pour la figure, soit pour la composition ; au reste ces derniers fossiles sont rares.

Par ce préliminaire on voit que les corps organisés, devenus fossiles, acquierent souvent un degré de solidité qu'ils n'avoient pas avant d'être ensevelis dans la terre ; il n'est pas rare d'en trouver dont la dureté égale celle des pierres ou matrices dont ils font partie ; mais si les masses de pierre qui les enveloppent viennent à se détruire, les fragmens des fossiles se retrouvent dans leurs débris, & sont toujours très-reconnoissables. Cependant il se trouve des corps organisés qui se détruisent entiérement. On sait, & personne n'en doute, qu'il y a une matiere, plus ou moins agitée, propre à pénétrer les corps ; ce qui ébranle leurs parties, les sépare les unes des autres, les entraîne avec elle & les répand çà & là dans le fluide qui les environne : aussi les voyons-nous presque tous, tant solides que liquides, se dissiper insensiblement, diminuer de volume, & enfin par le laps du temps, s'évanouir & disparoître à nos yeux. *Voyez* EAUX TERREUSES. Ne nous éloignons pas de notre sujet.

Toute pétrification strictement dite n'est plus que le squelette du corps qui a eu vie, ou qui a végété : c'est ainsi que le *bois pétrifié* n'est pas totalement le bois même ; une partie des principes qui entrent dans sa composition venant à se détruire par des causes locales, aura été remplacée par des substances sableuses ou terreuses, détrempées, très-ténues que des eaux qui les baignoient y auront déposées en s'évaporant ; ces parties terreuses, alors moulées dans le squelette, seront plus ou moins endurcies, & paroîtront avoir la figure, la structure, la grandeur, en un mot les mêmes

caracteres génériques, les mêmes attributs spécifiques & les mêmes différences individuelles : les rapports paroîtront exactement les mêmes. Nous disons plus, il paroît que dans le bois converti en pierre il n'existe plus de substance ligneuse. On sait que les bois ordinaires sont des corps qui ont beaucoup plus de volume en pores qu'en parties solides. Lorsque le bois est enterré dans certains lieux, il s'introduit dans ses différens pores des sucs lapidifiques extrêmement divisés, quelquefois colorés, & qui en rempliſſent les capacités; ensuite ces sucs se condensent & s'y moulent, après quoi le solide du bois se décompose & se réduit en parties poudreuses qui sont expulsées hors de la masse par les filtrations de l'eau; par ce moyen il laisse vides, en forme de pores, les places qu'il occupoit. Cette opération de la nature ne produit aucune différence apparente ni sur le volume, ni sur la forme; mais elle y cause un changement de substance, & le tissu ligneux se trouve retourné, c'est-à-dire que ce qui étoit pore dans le *bois naturel*, devient solide dans le *bois pétrifié*. Dans cette opération on voit que la nature s'est imitée & copiée elle-même. De cette maniere, dit M. *Musard*, le bois pétrifié a bien moins d'étendue en pores qu'en parties solides, aussi est-il un corps beaucoup plus dense & plus pesant que le premier. Telle est l'origine des pétrifications : ce sont des corps organisés, qui du fond des mers ou de la surface de la terre ont été dénaturés & ensevelis par divers accidens, à différentes profondeurs de la terre. Pour ne point laisser d'équivoque sur notre définition, *voyez* FOSSILES.

Parmi les *pétrifications de végétaux* appelées *dendrolites*, on trouve des parties d'arbrisseaux, des tiges, des racines, des portions de tronc, quelques fruits &c. encore ne faut-il pas confondre les *empreintes* des mousses, des fougeres, des feuilles, ni les *incrustations* avec les pétrifications. *Voyez ces mots & l'article* NOIX PÉTRIFIÉES.

Parmi les *pétrifications d'animaux*, on trouve des coquilles, des crustacées, des productions à polypier, quelques vermisseaux, des parties osseuses de poissons & d'amphibies, rarement d'oiseaux & de quadrupedes,

ainsi que des portions osseuses du corps humain. *Voyez les mots* OSTÉOLITHES, TURQUOISE, ENCRINITES, CRAPAUDINES, & tous les autres qui y ont rapport, & dont il est mention dans le corps de ce Dictionnaire. A l'égard des serpens pétrifiés, ce sont des *cornes d'Ammon*. Il y a aussi les corps figurés & accidentels, ce sont des *jeux de la nature*. Voyez ces mots.

Dans notre Traité particulier de *Minéralogie*, imprimé à Paris en 1761, & réimprimé en 1774, nous avons donné à la fin du second volume, par forme d'appendix, une classe de ces fossiles, avec une division très-succincte & une interprétation abrégée des noms que les différens Auteurs leur ont donnés; mais nous nous sommes réservé de donner un Ouvrage complet sur ces corps. Les recherches sans nombre qu'il faut faire à cet égard, demandent encore quelques années; nous ajouterons seulement ici ce que M. *Bertrand* dit de la pétrification (*Dictionnaire des Foss. T. II, p. 115*): pour qu'un corps se pétrifie, il faut, dit cet Auteur, qu'il soit, 1°. de nature à se conserver sous terre; 2°. qu'il soit à couvert de l'air & de l'eau courante; 3°. qu'il soit garanti d'exhalaisons corrosives; 4°. qu'il soit dans un lieu où se rencontrent des vapeurs ou des liquides chargés, soit de parties métalliques, soit de molécules pierreuses, comme dissoutes, & qui, sans détruire le corps, le pénetrent, l'imprégnent & s'unissent à lui, à mesure que les parties du corps se dissipent par l'évaporation.

C'est une question très-importante parmi les Naturalistes, que de savoir combien la Nature emploie de temps pour pétrifier des corps d'une grandeur un peu considérable. Feu l'Empereur, Duc de Lorraine, qui, connoisseur éclairé, ne regardoit pas sa magnifique collection d'Histoire Naturelle, comme un cabinet de parade, mais comme un sanctuaire où la Nature devoit se faire connoître par ses différentes productions, a souhaité qu'on découvrît quelque moyen pour fixer l'âge des pétrifications. M. le Chevalier de *Baillu*, digne Directeur du Cabinet d'Histoire Naturelle de Sa Majesté Impériale, & quelques autres Naturalistes eurent, il y a plusieurs années,

années, l'idée d'une recherche qui pouvoit répandre quelques lumieres sur la question proposée par l'Empereur. Sa Majesté Impériale, instruite par les observations unanimes des Historiens & des Géographes modernes, que certains piliers qui se voient actuellement dans le Danube en Servie près de Belgrade, sont des restes du pont que l'Empereur Trajan fit autrefois construire sur ce fleuve, présuma que ces piliers s'étant conservés tant de siecles devoient être pétrifiés, & qu'ils fourniroient des éclaircissemens sur le temps que la Nature emploie pour changer le bois en pierre. L'Empereur trouvant, dis-je, son espérance fondée, donna ordre aussi-tôt à son Ambassadeur à la Cour de Constantinople de demander la permission de faire retirer du Danube un des piliers du pont de Trajan, ce qui fut accordé; on en retira un avec beaucoup de peine, & il s'est trouvé que la pétrification ne s'y est avancée que de trois quarts de pouce dans quinze cents ans: mais il y a certaines eaux dans lesquelles cette transmutation se fait beaucoup plus promptement. Au reste, la pétrification paroît se former moins lentement dans les terrains poreux & un peu humides, que dans l'eau même.

Lorsqu'on fit la fouille des fondemens de la ville de Quebec en Canada, on trouva, dans les derniers lits que l'on creusa, un Sauvage pétrifié. Quoique l'on n'ait eu aucune anecdote du temps où cet homme fut enseveli sous ces ruines, toujours est-il vrai que son carquois & ses fleches étoient encore bien conservés. C'est ainsi qu'en fouillant une mine de plomb dans la Province de Derby en Angleterre, en 1744, on trouva un squelette humain parmi des bois de cerf: qui sait depuis quel nombre de siecles cet événement est arrivé? En 1695 on déterra près de Tonna en Thuringe un squelette entier d'éléphant, avec quatre dents molaires & deux défenses, chacune de huit pieds de longueur; quelque temps avant cette époque l'on avoit trouvé dans les mines de ce pays le squelette pétrifié d'un crocodile. Voici une autre anecdote également curieuse & arrivée au commencement de ce siecle: *Jean Munte*, Curé de Slægarp en Scanie, & plusieurs de ses Paroiss-

siens qui vouloient tirer de la tourbe d'un terrain marécageux desséché, trouverent à quelques pieds de profondeur dans la terre, un chariot entier avec les squelettes des chevaux & du Charretier. On présume qu'il y a eu autrefois un lac en ce même endroit, & que le Charretier voulant y passer sur la glace, y a probablement péri. Enfin on a trouvé du bois en partie fossile & en partie charbonneux, enseveli à une grande profondeur, dans les glaises dont on fait la tuile à l'Abbaye de Fontenay. On a découvert depuis peu du bois fossile à soixante-quinze pieds de profondeur dans un puits creusé entre Issi & Vanvres, près Paris : ce bois étoit dans du sable, entre un lit de glaise & de pyrites, & l'eau se trouvoit quatre pieds plus bas que les pyrites.

On trouve beaucoup de morceaux de bois pétrifié, dans différens pays de la France & de la Savoie. Dans le pays de Cobourg en Saxe, & dans les montagnes de la Misnie, on a tiré de terre des arbres d'une grosseur considérable qui étoient entiérement changés en une très-belle agate, ainsi que leurs branches, leurs racines : l'on a reconnu en les sciant les cercles annuels de leur croissance : on en a tiré des morceaux sur lesquels on voit distinctement qu'ils ont été rongés par les vers ; d'autres portent des marques visibles de la cognée. J'en ai où l'on voit quelques gros clous ; enfin l'on en a trouvé des morceaux qui étoient pétrifiés par un bout & dont l'autre bout étoit encore dans l'état de bois propre à brûler. Il paroit donc que le bois pétrifié est beaucoup moins rare dans la Nature, qu'on ne le pense communément, & qu'en bien des endroits il ne manque pour le découvrir, que l'œil d'un Naturaliste curieux : ajoutons que le bois pétrifié peut offrir les différentes teintes des diverses agates. Nous en avons un échantillon qui a absolument la teinte de la sardoine : il faisoit partie d'un pieu qui avoit servi à un édifice près de la mer, à la Martinique.

PÉTROLE, *petroleum*, en Italien *petroglio*. C'est un bitume liquide, inflammable, d'une odeur forte, d'une saveur pénétrante, & exhalant dans le feu une vapeur fétide ; il surnage toutes les liqueurs. Cette huile miné-

rale découle le long de certains rochers à travers des terres & des pierres dans la Sicile, dans l'Italie, en France, en Allemagne, &c. Quand cette substance bitumineuse est sans couleur, on l'appelle *naphte clair*, ou *pétrole blanc ;* tel est celui du Duché de Modene du côté du mont Apennin, près du mont Gibius, & notamment celui de Perse, dans la Péninsule, appelée par KEMPFER *mediæ-okesra.* Cette huile minérale se trouve toujours à la surface des eaux, ainsi que tous les pétroles. Le naphte, dit-on, ne peut être contrefait, & il ne souffre aucun mélange, il n'y a guere que l'éther qu'on puisse lui comparer. Le naphte a quelquefois une teinte verdâtre ou isabelle. Il s'allume à une petite distance du feu & brûle sans laisser de résidu : il s'empare aussi, & attire à la surface l'or qui est en dissolution dans l'eau régale. Lorsque le *pétrole* est rouge-brun, on l'appelle *huile de Gabian*, du nom d'un village, près de Béziers en Languedoc, où il se trouve, découlant des fentes de certains rochers bitumineux. S'il est noir ou d'un brun fauve, on l'appelle *huile minérale d'Ecosse*, parce qu'on le ramasse dans la fontaine de Sainte-Catherine d'Ecosse, à deux milles d'Edimbourg.

L'*huile minérale des Barbades*, qui se trouve dans l'Amérique, à Colao & à Surinam, est encore un pétrole jaunâtre, ainsi que celui de Ratwik en Dalécarlie.

Engelb. Kempfer (*Amœnit. exot. fascic.* 2, &c.) dit que les Turcs appellent *kara-naphti*, le pétrole noir. Il est fluide quand on le tire du puits ; mais il s'épaissit en consistance de poix, quand il est exposé à l'air. Les Russes appellent *kamina masla*, le même pétrole qu'ils recueillent dans les montagnes d'Ural en Sibérie. Ils s'en servent, dit *Strahlemberg*, pour noircir les cuirs. On remarque que plus le pétrole découle d'un lieu élevé, & plus il est léger & blanc ; tandis que celui qui se tire au pied d'une montagne, est brun, roux ou noir ; enfin, si l'on fouille plus bas, on rencontre souvent du *jayet*, ou de l'*asphalte*, ou de la *pissasphalte*, ou du *charbon de terre*, & quelquefois du *succin*, & même du *soufre*. Toutes ces matieres étant liquides, se trouvent plus communément dans des especes de

puits, & semblent tirer leur origine d'une même substance, mais qui est sujette à des modifications; ce qui peut produire la différence des bitumes que nous venons de citer. *Voyez leurs articles.* M. *Riviere* prétend que le pétrole de Gabian est semblable au produit que l'on retire vers le milieu de la distillation du succin. Il conclut même que le pétrole est une espece de succin qui a resté liquide pour n'avoir pas rencontré dans son courant quelque suc propre à le coaguler & à le durcir, ou qui est devenu liquide au moyen de la dissolution qu'en ont fait les sels âcres que l'eau minérale a détaché de sa surface. Le Physicien *Marius* a fait sur cette huile minérale plusieurs expériences dont voici l'extrait: 1°. une chandelle faite avec parties égales de pétrole & de résine brûle entiérement dans l'eau: 2°. La vapeur qui s'éleve du pétrole mis dans un vase sur le feu, forme un petit atmosphere d'un phlogistique volatil qui s'enflamme au moyen d'une bougie allumée à trois pieds de distance: 3°. l'eau n'éteint point cette huile enflammée, mais elle la fait élever avec bruit: le bois, les meches brûlent dans cette huile mêlée avec de l'eau: 4°. la gelée n'altere ni n'épaissit le pétrole; 5°. il nage sur l'huile d'olive, comme étant plus léger de dix-huit grains par once; il l'est de trente plus que l'eau-de-vie, & de quatre-vingt-quatre plus que l'eau commune: 6°. le pétrole s'enfonce plus promptement dans l'eau que les huiles végétales, mais il y remonte plus vîte: 7°. une seule goutte de pétrole versée sur une eau dormante s'étend de plus d'une toise en tout sens, & en cet état elle donne les plus vives couleurs de l'iris; mais si elle s'étend davantage, elle blanchit, & disparoit enfin. Cette extension est des plus surprenantes: on sait qu'un papier enduit de pétrole ne devient transparent que pour quelques momens, il cesse de l'être dès qu'il a été séché à l'air; pour ces expériences, il faut prendre le pétrole clair & léger.

Quelques Auteurs donnent le nom d'*huile fossile éthérée* ou de *gas*, au *pétrole*. On en a encore découvert depuis quelques années dans la chaîne d'Alais en Languedoc, & dans un ruisseau à cinq lieues de Bergerac,

mais en petite quantité. La fontaine de Béziers en donne par année environ trois à quatre quintaux ; elle en donnoit autrefois plus de trente-six. Ce bitume liquide sert à éclairer en Perse & en plusieurs autres lieux ; mais notamment à Backu, ville située sur la mer Caspienne, à trois milles d'Astracan, où il n'y a point de bois. On y fait un commerce si considérable du *pétrole*, qui s'y puise dans plus de vingt puits (dans un espace qui a environ un demi-quart de lieue de tour), que le Souverain en retire de droit régalien, plus de cent mille livres argent de France. Les Marchands de cette contrée envoient dans les pays étrangers le *naphte pur*, & gardent pour la consommation de leur pays le *pétrole*, que l'on brûle dans les Eglises & les maisons, dans des lampes garnies de meches grosses comme le pouce. On s'en sert aussi au lieu de bois : pour cet effet on jette deux ou trois poignées de terre dans l'âtre de la cheminée, on verse ensuite l'huile minérale par dessus, puis on l'allume avec un bouchon de paille, & sur le champ il en résulte une flamme assez vive ; plus on agite & retourne la terre imbibée, & mieux elle brûle : il en sort une vapeur d'une odeur très-disgracieuse, & la fumée noircit entiérement les habitations ; cependant les alimens n'en contractent absolument aucun mauvais goût. Les Gaures ou Persans qui adorent le feu & qui suivent la religion de Zoroastre, viennent à Backu pour rendre leur culte à Dieu, qu'ils adorent sous l'emblême du feu ; & la flamme du pétrole allumée est pour eux le *feu perpétuel*.

On prétend que le *pétrole* du commerce, sur-tout celui qui nous vient par la voie de Hollande, est composé de résine de sapin, d'essence de térébenthine, avec un peu d'huile de cade, & de celle de gabian & de talc. D'autres contrefont ou alterent le *pétrole* ou *huile de gabian*, avec de l'essence de térébenthine, du goudron & de la poix noire. Mais un tel pétrole se reconnoît bientôt par la propriété qu'il a de colorer entiérement l'esprit de vin, & de s'y dissoudre en bonne quantité ; ce qui, dit-on, n'arrive pas au pétrole naturel, à moins qu'on ne se serve d'un intermede. On assure cependant qu'il se mêle parfai-

tement avec les esprits acides, les huiles essentielles de thym, de lavande & de térébenthine.

On se sert de cette huile minérale pour guérir les membres gelés : on l'estime vermifuge & spécifique, étant appliquée sur les parties affoiblies, engourdies & paralytiques, & même pour la gale ; les Maréchaux s'en servent pour les enclouûres, ulceres & farcin des chevaux : on s'en sert dans certains feux d'artifice, & ceux qui font commerce de cette huile doivent user de grandes précautions contre le feu. On dit que le *pétrole* étoit la base inflammable du feu grégeois. *Voyez le second volume de notre Minéralogie.*

PETRO-SILEX. Espece de pierre ou *caillou de roche* que l'on regarde comme la matrice du *jaspe*, & quelquefois du *porphyre*. Voyez ces mots. Nous avons une suite fort étendue de *petro-silex*, dont les nuances nous font reconnoître l'une des especes de caillou silex, les jaspes, la matrice du porphyre & de plusieurs autres pierres à base marneuse, qui abonde en argile sableuse. Le petro-silex est composé de parties plus grossieres que les silex mêmes, & les pierres siliceuses, comme agates, cornalines, &c. Il est moins dur & moins propre à polir : il ne paroît demi transparent que dans les parties minces. Il y en a de différentes couleurs ; verdâtre, blanchâtre, bleu, jaune, &c. Son tissu tient de celui du grès & de celui du silex.

PETUN. *Voyez* NICOTIANE.

PETUN-SÉ, PE-TUN-TSE. C'est le nom que l'on donne à l'une des deux pierres qui entrent dans la composition de la porcelaine de la Chine. Les échantillons que nous en avons vus sont durs, opaques, d'un gris verdâtre, & nous ont toujours paru être une espece de spath fluor & vitrescent. On sait que cette sorte de spath est plus dur & plus pesant que les spaths proprement dits, lesquels sont calcaires & ne se vitrifient point : celui ci au contraire ne fait point d'effervescence avec les acides ; & quoiqu'il ne soit pas assez dur pour faire feu avec le briquet, cependant il entre en fusion au feu, propriété qui lui est propre, & qui oblige les Naturalistes d'en faire un genre particulier : ce petun-sé se casse en morceaux d'une forme assez rhomboïdale,

brillans intérieurement ; si on se contente de le calciner légérement, il acquerra, ainsi que la pierre de Boulogne, la propriété phosphorique. Celui de la Chine donne quelquefois, à l'aide du briquet, des étincelles fort foibles : on le trouve dans les rochers du pays. *Voyez* PIERRE DE BOULOGNE : *voyez aussi l'article* VASES.

Dans la premiere édition de ce Dictionnaire nous avons dit : « plus nous considérons les caracteres du » petun-sé de la Chine, & plus nous sommes tentés » de croire qu'il se trouve une pierre en Europe, & » sur-tout en France, qui partage avec lui les pré- » rogatives dont nous venons de faire mention : la » seule différence que nous y trouvons, c'est que no- » tre petun-sé de France fait plus de feu frappé avec » l'acier ; & pour trancher le mot, ce petun-sé est le » *feld spath* des Auteurs, c'est-à-dire un *quartz* vi- » treux ou lamelleux. On en trouve en quantité dans » les roches de granite en Allemagne, & particuliére- » ment au Hertrey, près d'Alençon, lieu où il se trouve » aussi une espece de kaolin, qui en Chine est la se- » conde matiere de leur porcelaine. On trouve aussi » dans les Vosges une pierre verdâtre qui participe » beaucoup des propriétés du petun-sé de la Chine. » *Voyez* KAOLIN.

Depuis cette édition nous avons appris qu'indépendamment de l'espece de kaolin à terre calcaire, dont nous avons parlé d'après les échantillons que nous conservons dans notre cabinet, & que nous avions rencontrés sur le terrain, ou reçu du P. d'*Incarville* Missionnaire à la Chine, il existoit aussi un kaolin dont toute la partie terreuse ne faisoit aucunement effervescence avec les acides, & nous avouons que nous en devons la description à M. *Guettard*. Voyez son Mémoire sur la découverte des terres à porcelaine, lu à l'Académie des Sciences, ann. 1765. Lorsque nous écrivions l'article kaolin de la seconde édition de cet Ouvrage, nous ne pouvions encore, ni ne devions rien ajouter, soit à nos connoissances acquises, soit à celles qu'on avoit rendues publiques ; l'illustre Académicien que nous venons de citer en réclamant l'honneur de la décou-

verte faite en France d'un kaolin ſemblable à celui de la Chine, n'a eu probablement en ſes mains que des kaolins dont la terre paroît ſemblable aux argiles blanches; car il paroît douter que nous ayons rencontré, ou vu, ou analyſé des kaolins a terre calcaire. Nous oſons cependant aſſurer à tout le monde chimique, que nos yeux ſont accoutumés à l'expérience, & notre plume à la vérité.... Au reſte nous aimons mieux croire que M. *Guettard* n'ayant vu qu'une même eſpece de terre à kaolin (celle qui effectivement eſt la plus abondante), il n'a pas pu en admettre d'autre.... Que n'avons-nous pu deviner les intentions ou les motifs de ce ſavant Naturaliſte! *Voyez* le Supplément de ſon Mémoire cité ci-deſſus; *voyez* auſſi les Obſervations faites à ce ſujet, & ſur le petunſé par M. *Torchet* de Saint-Victor, Ingénieur des mines de France. *Journal de Médecine, Février & Juin 1766.* Le Lecteur trouvera réunies de ſuite toutes les diſcuſſions faites à ce ſujet dans le premier Volume des *Mémoires ſur différentes parties des Sciences & Arts*, par M. *Guettard.*

PETZCOALT, eſt un ſerpent du Mexique, long de quatre pieds & demi, gros à proportion: il a le deſſus du corps jaune, mêlé d'un peu de rouge, couvert de grandes écailles taillées en loſange, unies, & gliſſantes au toucher: les écailles tranſverſales du ventre ſont mélangées de roux & de jaune; ſa tête eſt garnie d'amples & fortes écailles relevées en boſſe: ſes yeux ſont beaux & très-grands. Cette eſpece de ſerpent repaire dans des creux d'arbres d'où il épie ſa proie, & fond rapidement deſſus quand elle ſe préſente. Il n'eſt pas rare, dit *Séba*, de voir deux ou trois de ces ſerpens être aux aguets & viſer au même butin.

PEUCEDANE. *Voyez* QUEUE DE POURCEAU.

PEUPLADE. Terme dont on ſe ſert pour parler du frai, de l'alvin, & de tous les petits poiſſons que l'on met dans un étang pour l'empoiſſonner. On appelle auſſi *peuplade* une colonie d'étrangers qui viennent chercher des habitations dans une contrée. *Peuple* ſe dit encore des jetons ou talles qui viennent aux pieds des arbres & des plantes bulbeuſes.

PEUPLIER, *populus*. Le peuplier eſt un grand arbre dont il y a trois eſpeces principales ; ſavoir, le *peuplier blanc*, le *peuplier noir*, & le *peuplier tremble* déſigné ordinairement ſous le ſeul nom de *tremble*.

Il y a des peupliers qui ne portent que des fleurs mâles ; ceux qui portent des fleurs femelles donnent du fruit.

Chaque fleur mâle eſt à huit étamines attachées à une eſpece de corolle en entonnoir fort évaſé, taillé obliquement, & ſoutenue par une écaille frangée.

Les fleurs femelles ſont diſpoſées en chatons écailleux, différens de ceux des fleurs mâles, en ce qu'au lieu des étamines on y trouve, le long du filet, des piſtils auxquels ſuccedent des capſules à deux loges, dans leſquelles on voit des ſemences aigrettées.

Les feuilles de la plupart des peupliers ſont rondes ou rhomboïdales, & attachées à de longs pédicules : elles ſont poſées alternativement ſur les branches.

Le *peuplier blanc à grandes feuilles*, ou *griſaille de Hollande* ou *franc-picard à grandes feuilles*, & le *peuplier blanc à petites feuilles*, ont les feuilles velues & extrêmement blanches par deſſous, d'un vert brun par deſſus. Ces eſpeces de peupliers croiſſent avec une extrême vivacité dans les lieux aquatiques : ils viennent cependant bien dans les terrains aſſez ſecs. Nous en avons planté entre de gros ormes, dit M. *Duhamel*, pour remplir des places vides ; & ils y ont bien réuſſi, ce qui n'eſt pas un médiocre avantage.

On donne auſſi le nom d'*ypreau* ou de *blanc de Hollande* à un orme à larges feuilles.

Le premier nous eſt venu de la ville d'Ypres. Les Pariſiens donnent le nom d'*aubel* ou d'*orme blanc* au peuplier blanc.

Les *peupliers noirs* ne peuvent faire de grands arbres que dans les terrains humides : ils ſe plaiſent ſinguliérement ſur les berges des foſſés remplis d'eau : leurs feuilles ſont rhomboïdales, pointues, dentelées & liſſes. Il y a une eſpece de peuplier noir qui n'eſt qu'une variété de l'eſpece précédente, dont les feuilles ſont dentelées plus profondément & ondées ſur les bords : on cultive cette eſpece dans les vignes pour l'employer en place

d'osier : c'est pour cette raison & assez mal-à-propos, qu'on l'appelle *osier blanc*. On l'étête fort bas, & on coupe tous les ans ses rejets. Il y a une autre espece de peuplier noir, dont les feuilles ressemblent assez à celles du précédent, & qui vient de Lombardie : cette variété donne des arbres qui forment de belles pyramides ; & ces arbres réussissent parfaitement dans les lieux marécageux.

Il y a encore une autre espece de peuplier noir, que l'on nomme aussi *tacamahaca* : ses boutons répandent un baume très-odorant ; ce qui lui a fait aussi donner le nom de *baumier*. Cette espece d'arbre aime l'humidité ; mais il demande aussi une exposition chaude, & il craint les trop grands hivers : cependant placé dans un jardin bas, M. *Duhamel* lui a vu passer l'hiver de 1754, qui a fait périr beaucoup d'autres arbres. On le multiplie par marcottes & par boutures.

Les *peupliers noirs* ont leurs boutons, qui sont les œilletons ou germes des feuilles, chargés d'un baume dont l'odeur est assez agréable ; (on les nomme *yeux de peuple, oculi aut gemmæ populi nigræ*) : c'est pourquoi on fait entrer ces boutons dans quelques baumes composés & dans l'onguent *populeum* ; mais il n'y en a point qui en répandent autant, & d'une aussi agréable odeur que celui de l'espece à feuilles ovales surnommé *baumier*. Cette espece de peuplier, par rapport au baume qu'il répand, est assurément préférable à tous les autres pour l'usage de la Médecine. On tire de ces boutons de peuplier noir une teinture avec de l'esprit de vin, qui est propre à arrêter les anciens cours de ventre : on en fait aussi usage pour les ulceres internes. La dose ordinaire est un demi-gros, soir & matin, dans une cuillerée de bouillon chaud. Les feuilles de peuplier noir sont estimées propres à calmer les douleurs de la goutte & des hémorrhoïdes, étant pilées & appliquées sur la partie malade. On peut tirer des boutons à fleur des peupliers une espece de cire ; en voici le procédé : Il faut cueillir ces boutons à l'instant de leur maturité, c'est-à-dire lorsqu'ils sont bien visqueux ; on les écrase dans un mortier & on les fait tremper dans de l'eau bouillante, on verse le tout dans un sac de grosse toile,

on l'exprime au moyen d'une presse, & l'on obtient une cire molle d'un jaune grisâtre, très-combustible & qui donne une odeur agréable.

On a tenté avec succès de faire du papier avec le duvet que fournissent les aigrettes des semences du peuplier. M. *Brayset* fils, de Lyon, a obtenu de cette substance, sans aucun mélange de chiffons, un papier extrêmement fin, soyeux, également susceptible de recevoir la colle & d'être soumis à l'impression du marteau. Avant lui M. le Docteur *J. C. Schæffer* avoit fait à Ratisbonne la même expérience avec autant de succès, mais avec quelques différences que la diversité des procédés devoit occasionner dans les résultats. Les essais multipliés de ce dernier Observateur sur diverses substances végétales tendent à prouver qu'il en est peu dont on ne pût obtenir du papier: la pomme de pin, les bois du mûrier, de la vigne & du saule, la pomme de terre & jusqu'aux tourbes d'Hanovre & de Baviere, se sont converties en papier sous ses industrieuses mains. *Voyez l'article* PAPIER.

Les *peupliers trembles*, (car il y en a deux especes qui different par la grandeur de leurs feuilles), ont les feuilles presque rondes, non dentelées, mais ondées ou godronnées par les bords: elles sont soutenues par des queues très-menues & très-souples, ce qui fait qu'elles tremblent continuellement, pour peu que le vent les agite: ces arbres se plaisent dans les lieux humides; celui à petites feuilles se trouve néanmoins dans des terrains assez secs, & il y croît à une moyenne grandeur.

L'espece de peuplier de la Virginie & de la Caroline se fait aisément reconnoître à ses jeunes branches relevées de côtes ou arêtes saillantes, & à ses feuilles très-grandes, larges & épaisses. Cet arbre pousse avec une vigueur extraordinaire dans les terrains bas & humides; il se multiplie aisément de boutures.

On fait avec le bois de peuplier blanc des pieces de charpente pour les bâtimens de peu de conséquence; les Sculpteurs l'emploient en place de tilleul: & comme il est léger, on en fait des sabots, des talons de souliers, & des planches pour des fonds d'armoires, &c. qui sont

assez bonnes, quand elles sont à couvert de la pluie. Le bois du peuplier blanc n'est pas d'un usage si familier que celui du peuplier noir. Cependant les Ebénistes s'en servent pour les bâtis propres à recevoir les bois de placage. On dit que le bois du peuplier noir, lorsque l'arbre est vieux, devient propre à faire divers ouvrages de marqueterie, à cause des veines dont il est ondé. Les feuilles du peuplier noir & blanc sont, dit M. *Bourgeois*, très-bonnes pour nourrir les moutons pendant l'hiver. On émonde les branches de ces arbres tous les trois ans, & on en fait des fagots qui servent à brûler, après que les moutons en ont mangé les feuilles.

Quelques Auteurs prétendent que l'écorce du peuplier blanc a la propriété de faire venir abondamment de bons champignons, si on la répand par parcelles dans des terres qui auront été bien fumées auparavant.

Le *peuplier de Lombardie*, dont nous avons parlé plus haut, est connu aussi sous le nom de *peuplier d'Italie*. M. *Pelé de S. Maurice*, de la Société Royale d'Agriculture de la Généralité de Paris, a donné des Observations sur cet arbre fort commun en Italie, où il fait un très-bel effet. Cette espece d'arbre est, suivant ce qu'il nous en apprend, supérieure à tous les autres peupliers, par le produit qu'on en peut tirer: c'est pourquoi nous exposerons d'après lui, la maniere de le cultiver.

Le peuplier d'Italie ou de Lombardie croît en très-peu de temps, se multiplie très-facilement, ne demande ni beaucoup de soins, ni beaucoup de dépense, & après quinze ans de plantation, donne à son maître un produit considérable. A peine les arbres ordinaires commencent-ils à paroître, que ceux-ci n'existent plus: ce sont des prodiges qu'il faut voir pour se le persuader. On en voit qui au bout de douze ans, sont de la grosseur d'un muid, c'est-à-dire, qui ont vingt-sept à vingt-huit pouces de diametre, grosseur à laquelle les autres peupliers ne parviennent que dans l'espace de trente ans. Cet arbre est plus beau, plus droit, plus facile à employer que celui de France. Son bois est dur, propre à faire des charpentes de toutes especes:

on prétend même qu'on peut en faire des mâts de vaisseaux. Quelle ressource pour nous qu'un arbre si précieux ! & quel est le Citoyen qui ne s'empressera de le cultiver ! On assure que trente arpens de ce bois à couper, valent en Italie quatre-vingts ou cent mille livres. En faut-il davantage pour prouver la supériorité de cet arbre sur tous les autres : on peut voir le prompt accroissement de ces arbres & leur beauté, en suivant les bords du canal de Montargis.

Le peuplier d'Italie se fait encore distinguer des autres peupliers, parce que ses branches sortent droit de son tronc où elles sont plus approchées, & lui donnent la forme de pyramide, au lieu que dans le peuplier noir, nommé improprement *osier blanc*, auquel il ressemble le plus, les branches sont pendantes. Les feuilles de celui-ci sont d'un vert terne, au lieu que celles du peuplier d'Italie, sont d'un beau vert foncé : ce dernier devient toujours un arbre bien droit, tandis que l'autre est souvent tortueux. Quoiqu'il croisse beaucoup plus vîte, son bois est cependant plus dur, & les Menuisiers lui trouvent une qualité bien supérieure au premier.

Le peuplier d'Italie se multiplie avec la derniere facilité, par le moyen des boutures. Avec une branche qui a dix à douze pouces de longueur & un pouce de circonférence, on a un arbre qui en trois ans porte jusqu'à dix-huit pieds de hauteur, & qui dans cet intervalle produit assez de jets pour former une pépiniere.

Lorsqu'on veut en établir une pépiniere, on doit choisir un terrain gras & frais, mais qui ne soit point amendé, parce que les jeunes arbres gagnent toujours à être transplantés d'une terre moins bonne dans une meilleure, & que d'ailleurs on auroit à craindre les chancres & les gros vers blancs qu'engendre le fumier, & qui ravagent les pépinieres. C'est à la fin de Février qu'on doit élaguer les peupliers pour en tirer des boutures : on ne doit prendre que du bois d'un an, celui de deux ans est moins bon que le premier. On en coupe l'extrémité en flûte, & lorsqu'on observe de laisser un bourlet d'écorce au pied de la bouture, elle en reprend plus facilement, parce que c'est de

ces bourlets que partent les racines. On trace son terrain, on y fait des trous d'un pied de profondeur : on y enfonce la bouture à une profondeur de douze pouces, en observant de ne laisser au dehors qu'un œil ou deux. On donne de temps à autre des labours à la pépiniere. On ne doit pas retrancher les jets de la premiere année, parce qu'ils donnent de la nourriture au jeune plant. A la troisieme année on décharge l'arbre de quelques brins qui croissent vers le bas de la tige, & on le nettoie ainsi chaque année en montant. Lorsqu'on retire les arbres de la pépiniere, on peut les planter dans toutes sortes de terrains, à moins qu'ils ne soient trop secs ou trop pierreux. Les prés, les vallons, les bords des ruisseaux, les terres fraîches & grasses paroissent leur convenir davantage, ils y deviennent de la plus grande beauté. Une observation très-importante & générale lorsqu'on plante les arbres, c'est de ne les enfoncer tout au plus que d'un pouce de plus qu'ils l'étoient dans la pépiniere : on les voit souvent périr par la manie des gens de campagne, qui mettent jusqu'à un pied & demi de terre sur leurs racines, au lieu qu'il ne doit y en avoir qu'un demi pied.

Après quinze ou vingt ans de plantation le propriétaire peut se faire un grand produit de ces arbres, car en les débitant en voliches, on peut retirer au moins quarante-quatre livres de chacun. Ainsi il résulte de tout ce que nous venons de dire, que le peuplier considéré par rapport à son agrément, son progrès & son utilité, est pour celui qui le possede une source abondante de biens. Le produit de ces arbres est souvent doublé avant que d'autres especes d'arbres aient pu être coupés une seule fois.

Les pépinieres où l'on peut trouver des boutures de peuplier d'Italie, sont à Montargis, à Nemours, à Moret, à Gron près Sens, & à Mombar. M. le Marquis de *Chambray* cultive avec succès les peupliers d'Italie à sa terre de Chambray, proche de Tillieres en Normandie ; il se fait un plaisir d'en donner des boutures aux personnes qui desirent se procurer cet arbre.

PHACITE, *phacites*, est le nom que l'on donne quelquefois à une espece de *pierre ovaire*, & plus com-

munément à la pierre nommulaire, & dont les grains sont de la grandeur des lentilles. *Voyez les mots* OOLITHES & PIERRE LENTICULAIRE. On trouve des *phacites* dans les environs de Bayonne, sur le bord de la mer où ils sont en masses considérables. On en rencontre qui ont depuis une ligne jusqu'à un pouce & plus de diametre, détachées ou solitaires, ou groupées en masses, en d'autres endroits de la France, en Italie, &c.

PHAGOLINO. *Voyez* ACARNE.

PHAISAN. *Voyez* FAISAN.

PHALANGE, *phalangia*. C'est le nom qu'*Aëtius* donne à six différentes especes d'araignées. Il appelle la premiere *pagion*, qui signifie *pepin de raisin*, parce qu'elle en a la figure: elle est noire & ronde, elle a la bouche au milieu du ventre & de petits crochets autour. La seconde est appelée *loup*, parce qu'elle chasse aux mouches & s'en nourrit: elle a le corps large & agile. On remarque qu'elle a certaines incisions vers le cou, & la bouche relevée en trois endroits. La troisieme est appelée *fourmilliere*, parce qu'elle a beaucoup de ressemblance avec une grande fourmi: elle est de couleur de suie, & a le corps marqueté de petites étoiles, sur-tout vers le dos. La quatrieme est nommée *cronocolaple*: elle a son aiguillon auprès du cou, elle est verdâtre & longuette, elle ne cherche qu'à piquer vers la tête quand elle attaque quelque animal. La cinquieme est appelée *sclérocéphale*, parce qu'elle a la tête dure comme une pierre: elle est rayée de même que ces petits phalenes qui volent autour de la lumiere. La sixieme enfin, qu'on appelle *vermiculaire*, est longuette & un peu tachée vers la tête. *Voyez l'article* TARENTULE.

Lonvilliers de Poincy (*Hist. Nat. des Antilles*, *ch. 14*, *art. 3*,) dit qu'il y a dans les Antilles une sorte de grosse araignée que quelques-uns, à cause de sa figure monstrueuse, mettent au rang des phalanges. Leurs pattes étant étendues forment un cercle qui a plus d'espace que le tour de la main. Nous avons dans notre cabinet une de ces phalanges: son corps est composé de deux parties, l'une est plate, l'autre ronde &

pointue comme un œuf de pigeon ; sa bouche, qui est presque toute cachée sous un poil fauve, est armée de part & d'autre de crochets fort pointus, qui sont d'une matiere solide, d'un noir très-poli & très-luisant. Les Curieux font enchâsser ces crochets dans de l'or, pour s'en servir comme de cure-dents, qui sont très-estimés, parce qu'ils préservent, dit-on, les dents de douleur & de corruption. Ces crochets servent aussi aux Indiens pour déboucher leurs pipes. Notre phalange-araignée étrangere a un trou sur le dos qui est comme son nombril. Quand ces phalanges sont jeunes, leur espece de poil est d'un gris blanchâtre, mais il noircit à mesure qu'elles vieillissent. Leur corps est supporté par dix pieds, velu presque tout autour & garni en-dessous de petites pointes écailleuses, dont elles se servent pour s'accrocher par-tout où elles grimpent ; le bout des pieds est aussi muni d'une corne noire, fourchue & dure : tous ces pieds tiennent à la partie plate du corps, & ont quatre jointures chacun : ces pieds vont en grandissant du premier au dernier. On a bien de la peine à distinguer les yeux de ces animaux, tant ils sont petits : ces phalanges qui vivent de mouches sont peut-être les mêmes que l'araignée *anause* de la Guinée, & le *democulo* de l'île de Ceylan, dont il est fait mention dans l'*Hist. des Voyages*, *T. IV & T. VIII.* La tarentule est encore une espece de *phalange*. Voyez l'article ARAIGNÉES ÉTRANGERES.

Dans les mêmes Iles, on donne aussi le nom de *phalanges* à ces prétendues grosses mouches cornues, dont nous avons parlé à la suite de l'*article* MOUCHE.

PHALANGE, *phalangium*, est une plante dont on distingue trois especes. La premiere pousse une tige non rameuse, haute d'un pied, ronde, ferme, soutenant en sa sommité des fleurs composées chacune de six feuilles, disposées en étoile, de couleur blanche : à cette fleur succede un fruit arrondi, divisé en trois loges, qui renferment des semences anguleuses & noires : ses racines sont fibrées. La seconde espece est rameuse ; la troisieme, que l'on regarde comme un faux asphodele des Alpes, pousse des feuilles étroites, vertes, dures, semblables à celles de l'iris, d'un goût un peu

peu amer : il s'éleve d'entre elles une tige haute d'un pied & demi, grêle & revêtue de quelques feuilles, portant en sa sommité un épi de petites fleurs à six feuilles, étoilées, pâles ou de couleur herbeuse. Quand ces fleurs sont passées, il leur succede des fruits comme aux especes précédentes.

Toutes les especes de phalanges, dit *Lémery*, croissent pour l'ordinaire aux lieux aquatiques & montagneux, proche des ravines d'eau : on les estime propres contre les morsures des serpens, contre les piqûres des scorpions, des phalanges, & pour chasser les vents, étant prises en décoction dans du vin.

PHALANGER. Espece de petit animal ainsi nommé de ce qu'il a les phalanges singuliérement conformées, & que de quatre doigts qui correspondent aux cinq ongles dont ses pieds de derriere sont armés, le premier est comme soudé avec son voisin, en sorte que ce double doigt fait la fourche, & ne se sépare qu'à la derniere phalange pour arriver aux deux ongles. Ces animaux sont de la taille d'un petit lapin, & sont surtout remarquables par l'excessive longueur de leur queue, par l'alongement de leur museau & par la forme de leurs dents qui suffiroient pour les faire distinguer du *sarigue*, de la *marmose*, des *rats* & de toutes les autres especes d'animaux auxquels on voudroit rapporter le *phalanger*.

PHALANGISTE. Nom donné à un scarabée très-curieux; son corselet est armé de deux longues pointes latérales qui débordent la tête.

PHALAROPE, *phalaropus*. Nom donné à un genre d'oiseau étranger & aquatique, dont le caractere est d'avoir des pieds semblables à ceux de la foulque; quatre doigts devant & un derriere, tous à membranes séparées; le bec droit, menu, & la mâchoire supérieure plus ou moins courbe vers le bout. On en distingue plusieurs especes: il y a le phalarope qui se trouve en Angleterre sur les bords de la mer; c'est le *tringa gris de fer au pied de poule d'eau d'*Edwards. Son plumage est bleuâtre sur le dos, les ailes sont noires vers le milieu des grandes plumes. Cet oiseau est un peu moins gros que le râle aquatique : les membranes

du pied intérieur sont divisées en deux lobes; celles du doigt du milieu en trois lobes, & celles du doigt extérieur en quatre lobes; tous ces lobes n'ont pas plus d'une ligne d'intervalle de l'un à l'autre, & ils sont tous denticulés : le bec est noir.

Le *phalarope cendré* se trouve dans la Baie d'Hudson, ainsi que celui qui est rousâtre.

Le *phalarope brun* se rencontre dans l'Amérique Septentrionale; il est un peu plus gros que les précédens.

PHALENE. Les Naturalistes donnent ce nom à toutes les especes de papillon qui ne volent que sur le soir & pendant la nuit à la clarté d'une lumiere; ce qui fait qu'on les appelle aussi *papillons nocturnes*. C'est la classe de papillons la plus nombreuse. Les Curieux connoissent le *souci*, le *filene*, la *petite tortue*, l'*écaille marte*, le *ptérophore*, le *grand paon de nuit*, le *sphinx du troêne*, la *lichenée rouge*, la *feuille morte*, le *volant doré*, le *lambda*, le *zig-zag*, &c. *Voyez ce que nous avons dit des phalenes au mot* PAPILLON, pour ce qui les distingue des *papillons diurnes*, ou *papillons de jour*, dont les plus connus en France, sont les *nacrés*, le *gamma* ou *robert le diable*, le *deuil*, le *demi-deuil*, le *gazé*, l'*aurore*, le *satyre*, *les argus*, &c.

PHARMACITE ou AMPELITE. Espece de terre noire bitumineuse. *Voyez au mot* CRAYON NOIR.

PHASE. *Voyez à l'article* PLANETE.

PHASÉOLE. *Voyez* HARICOT ORDINAIRE.

PHATAGIN. Espece d'animal des Indes Orientales, connu aussi sous le nom impropre de *lézard écailleux*. Le phatagin ressemble assez au pangolin. *Voyez son histoire au mot* PANGOLIN.

PHIALITE. Nom donné à des concrétions pierreuses, souvent fableuses & qui imitent des flacons, des poires à poudre, des bocaux. *Voyez* JEUX DE LA NATURE & LITHOGLYPHITES.

PHILANDRE. *Voyez* DIDELPHE.

PHOQUE, *phocas*. Cet animal nous paroît être le même que le veau marin, ou le tigre marin : il n'est qu'une variété du *loup marin*. Voyez ce mot.

Le phoque est une espece d'amphibie vivipare, dont le caractere, dit M. *Brisson*, *pag. 229*, est d'avoir six

dents incisives à la mâchoire supérieure, & quatre à l'inférieure ; à chaque pied cinq doigts onguiculés joints ensemble par des membranes ; les pieds postérieurs tournés en arriere : cet animal habite plus la mer que la terre. Il a quatre dents canines semblables à celles des chiens, savoir, une de chaque côté à chaque mâchoire : le nombre de ses dents molaires n'est pas constant.

Le phoque a, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, environ quatre pieds de long ; la mâchoire supérieure plus longue que l'inférieure : l'ouverture de sa gueule est moyenne : ses dents se serrent les unes contre les autres, elles sont pointues, dures, & blanches ; son museau est oblong & garni de moustaches très-roides & courbées en arriere ; ses yeux sont grands & enfoncés profondément dans leur orbite : on ne lui reconnoît point d'oreilles extérieurement, mais à leur place il y a des trous par lesquels il entend ; sa tête est petite, & ressemble à celle d'un chien à qui on a coupé les oreilles près de la tête : il a les narines du veau terrestre ; son cou est alongé, & il peut le raccourcir à sa volonté ; sa poitrine est large ; le reste de son corps, jusqu'aux pieds de derriere, qui sont à l'extrémité de l'animal, va en diminuant ; ses jambes sont tout-à-fait sous la peau : il n'y a que les pieds qui paroissent ; ceux de devant ont quatre pouces de long, & ceux de derriere neuf pouces : ils sont entiérement garnis du même poil que le corps, & gros comme le poignet d'un homme, sur-tout dans la partie d'en bas ; tous leurs doigts sont joints ensemble par de fortes membranes & armés de cinq ongles, forts, noirs & très-piquants ; sa queue a deux pouces & demi de long, & est plate horizontalement : sa peau est dure ; tout son corps est couvert de poils courts, roides, d'un gris brillant & marqué d'un nombre de taches noirâtres, tant en dessus qu'en dessous : le ventre est d'un blanc sale. Tel est le phoque, qui est dans notre collection d'animaux.

Plusieurs Auteurs ont soupçonné qu'il y avoit aussi des phoques noirs ; nous pouvons affirmer qu'il en existe, d'après celui que M. G***. nous a confié pour en faire l'examen : ce phoque n'a que vingt-six pouces de lon-

gueur, à prendre du bout du museau jusqu'à l'extrémité de la queue, qui est un peu arrondie, & qui n'a pas plus de huit lignes. Le poil de son dos, de dessus le cou & de la tête, est d'un noir de jayet, mais celui qui couvre la poitrine est moins foncé, ainsi que celui de la gorge. Le poil du ventre jusqu'à l'anus est de couleur fauve. Les appendices qui rendent ses pieds palmés, imitent beaucoup plus les nageoires, que dans le phocas précédent. La peau du menton est non-seulement dégarnie de poil, mais un peu amincie par le frottement qu'a éprouvé cette partie quand l'animal marchoit sur les bords des greves, &c. On sait que les pieds antérieurs du phoque étant placés vers le plus grand diametre de sa poitrine, qui est elle-même située au milieu de toute la longueur de l'animal, & son cou étant d'ailleurs long & aussi gros que sa tête, il en résulte une masse qui n'a pour appui que la mâchoire inférieure. Une remarque importante, dont il convient de faire mention, c'est qu'aucuns *phocas* ou *veaux marins* n'ont, dit-on, d'oreilles saillantes: celui-ci en a qui ont chacune un pouce de longueur; nous n'avons remarqué que peu ou point d'ongles dans les palmes antérieures, peut-être auroient-elles été plus sensibles si l'animal eût été plus grand; peut-être aussi est-ce une espece différente, & non une seule variété du phocas.

Le phocas, dit M. *de Buffon*, est d'autant plus étrange, qu'il paroît fictif, & qu'il est le modele sur lequel l'imagination des Poëtes enfanta les *tritons*, les *sirenes*, & ces Dieux de la mer à tête humaine, à corps de quadrupede, à queue de poisson. Le phocas regne en effet dans cet Empire muet, par sa voix, par sa figure, par son intelligence, par des facultés, en un mot, qui lui sont communes avec les habitans de la terre, si supérieures à celles des poissons, qu'il semble être non-seulement d'un autre ordre, mais d'un monde différent. Aussi cet *amphibie*, quoique d'une nature très-éloignée de celle de nos animaux domestiques, ne laisse pas d'être susceptible d'une sorte d'éducation; on le nourrit en le tenant souvent dans l'eau; on lui apprend à saluer de la tête & de la voix: il s'accoutume à celle de son

maître ; il vient lorsqu'il s'entend appeler, & donne plusieurs autres signes d'intelligence & de docilité.

Le phocas, continue M. *de Buffon*, a le cerveau & le cervelet proportionnellement plus grands que l'homme, les sens aussi bons qu'aucuns des quadrupedes, par conséquent le sentiment aussi vif, & l'intelligence aussi prompte : l'un & l'autre se remarquent par sa douceur, par ses habitudes communes, par ses qualités sociales, par son instinct très-vif pour sa femelle & très-attentif pour ses petits, par sa voix plus expressive & plus modulée que celle des autres animaux : il a aussi de la force & des armes ; son corps est ferme & grand, ses dents tranchantes, ses ongles aigus. D'ailleurs il a des avantages particuliers & uniques sur tous ceux qu'on voudroit lui comparer : il ne craint ni le froid, ni le chaud ; il vit indifféremment d'herbes, de poisson & de chair ; il habite également l'eau, la terre & la glace ; il est avec la *vache marine* ou *morse*, le seul des quadrupedes qui mérite véritablement le nom d'*amphibie*, le seul qui ait le trou ovale du cœur toujours ouvert, le seul par conséquent qui puisse se passer de respirer, & auquel l'élément de l'eau soit aussi convenable, aussi propre que celui de l'air. La *loutre* & le *castor* ne sont pas de vraies amphibies, puisque leur élément est l'air ; & que n'ayant pas cette ouverture dans la cloison du cœur, sur-tout la loutre, ils ne peuvent rester long-temps sous l'eau, & qu'ils sont obligés d'en sortir ou d'élever leur tête au-dessus pour respirer.

Gesner dit que le phocas fréquente plus le rivage que la haute mer, nous en avons cependant vu prendre un dans la mer à la distance de vingt-sept lieues du rivage. Ses jambes de derriere, quoiqu'ayant les doigts des pieds onguiculés, lui servent plus commodément à nager qu'à marcher. Lorsque le phocas est dans l'eau, & qu'il y a excité des mouvemens d'impulsion avec ses jambes postérieures faites en rames, on remarque qu'il réunit longitudinalement ces membres, de maniere à ne leur donner que la figure d'une queue de poisson fourchue, mais perpendiculaire : cet animal est si gros & a les jambes si courtes, que lorsqu'il est couché, la rondeur du ventre les empêche

presque de toucher à terre ; cependant il ne laisse pas que de s'en servir & de se traîner plus vîte qu'on ne croiroit.

Anderson prétend que dans le détroit de Davis ces animaux parviennent à la longueur de dix pieds ou environ ; ils ont, dit-il, entre la chair & la peau quatre doigts d'épaisseur d'une graisse qui donne de fort bonne huile. Ce même Naturaliste du Groënland, qui nomme improprement, ainsi que les habitans du Cap de Bonne-Espérance, le phocas *chien de mer*, dit encore que sa peau est fort recherchée, & que l'on équipe tous les ans quelques petits bâtimens pour leur faire la chasse. Ces especes de Chasseurs marins portent le nom de *robben-schlagers*, qui signifie *batteurs de chiens de mer*, parce qu'ils les surprennent sur la glace quand ils dorment : ils les tuent à coups de bâton en les frappant sur le nez, où ces animaux sont uniquement fort sensibles ; d'autres fois ils les percent à coups de lance. Les phocas qui se trouvent aussi dans les mers & les lacs de Kamtschatka sont fort vivaces : ils couvrent quelquefois entiérement les bancs de sable ; ils se jettent tous à l'eau quand un bateau approche. Ces animaux sont d'une ressource infinie pour les habitans Sauvages du détroit de Davis ; la chair étant fumée, leur sert de nourriture, le sang de médecine, la peau d'habillement. Les Kamtschadales font encore de cette peau non-seulement des semelles de souliers, mais encore des bateaux qui contiennent jusqu'à trente hommes, & qui sont plus légers & plus vîtes que ceux de bois ; les tendons & les intestins servent de vitrage, de voile, de fil à coudre & de ficelle à lier ; les os, de toutes sortes d'ustensiles de ménage & de chasse. M. *Heidenreich*, Voyageur royal pour la découverte des mines de Sibérie & de la Tartarie, dit qu'on trouve dans le lac de Beickal qui est d'eau douce, des phocas, qui dans le temps des gelées savent adroitement pratiquer çà & là des ouvertures dans la glace pour en sortir & pour y rentrer selon leurs besoins, ne trouvant pas toujours des vivres sous l'eau. Les habitans voisins de ce lac les tirent avec des harpons à trois crochets, & ils ne se servent dans leurs lampes que de l'huile tirée de cette graisse ; ils en font aussi de la chandelle.

Il ne nous doit plus paroître incroyable que cet animal marin puisse vivre aussi dans l'eau douce, tout Paris en a été témoin depuis quelques années, ayant eu occasion d'en voir un que l'on montroit aux foires, & que l'on conservoit dans des cuves.

Denys, dans sa *Descript. des côtes de l'Amériq. Septentrionale*, *Tom. I. pag. 64*, dit que les jeunes phocas sont plus gras que les vieux, & que l'huile des premiers est aussi bonne à manger & à brûler que l'huile d'olive, n'ayant aucune mauvaise odeur. Ce même Auteur (*T. XI*, *C. 17*) fait mention d'une petite espece de ce même amphibie, dont la chair fait les délices des Sauvages, de même que l'huile avec laquelle ils s'oignent aussi les cheveux: cependant la chair de cette espece d'animal est molle & grasse, & elle se fond entre les mains quand on l'y tient long-temps, tant elle est huileuse.

Le phocas ou veau marin se nomme en Languedoc, *vedel de mar*, en Italie, *vechio marino*. *Rondelet* assure que cet animal vient faire ses petits à terre, mais qu'il ne peut pas vivre long-temps sans retourner à la mer: il dit aussi que ses épaules sont jointes par quatre muscles. Ces animaux s'accouplent comme les cétacées; le mâle a le membre génital long & osseux, & les femelles ont une fente comme les raies: elles font un ou deux petits, & les allaitent avec leurs deux mamelles; au bout de douze jours les meres menent les petits à la mer, pour les accoutumer peu à peu à nager. Le veau marin vient souvent dormir à terre; il ronfle si haut, qu'il fait alors un bruit pareil à celui du veau terrestre quand il beugle; sa langue est comme fendue ou fourchue par le bout.

La voix du phocas peut se comparer à l'aboiement d'un chien enroué; dans son premier âge son cri imite assez le miaulement d'un chat: les petits qu'on enleve à leurs meres miaulent continuellement, & se laissent quelquefois plutôt mourir d'inanition que de prendre la nourriture qu'on leur offre; ils ne reçoivent que l'aliment que leur donne la mere. Les vieux phocas aboient contre ceux qui les frappent, & font tous leurs efforts pour mordre & se venger. En général, ces ani-

maux ſont peu craintifs, ils ſont même naturellement courageux; on a remarqué que le bruit du tonnerre & le feu des éclairs, loin de les épouvanter, ſemblent les récréer: ils ſortent de l'eau dans la tempête, dit M. *de Buffon*, ils quittent même alors leurs glaçons pour éviter le choc des vagues, & ils vont à terre s'amuſer de l'orage, & recevoir la pluie qui les réjouit beaucoup: ces différentes ſcenes de la Nature ſont pour eux des ſpectacles très-agréables. Ils ont naturellement une mauvaiſe odeur, & que l'on ſent de fort loin lorſqu'ils ſont en grand nombre; il arrive ſouvent que quand on les pourſuit, ils lâchent leurs excrémens qui ſont jaunes & d'une odeur inſupportable; ils aiment à dormir au ſoleil, ſur des glaçons, ſur des rochers: on peut les approcher ſans les éveiller, & c'eſt une des manieres ordinaires de les prendre.

Dans la mer de Feroë le phocas, dit *P. J. Debes*, a ſa retraite dans les cavernes des rochers; on peut avec de petites barques entrer dans ces antres étroits, pour le ſurprendre & le tuer ainſi que ſes petits: les vieux eſquivent le coup de maſſue, & échappent ſouvent aux Pêcheurs; mais pour peu qu'on les frappe ſur la tête, ils tombent, répandent des larmes, & voulant ſe défendre avec la gueule, ils préſentent la gorge au couteau. On en égorge quelquefois de cette maniere juſqu'à cinquante dans un jour. *Debes* ajoute que pour donner la chaſſe à ces animaux, il faut être armé de perches, de gros bâtons & de torches allumées; les jeunes ne ſont pas difficiles à tuer. M. *Knutberg* a trouvé un autre moyen pour détruire les phocas, c'eſt de braquer dans les trous des rochers, où ces animaux ſe raſſemblent en grand nombre, une eſpece de lance qui eſt pouſſée dans le corps de l'animal par un reſſort que le moindre mouvement fait détendre. On trouve dans les *Mém. de l'Acad. Royale de Suede*, *1757*, un détail de la pêche des veaux marins dans l'Oſtro-Bothnie. Les Finlandois n'ayant rien à faire pendant l'hiver, s'aſſemblent en troupe & vont à la chaſſe de ces animaux pendant Février, Mars & Avril: ils ſe ſervent de fuſils & de filets. Cette caravane qui ne boit que de l'eau de mer que l'on adoucit quelquefois avec du

petit lait, voyage avec beaucoup de précaution & de danger au milieu des glaces, sur lesquelles on est souvent obligé de traîner les bateaux ; on y rampe aussi sur le ventre, & l'on frappe du pied comme ces animaux pour les attirer. Le plus court expédient est de les guetter aux ouvertures qu'ils ont pratiquées dans les glaces pour sortir à volonté de l'eau, ou pour respirer l'air frais ; c'est là qu'on peut leur couper le nez. Quand on tient un petit, on le fiche tout vivant sur un fer à trois pointes, qu'on enfonce dans l'eau par les ouvertures ; la mere accourt aussi-tôt, & voulant le débarrasser, elle se blesse & périt. Dans les mers du Kamtschatka les femelles des phocas ne portent qu'un petit, qu'elles mettent bas sur la glace ; elles l'allaitent. Quand la marée descend, ces animaux restent couchés sur les rochers, & pour se jouer, ils se poussent les uns les autres dans la mer, mais ces petits jeux dégénerent bientôt en querelles sanglantes, ils se font des morsures cruelles : comme ils marchent difficilement, on prétend que pour rendre leur chemin plus facile, ils vomissent, dégorgent de l'eau sur le sable.

PHOCENE. Animal cétacée des Anciens, les Modernes l'ont nommé *marsouin*. Voyez ce mot.

PHŒNICOPTERE ou FLAMAND ou FLAMBANT. *Voyez* BECHARU.

PHOLADE. C'est un coquillage multivalve, que l'on appelle *pitaut* en Normandie, *dail* en Poitou & dans l'Aunis, & *piddochs* en Angleterre. Les Anciens ont nommé ce coquillage *pholas ;* il meurt dans le premier trou qu'il a habité après sa naissance, sans en être jamais sorti pendant sa vie ; aussi le caractere générique des dails se tire-t-il de leur habitude à se cacher dans les pierres, & à y creuser eux-mêmes leurs sépulcres. L'on en trouve quelquefois vingt dans un même bloc de pierre ; & *Rondelet* dit qu'ils ne sont pas rares sur le rivage d'Ancône. (Les dails de *Rondelet* ne sont peut-être que les dattes de la Méditerranée. *Voyez* DATTES DE MER).

On en distingue deux especes fort communes sur les côtes d'Aunis & d'Angleterre. La coquille du dail est composée, dit M. d'*Argenville*, de trois pieces, dont

deux sont semblables, égales, blanches, & fort grandes par rapport à la troisieme; celle-ci est posée auprès du sommet des deux autres, & elle remplit un petit espace, qui resteroit vide entr'elles. On en distingue encore quelquefois deux autres petites & fort minces, qui sont attachées par des ligamens au dos de la coquille, & qui souvent tombent dès que le dail est mort, ce qui arrive quand il cesse d'être baigné par l'eau de la mer: cette coquille a encore une sorte d'opercule cartilagineux.

Ce coquillage, qui est long de quatre pouces, habite ordinairement dans une pierre grisâtre, médiocrement dure & qu'on appelle *banche;* son trou est une fois plus profond que sa coquille n'est longue: la figure de ces trous approche d'un cône tronqué, excepté qu'ils sont terminés par une surface concave & arrondie: leur direction est à-peu-près oblique à l'horizon: les petits trous qui sont à l'extérieur dénotent où sont les dails.

M. de Réaumur (*Mém. de l'Acad. des Scienc. 1712, pag. 126 & suiv.*) dit qu'il n'y a guere de mouvement progressif, plus lent que celui du dail: muré comme il est dans son trou, il n'avance qu'en s'approchant du centre de la terre: le progrès de ce mouvement est proportionné à celui de l'accroissement de l'animal; à mesure qu'il augmente en étendue, il creuse son trou, & descend plus bas: son outil, dit cet Auteur, est la partie charnue, située près du bout inférieur de la coquille, elle est faite en losange, & assez grosse par rapport au reste du corps. On a vu des dails, tirés de leurs loges souterraines & posés sur la glaise assez molle, la creuser assez profondément en peu d'heures, en recourbant & en ouvrant successivement cette partie charnue, & l'on a reconnu aussi que l'animal y employoit d'autant plus de temps que la substance de la matiere qu'on lui offroit rendoit son ouvrage plus difficile & son travail plus pénible.

Les dails, selon M. d'*Argenville*, ne sont jamais, quoique tirés de la pierre, fermés par leurs extrémités; la superficie extérieure des deux grandes valves est toujours la même: elle ressemble à une lime, surtout vers la tête. (Ne seroit-ce pas là les armes dont

les dails se serviroient pour percer ou tarauder les pierres plus ou moins dures & agrandir ces especes de sépulcres, à mesure qu'ils grossissent?) Comme on ne trouve point de jeunes dails dans la banche, mais seulement dans la glaise, il est à présumer que les trous des gros dails ont été pratiqués d'abord dans de la glaise molle & qui s'est ensuite endurcie, d'autant que l'animal y doit passer sa vie, puisqu'il lui est impossible de sortir de cette loge, sur-tout celle qui est dure, l'orifice étant beaucoup trop étroit pour permettre la sortie de la coquille : du milieu des écailles des dails, sort un long tuyau épais, & partagé en deux cloisons inégales; dont un trou sert à l'animal pour vider ses excrémens, l'autre à respirer & à prendre de la nourriture. Quand la pholade a pris trop d'eau, elle la rejette avec violence. M. *de Réaumur* n'a pu trouver que trois pieces aux pholades de nos Côtes; mais M. *de la Faille* prétend que tous les dails ont nécessairement six pieces. Voyez *le Mémoire de ce Savant, imprimé dans le Recueil des différentes pieces présentées à l'Académie de la Rochelle.* Ce Mémoire est rempli d'observations qui semblent vider le différent entre MM. de *Réaumur* & d'*Argenville.* Nous avons vu des pholades composées de six pieces fort inégales entr'elles & plus ou moins fines, dont les deux plus grandes qui sont latérales répondent aux battans des bivalves, & sur-tout de certaines tellines; les autres qui sont beaucoup plus petites se trouvent fixées par des ligamens, partie sur le sommet & sur le repli extérieur de chaque battant, partie le long des battans mêmes, soit en dessus, soit en dessous; il faut observer que ces dernieres pieces sont si fragiles & si minces, qu'il est rare de les trouver jointes aux deux principales, qui d'ailleurs ne ferment jamais exactement. Voilà les pholades à six pieces ou *sextivalves* : on les trouve sur les parages de presque toutes les mers. Les deux grandes valves sont sinueuses & évasées, bombées vers l'une des extrémités, à larges replis sur ses sommets, à bords dentelés; la robe est un réseau granuleux, dans un tiers de sa longueur & près la tête: il y en a qui ne sont réticulées que dans la partie antérieure, le reste de la robe est strié. Il y a certaines es-

peces de pholades qui ne se logent que dans les bois qui se trouvent dans la mer, leur forme est presque conique, leur robe est peu réticulée ; elles ne sont ordinairement composées que de cinq pieces, ou *quintivalves*. Ces pholades ne sont pas si communes.

Les dails-moules, *dactyli Plinii*, (ce sont probablement les *dattes de mer*) ont la propriété de luire dans les ténebres, & la lumiere qu'ils répandent est d'autant plus brillante, que le coquillage renferme plus de liqueur : cette lumiere, dit Pline, *Hist. Nat. Lib. IX, Cap. LXI*, paroît jusques dans la bouche de ceux qui mangent des dails pendant la nuit : elle paroît sur leurs mains, sur leurs habits & sur la terre, dès que la liqueur de ce coquillage se répand, n'y en eût-il qu'une goutte ; ce qui prouve que cette liqueur a la même propriété que le corps de l'animal. Ces faits ont été vérifiés il y a quelques années sur les vraies pholades des côtes du Poitou, & se sont trouvés vrais dans tous les détails. On ne connoît sur cette côte aucun autre coquillage, ni même aucun poisson, ni aucune sorte de chair d'animaux qui ayent cette propriété avant d'être pourris. Les dails, au contraire, ne paroissent jamais plus phosphoriques que lorsqu'ils sont plus frais, & même ils ne jettent plus aucune lumiere lorsqu'ils sont corrompus à un certain point. L'animal, dépouillé de la coquille, est lumineux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ; car si on le coupe, il sort de la lumiere du dedans comme du dehors : ces coquillages en se desséchant, cessent d'être lumineux. Si on les humecte, il reparoît une nouvelle lumiere, mais foible ; de même celle que jette la liqueur qui sort de ce coquillage s'éteint peu-à-peu à mesure que cette liqueur s'évapore. Cependant on peut la faire reparoître par le moyen de l'eau : par exemple, lorsqu'on a vu cette lumiere s'éteindre sur un corps étranger qui avoit été mouillé de la liqueur du coquillage, on fait reparoître la même lumiere en trempant ce corps dans l'eau. *Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, année 1723.*

PHOLADITE, est la coquille précédente devenue fossile. Il n'y a pas long-temps qu'on a découvert ces sortes de coquillages fossiles.

PHOLIDOTE. Espece de *lézard écailleux*. Voyez ce mot.

PHOSPHORE ou PORTE-LUMIERE. Nom que l'on donne aux corps qui paroissent lumineux dans l'obscurité. Il y a des phosphores naturels & d'artificiels : les premiers sont les *vers lumineux des huîtres*, les *dails*, le *bois pourri*, le *poisson puant*, les *yeux du chat*, le *ver-luisant*, le *porte-lanterne* d'Amérique, la *mer lumineuse*, les *éclairs dans les nuages orageux*, les *prétendues étoiles qui filent ou qui tombent ;* souvent la chair, le sang, les cheveux, les écailles, les cornes, la farine, & une infinité d'autres matieres provenues des plantes & des animaux, mais particuliérement les urines sont propres à devenir noctiluques. C'est ainsi qu'au moyen de l'art, on produit aussi des phosphores ; il suffit de chauffer ou de frotter vivement les diamans, les cailloux, les quartz, les bois durs & résineux, le sucre, de calciner la *pierre de Bologne*, de verser de l'esprit de nitre sur de la craie, de cuire de l'alun avec du miel, d'évaporer l'urine, &c. Les phosphores produits par ces dernieres opérations s'appellent *pyrophores*, & sont d'autant plus singuliers, qu'on peut en allumer de l'amadou, brûler du papier, écrire des lettres de feu ; cette écriture lumineuse peut être utile pour établir une correspondance secrete & mystérieuse pendant la nuit ; en effet on peut s'en servir sur mer pour s'expliquer tacitement d'un vaisseau à l'autre durant l'obscurité, ou pour faire connoître de la même maniere les besoins d'une Place affiégée, à ceux avec lesquels on seroit convenu de la signification de certains caracteres. M. *Dufay* dit, (Mémoires de l'Académie, 1730), que la pierre à plâtre, les marbres, & toutes les pierres calcaires, même les bois calcinés, produisent aussi de la lumiere dans l'obscurité : mais entre les pierres phosphoriques, la pierre de Bologne & les spaths fluors tiennent le premier rang. L'on trouve encore près de Stockholm & de Rombiere une espece de terre qui, frottée dans un endroit obscur, donne de la lumiere ; il n'y a personne qui ait encore fait sur cette terre les recherches nécessaires pour savoir à quelle espece on doit la rapporter. Combien de substances produiront

auſſi des émanations lumineuſes, ſi avant de les porter dans un lieu obſcur on les a expoſées quelque temps aux rayons du ſoleil pour s'imbiber de ſa lumiere! Combien d'autres dans leſquelles l'élément du feu qu'elles contiennent deviendroit apparent, ſi on leur faiſoit ſubir une ſorte de décompoſition ou de putréfaction, ou qu'on les ſoumît à quelque changement!

PHRYGANE ou FRIGANE, *phryganea*. Nom générique que l'on donne, d'après M. *Linnæus*, à pluſieurs eſpeces de mouches aquatiques, parmi leſquelles on a rangé l'hémerobe & la charrée : *voyez* CHARRÉE. L'hémerobe forme un genre à part: *voyez* HÉMEROBE. La *phrygane* & la *charrée* paroiſſent être le même inſecte, ou au plus deux variétés de la même eſpece.

M. Géoffroy (*Hiſt. des Inſect. des envir. de Paris*) dit que la phrygane eſt un inſecte à antennes filiformes, & très-longues; qui a des ailes bigarrées & poſées latéralement en forme de toit aigu, & relevées à l'extrémité; la bouche eſt formée par une petite trompe accompagnée de quatre barbillons, & ſa tête de trois petits yeux liſſes; la queue eſt ſimple & nue. Divers Naturaliſtes nomment ces inſectes *mouches papilionacées*. Ils reſſemblent un peu aux *perles* pour la forme & la maniere de ſe faire des fourreaux dans l'état de larves. Rien d'auſſi barroque que la figure de ces fourreaux : on diroit d'un trophée de petites coquilles & de plantes; rien encore d'auſſi ſingulier que de voir la larve de la phrygane ſe promener dans l'eau avec le fourreau, dont la plupart des matieres qui le compoſent ſont légeres. Cet étui, dans lequel l'inſecte rentre toutes les fois qu'on l'en retire, ne ſemble formé que pour cacher ſon habitant qui, ſans cela, deviendroit la proie d'un nombre infini d'inſectes aquatiques voraces & même des poiſſons, qui en auroient bientôt détruit l'eſpece, ſi la nature dans l'état de foibleſſe où elle a laiſſé cette larve, ne lui avoit donné en partage la ruſe & l'induſtrie pour éviter les continuelles pourſuites de ſes vigilans ennemis : en effet autant ſa retraite eſt foible, & d'une forme bizarre, autant elle eſt propre à donner le change aux ennemis qui paſſent à chaque inſtant ſur le corps de l'animal, ſans avoir le moindre ſoupçon

de toucher de si près la proie qu'ils cherchent avec tant d'avidité. Le goût, le besoin & l'adresse de notre petit architecte aquatique, décident de la variété de la construction de sa maison, qui n'est pas la même pour tous ceux de la même espece; les uns s'enveloppent d'une simple feuille verte de jonc, ou de quelqu'autre herbe fraîche qu'ils enduisent en dedans d'une matiere impénétrable à l'eau; les autres font un amas de différens brins de joncs, de feuilles seches, de petites coquilles plus ou moins entieres, qu'ils lient ensemble sans ordre, tout est bien calfaté en dedans: chaque larve pratique deux issues dans sa loge; l'une pour se procurer la nourriture & l'autre pour s'en décharger, sans être obligée de sortir de sa maison, qu'elle ne quitte plus quand elle en a une fois pris possession; elle la transporte par tout avec elle dans ses différens voyages de fantaisie ou de nécessité: les jambes lui servent pour marcher & voyager sur terre en tenant le fond de l'eau; elles lui servent aussi de bras lorsqu'elle veut nager & faire le trajet par eau; comme l'animal est obligé, pour fournir à ces différens voyages, d'avoir presque toujours hors de son étui, la partie du corps à laquelle les jambes se trouvent attachées, la sage & savante Nature qui en a prévu toutes les fatales conséquences, l'a muni d'une membrane également forte & compacte, tandis que la partie qui reste dans le fourreau n'est enveloppée que d'une pellicule très-fine & très-déliée. Il y a des phryganes de couleur fauve, de panachées, de noires. La phrygane *mouche en deuil* se distingue des autres, on diroit d'une petite phalene; ses dernieres pattes sont d'une grandeur prodigieuse. *Voyez maintenant* TEIGNE AQUATIQUE.

PHRYGIENNES. On appelle ainsi certaines mouches qui doivent leur naissance à un ver qu'on voit en Phrygie. (*Charleton exercitat.*)

PHYLLIREA. *Voyez* FILARIA.

PHYTOLITHE. Les Naturalistes donnent ce nom aux plantes réellement pétrifiées: on dit *phytotypolithes*, quand elles ne sont qu'en empreintes. On voit beaucoup de roseaux, des prêles, des capillaires, des fougeres, sur les schistes de Pesternitz en Saxe, & de

Saint-Chaumont en Forez, & qui ne sont que des *phytotypolithes*. On en trouve aussi dans des marnes feuilletées, & dans des couches de tuf.

PIC. Nom donné à différentes montagnes très-élevées. Il y a le pic d'Adam dans le Ceylan; le pic de Derby en Angleterre; le pic du Midi dans les Pyrénées; le pic de Saint-George dans les Açores; le pic de Teneriſe près des Canaries; &c. *Voyez l'article* MONTAGNE.

PIC, *picus*. Nom donné à un genre d'oiſeaux dont M. *Briſſon* compte trente-deux eſpeces.

Le caractere des pics eſt d'avoir de forts muſcles aux cuiſſes, des pieds ſolides, fournis de deux doigts devant & de deux derriere, qui ſont armés d'ongles crochus & pointus qui leur ſervent à monter le long des arbres. Ces oiſeaux ne paroiſſent faire leur nourriture que d'inſectes, d'œufs de fourmis, d'artiſons, de vers de bois, ſur-tout de la belle chenille du ſaule, nommée *coſſus*. Ils font des trous dans les arbres avec leur bec, qui eſt fort droit & un peu anguleux: c'eſt dans ces trous d'arbres, qu'ils ont faits ou qu'ils ont trouvés tout faits, que ces oiſeaux ſe retirent: leur langue eſt longue, munie au bout d'un aiguillon oſſeux & dentelé, qui leur ſert à piquer & à enlever la chenille & les autres divers inſectes. On diſtingue:

1°. Le PIC VERT ORDINAIRE, ou PIC-MARS ou PIVERT, *picus martis aut viridis*. Cet oiſeau, que l'on nomme auſſi *pleu-pleu*, eſt très-facile à connoître parmi les autres de ſon eſpece, tant par ſa grandeur que par ſa couleur verte. Ce pic vert a quatorze pouces de longueur depuis la pointe du bec juſqu'à l'extrémité de la queue; ſon envergure eſt de vingt pouces; ſon bec eſt long d'environ deux pouces, noir, dur, fort & triangulaire, un peu émouſſé par le bout; l'iris eſt en partie blanche & en partie rougeâtre; ſa langue étendue a ſix pouces de longueur, & offre des nœuds ou des eſpeces d'articulations: il a le haut de la tête cramoiſi ou couleur de vermillon, tacheté de noir, ainſi que le contour des yeux; il ſe trouve ſous ce noir de chaque côté, une autre tache rouge particuliere au mâle; la gorge, la poitrine & le ventre ſont d'un vert pâle; le dos, le cou & le moindre rang des plumes couvertes

vertes des ailes, sont verts ; les grandes pennes de l'aile d'un blanc verdâtre ; le croupion est d'un jaune pâle ; le dessous de la queue rayé de lignes brunes & transversales : les plumes de la queue sont en partie d'un vert pâle, mêlées de noir & très-fortes : elles semblent comme fourchues par leurs pointes qui sont noirâtres : les pattes & les doigts sont de couleur de plomb, les serres grises-brunâtres ; les jambes sont très-courtes. Cet oiseau se met quelquefois à terre près des fourmilleres, pour chercher sa nourriture.

Cette sorte de pic pond dans des creux d'arbres cinq à six œufs à la fois, & on a trouvé six petits ensemble. Cet oiseau, qui se pose souvent à terre, a une façon de vivre singuliere, il est muni d'instrumens ou d'organes qui lui sont propres & particuliers : n'y eût-il que sa langue, qui outre sa longueur est armée de petites pointes, & toujours enduite de glu vers son extrémité ; enfin l'appareil du bec, des ongles & leur disposition, tout lui est utile & a rapport à sa maniere de chasser & de se nourrir. Il tire sa subsistance des petits vers ou insectes qui vivent dans le cœur de certaines branches, & plus communément sous l'écorce du vieux bois, même sous l'écorce des plus grosses bûches flottées : il essaie par de forts coups de bec qu'il donne le long des branches, les endroits qui sont cariés & vides ; il s'arrête où la branche sonne creux, & casse avec son bec l'écorce & le bois, après quoi il avance son bec dans le trou qu'il a fait, & pousse une sorte de sifflement dans le creux de l'arbre, pour détacher & mettre en mouvement les insectes qui y dorment ou qui s'y croient en sureté ; alors il darde sa langue dans le trou, & à l'aide des aiguillons dont elle est hérissée & de la colle dont elle est poissée, il emporte ce qu'il trouve de petits animaux pour s'en nourrir. C'est dans *Willughby* & *Aldrovande* qu'il faut consulter l'histoire, la figure des muscles & des cartilages qui servent à mouvoir la langue du pic vert. *Voyez aussi les* Observations sur les mouvemens de la langue de cet oiseau, par M. *Mery*, dans les *Mémoires de l'Académie des Sciences*, *an. 1709*, *page 85* ; observations beaucoup plus exactes que celles de MM. *Borelli* & *Perrault*.

Le pic vert a le testicule droit rond, & le gauche oblong; son bec est si dur & si fort, qu'on l'entend souvent dans les forêts frapper contre les vieux chênes, les hêtres, les charmes & les peupliers: c'est-là qu'avec le temps il fait des trous aussi bien arrondis que ceux que fait le Géometre avec son compas. Le vulgaire dit que quand le pic vert a donné quelques coups de bec à un arbre, il va aussi-tôt de l'autre côté pour voir s'il est percé d'outre en outre: mais c'est une erreur, car si l'oiseau tourne autour de l'arbre, c'est plutôt pour y prendre les insectes qu'il a mis en mouvement. Le pic vert vole lentement; néanmoins quand il est poursuivi par l'épervier ou par l'émerillon, il accélere son vol & semble se précipiter & se relever en décrivant des paraboles & en criant de toutes ses forces.

On mange rarement la chair du pic vert, parce qu'elle est trop fibreuse, dure & coriace: cependant à Boulogne on en vend pendant tout l'automne au marché, saison où cet oiseau est fort gras. En Médecine on estime le pic vert apéritif & propre à aiguiser la vue.

2°. Le PIC VERT TRÈS-GRAND, *picus viridis maximus*. Il ne differe du précédent que par son bec qui est un peu courbé, & par le volume de son corps qui égale celui d'une petite poule: ses ailes sont tachetées.

3°. Le PIC VERT BIGARRÉ, *picus varius*. Cet oiseau que l'on appelle encore *épeiche* & *cul rouge*, a le bas du ventre sous la queue d'un beau rouge; le plumage des mâchoires est blanc; celui de la tête est noir, ainsi que le dos: le reste du plumage est assez semblable à celui du pic vert vulgaire, excepté qu'il est tacheté de lignes noires & de points blancs. Le *petit pic vert bigarré* ne differe du précédent que pour la grandeur. En donnant de son bec dans la fente du bois, ou en frappant contre l'arbre avec vivacité çà & là, ses coups redoublés forment un son qu'on entend de fort loin. Il a une tache rouge sur la tête: cet oiseau semble être le petit cul rouge ou le pic rouge, ou la petite épeiche. Des Ornithologistes citent encore un autre petit pic vert bigarré qui n'est que de la grandeur du moineau domestique. M. *Linnæus* en cite aussi un dans les Actes

de Stockholm, *ann. 1740, pag. 222*, qui se trouve en Suede dans les montagnes de Dalécarlie.

4°. Le PIC DE MURAILLE ou PIC D'AUVERGNE, *picus murarius*. Cet oiseau qui est l'*échelette* de *Belon*; ne se trouve guere qu'en Auvergne, où on le nomme *ternier*: c'est une espece de *grimpereau*. Voyez ce mot. Autant les pics verts aiment à monter le long des arbres, autant celui-ci grimpe le long des murailles; ses ailes sont marquées de rouge comme celles d'un papillon; sa queue est courte & noire, ainsi qu'une partie de ses ailes: il a le bec & la tête comme l'étourneau, le dos, le cou & la tête de couleur cendrée: c'est un oiseau gai, volage: il est gros comme le merle, il se fait entendre de loin, sa voix est forte & mélodieuse: il ne peut rester en place, ni perché, mais pendu par ses griffes & sur sa queue à la maniere des pics verts; il vole en battant des ailes, & ordinairement seul ou avec un autre: sa nourriture consiste en mouches & en araignées; il fait ses petits dans des trous de murailles.

5°. Le GRAND PIC NOIR ou PIMAR, *picus niger maximus nostras*. Cet oiseau est le grimpereau noir d'*Albin*. *Voyez l'article* GRIMPEREAU. Le *pic cendré* est le *torchepot*.

6°. PICS ÉTRANGERS. On distingue, 1°. celui qui a le bec d'un blanc d'ivoire, une crête rouge, tout le reste du plumage blanc mêlé de noir, on le voit dans la Caroline, celui de la Virginie a le bec plombé: 2°. le pic aux ailes dorées: 3°. celui qui a le ventre rouge: 4°. le pic velu, c'est-à-dire qui a le long du dos des plumes velues & variées: 5°. le pic à ventre jaune: 6°. le pic grivelé; il est très-petit & ressemble assez au pic velu: 7°. le pic varié de Bengale; ses couleurs qui sont agréablement distribuées, tirent sur le gris, le noir, le blanc, le rouge & le jaune: 8°. le pic rayé de S. Domingue; il a le dessus de la tête & de la queue d'un beau couleur de rose; sa queue est noirâtre; le reste du plumage comme au pic vert bigarré: 9°. le pic jaune de Perse: 10°. le pic vert varié de Cayenne qui n'a que trois onglets: 11°. le pic blanc de Cayenne &c.

Il y a quantité d'autres oiseaux qui approchent des pics & que l'on reconnoîtra facilement par les caracte-

res génériques que nous avons exposés au commencement de cet article.

PICACUROBA. *Voyez* TOURTE.

PICAREL, *smaris*. C'est un petit poisson de mer, blanc, à nageoires épineuses : on le nomme à Marseille *haret*, comme qui diroit *petit hareng*, parce qu'ayant été fumé comme les autres harengs, il pique la langue quand on le mange : c'est une espece de petite *mendole blanche*. Ce poisson est de la longueur du doigt, il a le museau pointu, le milieu du corps marqué des deux côtes de taches noires ; ses traits sont argentés & dorés : on le nomme à Antibes *garon*. Les Pêcheurs le salent & le mettent à l'air pour dessécher ; il y en a qui le font tremper & dissoudre dans le sel pour faire la sauce que l'on appelle *garum*. Ce mets si vanté des Grecs & des Romains, & dont le prix égaloit celui des parfums les plus précieux, excite singuliérement l'appétit. *Lémery* dit que le picaret excite le lait aux nourrices, & qu'il est propre contre le venin du scorpion & du chien enragé. Ce même Auteur dit que le nom latin *smaris* dérive d'un mot grec qui exprime sa blancheur ; de là vient, ajoute-t-il, qu'on appelle en latin les hommes pâles, *smarides*.

PICEA ou PESSE. *Voyez à l'article* SAPIN.

PICHOT. Nom que l'on donne en Provence au cerisier. *Voyez* CERISIER.

PICHOU ou PICHON. C'est une espece particuliere de *chat putois* ou *sauvage* qui se voit à la Louisiane. M. le *Page du Pratz* dit qu'il est aussi haut que le tigre, mais moins gros ; sa peau ou fourrure est très-belle & estimée : heureusement qu'on y en trouve peu, car cet animal chasse aussi bien la volaille des basse-cours que les animaux des bois. Le pichou est le *margay*. Voyez ce mot.

PIC-VERT. *Voyez à la suite de l'article* PIC.

PICUIPINIMA. *Voyez* COCOTZIN.

PIE, *pica*. C'est un genre d'oiseaux qui approche de celui du *coracias* & de celui des *corbeaux* par le bec, les pieds & les ongles : on en distingue plusieurs especes que nous citerons après avoir donné l'histoire de la pie ordinaire.

1°. La PIE VULGAIRE, *pica varia & caudata.* Cet oiseau qui est très-commun en France, en Angleterre, en Allemagne, en Suede & dans toute l'Europe, excepté en Laponie & dans les pays de montagnes où il est rare, d'où l'on peut conclure que la pie craint le grand froid; cet oiseau, dis-je, a depuis le bout du bec jusqu'à l'extrémité de la queue, dix-huit pouces de longueur; le bec long d'un pouce & demi, noir, gros & fort; la mâchoire supérieure un peu recourbée, saillante & pointue; les narines un peu barbues; la langue fourchue, noirâtre & semblable à celle du geai; l'iris de couleur de noisette pâle; la tête, le cou, la gorge, le dos, le croupion & le bas ventre de couleur noire; le bas du dos près du croupion, grisâtre; la poitrine & les côtés blancs, ainsi que les premieres plumes de l'aile; les ailes petites à proportion de la grandeur du corps; la queue & les grandes plumes des ailes ornées de très-belles couleurs mêlées de vert, de pourpre & de bleu, mais seulement aux barbes extérieures. Le pennage de l'aile est taché de blanc du côté des tuyaux: la queue qui est faite en coin, a les deux plumes du milieu plus longues que les autres: les pieds & les ongles sont noirs; enfin cet oiseau ressemble assez bien au choucas, si l'on en ôte le blanc & la longueur de la queue; & *Belon* dit que si la pie n'avoit pas le dessous du ventre blanc ainsi que le coin des ailes, il ne seroit pas facile de la distinguer de la corneille; elle en a le geste & la façon de vivre.

La pie est un oiseau fort babillard, qui apprend à articuler des paroles: on prétend même qu'elle annonce la pluie, lorsqu'elle jase plus qu'à l'ordinaire. Cet oiseau fait son nid sur les arbres les plus élevés & les plus inaccessibles avec une grande adresse, le garnissant d'épines en toutes ses surfaces extérieures, & n'y laissant qu'un trou fort étroit pour l'entrée. *Voyez ce qu'en dit* Aldrovande. Cet oiseau pond à chaque couvée cinq ou six œufs, quelquefois huit, chargés de taches noires: il se nourrit des mêmes alimens que la corneille; il se jette sur les moineaux & autres petits oiseaux, & les mange. On sait que son tempérament carnassier le porte à détruire non seulement le gibier de vol, mais

même les petits lapereaux & levrauts ; il mange aussi les œufs des autres oiseaux, & notamment ceux du merle & de la perdrix dont les nids sont ordinairement mal cachés. Des particuliers ont tiré parti de son appétit pour la chair vivante, en la dressant à la chasse comme on y dresse le corbeau. La pie a cela de particulier, qu'elle devient chauve tous les ans pendant la mue.

Nous avons dit que la pie a beaucoup de babil, surtout quand on lui a coupé le filet, & qu'on la tient en cage. Elle devient aussi familiere dans les maisons qu'elle est naturellement sauvage dans les champs : elle n'a pas moins d'instinct étant privée que dans l'état sauvage. On lui attribue de l'inclination au larcin, & l'on en raconte des histoires fort étranges. En effet, quand elle est rassasiée, elle va cacher adroitement ce qui lui reste de provision, pour les besoins à venir ; elle aime aussi à cacher jusqu'à la vaisselle d'argent, & l'on doit se méfier d'un tel voleur qui peut causer beaucoup de désordres sur le compte des domestiques fideles. Elle est d'un tempérament chaud & lascif : elle fait l'amour dès le mois de Février & pond dans le printems. Rien de si original que de la voir en colere contre les corneilles ou même les oiseaux de proie qui approchent de son nid : elle les attaque toujours & les poursuit en criant sans cesse, jusqu'à ce qu'ils soient bien éloignés : si on lui déniche de bonne heure sa premiere couvée, elle en fait une seconde.

La pie marche en sautant & remue perpétuellement la queue ; elle est assez hardie pour manger dans les auges des pourceaux, qui souffrent volontiers qu'elle monte sur leur dos pour y picorer les poux qui les désolent.

Le Docteur *Derham* a nourri une pie qui a vécu plus de vingt ans, mais qui à cet âge étoit tout-à-fait aveugle de vieillesse.

On trouve dans les *Ephémer. d'Allem. Decur. II. Ann. IV. append. 210*, une observation rapportée par le Docteur *Paullini* sur une pie femelle, d'ailleurs très saine, qui tous les mois à la nouvelle lune rendoit pendant deux ou trois jours du sang assez copieusement par l'anus ; à quoi il ajoute qu'il a quelquefois remar-

qué de semblables purgations menstruelles dans des jumens, dans des truies & dans des brebis ; puis il finit par observer qu'un de ses confreres a vu un paon qui à chaque mois dans le décours de la lune, rendoit par l'anus une pelote glaireuse qui en dedans ne contenoit qu'une infinité de petits grains de sable que l'oiseau avoit avalés.

La pie porte différens noms en France suivant les Provinces ; le plus général est celui d'*agasse* : on l'appelle aussi *dame jaquette* ou *margot*.

Le nom latin de *pica* n'est pas particulier, dit *Lémery*, à la pie. Il lui est commun avec une maladie qui arrive souvent aux filles & aux femmes. C'est, dit-il, un appétit dépravé qui les excite à manger en secret des substances incapables de nourrir, & qui peuvent leur produire des obstructions fortes, des pâles couleurs, &c. ces substances sont du plâtre, du charbon, de la cendre, de la craie, de la cire, du poivre, &c. elles aiment aussi à manger du marc de café & des grains de café grillé.

La chair de la pie n'est guere d'usage en aliment ; étant dure & coriace ; on en fait seulement des bouillons qui sont d'un bon suc & nourrissans. Les gens de la campagne mangent volontiers les petits, appelés *piats* ou *piots*. En Médecine la pie est estimée propre pour l'épilepsie, la manie & la mélancolie, & sur-tout pour la foiblesse de la vue. Quelques Auteurs vantent beaucoup la pie mangée en substance, soit rôtie, soit bouillie.

Les *pies étrangeres* sont, 1°. celles de *Bengale* & du *Sénégal*, elles sont plus petites que la nôtre, leur couleur est noir-bleuâtre ou violet ; les Indiens appellent celle de Bengale *dials-bird*, c'est-à-dire, *oiseau du cadran solaire*. 2°. La *pie du Mexique*, *pica Mexicana*, qui apprend facilement à parler, & a une bosse sur le bec, un cri plaintif & semblable à celui des étourneaux. 3°. La *pie du Brésil*, *pica Brasiliana* ; les couleurs du plumage sont très-joliment diversifiées ; son plumage inférieur est comme cotonneux ; elle a du jaune depuis le milieu du dos jusqu'au croupion : quelques-uns donnent aussi le nom de *pie du Brésil* au mangeur de poi-

vre, qui est le *toucan*; voyez ce mot. 4°. La *pie des Antilles*; elle a les pieds rouges & le cou bleu, ceint d'un collier blanc, avec une huppe blanche sur la tête, le croupion jaune. 5°. La *pie de la Louisiane* est d'un très-beau noir. 6°. La *pie de la Jamaïque* est environ un tiers plus petite que notre pie commune, dont elle a le bec, les pieds & la queue; le plumage du mâle est noir avec des reflets pourpres, celui de la femelle est brun, plus foncé sur le dos & sur toute la partie supérieure du corps, moins foncé sous le ventre. Les pies de la Jamaïque font leurs nids sur les branches des arbres; on en trouve dans tous les districts de l'île, mais plus abondamment dans les lieux les plus éloignés du bruit: c'est de-là qu'après avoir fait leur ponte & donné naissance à une génération nouvelle pendant l'été, elles se répandent pendant l'automne dans les habitations & arrivent en si grand nombre, que l'air en est quelquefois obscurci. Elles volent ainsi en troupes l'espace de plusieurs milles, & par-tout où elles se posent, elles font un dommage considérable aux Cultivateurs. Leur ressource pendant l'hiver est de venir en foule aux portes des granges. Tout cela donne lieu de croire qu'elles sont frugivores; cependant on remarque qu'elles ont l'odeur forte, que leur chair est noire & grossiere, & qu'on en mange fort rarement. On dit qu'il y a des pies toutes blanches vers le Spitzberg. Celle de l'île de Papoë, *pica Papoensis*, est moitié blanche & moitié noire; son bec & ses ongles sont blancs & ses pieds rouges.

PIE-COQUILLE ou PIE TESTACÉE. Nom donné à un coquillage univalve, espece de sabot ombiliqué dont la robe est à fond blanc & tachetée de noir, comme marbrée. On l'appelle quelquefois *veuve*: c'est le *livon* de M. *Adanson*.

PIE-GRIECHE, *collurio*, *aut pica Græca*, est un genre d'oiseau connu par-tout: on en distingue plusieurs especes, la *grande*, la *petite*, &c.

La premiere est la *grande pie-grieche grise*, *lanius cinereus major*, ou le *grand écorcheur cendré*; elle est de la grosseur d'un merle, ornée de taches blanches aux côtés comme la *pie*; elle a la tête grosse & large, le bec dur, noir, gros, un peu crochu par le bout, long

d'un pouce & demi, & ayant l'ouverture large ; sa langue est fourchue & hérissée de petits filets : son plumage est d'un gris cendré, elle a une ligne noire près des mâchoires, le ventre & le dessous de la queue sont blanchâtres ; sa queue est fort longue, les deux plumes du milieu sont noires, les quatre autres sont blanches par les bouts : ses jambes & ses pieds sont noirs, munis d'ongles crochus. Cet oiseau repaire dans les arbrisseaux, il fait son nid de mousse, de laine, d'herbe à coton, le fond est de bruyere ; il est garni en dedans de quelques brins de foin & de chiendent. On trouve dans ce nid six petits qui ne ressemblent à la mere que par le bec, les racines de leurs plumes étant encore en tuyaux verdâtres. La pie-grieche reste sur des arbrisseaux épineux, elle se perche toujours sur le sommet des branches, & lorsqu'elle est posée, elle leve sa queue. On l'entend chanter sur différens tons pendant l'automne ; en hiver elle n'a qu'un ton de voix qu'on entend de fort loin ; elle crie assez agréablement & fort souvent *houin-houin*. Les Italiens la nomment *falconello*, comme qui diroit *fauconnette*, parce qu'elle est au nombre des oiseaux de proie, & que quand elle est leurrée, elle a beaucoup de courage à la chasse. Cet oiseau ne se nourrit pas seulement d'insectes, il mange assez souvent des petits oiseaux, comme des pinçons, des roitelets ; il est si hardi, qu'il attaque les merles, les grives & les tue.

La *petite pie-grieche*, *pica Græca minor*, *aut lanius minor*, se nomme aussi *pie ancrouelle* ou *pie effraye* ; elle ne differe de la précédente que par la grandeur ; la couleur du plumage est fauve & plus madrée ; sa couvée est plus nombreuse. Elle tient sa proie dans une de ses pattes, & la mange appuyée sur une jambe à la maniere du perroquet. Lorsque cet oiseau a peur, il pousse un cri effrayant, remue la queue d'un côté & d'autre & la tient élevée. Il extermine les mulots, les campagnols & les souris, tant dans les terres labourables que dans les jardins. Il se tient suspendu en l'air à la maniere de cercerelles : il vient souvent se percher sur les chardons, & indifféremment sur toutes sortes de tiges quand il a manqué sa proie. (*Belon*).

Il y a encore la *pie-grieche totalement blanche des Alpes ;* l'espece appelée l'*écorcheur* à tête rouge, ou la *pie-grieche rousse*, ou la petite *pie matageſſe*. On trouve auſſi des pies-grieches dans preſque toutes les Indes, en Amérique & en Afrique ; leurs couleurs ſont très-riches. Il y a la pie-grieche noire de la Caroline : *voyez* FINGAH. L'*écorcheur de Madagaſcar* eſt une pie-grieche, ainſi que la *rouge-queue* de Bengale dont le bout du bec ſupérieur eſt très-arqué : à l'égard de la pie-grieche rouge du Sénégal, *voyez* GONOLEK.

Tout ce que nous venons de dire ſur les pies-grieches ſe trouve aſſez confirmé dans la belle deſcription qu'en donne M. *de Buffon*. Cet Hiſtorien Philoſophe dit que ces oiſeaux, quoique petits, quoique délicats de corps & de membres, doivent néanmoins par leur courage, par leur large bec, fort & crochu, & par leur appétit pour la chair, être mis au rang des oiſeaux de proie, même des plus fiers & des plus ſanguinaires. On eſt toujours étonné de voir l'intrépidité avec laquelle une petite pie-grieche combat contre les pies, les corneilles, les cercerelles, tous oiſeaux beaucoup plus grands & beaucoup plus forts qu'elle ; non-ſeulement elle combat pour ſe défendre, mais ſouvent elle attaque & toujours avec avantage, ſur-tout lorſque le couple ſe réunit pour éloigner de leurs petits les oiſeaux de rapine ; elles n'attendent pas qu'ils approchent, il ſuffit qu'ils paſſent à leur portée pour qu'elles aillent au devant ; elles les attaquent à grands cris, leur font des bleſſures cruelles, & les chaſſent avec tant de fureur, qu'ils fuient ſouvent ſans oſer revenir : & dans ce combat inégal contre d'auſſi grands ennemis, il eſt rare de les voir ſuccomber ſous la force ou ſe laiſſer emporter : il arrive ſeulement qu'elles tombent quelquefois avec l'oiſeau contre lequel elles ſe ſont accrochées avec tant d'acharnement, que le combat ne finit que par la chute & la mort de tous deux. Auſſi les oiſeaux de proie les plus braves les reſpectent, les milans, les buſes, les corbeaux paroiſſent les craindre & les fuir plutôt que les chercher. Rien dans la Nature ne peint mieux la puiſſance & les droits du courage que de voir ce petit oiſeau qui n'eſt

guere plus gros qu'une forte alouette ou qu'un merle, voler de pair avec les éperviers, les faucons & tous les autres tyrans de l'air ſans les redouter, & chaſſer dans leurs domaines ſans craindre d'en être punis ; car quoique les pies-grieches ſe nourriſſent communément d'inſectes, elles aiment la chair de préférence, elles pourſuivent au vol tous les petits oiſeaux ; on en a vu prendre des perdreaux & de jeunes levrauts ; les grives, les merles & les autres oiſeaux pris au lacet & au piege, deviennent leur proie la plus ordinaire, elles les ſaiſiſſent avec les ongles, leur crevent la tête avec le bec, leur ſerrent & déchiquetent le cou, & après les avoir étranglés ou tués, elles les plument pour les manger, les dépécer à leur aiſe, & en emporter dans leurs nids les débris en lambeaux.

M. *de Buffon* ajoute qu'on peut réduire à trois eſpéces principales les pies-grieches de notre climat ; ſavoir, la *pie-grieche griſe*, la *pie-grieche rouſſe* & la *pie-grieche* appelée vulgairement l'*écorcheur*.

La *pie-grieche griſe* ou la *grande pie-grieche* nourrit ſes petits de chenilles & d'autres inſectes dans les premiers jours, & bientôt elle leur fait manger de petits morceaux de viande que le pere leur apporte avec un ſoin & une diligence admirables : bien différente des autres oiſeaux de proie, qui chaſſent leurs petits avant qu'ils ſoient en état de ſe pourvoir d'eux-mêmes, la pie-grieche garde & ſoigne les ſiens tout le temps du premier âge, & quand ils ſont adultes, elle les ſoigne encore ; la famille ne ſe ſépare point, on les voit voler enſemble pendant l'automne entier & encore en hiver, ſans qu'ils ſe réuniſſent en grande troupe ; chaque famille fait une petite bande à part, ordinairement compoſée du pere, de la mere & de cinq ou ſix petits, qui tous prennent un intérêt commun à ce qui leur arrive, vivent en paix & chaſſent de concert, juſqu'à ce que le ſentiment ou le beſoin d'amour, plus fort que tout autre ſentiment, détruiſe les liens de cet attachement & enleve les enfans à leurs parens ; la famille ne ſe ſépare que pour en former de nouvelles. Il eſt aiſé de reconnoître les pies-grieches de loin, non-ſeulement à cauſe de cette petite troupe qu'elles for-

ment après le temps des nichées, mais encore à leur vol qui n'eſt ni direct ni oblique à la même hauteur, & qui ſe fait toujours de bas en haut & du haut en bas alternativement & précipitamment.

La *pie-grieche rouſſe* ou la petite pie-grieche, eſt un oiſeau de paſſage, au lieu que la pie-grieche griſe reſte dans le pays. On voit chaque famille de pie-grieche rouſſe partir vers le commencement de Septembre, mais ſans faire de longs vols. Cette eſpece de pie-grieche n'eſt pas abſolument mauvaiſe à manger.

PIE DE MER, *pica marina Gallorum & Anglorum.* Nous avons parlé de cet oiſeau au mot BÉCASSE DE MER.

PIE DE MER A GROS BEC, *pica marina*, eſt un oiſeau de paſſage de la grandeur d'un canard domeſtique. Il eſt long d'un pied, mais ſon envergure l'eſt de deux. Le bec eſt court, large & aplati de côté d'une maniere oppoſée à celui des canards; il eſt triangulaire & pointu: la mâchoire ſupérieure eſt arquée par le bout, le bec eſt griſâtre à ſa racine & rougeâtre vers la pointe: le plumage eſt noir, la poitrine blanche & la tête tachetée de cette couleur: les ailes ſont compoſées de plumes courtes, néanmoins l'oiſeau vole fort vîte près de la ſurface de l'eau: les jambes & les pieds ſont d'un rouge jaunâtre, & placés en arriere comme dans les plongeons ordinaires, de maniere que l'oiſeau ſemble marcher en s'appuyant perpendiculairement ſur la queue; il lui manque le doigt de derriere. Ces oiſeaux pondent leurs œufs ſans nids, mais à raſe terre ou dans des trous de lapins, qu'ils chaſſent exprès pour s'en emparer; leur ponte n'eſt que d'un œuf; ſi on ôte cet œuf, l'oiſeau en pond un autre, & toujours de même juſqu'au cinquieme: cet œuf eſt très-gros, eu égard au volume de l'animal. On rencontre ces pies de mer dans les îles déſertes, près des côtes de la mer, aux environs de Scarboroug, de Tenby, &c. Elles s'en vont en automne & reviennent au printems pour pondre.

Albin dit qu'il ſe trouve parmi ces oiſeaux des avant-coureurs qui vont reconnoître les endroits qu'ils ont coutume de choiſir pour couver, & qui examinent ſi

tout y va bien. S'il arrive que la saison soit orageuse ou sujete aux tempêtes & que la mer soit agitée, on en trouve un grand nombre de jetés sur les côtes, qui sont maigres & affamés jusqu'à en mourir ; car à moins que la mer ne soit calme, ils ne peuvent poursuivre leur route, ni se pourvoir de nourriture qui est de poisson.

PIE-MERE. *Voyez à l'article* HOMME.

PIECES ANATOMIQUES INJECTÉES. Les cabinets des Curieux renferment aujourd'hui des animaux ou parties d'animaux écorchées & conservées comme au naturel au moyen de l'injection ; parmi ces pieces injectées on admire plus volontiers celle de l'homme : en effet la connoissance la plus intéressante à l'homme, est l'homme même. Dès les premiers momens de l'anatomie, l'œil curieux découvrit dans la dissection des corps tous les ressorts de la machine animale ; l'art de l'injection répandit un plus grand jour sur les découvertes de l'anatomie. Le voile qui cachoit la marche de la Nature fut soulevé ; des liqueurs colorées & injectées dans les vaisseaux, pénétrerent jusque dans les plus petites ramifications des arteres & des veines. On apperçut distinctement les anostomoses ; mille vaisseaux imperceptibles qu'on ne soupçonnoit point, furent reconnus, & le système admirable de la machine hydraulique vivante fut dévoilé. Ce n'est qu'à force de travail & par des essais souvent réitérés qu'on est parvenu à injecter les pieces anatomiques. Les Anciens n'avoient d'autre maniere de conserver la forme & le diametre des vaisseaux sanguins qu'en les remplissant d'air : à ce procédé insuffisant on substitua dans le siecle dernier l'injection des matieres colorées ; le bleu donna le sang veineux, le rouge donna le sang artériel....

PIED ou PIÉ, *pes*. Partie de l'animal qui lui sert à se soutenir & à marcher, & qui est l'instrument du mouvement progressif. Les animaux se distinguent par rapport au nombre de leurs pieds, en *bipedes*, comme les oiseaux ; en *quadrupedes*, comme les chevaux & autres bêtes à quatre pattes ; en *polypedes* ou *centipedes* ou *millepedes*, comme les insectes. Quelle variété dans

l'arrangement des pieds des animaux ! il suffit d'examiner & de comparer ceux de l'écrevisse, de la taupe, de la sauterelle, du cormoran, des canards, &c. Le pied de l'homme est très-différent de celui de quelque animal que ce soit, & même de celui du singe, qui est plutôt une main qu'un pied. Enfin c'est une chose remarquable de voir avec combien d'exactitude les jambes & les pieds de tous les oiseaux aquatiques répondent à leur maniere de vivre.

PIED D'ALEXANDRE. *Voyez au mot* PYRETRE.

PIED D'ALOUETTE, *delphinium*, est une espece de plante appelée *consoude royale*, que l'on cultive dans les jardins pour l'ornement. On en distingue deux especes.

La premiere est le *delphinium hortense flore majore & simplici* des Botanistes. C'est une plante rameuse qui pousse des feuilles découpées, & presqu'aussi déliées que celles du fenouil. Ses sommités sont garnies de belles fleurs rangées par ordre en maniere d'épi, de diverses couleurs; chacune de ces fleurs est composée de plusieurs feuilles inégales, dont cinq sont plus grandes que les autres & disposées en rond; la supérieure s'alonge sur le derriere en maniere d'éperon, qui reçoit l'éperon d'une autre feuille: à ces fleurs succedent des fruits composés de trois graines noirâtres qui renferment des semences anguleuses, noires & ameres au goût. Cette plante est, dit-on, astringente, consolidante & vulnéraire; elle provoque l'accouchement, mais elle n'est guere d'usage.

La seconde est le *calcatrippa*. Elle pousse une tige rameuse, haute d'un pied: ses feuilles sont très-découpées & d'un vert noirâtre: ses fleurs sont panachées de bleu, de blanc & de rouge. Cette plante a les mêmes propriétés que la précédente; on ne s'en sert pas davantage en Médecine: on leur substitue une espece de PIED D'ALOUETTE SAUVAGE, *delphinium segetum*, lequel vient naturellement dans les blés, & qui a pour le moins autant de vertu.

Les Fleuristes se réservent les deux autres especes pour l'ornement des jardins, à cause de la grande

beauté de leurs fleurs. On les seme en automne en pleine terre, ou dans les plates-bandes, & au large.

Cette plante une fois introduite dans les jardins, se seme d'elle-même, & souvent on est obligé d'en arracher une grande quantité au printems.

PIED D'ANE. On nomme ainsi une espece d'huître dont la forme de la coquille a beaucoup de ressemblance avec la corne du pied de l'âne. Le fond intérieur est blanc, le dessus est armé de longues pointes, couleur de rose vif & d'orangé, & quelquefois blanches, ainsi que la robe qui est souvent marquée par des traits en zig-zag: sa charniere consiste en deux boutons arrondis qui renferment le ligament, disposés de maniere que les boutons de la valve supérieure sont reçus dans les cicatrices de l'inférieure, & que pareillement les boutons de cette derniere se logent dans les trous de la supérieure. Le ligament qui est d'une nature coriace, se trouve entre les boutons, & sert à la charniere des deux valves. Cette huître est une espece de *spondyle*.

PIED DE CHAT. *Voyez* HERBE BLANCHE.

PIED DE CHEVRE. C'est la petite angélique sauvage.

PIED DE COQ ÉGYPTIEN. Cette petite plante d'Egypte genouillée & rampante est le *gramen dactylon Ægyptiacum* de *Parkinson*. Cette plante est d'usage médicinal en Egypte.

PIED-DE-GRIFFON ou POMMELÉE, ou HERBE DE CRU, *helleborus niger fœtidus*, est une espece d'*hellébore noir commun*, qui vient communément à la campagne, & qui differe du véritable par sa tige d'un vert rougeâtre, plus haute, plus chargée de feuilles & de fleurs; & par ses racines tout-à-fait blanches, cependant noires en dehors. Ses feuilles sont étroites & ses fleurs verdâtres: elle fleurit en Février. Ses racines fibreuses servent à faire des sétons; ses fruits sont composés de plusieurs graines membraneuses, ramassées en maniere de tête, & renfermant des semences arrondies & noirâtres: elles mûrissent en Juin.

Les gens de la campagne emploient quelquefois la racine du *pied-de-griffon* pour se purger; mais ce n'est pas

sans danger. Il y a des personnes qui s'en servent avec succès pour détruire la fluxion des yeux : pour cela ils percent le bout de l'oreille & y lardent ensuite un brin de cette racine. Mais l'usage le plus ordinaire est de traverser le fanon, c'est-à-dire la peau qui pend sous la gorge des bœufs malades, d'un gros brin de cette racine en forme de séton ; ce qui y attire un écoulement abondant de sérosité, qui les guérit souvent de leurs maladies.

PIED-DE-LIEVRE, *lagopus vulgaris*, est le petit trefle des champs. *Voyez l'article* TREFLE.

PIED-DE-LION, *alchimilla vulgaris*, est une plante qui se plaît aux lieux herbeux & humides, dans les prés, le long des vallées & à l'adossement des hautes montagnes. Sa racine se répand obliquement: elle est de la grosseur du petit doigt, fibreuse, noirâtre & astringente ; elle pousse un grand nombre de feuilles attachées à de longues queues, velues, souvent couchées à terre, crêpées, dentelées & partagées en huit ou neuf angles, avec autant de nervures. Du milieu de la plante s'élevent de petites tiges, hautes d'environ un pied, rondes, velues & rameuses, portant à leurs sommets un bouquet de fleurs étoilées d'un vert pâle, apétales ou sans corolle: elles contiennent quatre étamines & un pistil ; le calice est en cloche découpée en huit segmens alternativement inégaux. A ces fleurs succedent des semences menues, jaunâtres, luisantes & arrondies.

On met cette plante au nombre des vulnéraires astringentes: elle a la vertu de réunir les levres des plaies, d'épaissir le sang dissous, d'arrêter les regles trop abondantes, & de guérir la dyssenterie. C'est un remede fort utile dans le crachement & le pissement de sang, & pour les poumons ulcérés. *F. Hoffmann* dit qu'il y a des filles qui savent se servir adroitement de la décoction de pied-de-lion, dont elles font un demi-bain pour réparer & rappeler les signes extérieurs d'une virginité perdue. Elles tâchent aussi, par cette même décoction, de rendre fermes & élastiques leurs mamelles ; elles trempent un linge dans la décoction de cette plante, & elles l'appliquent sur le sein : au défaut de ces feuilles elles prennent celles du petit myrte, &c. *Voyez* MYRTE. Cette plante

qui

qui a auſſi l'avantage de pouvoir réuſſir dans des terres montagneuſes & ingrates, fournit un excellent pâturage, qui procure aux vaches un lait très-abondant.

PIED-DE-LIT. Nom que l'on donne à une eſpece d'origan appelé *baſilic ſauvage*. Voyez BASILIC.

PIÉD ou PATTE-DE-LOUP. *Voy. l'art.* MOUSSE.

PIED-D'OISEAU. *Voyez* ORNITHOPODE.

PIED-DE-PIGEON. *Voyez* BEC-DE-GRUE.

PIED-DE-POULE, *gramen dactylon radice repente, ſive officinarum.* TOURNEF. C'eſt une eſpece de chiendent. *Voyez ce mot.* On donne auſſi ce nom à une eſpece d'*ortie rouge annuelle*. Voyez l'article ORTIE.

PIED ROUGE ou BEC-DE-HACHE. Les habitans de la Louiſiane donnent ce nom à un oiſeau qui habite communément les bords de la mer & les lacs ſalés, où il ſe nourrit de poiſſon & de coquillages. Son bec eſt très-fort & fait en taillant de hache de haut en bas; ſon plumage, quoique peu varié, eſt aſſez beau. On a remarqué qu'il ne paroît dans les terres que pour annoncer quelque grand orage, qui ne manque pas de ſe paſſer ſur la mer. (*Le Page Dupratz*).

PIED-DE-VEAU, *arum*. Plante dont M. *de Tournefort* diſtingue trente-quatre eſpeces: nous n'en citerons ici que deux principales qui ſont d'uſage dans les boutiques, & qui, ſuivant M. *Deleuze*, ne ſont que deux variétés de la même eſpece.

1°. Le PIED-DE-VEAU SANS TACHE, *arum vulgare non maculatum*. Sa racine eſt tubéreuſe, charnue, de la groſſeur du doigt, blanche, âcre au goût, remplie d'un ſuc laiteux & un peu fibrée; ſes feuilles ſont longues de neuf pouces, triangulaires, vertes, luiſantes & veinées: il s'éleve d'entr'elles une petite tige ronde, haute d'un pied & demi, cannelée, laquelle porte en ſon ſommet une fleur à une ſeule feuille, coupée en langue & roulée en maniere de cornet: il ſuccede à cette fleur des baies rouges raſſemblées en une tête oblongue. Ces baies ſont molles, pleines d'un ſuc purpurin & renfermant deux petites ſemences arrondies; toute la plante a une ſaveur fort âcre.

Le genre de l'*arum*, dit M. *Deleuze*, eſt remarquable par l'appareil ſingulier de la fructification, formé d'une

spathe en cornet assez ample, souvent colorée intérieurement, du fond de laquelle s'éleve une colonne charnue environnée à sa base des embryons des graines rangées en anneau : un peu plus haut est un pareil anneau d'étamines, dont les antheres sont attachées immédiatement à la colonne. L'intervalle entre les ovaires & les étamines est garni de quelques filets : la colonne se termine par une masse charnue, oblongue, cylindrique & ordinairement colorée.

2°. Le PIED-DE-VEAU MARQUÉ DE TACHES, ou le PIED-DE-VEAU D'ITALIE, *arum maculatum vulgare, maculis candidis vel nigris.* Il differe du précédent en ce que ses feuilles sont marquetées de taches blanches ou noires : l'un & l'autre naissent dans les forêts, aux lieux ombrageux & champêtres. Il n'y a guere que leur racine d'usage en Médecine : elle est douée, étant verte, d'une très-grande acrimonie qui fait beaucoup d'impression sur la langue ; elle est gluante & farineuse ; elle est bien moins violente, étant desséchée. *Lémery* dit qu'en temps de disette on fait du pain de racine d'*arum*, comme on en fait avec la racine d'asphodele. *Voyez ce mot.* Nous disons que lorsque la racine d'*arum* est fraîche, son suc est âcre & brûlant ; il faut apparemment que ce suc qui occasionne cette causticité, s'évapore & se dissipe pour parvenir à en faire un pain non mal-faisant. On lit dans les *Transactions Philosophiques* des observations faites avec le microscope sur le suc d'*arum ;* examiné au microscope il parut à l'Observateur, qui en mit quelques gouttes sur un morceau de papier bleu, qu'une partie passa à travers le papier ; ce qui resta sur le papier lui parut composé d'une multitude infinie de corps ressemblans à des lames de couteau. La figure de ces corps est dûe à la partie saline qui n'est plus de même nature dans la poudre féculente qu'on en fait. La poudre de cette racine rétablit l'appétit : elle guérit souvent les fievres intermittentes ; elle est fort utile dans les maladies chroniques, en dissipant la jaunisse, les pâles couleurs, & levant les obstructions des visceres ; enfin elle convient singuliérement pour l'hydropisie & pour la mélancolie hypocondriaque ; la dose en est depuis un demi-gros jusqu'à un gros. Cette racine

eſt très-utile, dit M. *Bourgeois*, dans l'aſthme pituiteux, en fondant les matieres glaireuſes amaſſées dans les glandes bronchiales. C'eſt encore un excellent remede pour les eſtomacs foibles & remplis de glaires attachées à leurs parois : elle fait la baſe de l'excellente poudre ſtomachique de *Birckman*, dont on fait un uſage très-fréquent dans la pratique. *Tragus* aſſure que la pulpe de la racine d'*arum* fraîche eſt un excellent antidote pour les poiſons & la peſte. Il y a des Dames qui préparent des eaux diſtillées des racines de pied-de-veau pour ſe farder, pour faire diſparoître les rides du viſage & réparer les torts de la vieilleſſe. On en fait auſſi une fécule qui eſt propre aux mêmes uſages ; car on dit qu'elle rend la peau brillante : nous en avons vu ſur la toilette de pluſieurs Dames. Dans le Poitou les femmes de la campagne font une maſſe des tiges & des racines de cette plante fleurie, qu'elles coupent menue & qu'elles macerent pendant trois ſemaines dans l'eau qu'elles renouvellent tous les jours : elles pilent cette maſſe & la font ſécher ; enſuite elles s'en ſervent au lieu de ſavon pour nétoyer leur linge. *J. Ray* prétend que ce ſecret n'eſt pas inconnu dans quelques endroits de l'Angleterre.

L'ARUM montant d'Amérique à grandes feuilles percées, *arum hederaceum, amplis foliis perforatis*, s'attache au tronc des arbres de la même maniere que nos lierres : c'eſt le bois de couleuvre des Antilles.

L'ARUM d'Amérique à feuilles de fleche, *arum Americanum, arboreſcens, ſagittariæ foliis*, porte un fruit qui pique la langue, tandis que ſa racine eſt douceâtre & d'un aſſez bon goût ; c'eſt l'*arum eſculentum, ſagittariæ foliis viridi-nigricantibus* de *Sloane*.

PIED DE VENT. Phénomene dont on trouve la deſcription dans l'*Hiſt. de l'Acad. des Scienc. ann. 1732*, & qu'on doit ranger dans la claſſe de ceux que les nuées repréſentent par leur différente ſituation. La diſpoſition de ce météore eſt l'arrangement naturel que lui donne le vent & qui, ſuivant les regles de l'Optique, nous paroît affecter ſenſiblement telle & telle figure.

PIERRES, *lapides*. Les pierres sont composées de substances terreuses ou sablonneuses, endurcies au point de ne plus s'amollir dans l'eau. Selon que les parties qui les composent sont plus ou moins atténuées & homogenes, elles sont plus ou moins étroitement liées les unes aux autres. Les pierres doivent donc leur origine à l'affluence, aux dépôts & aux couches successives & externes des particules intégrantes de la terre ou du sable : il entre aussi quelquefois dans leur composition d'autres particules hétérogenes ; le véhicule de ces différentes parties qui concourent ensemble à former les pierres, est un liquide ; les principes moteurs sont l'air & le feu : la cause de leur liaison est la pression des autres corps & la cohésion & l'attraction des parties similaires, qui croissent en raison du contact & des surfaces. Toutes les pierres se forment par juxta-position.

Parmi les pierres les unes sont tendres comme le talc, ou poreuses comme la ponce ; d'autres sont dures & ne peuvent être travaillées qu'avec l'acier & l'éméril, comme l'agate & le jaspe, ou même avec la poudre de diamant, comme les plus belles pierres précieuses.

Toutes les pierres varient beaucoup pour la figure, le tissu, la grandeur de leur masse, les couleurs & les propriétés. Les unes sont opaques, irrégulieres ou informes & communes ; les autres sont transparentes, configurées & précieuses ; les unes sont simples, d'autres composées. En général, elles ne different des terres que par la dureté & la liaison des parties, toutes circonstances qui sont l'effet du temps & du hasard. Les pierres se divisent selon leur essence en cinq ordres principaux, que l'on détermine facilement par les expériences suivantes, & qui donnent toujours une division méthodique plus constante que celle qui est établie d'après le coup d'œil extérieur.

Le premier renferme les pierres argileuses, *petræ argillosæ* ; elles ne font point d'effervescence avec les acides, mais elles durcissent au feu ordinaire : *voyez* ARGILE.

Le deuxieme comprend les pierres calcaires, *lapides*

calcarei ; elles se dissolvent avec effervescence dans les acides, perdent leur liaison dans le feu, & s'y réduisent en chaux : *voyez* PIERRES A CHAUX.

Le troisieme contient les pierres gypseuses ou à plâtre, *lapides gypsei ;* elles ne se dissolvent point dans les acides, mais elles forment du plâtre par l'action du feu : *voyez le mot* GYPSE.

Le quatrieme comprend les pierres igneſcentes ou scintillantes, *lapides igneſcentes aut scintillantes ;* elles ne sont point attaquées par les acides & n'éprouvent que peu ou point d'altération au feu, mais frappées contre l'acier, elles produisent des étincelles: *voy.* CAILLOU, AGATE, JASPE, QUARTZ, CRISTAL, &c.

Le cinquieme renferme les pierres fusibles par elles-mêmes au degré du feu où les précédentes ont résisté ; elles ne sont point de feu avec le briquet ; elles sont ordinairement très-pesantes : *voyez* SPATH FUSIBLE. Dans notre Minéralogie nous avons donné à ce genre de pierres le nom de *pierres médiastines.* Ce sont des pierres vitreuses, *lapides vitrescentes.* Consultez maintenant l'article *Terre vitrifiable.* Il y a aussi l'ordre des *Pierres de roches agrégées.*

PIERRE ACIDE, *oxipetra*, est la mine d'alun pierreuse : *voyez* ALUN & PYRITE D'ALUN.

PIERRE D'ÆLAND. Espece de marbre fort dur d'un rouge mat, rempli de coquilles & sur-tout d'orthocératites, lequel se trouve dans l'île d'Æland dans la mer Baltique, vis-à-vis de la ville de Calmar, où il y en a des couches immenses, & dont on fait des tables, des chambranles de cheminées, &c.

PIERRE D'AIGLES : *voyez* ETITES.

PIERRE A AIGUISER, appelée *naxienne :* voyez PIERRE A RASOIR.

PIERRE A AIGUISER DE TURQUIE : *voyez le mot* GRAIS DE TURQUIE *à l'article* GRAIS.

PIERRE D'AIMANT : *voyez* AIMANT.

PIERRE D'ALCHERON. On donne ce nom à la pierre qui se trouve dans la vessie du fiel des bœufs : *voyez les mots* BÉZOARD & BŒUF.

PIERRE ALECTORIENNE ou PIERRE DE COQ, *gemma alectoria.* Espece de pierre qui se forme

dans l'estomac & dans le foie des coqs, & même des chapons : celles qui se trouvent dans le foie sont les plus grosses. Celles de l'estomac sont la plupart assez semblables aux semences de lupin pour la figure, & à une feve pour la grandeur ; leur couleur est d'un gris-obscur : il s'en trouve qui sont cannelées & rougeâtres.

PIERRE D'ALTORF. Nom que l'on donne aujourd'hui à une espece de marbre coquiller nouvellement découvert aux environs d'Altorf. Ce marbre contient beaucoup de cornes d'Ammon, qui sont quelquefois métallisées, & une quantité de bélemnites & d'impressions de différens coquillages. On vient d'établir, près de Nuremberg, une fabrique où l'on travaille cette espece de marbre dont on fait des tables d'une grande beauté par la mosaïque charmante qu'y font appercevoir les coquilles fossiles, &c.

PIERRE DES AMAZONES. *Voyez à l'article* JADE.

PIERRE DES AMPHIBIES. Dans cet ordre d'animaux le serpent cobra, la tortue, le castor, le cayman, &c. fournissent des especes de *bézoards* ou *calculs*. Voyez ces mots.

PIERRE DES ANIMAUX. On donne ce nom au bézoard ou calcul, ainsi qu'à toutes les especes de pierres qui se trouvent ou dans les reins ou dans la vessie, &c. de plusieurs animaux : *voyez le mot* BÉZOARD. Il n'est pas rare de rencontrer encore une pierre sous la langue de l'homme. Voyez dans les *Mémoires de l'Académie Royale de Chirurgie*, *Tom. III*, *pag. 460*, une Dissertation de M. *Louis*, &c.

PIERRE DE L'APOCALYPSE. *Voyez* OPALE.

PIERRE APYRE. C'est celle qui a la propriété de résister à la plus grande action du feu des fourneaux sans en recevoir d'altération sensible, c'est-à-dire qui ne doit éprouver de la part du feu ni fusion, ni aucun autre changement, tel est le quartz pur, le cristal de roche, &c. *Voyez ces mots.*

On nomme *pierre réfractaire* celle qui a également la propriété de résister à la violence du feu sans se fondre, quoiqu'elle éprouve d'ailleurs des altérations considé-

rables: telles sont plus ou moins les pierres calcaires, les amiantes, les mica, les talcs, les pierres ollaires, &c. Il suit de là, comme le dit très-bien l'Auteur du Dictionnaire de Chimie, que toute substance réfractaire n'est point apyre. Au reste toutes les pierres ne sont réfractaires, ou même apyres, que relativement au degré du feu qu'on leur fait subir.

PIERRE ARBORISÉE. *Voyez à l'article* AGATE & DENDRITE.

PIERRE ARGILEUSE. *Voyez au mot* PIERRE & *à l'article* ARGILE.

PIERRE D'ARITHMÉTIQUE. Pierre ainsi nommée parce qu'on y voit un ou plusieurs chiffres fort bien représentés par la nature. On appelle *pierre de l'alphabet* celle qui représente une ou plusieurs lettres de l'alphabet.

PIERRE D'ARMÉNIE ou ARMÉNIENNE ou MÉLOCHITE, *lapis Armenus*. On l'appelle quelquefois *pierre d'azur femelle* ou *azur Occidental*. Voyez AZUR au mot LAPIS LAZULI. Cette pierre est graveleuse, opaque, bien moins dure que celle du lapis, recevant un poli terne, d'un bleu verdâtre ou obscur, privée des parties pyriteuses ou auriferes qui se trouvent quelquefois dans le lapis oriental. Comme certains caracteres extérieurs rapprochent quelquefois la pierre Arménenne du vrai lapis, il ne doit pas paroître étonnant que quelques Marchands Juifs & Turcs les vendent souvent l'une pour l'autre aux personnes qui n'ont pas une grande connoissance de ces sortes de pierres (ici la friponnerie est en rivalité avec l'ignorance). Cependant la vraie pierre Arménienne differe essentiellement du lapis, en ce qu'elle se calcine au feu, qu'elle s'y vitrifie facilement, & que sa couleur s'y détruit. La poudre bleue qu'on en retire est aussi bien inférieure en beauté & en durée à celle de l'outremer; mais elle est, en revanche, de toutes les pierres colorées en bleu, celle dont on retire le plus abondamment du cuivre de la meilleure espece. C'est communément avec cette pierre qu'on fait le bleu de montagne factice des boutiques. On s'en sert aussi en peinture & en teinture; on la vend souvent sous le nom de cendre verte, sur-tout quand elle est en poudre &

préparée par cette même préparation de la pierre Arménienne, qui eſt décrite dans notre Minéralogie : on en tire d'abord le *petit outremer* ou la poudre d'azur commun, puis la *cendre verte*, enſuite le *vert de terre*, & enfin le *vert d'eau* ; toutes drogues dont les Marchands de couleurs font un grand débit.

La pierre d'Arménie qui ne ſe trouvoit autrefois qu'en Arménie, ſe rencontre aujourd'hui dans les pays de Naples, du Tirol, de Boheme, de Wirtemberg : on en trouve auſſi en Auvergne. *Lémery* dit que cette pierre en poudre eſt un purgatif bon pour les maniaques ; mais on ne peut trop redouter de ſemblables remedes, à moins que ce ne ſoit pour l'extérieur.

PIERRE D'ARQUEBUSADE, eſt la pyrite de ſoufre. *Voyez le mot* PYRITES.

PIERRE ASSIENE ou D'ASSO, *lapis aſſius aut ſarcophagus*. C'eſt une pierre peu peſante, friable, veinée, couverte d'une poudre farineuſe, jaunâtre & légere, ſalée & un peu piquante : cette pierre ſe trouve ſouvent en Italie. *Lémery* dit que les Anciens s'en ſervoient pour conſtruire leurs ſépulcres, afin que les parties charnues des morts fuſſent promptement conſumées par cette pierre, avant qu'elles euſſent le temps de ſe corrompre. La fleur (l'efflorescence) de cette pierre nétoie les vieux ulceres & les cicatrices. Cette pierre a tiré ſon nom d'une ancienne Ville nommée autrefois *Aſius*, où l'on s'en ſervoit pour les tombeaux des morts qu'on y apportoit. Toutes les eſpeces de pierre aſſienne ou de ſarcophage, que nous avons vues, étoient de la mine d'alun en efflorescence.

PIERRE ATRAMENTAIRE. On donne ce nom à diverſes pierres vitrioliques. *Voyez au mot* VITRIOL.

PIERRE D'AVANTURINE. *Voyez* AVANTURINE.

PIERRE D'AZUR. *Voyez* LAPIS LAZULI & *le mot* AZUR.

PIERRE DE BASALTE. Dans l'envoi des minéraux que Guſtave III, Roi de Suede, a fait à S. A. S. Mgr. le Prince de Condé, nous avons examiné avec ſoin les ſubſtances qui y ſont déſignées ſous le nom de *baſalte*, & il y en a une belle ſuite très-variée par la figure, la couleur, la dureté, le brillant & les gangues tant pier-

reuſes que métalliques. Nous avons reconnu que ce nom eſt appliqué tantôt au ſpath fuſible, tantôt au *ſchorl* criſtallifé en aiguilles priſmatiques, & ſemblable à celui qui ſe trouve dans le criſtal de Madagaſcar, tantôt à l'asbeſte colorée, à la *zéolite* en rayons concentriques; ceux-ci ſont tendres, & on les déſigne ſous le nom de *baſalte ſpathique*. Il y en a qui reſſemblent à la roche de corne en canons, au trapp, au *horn-blende*, à la fauſſe galene noirâtre, au feld-ſpath en feuillets parallélogrames & de couleur hépatique, au wolfram ou ſtrié ou en écailles; ceux-ci ſont durs. Ces pierres ont pour matrice ou gangue, tantôt le quartz, le ſpath calcaire, la pyrite cuivreuſe, l'asbeſte, le mica, la ſtéatite, la pierre ollaire; elles ſont preſque toujours accompagnées de fer, quelquefois de grenats impurs, & ſe trouvent dans les minieres de fer, quelquefois dans celle de cuivre, rarement dans celles d'argent. En général ces baſaltes envoyées de Suede, tiennent de la nature du *ſchirl*: voyez ce mot. Ils ne reſſemblent aucunement aux baſaltes de Blaud & de Saint-Sandoux en Auvergne.

PIERRE DE BŒUF. *Voyez* PIERRE D'ALCHERON & BÉZOARD.

PIERRE DES BESTIAUX, *bulithes*. On en trouve quelquefois dans l'eſtomac des vaches & des bœufs; & on a lieu de croire que ces animaux les ont avalées. Il ne faut pas confondre ces ſortes de pierres avec celles qui ſont ſouvent dans les reins & dans la véſicule du fiel de ces animaux, ni avec les égagropiles dont nous avons parlé.

PIERRE DE BOLOGNE, *lapis Bononienſis*. C'eſt une pierre de la groſſeur d'un œuf de poule, de figure irréguliere, griſâtre, peſante, d'un œil vitreux, qui ſe trouve près de Bologne en Italie, au pied du Mont Paterno: c'eſt après les grandes pluies qu'on en découvre. Cette pierre ne fait aucune effervescence avec les acides; mais lorſqu'elle a été calcinée, elle acquiert la propriété phoſphorique, & répand alors une légere odeur fétide & urineuſe. Dans cet état, ſi on l'expoſe au ſoleil ou au grand jour, & même à la clarté du feu, elle s'imbibe de la lumiere; & portée à l'inſtant dans l'obſcurité, elle paroît lumineuſe comme un charbon

ardent, mais sans chaleur sensible. Cette lueur s'évanouit à la fin, mais on la rend à la pierre en la mettant de nouveau dans un lieu éclairé. Les pierres de Bologne les plus luisantes sont celles qui sont le moins remplies de taches, & couvertes à leur surface d'une croûte blanche, mince & opaque. Quand on calcine ces pierres, on les enduit, après les avoir imbibées d'eau-de-vie, d'une poudre très-fine & bien tamisée, provenant d'une de ces pierres de Bologne, qu'on a pulvérisée; on met ensuite la pierre à calciner au feu de réverbere; on conserve ces phosphores dans de la laine ou du coton, en les préservant soigneusement des impressions de l'air. Lorsqu'elles ont perdu entiérement leur propriété phosphorique, on la leur rend, en les faisant calciner de nouveau.

M. *Wallerius* range cette pierre célebre parmi les gypses; mais nous la rapportons avec *Wolterſdorf* au genre des pierres ou spaths fusibles. *Henckel* attribue le phénomene phosphorique de cette pierre à l'acide du sel marin qui y est contenu, & M. *Pott* à une matiere sulfureuse très-subtile: mais on sait que personne n'a mieux traité cette matiere que M. *Marcgraff*, dans les *Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de Berlin, ann. 1749. Consultez* aussi l'Ouvrage de M. *Mamelius*, divisé en quatorze Chapitres sur la comparaison de la pierre de Bologne, dans les *Ephém. des Cur. de la Nat. T. IV, App. pag. 165. Voyez maintenant* Spath fusible.

PIERRE DE BOMBACO ou de MOMBAZA. Les Portugais donnent ce nom au bézoard du cheval sauvage des Indes.

PIERRE A BOUTON. En Allemagne on donne ce nom à une espece d'ardoise, souvent pyriteuse, qui se vitrifie au feu, & qui devient par-là susceptible de la taille & du poliment. On donne aussi le nom de *pierre à bouton* à une espece de *porpites*.

PIERRE BRANCHUE. Nom donné à des corps pierreux qui se trouvent en terre, & dont les uns ne sont que des madrépores fossiles ou pétrifiés, les autres ne sont que des corps accidentellement configurés qui se trouvent dans les creux sillonnés & horizontaux des couches de terre. L'eau en perçant & s'infiltrant en

ſerpentant dans la terre, forme peu à peu des canaux tortueux ; elle ſe charge de particules friables, ſoit de terre, ſoit de pierre, coule ainſi ſous l'état de *guhr terreux*, ſe ramaſſe dans ces cavités branchues, s'y évapore enſuite, & la matiere terreuſe s'y moule à meſure qu'elle ſe condenſe & ſe ſolidifie. Ces pierres branchues configurées ſont de différentes natures & de diverſes formes ; ſouvent elles ſont enclavées les unes dans les autres ; celles qui font effervescence aux acides ſont crétacées, communément de couleur ou griſe ou bleuâtre & de forme baroque : extérieurement elles ont une écorce plus ou moins épaiſſe, & plus ou moins dure & raboteuſe, quelquefois friable. On peut ranger ces pierres branchues, dont on trouve une grande quantité à Riom, dans l'ordre des dépôts ; *voyez l'article* STALACTITES. On peut conſulter les Obſervations ſur ce genre de pierres configurées dans le cinquieme volume des Savans étrangers, pag. 54.

PIERRE BRULÉE. En Auvergne, dans le Bourbonnois & à Andernack ſur le Bas-Rhin, on donne ce nom à une eſpece de larve griſe dont on fait des meules de moulin ; elle ſert auſſi à bâtir. La pierre de Volvic eſt une *pierre brûlée*.

PIERRE CALAMINAIRE ou CALAMINE, *lapis calaminaris*, eſt une terre dure & de différentes couleurs, chargée principalement de zinc dans l'état d'ochre (*ochra zinci.*) MM. *Pott* & *Marcgraff*, de l'Académie Royale de Pruſſe, ont été les premiers qui ont fait connoître que la *calamine*, ainſi que la *blende*, ſont des mines de ce demi-métal ; *voyez ces mots & l'article* ZINC. La pierre calaminaire qui eſt une ochre chargée de zinc paroît avoir été formée par la décompoſition du vitriol blanc.

PIERRE CALCAIRE, *lapis calcareus aut calcis.* On donne ce nom à toutes les eſpeces de pierres, qui ſont preſqu'entiérement ſolubles par les acides, & qui en ſont attaquées avec effervescence. Ces ſortes de pierres, qui paroiſſent tirer évidemment leur origine des corps organiſés & durs, appartenans au regne animal, comme os, coquilles, madrépores, &c. *voyez au mot* FOSSILES, ſe calcinent au feu & s'y ré-

duisent en chaux. Il y en a d'opaques, non cristallisées, rarement brillantes, sinon dans leurs fractures; telles sont les pierres à chaux, qui se trouvent en quantité dans presque tous les lieux où il y a des coquilles fossiles grouppées & à demi-dénaturées. La véritable pierre à chaux, celle dont on se sert pour le ciment, est ou dure & compacte, d'un grain fin ou raboteuse, ou brillante, écailleuse & tendre, d'une couleur peu agréable, quoique variée de blanc, de jaune, de gris & de rouge; se divisant en morceaux irréguliers; *voyez* notre Minéralogie pour les variétés de cette pierre calcaire, avec la maniere de la calciner & de la fuser. On prétend que l'excellence de la chaux des Anciens Romains ne consistoit que dans l'emploi de cette chaux, long-temps éteinte avant qu'on en fit usage; mais aussi un tel ciment ne convient pas tant pour les édifices que l'on construit dans l'eau: il y a même des cas où il ne faut éteindre la chaux qu'à l'instant où l'on doit l'employer. Il seroit cependant à désirer que quelqu'un fît le commerce de chaux éteinte depuis trois années au moins. Dans plusieurs contrées des Indes, on fait de la chaux avec des *coquilles* ou des *madrépores*. L'on en fait de même dans tous les autres endroits où l'on est à portée d'en faire de grands amas, comme dans le ressort de l'Amirauté de Brest. Pendant le temps des chaleurs, lorsque la pêche des huîtres cesse par-tout ailleurs, on ne laisse pas de continuer dans ce Canton, non pour l'animal qui ne vaut plus rien, mais pour les écailles dont on fait une chaux, qu'on emploie à blanchir le fil & les toiles qui s'embarquent à Landernau pour le commerce d'Espagne. Cette chaux peut être très-bonne à cet usage; on peut aussi l'employer aux gros ouvrages de maçonnerie: mais il est d'expérience qu'elle ne vaut rien à blanchir la surface des murs, & qu'elle s'écaille.

Les autres pierres calcaires sont, le *marbre*, le *spath calcaire*, les *stalactites* & l'*albâtre calcaire*. Voyez chacun de ces mots. La plupart des pierres calcaires spathiques de Suede sont très-variées pour le tissu & la couleur, mais elles sont souvent mêlées de quartz, de pyrites, &c.

A l'égard de la chaux naturelle, que quelques Auteurs disent se trouver dans les eaux de Bath en Angleterre, assurant de plus qu'elle a la propriété de produire une ébullition très-considérable avec l'eau froide, & de l'échauffer au point qu'on pourroit y faire cuire des œufs; nous croyons pouvoir dire ici, qu'ayant répété l'expérience avec le thermometre, s'il s'en est trouvé qui eût cette propriété, on devoit l'attribuer à des feux souterrains qui l'avoient calcinée. La pierre à chaux calcinée, fusée & étendue dans l'eau, donne à cette liqueur une propriété utile à un grand nombre de maladies chroniques & rebelles: on l'estime un puissant lithontriptique, sur-tout si on y joint le savon. Quant aux propriétés physiques de la chaux, lesquelles sont communes aux alkalis fixes, *voyez le Dictionnaire de Chimie.*

PIERRE DE CASTOR. *Voyez* PIERRE DES AMPHIBIES.

PIERRE DE CAYENNE. On a vu à la ménagerie du Roi, sous ce nom un oiseau, connu au Mexique sous le nom de *pauxi*, & dans quelques Auteurs sous les noms de *cuxo* ou *cushew*, ou de *poule de Numidie*: Cet oiseau a beaucoup de rapport avec le hocco, mais il en differe par plusieurs caracteres, sa taille est plus petite, son bec est plus fort, plus courbe, & presque autant que celui d'un perroquet; son plumage d'un beau noir fait voir des reflets bleus & couleur de pourpre; sur son bec est un tubercule bleu, en forme de poire. Suivant *Aldrovande*, la femelle a le bec moins crochu, elle n'a point de queue, ce qui seroit, dit M. de *Buffon*, un trait de conformité avec le hocco des Amazones de *Barrere*, dont la femelle a la queue beaucoup moins longue que le mâle; ce ne sont point les seuls oiseaux d'Amérique qui n'aient point de queue; il y a même tel canton de ce Continent où les poules transportées d'Europe ne peuvent vivre long-temps sans perdre leur queue, & même leur croupion. La *pierre de Cayenne* se perche sur les arbres, pond à terre comme les faisans, mene ses petits & les rappelle de même; les petits vivent d'abord d'insectes, & ensuite quand ils sont grands, de fruits, de grains & de

tout ce qui convient à la volaille : il eſt ſi ſtupide qu'il ſe laiſſe tirer juſqu'à cinq ou ſix coups de fuſil ſans ſe ſauver ; cependant il ne ſe laiſſe ni prendre ni toucher : on ne le trouve que dans les lieux inhabités, ce qui fait que l'on a aſſez rarement cet oiſeau en Europe.

PIERRE DES CENDRES. *Voyez* TOURMALINE.

PIERRE A CHAMPIGNON. *Voyez à la ſuite de l'article* CHAMPIGNON.

PIERRE CHATOYANTE. *Voyez d'abord le mot* CHATOYANTE *& enſuite l'article* ŒIL DU MONDE.

PIERRE DE CHAUDRON. *Voyez au mot* STALACTITES.

PIERRE ou PAVÉ DE LA CHAUSSÉE DES GÉANTS. C'eſt une pierre igneſcente & configurée, qui eſt au rang des merveilleuſes productions naturelles de l'Irlande, dont le Docteur *Pocock* & le Naturaliſte *d'Acoſta* nous ont donné une deſcription très-détaillée. *Voyez le mot* BASALTES.

PIERRE A CHAUX ou A CIMENT. *Voy.* PIERRE CALCAIRE.

PIERRE DE CHELIDOINE. C'eſt la *pierre d'hirondelle.* Voyez ce mot.

PIERRE DE CHEVAL, *hippolitus.* C'eſt une eſpece de *bézoard.* Voyez ce mot.

On trouve des pierres dans l'eſtomac, dans la véſicule du fiel, dans la veſſie & dans le canal ſalivaire des chevaux, dans la tête & dans la mâchoire des ânes ſauvages, dans l'eſtomac & dans les inteſtins des mulets. Les pierres d'éléphans ſont de vrais *bézoards*, ainſi que celles des ſinges.

PIERRE DE CIRCONCISION. On a donné ce nom aux *haches de pierres* dont nous avons parlé, parce qu'on croyoit que les Anciens s'en ſervoient pour l'opération dont elle porte le nom. La nature de cette pierre n'eſt pas toujours la même : il y en a de ſilicées, d'autres ſont ou de pétroſilex, ou de baſalte, ou de jade.

PIERRE DE CLOCHE, *chalcophonus.* Pierre dont il eſt mention dans *Boëce de Boot :* c'eſt une pierre couleur de marbre noir, qui rend le même ſon que l'airain quand on la frappe, & qui ſe trouve au Mexique,

dans le lit d'une riviere qui ne coule pas toujours & qui traverse la ville de Cuantala. Cette pierre est ornée d'une tache, ou plutôt d'une incrustation très-adhérente & de matiere différente. M. Anderson (*Histoire Naturelle du Groënland*) parle aussi d'une semblable pierre d'un verd-bleu, & qui a le son d'une cloche : on prétend que la *pierre de cloche* se trouve en Canada. Cette pierre ne seroit-elle pas plutôt du cuivre fondu par quelque feu souterrain ?

PIERRE CLOISONNÉE. Pierre figurée à cloisons. Quelques-uns rangent cette pierre au nombre des jeux de la nature. *Voyez* LUDUS HELMONTII.

PIERRE DE COBRA ou DE SERPENT DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE. *Voyez au mot* PIERRE DE SERPENT.

PIERRE DE COCHON. C'est une espece de *bézoard*.

PIERRE COLUBRINE, *lapis colubrinus*. C'est une espece de *pierre ollaire solide*, un peu grasse au toucher : elle est composée de particules très-fines, susceptible d'être travaillée sur le tour avec des outils de fer ; mais elle ne peut recevoir aucun poli : il y en a de dure, sa couleur est d'un gris de fer ; une autre qui est feuilletée, & enfin une troisieme variété qui est tendre : on s'en sert quelquefois pour tracer & former des dessins sur des murailles. On trouve la pierre colubrine à Sahlberg & à Carpenberg.

PIERRE DE COME ou COLOMINE, *lapis comensis*. C'est une espece de *pierre ollaire*, peu dure & facile à travailler sur le tour, opaque, grise, de diverses couleurs, comme marbrée, & remplie de particules talqueuses ou micacées qui y forment des manieres d'ondes. Si on lui fait subir l'action du feu, elle se durcit & y acquiert un éclat argentin : on trouve cette pierre dans le Jemteland, & particuliérement chez les Grisons, près de Pleurs, *Plurium*, ville ou bourg considérable, situé autrefois près du lac de Côme. Cette ville fut ensévelie en 1618 sous les débris d'une montagne voisine, d'où l'on tiroit la pierre dont il s'agit, & qu'on avoit creusée trop inconsidérément : son emplacement est aujourd'hui un lac. On fait encore de cette pierre des vases

ou poteries qui réſiſtent au feu, & qu'on porte enſuite à Côme, d'où lui eſt venu le nom de *pierre de Côme*. Il y a pluſieurs autres mines de pierre ollaire chez les Griſons, 1°. auprès de Chiavenne; 2°. dans la Valteline, chez les Griſons mêmes, appelés *Lavezzi*, où la pierre ollaire étoit autrefois appelée *laveze*. Les habitans de la montagne de Galand l'appellent *craie verte ſavonneuſe*.

PIERRE COMPOSÉE : *voyez au mot* ROCHE.

PIERRE DE COQ : *voyez* PIERRE ALECTORIENNE.

PIERRE DE COQUILLES : *voyez l'article* PERLES *au mot* NACRE DE PERLES.

PIERRE DE CORNE, *lapis corneus*. Les Naturaliſtes Allemands & les Ouvriers des mines de ce pays donnent le nom de *pierre de corne* (hornſtein) à pluſieurs eſpeces de pierres de nature différente. *Henckel* dit qu'on déſigne par-là une pierre feuilletée, & qui eſt un vrai jaſpe : elle reſſemble parfaitement au caillou & au quartz qui ſeroient colorés en brun, en jaune, en rouge, en gris & en noir. Le même Auteur dit qu'il ſe trouve de la pierre de corne en Saxe dans le voiſinage de Freyberg, & qu'elle eſt compoſée d'un aſſemblage de petites couches de ſpath peſant, d'améthyſte, de quartz, de jaſpe, de criſtal, qui ſont entremêlées les unes ſur les autres.

D'autres donnent le nom de *pierre de corne* à cette eſpece de *ſilex* ou *pierre à fuſil jaunâtre* qu'on trouve ſouvent dans des ſablonnieres, ou par morceaux répandus dans la campagne, & dont la couleur reſſemble à celle de la corne des animaux. Voyez notre *Minéralogie*, *ſeconde édition*, *vol. I.* & l'article ROCHE DE CORNE dans ce Dictionnaire.

PIERRE DE CRABE. *Voyez* QUEUE DE CRABE.

PIERRE DE CRAPAUD. *Voyez* CRAPAUDINE.

PIERRE DE CROIX, *lapis crucifer*. Cette pierre qui eſt en partie d'une nature de marne & en partie ſilicée, a une couleur de corne griſe, & porte exactement dans ſon intérieur la figure d'une croix noirâtre, tout-à-fait différente des *macles* que l'on appelle auſſi *pierre de croix*. Voyez MACLE.

La

La pierre de croix ne semble être qu'une frondipore (espece de madrépore) fossile, dont deux lames de nature silicée se croisent de maniere qu'étant sciées horizontalement ou même verticalement, & ensuite polies, elles ne représentent pas mal une croix, dont l'intervalle des angles seroit rempli d'une matiere semblable à une pierre ollaire ou à de la marne très-argileuse & très-durcie. On trouve beaucoup de ces pierres en basse Normandie, en Poitou ou en Saintonge, dans la Guienne, & principalement aux environs de Compostelle en Espagne, à vingt milles de l'Eglise de Saint Jacques. Les Jouailliers d'Espagne les taillent en amulettes, & les enchâssent dans de l'or ou de l'argent pour satisfaire à la crédulité des gens du pays, qui prétendent qu'on trouve ainsi ces pierres toutes polies, & pour des causes dont ils ont seuls la révélation; on en fait aussi des chapelets, des rosaires, &c.

PIERRE A DÉTACHER. On sait que la glaise pure, lorsqu'elle est seche, a une grande disposition à imbiber les matieres huileuses & grasses; cette propriété fait qu'on s'en sert pour faire les pierres à enlever les taches des habits, & qu'on les nomme *pierres à détacher*. M. *Bourgeois* prétend que la bonne marne pure est la meilleure de toutes les pierres à détacher; elle est, dit-il, préférable à toutes les especes de glaises, parce qu'outre la glaise qui en fait la base, elle contient une terre absorbante qui se charge encore mieux que la glaise, des huiles qui tachent les étoffes.

PIERRE DIVINE. *Voyez* JADE.

PIERRE DE DOMINÉ. Nom donné à une espece de marne qui se pétrifie, & qui, au rapport des Voyageurs Hollandois, se trouve dans une riviere qui passe près de la forteresse de Victoria, dans l'île d'Amboine. Cette pierre est mouchetée comme du marbre serpentin, & de la grosseur d'un œuf d'oie, chargée de mamelons; cependant lisse, assez tendre & facile à polir. On prétend que c'est un Curé Protestant (que les Hollandois nomment *Dominés*) qui le premier l'a découverte & fait connoître: on assure même qu'il en faisoit mâcher à ses malades. *Dictionnaire universel de Hubner*,

PIERRES DE DRAGÉES, *confetti*. Nom donné à des congélations lapidifiques qui imitent des dragées. Le château d'Arbent en Bugey en eſt preſque entiérement bâti. *Voyez* DRAGÉES DE TIVOLI.

PIERRE DE DRAGON, *draconites*. Pierre demi-tranſparente que quelques anciens Naturaliſtes ont prétendu ſe trouver dans la tête du dragon, & ſur laquelle on a débité beaucoup de rêveries. *Voyez* Boëce de Boot *de Lapid. & Gemm. p. 441, édit. de 1644.* M. Stobæus (*Stobæi Opuſcula, pag. 130, &c.*) croit que la draconite n'eſt autre choſe que l'aſtroïte. Il prétend que les Charlatans pour en relever le prix, ſe ſont imaginés de dire qu'elle venoit des Indes, & qu'elle avoit été tirée de la tête d'un ſerpent endormi, avant que de lui couper la tête. La forme d'une étoile qu'on remarque dans cette pierre, ſuffiſoit d'ailleurs pour la rendre merveilleuſe aux yeux du peuple qui ne pouvoit manquer d'y appercevoir des marques d'une influence céleſte. Une autre circonſtance qui devoit encore frapper des gens peu inſtruits, c'eſt qu'en mettant du vinaigre ſur cette pierre, on y apperçut du mouvement; effet aſſez naturel lorſque la pierre eſt poreuſe & du genre des calcaires qui ont la propriété de ſe diſſoudre dans les acides, & d'y faire efferveſcence: c'eſt un phénomene ſemblable qui a fait donner à la *pierre lenticulaire* le nom de *pierre ſorciere*. Voyez ce mot. La *pierre de dragon* eſt une aſtroïte convertie en ſpath: *voyez* ASTROITE & SPATH.

PIERRE A ÉCORCE. *Voyez* ROCHE DE CORNE.

PIERRE D'ÉCREVISSES. *Voyez à la ſuite du mot* ÉCREVISSE.

PIERRE D'ÉMERIL. *Voyez* ÉMERIL *à l'article* FER.

PIERRE ÉCUMANTE. Cette ſubſtance minérale que les Suédois appellent *gæſſen*, bouillonne dans le feu, forme de l'écume, & a beaucoup de propriétés analogues à celles de la *gelée minérale*, & ſur-tout avec la *zéolite*. Voyez ces mots.

PIERRE ÉLÉMENTAIRE. Les Lithologiſtes donnent ce nom ou à une *agate de quatre couleurs*, ou à une *opale*. Voyez ces mots.

PIERRE EMPREINTE. *Voyez* TYPOLITES & l'article EMPREINTES.

PIERRES D'ÉPONGE, *lapis spongiæ*. Ce sont de petits corps ou concrétions poreuses & pierreuses qui se trouvent dans les pores de l'*éponge* ou dans l'intérieur de la terre : alors ce sont des especes d'*ostéocolle*. Voyez ces mots.

PIERRE D'ÉTAIN. Les Mineurs donnent ce nom à l'étain minéralisé dans la pierre : ils le donnent aussi à la mine d'étain bocardée, lavée & prête à être purifiée par la fonte. *Voyez* ÉTAIN.

PIERRE D'ÉTHIOPIE. Il semble que c'est le basanite ; mais le basanite est-il le vrai basalte, ou un marbre noir très-dur ? On n'a encore rien éclairci à ce sujet.

PIERRE ÉTOILÉE ou ASTERIES. *Voyez au mot* PALMIER MARIN.

PIERRE A FARD. C'est une espece de *talc*. Voyez ce mot.

Le nom de *fard* se dit de toute composition soit de blanc, soit de rouge, dont les femmes & quelquefois les hommes mêmes se servent dans certains pays pour embellir leur teint, imiter les couleurs de la jeunesse, ou les réparer par artifice.

On lit dans l'Encyclopédie que l'amour de la beauté a fait imaginer de temps immémorial tous les moyens qu'on a cru propres à en augmenter l'éclat, à en perpétuer la durée ou à en rétablir les breches, & que les femmes chez qui le goût & l'art de plaire sont très-étendus, ont cru trouver ces moyens dans les *fardemens*. (Consultez le Livre d'*Enoc*.) L'antimoine est le plus ancien fard dont il soit fait mention dans l'Histoire, & en même temps celui qui a le plus de faveur. Comme dans l'Orient les yeux noirs, grands & fendus passoient, ainsi qu'en France aujourd'hui, pour les plus beaux, les femmes qui avoient envie de plaire se frottoient le tour de l'œil avec une aiguille trempée dans du fard d'antimoine pour replier la paupiere, afin que l'œil en parût plus grand : on ne sauroit croire combien l'usage d'un tel fard s'étendit & se perpétua. Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'aujourd'hui les femmes Syrien-

nes, Babyloniennes & Arabes se noircissent du même fard le tour de l'œil, & que les hommes en font autant dans les déserts de l'Arabie pour se conserver, disent-ils, les yeux contre les ardeurs du soleil. Tous ces peuples tirent une ligne noire en dehors du coin de l'œil, pour le faire paroître plus fendu, & les femmes Barbaresques croiroient qu'il manqueroit quelque chose d'essentiel à leur parure si elles n'avoient pas teint le poil de leurs paupieres & leurs yeux avec de la poudre de *molybdene*. Voyez ce mot. Les femmes Grecques & Romaines emprunterent des Asiatiques la coutume de se peindre les yeux en noir; mais pour étendre encore plus loin l'empire de la beauté, & réparer les couleurs flétries, elles imaginerent deux nouveaux fards inconnus auparavant dans le monde, & qui ont passé jusqu'à nous, c'est-à-dire le *blanc* & le *rouge*.

La plupart des Peuples de l'Asie & de l'Afrique sont encore dans l'usage de se colorier diverses parties du corps, de noir, de blanc, de rouge, de bleu, de jaune, de vert, en un mot de toutes sortes de couleurs, suivant les idées qu'ils se sont formées de la beauté.

Avant que les Moscovites eussent été policés par le Czar Pierre I, les femmes Russes savoient déjà se mettre du rouge, s'arracher les sourcils, se les peindre ou s'en former d'artificiels. Nous voyons aussi que les Groënlandoises se bariolent le visage de blanc & de jaune; & que les Zembliennes pour se donner des graces, se font des raies bleues au front & au menton: elles ont aussi la coutume de se percer le nez & les oreilles, & d'y attacher des pendans de pierres bleues. Les Mingréliennes, sur le retour, se peignent tout le visage, les sourcils, le front, le nez & les joues. Les Japonnoises de Jédo se colorent de bleu les sourcils & les levres. Les Insulaires de Sombréo au nord de Nicobar, se plâtrent le visage de vert & de jaune. Quelques femmes du royaume de Décan se font découper la peau en fleurs qu'elles teignent de diverses couleurs. Les Arabes, outre ce que nous en avons dit ci-dessus, sont dans l'usage de s'appliquer une couleur bleue aux bras, aux levres & aux parties les plus apparentes du corps: ils mettent, hommes & femmes, cette couleur

par petits points, & la font pénétrer dans la chair avec une aiguille faite exprès : la marque en eſt inaltérable. Les Turqueſſes Africaines s'injectent de la tuthie préparée dans les yeux pour les rendre plus noirs, & ſe peignent les cheveux, les mains & les pieds en couleur jaune & rouge. Les Maureſſes ſuivent la même mode, mais elles ne teignent que les paupieres & les ſourcils avec la molybdene. Les filles qui habitent les frontieres de Tunis ſe barbouillent de couleur bleue le menton & les levres ; quelques-unes impriment une petite fleur dans quelqu'autre partie du viſage, avec de la fumée de noix de galle & du ſafran. Les femmes du royaume de Tripoli font conſiſter les agrémens dans des piqûres ſur la face, qu'elles pointillent de vermillon, elles peignent leurs cheveux de même : la plupart des filles Negres du Sénégal, avant de ſe marier, ſe font broder la peau de différentes figures d'animaux & de fleurs de toutes couleurs. Les Négreſſes de Serra-Liona ſe colorent les yeux de blanc, de jaune & de rouge. Les Créecks & les Habitans du détroit de Davis en Amérique, dans la vue de s'embellir, ſe découpent la peau du viſage, &c. en ſerpens, lézards, crapauds & fleurs, & rempliſſent ces coupures de couleur noire. Les Floridiennes ſeptentrionales ſe peignent par piqûres le corps, le viſage, les bras & les jambes de toutes ſortes de couleurs ineffaçables. Enfin les Sauvageſſes Caraïbes ſe barbouillent toute la face de roucou. Si nous revenons en Europe, nous trouverons que le blanc & le rouge (le talc & le carmin) ont fait fortune en France. Nous en avons l'obligation aux Italiens qui paſſerent à la Cour de Catherine de Médicis : mais ce n'eſt que ſur la fin du ſiecle paſſé que l'uſage du rouge, du crêpon de Strasbourg & du nakarat de Portugal, eſt devenu général parmi les femmes de condition, &c. &c. on a même étendu l'uſage du fard juſques ſur les cheveux : on ſe ſert aujourd'hui de poudre à poudrer blanche ; il y a des perſonnes du ſexe qui prétendant être guidées par le bon goût, adoptent l'uſage de la poudre blonde ; d'autres adoptent, pour relever l'éclat naturel de leur teint, une poudre d'une teinte plus foncée ; enfin quelques autres, peut-être par fantaiſie, peut-être par ca-

price, exigent une poudre entiérement rouſſe. Il eſt à déſirer en faveur du beau ſexe, que les Parfumeurs, pour ſe conformer à la variété des demandes, ne débitent que de la poudre d'amidon brûlé, enſuite broyé & tamiſé: ſuivant la calcination de l'amidon, il eſt réduit en une eſpece de charbon d'une couleur plus ou moins foncée; mais nous l'avons dit, ces nuances obſcures ne ſatisfaiſant pas toujours quelques perſonnes, il a fallu, dit M. *de la Follie*, remonter la couleur avec du *roucou*, du *colcothar* & autres drogues ſemblables, qui mêlées avec de la poudre déjà échauffée & deſſéchée au point d'avoir perdu un tiers de ſon poids ſur le feu, forme un compoſé mal-ſain ſur la peau, nuiſible à la conſervation des cheveux, & d'une odeur dont le retour ne flatte pas toujours l'odorat. Puiſqu'il eſt du bel air de faire uſage des poudres de différentes nuances, M. *de la Follie* propoſe aux Dames le moyen d'en faire qui ne ſoient aucunement dangereuſes & plus agréables que toutes celles qui ſont uſitées. Il faut colorer la poudre d'amidon avec une décoction de ſix onces de bois de Bréſil, faite dans quatre livres d'eau bouillante & repoſée, en former une pâte qui ne ſoit pas trop liquide: on diviſe cette pâte en petites portions pour la faire ſécher; enſuite on l'écraſe & on la fait paſſer au tamis: cette poudre eſt d'un beau jaune chamois. On met dans le reſte de la décoction de bois de Bréſil un demi-gros d'alun qu'on fait fondre ſur le feu; on laiſſe refroidir & repoſer ce bain aluné; on en verſe ſur une autre livre de poudre de la même maniere que ci-deſſus, & on en obtient une poudre qui conſerve au ſec une belle couleur roſe. Le bois d'Inde & l'alun de Rome produiroient par le même procédé une poudre d'un gris-roſe très-agréable. Le vitriol de Chypre en place d'alun produiroit une poudre d'une belle couleur lilas: la ſurface de cette poudre expoſée à l'air devient entiérement bleue; mais ſi on remue cette poudre, elle redevient de couleur lilas, & ces changemens de couleur s'operent autant de fois qu'on renouvelle les ſurfaces. Ce phénomene digne de l'attention du Phyſicien peut amuſer une Dame à ſa toilette. Des poudres colorées avec le bleu de Pruſſe & mêlées avec les poudres

roſes produiſent de belles couleurs violettes & lilas, & les ſurfaces n'éprouvent point à l'air les changemens ſinguliers de la poudre précédente. Si au lieu d'alun & de vitriol de Chypre on met dans la décoction de bois d'Inde de la couperoſe verte, on aura une poudre d'un bleu ardoiſé uniforme.

Le fard ne peut réparer les injures du temps, ni rétablir ſur les rides du viſage la beauté qui s'eſt évanouie; & loin que les fards produiſent cet effet, preſque tous gâtent la peau, la rident, l'alterent & ruinent la couleur naturelle: heureuſement que les Dames qui entendent leurs intérêts, ne ſe laiſſent guere abuſer ni ſur la qualité du *rouge*, ni ſur celle du *blanc*, *&c.* autrement leur peau perdroit tous ſes agrémens. *Voyez les articles* TALC, BISMUTH, COCHENILLE & HOMME, où l'on trouvera pluſieurs autres ſortes de détails ſur la beauté & l'art coſmétique des différens Peuples.

PIERRE A FAUX. *Voyez* GRAIS DE TURQUIE.

PIERRE A FEU MÉTALLIQUE. *Voyez l'article* PYRITES.

PIERRE DE FIEL. Concrétion pierreuſe qui ſe trouve dans l'amer ou véſicule du fiel de pluſieurs animaux: elle eſt formée par l'épaiſſiſſement & le deſſéchement de la bile, dont elle conſerve la couleur & l'amertume. Elle eſt plus ou moins groſſe & arrondie; celle du bœuf étant broyée ſur le porphyre, fait un jaune doré très-beau: elle peut s'employer à l'huile, quoique rarement, ſon plus grand uſage étant pour la miniature ou détrempe.

PIERRES FIGURÉES, *figurata.* On donne ce nom à toute eſpece de pierre, qui porte naturellement en ſa ſuperficie ou dans ſon total, une figure extraordinaire, & tout-à-fait étrangere au regne minéral: *voyez l'article* JEUX DE LA NATURE. Il y a auſſi des pierres figurées artificielles, que l'on rencontre quelquefois dans la terre à différentes profondeurs, communément dans des butes & dans des tombeaux; telles ſont, 1°. les prétendues *pierres de tonnerre* ou de *foudre*, faites en forme de croix, ou pyramidales par les deux extrémités, renflées dans le milieu, & percées d'un trou; 2°. les *haches de pierre*; 3°. les *marteaux de pierre*; 4°. les

couteaux de pierre ; 5°. les *fleches de pierre.* Il paroît que ces pierres sont des armes, des instrumens & ustensiles dont anciennement les hommes, & sur-tout les Sauvages se servoient soit à la guerre, soit pour d'autres usages, avant que de savoir traiter le fer. On peut ajouter à ces sortes de pierres taillées ou figurées, 6°. les *langues de pierre ;* 7°. les *urnes sépulcrales ;* 8°. les *dez de Bade*, &c.

PIERRE A FILTRER. *Voyez à l'article* GRAIS.

PIERRE DE FLORENCE. Espece de marbre opaque, grisâtre & orné de figures jaunâtres, qui ressemblent assez à des ruines ; ce qui lui a fait donner le nom de *lapis ruderum.* On en fait des tableaux en pieces de rapport qui sont entre les mains de tout le monde. *Voyez à l'article* MARBRE.

PIERRE DE FOUDRE ou DE TONNERRE. Pierre dont le vulgaire pense que la chute ou même la formation du tonnerre est toujours accompagnée. Son existence est fort douteuse. Ce qu'on a pris pour une pierre de foudre ou de tonnerre est une matiere minérale fondue par l'action du feu du Ciel, ou peut-être même quelque substance, telle que la terre en renferme beaucoup dans les endroits où elle a été fouillée par des volcans qui se sont éteints. Le tonnerre étant venu à tomber dans ces endroits, & le peuple y ayant ensuite rencontré ces substances qui portent extérieurement des preuves certaines de l'action du feu, il les aura prises pour ce qu'il a appelé des *pierres de foudre.* *Voyez* CERAUNIAS & BELEMNITES.

PIERRE FROMENTAIRE ou FRUMENTACÉE, *lapis frumentarius.* Ce sont des corps fossiles, qui étant grouppés & cassés latéralement ressemblent alors à des grains de froment, suivant les différens aspects que présente cette pierre : on lui donne aussi d'autres noms. *Voyez* PIERRE LENTICULAIRE & PIERRE NUMISMALE.

PIERRE A FUSIL ou SILEX. *Voyez aux mots* CAILLOU & SILEX.

PIERRE DE GALLINACE. Espece de verre noirâtre, très-dur, opaque ou obscur, fort pesant, susceptible du poli, & dont les Péruviens se servoient en guise de glaces pour faire leurs miroirs. Les Indiens

l'appellent auſſi *guanucuna culqui* (argent des morts), parce qu'ils avoient coutume d'en enterrer divers morceaux avec leurs morts. On en trouve en effet dans leurs anciens tombeaux des morceaux taillés. On en voit un très-beau dans le Cabinet d'Hiſtoire Naturelle du Roi ; il fut tiré d'un tombeau fort écarté dans les montagnes de Pichencha près Quito. Il a neuf pouces de diametre, & dix lignes & demie d'épaiſſeur ; il eſt de figure convexe des deux côtés, mais de convexités inégales, & on y remarque une face plus polie que l'autre. M. *Godin* dit avec raiſon qu'il y a une mine de *pierres de gallinaces* à pluſieurs journées de Quito ; elle n'en eſt même éloignée que de neuf lieues dans la partie de l'Eſt, dans les montagnes de la grande Cordilliere, Paroiſſe de Quinche ; là ſe trouve un rocher entiérement compoſé de cette ſubſtance, dans lequel eſt une grotte que les Indiens nomment *quiſica-machai*, & les Eſpagnols *machay-cueva*, & d'où l'on peut tirer des pieces de gallinace de plus de cinq pieds de largeur. On ne peut travailler cette pierre qu'en l'uſant. Il paroît que la *gallinace* eſt un verre ou un laitier des volcans du Pérou. *Voyez* PIERRE OBSIDIENNE.

PIERRE DE GOA. Eſpece de *bézoard factice*. Voyez au mot BÉZOARD.

PIERRE GYPSEUSE. *Voyez* GYPSE.

PIERRE HÉMATITE. *Voyez à l'article* FER.

PIERRE HÉLIOTROPE. *Voyez au mot* JASPE.

PIERRE HÉPATITE. Quelques-uns ont donné ce nom à la pierre appelée *lawezze*. La pierre hépatite ou hépatique eſt le produit d'une combinaiſon de l'acide vitriolique, du phlogiſtique & d'une terre calcaire : en la frottant, elle exhale une odeur de foie de ſoufre ; elle ne fait pas efferveſcence avec les acides : elle tient le milieu entre la pierre-porc & le gypſe.

PIERRE HERCULIENNE, eſt l'*aimant*. Voyez ce mot.

PIERRE HERBORISÉE. *Voyez à l'article* AGATE & DENDRITE.

PIERRE D'HIRONDELLE. Nom donné à de petites pierres que l'on prétend ſe trouver dans l'eſtomac

de l'oiseau qui porte ce nom, & qu'il avoit avalées pour faciliter sa digestion. Ce sont de petits grains d'agate, ou de pierre à fusil ou de quartz plus grands qu'une semence de lin. Il y en a de blanches, de grises, de bleuâtres, jaunâtres, grisâtres, plus ou moins unies & luisantes. Ces pierres ont une réputation très-ancienne parmi le peuple, & même parmi les Naturalistes qui les ont estimées ophtalmiques. Les Cabinets les plus distingués offrent de ces petits cailloux ou sables peu intéressans par eux-mêmes : on a prétendu que ces sortes de pierres sableuses ne se trouvoient que dans les cuves & les grottes de la montagne de Sassenage, près de Grenoble en Dauphiné ; l'on y en rencontre quelquefois, mais c'est en petite quantité & en certains temps ; le véritable endroit où elles abondent aujourd'hui, & où on les ramasse en tout temps est au-dessus des grottes, dans une partie de la même montagne, où l'on ne peut parvenir qu'en faisant un circuit d'environ trois heures de chemin : on va de là par une montée très-rapide au bord d'un ruisseau appelé *Germe* qui sort avec impétuosité d'un antre creusé par la nature dans le rocher, & va se joindre ensuite non loin de là, à un autre ruisseau nommé *Feron*, où il perd son nom. Voilà l'endroit où les pierres dont il est mention se trouvent en abondance dans un sable mélangé avec de petits fragmens d'une pierre blanche, tendre ou spatheuse, ou marneuse. Il se trouve des pierres d'hirondelle ou de Sassenage, d'un très-beau poli : elles n'affectent point de figure déterminée, il y en a d'orbiculaires ou rondes, de triangulaires, d'aiguës, d'irrégulieres. Ces pierres, d'un grain plus ou moins fin, se trouvent aussi dans un ruisseau du Bailliage d'Aigle, au Canton de Berne ; quand elles sont pures & sans être mélangées, elles ne font aucune effervescence avec les acides.

On voit encore bien des personnes avoir confiance en cette pierre, étant introduite dans le coin de l'œil, pour en extraire les corps étrangers qui le fatiguent. Cette propriété que le jade & le cristal de roche auroient de même, n'est due qu'à son poli, qui fait qu'elle peut aller & venir impunément sur la surface de l'œil

ſans le bleſſer, & détacher quelquefois les atomes d'ordures qu'elle rencontre ſur ſa route.

PIERRE A L'HUILE ou D'ORIENT. *Voyez* PIERRE A RASOIR.

PIERRE DES HUMAINS. *Voyez au mot* CALCUL ET PIERRE DES ANIMAUX.

PIERRE HYSTÉRIQUE. *Voyez* HISTÉROLITHE.

PIERRE DES INCAS, *piedra de los Ingas*, eſt une eſpece de pyrite arſenicale, luiſante comme de l'étain ou du fer recuit: elle ne ſe ternit que peu ou point à l'air; ſa figure eſt indéterminée. Les Incas, Rois du Pérou, l'ont miſe en honneur; ils attribuoient de grandes vertus à cette pierre, qui eſt une véritable marcaſſite arſenicale, ils l'eſtimoient propre à guérir la paralyſie; ils en portoient des bagues montées à jour, des amulettes; ils les faiſoient tailler à facettes, & l'on en mettoit dans leurs tombeaux. On en a fait auſſi des miroirs très-unis & des colonnes. On prétend que l'on a retiré quelques-unes de ces pierres de certains tombeaux des Incas, qui avoient près de quatre cents ans d'antiquité, ſans qu'elles paruſſent altérées en rien. Ces marcaſſites ſont d'autant plus rares aujourd'hui qu'on ne les rencontre guere que dans ces tombeaux. Suivant la coutume de ces peuples on enterroit avec le défunt ſes bijoux les plus précieux.

PIERRE INFERNALE. *Voyez à l'article* ARGENT.

PIERRE D'IRIS. Les Anciens ont donné ce nom à une pierre précieuſe, tranſparente, dans laquelle on remarque les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Quand un criſtal de roche eſt équilatéral, & qu'on regarde le ſoleil ou le jour au travers, on y reconnoît le même phénomene: ſouvent un criſtal, étonné par le contre-coup d'un marteau, ſoit dans l'eau chaude, ſoit à l'air libre, eſt ſuſceptible de réfléchir des iris.

PIERRE JUDAÏQUE, ou DE SYRIE, ou DE PHÉNICIE, *lapis Judaïcus*. On préſume & même il paroît démontré, que c'eſt la pointe d'une eſpece particuliere d'ourſin, devenue foſſile, & même convertie en ſpath: elle eſt oblongue, obtuſe, renflée dans ſon milieu, tantôt unie & tantôt chagrinée, ou ornée de lignes perlées, d'une couleur griſâtre. Ces ſortes de pierres ont

un pédicule, au bout duquel est une cavité cotyloïde, peu profonde, qui sert d'emboîture : elles se cassent toujours obliquement. On les trouve communément en Syrie, & dans plusieurs autres endroits de la Judée. Il y en a aussi en forme de gland. Consultez le *Tome IV. des Mémoires des Savans étrangers.*

PIERRE DE LAIT. C'est le *morochtus* ou le *morochite* des Auteurs. On donne aussi ce nom au *lait de lune fossile* à demi-solide ; *voyez ce mot.* Cependant le vrai *morochite* est une substance argileuse, verdâtre ou jaunâtre, de la nature de la *craie de Briançon :* c'est le *milch-stein des Allemands*, qui attribuent beaucoup de propriétés imaginaires à cette substance : on s'en sert quelquefois pour dégraisser & pour tracer des lignes. *Voyez aussi* GALACTIT & GALAXIE.

PIERRE DE LA LANGUE. *Voyez à l'art.* CALCUL.

PIERRE DE LARD ou DE LARRE, *lardites.* C'est une pierre ollaire qui nous vient de la Chine, où on lui donne toutes sortes de figures de magots, d'animaux, &c. & d'où elle nous est envoyée toute façonnée ; elle est douce, savonneuse au toucher, d'une transparence de cire ou de suif, assez dure, de différentes couleurs, tantôt blanche & tantôt marbrée ; c'est la *stéatite* des Anciens, le *gemma-huya* du Dictionnaire de Trévoux, le *speckstein* & le *smectites* des Modernes.

PIERRE LENTICULAIRE ou PIERRE NOMMULAIRE, *lapis lenticularis aut lens lapideus, seu nummus diabolicus.* Parmi les corps les plus inconnus de la Lithologie, les Naturalistes regardent comme un des plus singuliers la *pierre lenticulaire*, ainsi nommée de sa parfaite ressemblance extérieure avec des lentilles, ou avec certaines monnoies. On soupçonne cependant que ces corps organisés sont des testacites, c'est-à-dire, qu'ils ont été dans leur origine des coquillages marins : peut-être sont-ce des especes singulieres de petits nautiles fossiles. Les pierres lenticulaires sont des corps ronds ou orbiculaires, aplatis, plus ou moins épais en leur milieu, lisses, quelquefois radiés en dessus, très-durs, d'une superficie plus ou moins considérable ; les petites ont trois à quatre lignes de largeur, il y en a même d'une petitesse im-

perceptible ; les moyennes en ont six à huit, mais on en trouve de quinze lignes & plus : ces fossiles sont composés de plusieurs couches faciles à distinguer lorsqu'on vient à les user jusqu'à la moitié de leur épaisseur, car on voit alors six à sept traces concamérées en volute, dont l'œil est au centre de cette coupe ; les premieres révolutions sont grenelées : si on coupe ces pierres dans le juste milieu ou leur grand diametre, on voit des traces ovales & concentriques, quelquefois distinguées les unes des autres par une matiere plus ou moins dure : *voyez* PIERRES NUMISMALES. Il y a des pierres lenticulaires par masses & par bancs, les unes sont calcaires, d'autres silicées ; il y en a de blanchâtres, de jaunâtres & de noirâtres : on en trouve beaucoup sur le mont Randen & aux environs de Soissons, & on leur donne le nom de *pierre fromentacée*, quand elles ont été usées, arrondies par des frottemens naturels & suivant leur grand axe ou diametre.

PIERRE DE LIMACE : *voyez à l'article* LIMACE.

PIERRE DE LINX, *lapis lyncis : voyez* BELEMNITE.

PIERRE DE LIS ou ENCRINUS : *voyez* *LILIUM LAPIDEUM*, & l'article PALMIER MARIN.

PIERRE LUMACHELLE ou DE LIMAÇON. Cette pierre que les Italiens nomment ainsi est le *marbre conchyte* de la plupart des Naturalistes. On n'a jusqu'ici que des idées très-incertaines de cette production de la Nature, & de tous les corps organisés qui s'y rencontrent, mais rarement entiers ; on y distingue quelques limaçons à coquille, quelquefois des écailles de poissons de mer, des especes de cornes d'ammon, des bélemnites, &c. La *pierre lumachelle* est susceptible de poli, & se trouve dans des collines composées de couches horizontales de sable & de craie. En 1758 Madame Poncher découvrit dans sa terre de Chacenay en Champagne, près de Bar-sur-Seine, une carriere de ce marbre, dont elle fit conduire quelques blocs à Paris ; le sieur Adam, Marbrier du Roi, les a travaillés & en a fait de très-beaux ouvrages. Par l'échantillon qui nous en a été présenté, nous y avons reconnu des gryphites, des cochlites, la plupart converties en spath ; le gluten ou la pâte de ce marbre

eſt d'un grain fin, dur, ſans fils, & ſuſceptible d'un beau poli. Les blocs qu'on tire de la carriere ont ordinairement ſix à ſept pouces d'épaiſſeur, cinq à ſix pieds de longueur, & trois à quatre pieds de largeur: on pourroit en tirer de plus conſidérables. Ce *marbre conchyte* nous a paru pour le moins auſſi beau que le *lumachella* ſi eſtimé en Italie.

PIERRE LUMINEUSE: *voyez au mot* PHOSPHORE.

PIERRE DE LUNE. Eſpece d'agate nébuleuſe ou d'opale foible, qui réfléchit la lumiere comme la lune.

PIERRE DE LYDIE, eſt l'eſpece de pierre argileuſe qui ſert de *pierre de touche*: voyez ce mot.

PIERRE DE MALAC, eſt le *bézoard du porc-épic*: voyez ce mot.

PIERRE DE MALLACA. Eſpece de bézoard factice: *voyez au mot* BÉZOARD.

PIERRE DE LA MATRICE ou DE VÉNUS: *voyez au mot* HYSTEROLITHE.

PIERRE DE MANSFELD, eſt une eſpece de ſchiſte noirâtre qui ſe trouve près d'Eiſleben en Allemagne; on y voit diſtinctement des empreintes de divers poiſſons ſous un état pyriteux. Cette pierre eſt une vraie mine de cuivre, dont on tire ce métal avec ſuccès dans les fonderies du voiſinage.

PIERRE DE MEMPHIS, eſt une *onyx*: voyez ce mot. Les Anciens appeloient auſſi *memphite* une pierre qui, miſe en macération dans du vinaigre, engourdiſſoit les membres au point de les rendre inſenſibles à la douleur & même à celle de l'amputation. Le *memphite de Pline* eſt l'*ophite noir*: voyez OPHITE.

PIERRE MEULIERE, *lapis molitoris*. Cette pierre eſt une de celles auxquelles un uſage journalier & intéreſſant donne une certaine célébrité. On doit la conſidérer comme une eſpece de quartz carié, ſur-tout celle de France, car elle varie de nature ſuivant les différens pays d'où on la tire, comme de l'Allemagne, du Nord, &c. Il y en a qui reſſemblent à un amas de cailloux de différentes eſpeces, d'autres paroiſſent compoſées de grains de ſable quartzeux ou de matieres graniteuſes,

comme celles de Malung en Dalécarlie. Au reste la surface de ces sortes de pierres est assez inégale, comme trouée, & assez dure pour pouvoir moudre le grain, & même pour faire feu lorsqu'elle éprouve des frottemens rapides. La porosité de ces mêmes pierres fait qu'on les emploie communément en maçonnerie : le ciment en entrant dans ses cavités, les unit beaucoup mieux que toutes autres pierres pleines. Voyez ce que nous avons dit de la *pierre meuliere* au mot GRAIS & à celui de QUARTZ CARIÉ.

PIERRE DE MOKA, est la belle agate herborisée, dont on trouve des quantités près de Moka en Arabie. *Voyez* DENDRITE & AGATE.

PIERRE DE MORAVIE : *voyez* PIERRE RAYÉE DE NANIEST.

PIERRE NAXIENNE ou QUEUX : *voyez* PIERRE A RASOIR. La vraie pierre naxienne sert à aiguiser les faux.

PIERRE NÉPHRÉTIQUE : *voyez* JADE.

PIERRE NOIRE : *voyez* CRAYON NOIR.

PIERRE NOMMULAIRE, *nummus diabolicus* : voyez PIERRE LENTICULAIRE & ÉCU DE BRATTENBOURG.

PIERRE NUMISMALE, *lapis numismalis*. On en distingue de plusieurs sortes, savoir, la *pierre lenticulaire* ou *nommulaire* & la *pierre fromentaire*. Quand on veut voir l'intérieur de ces corps organisés, & qu'ils font effervescence avec les acides, il suffit de les chauffer sur un charbon, & de les jeter toutes chaudes dans de l'eau froide ; aussi-tôt elles s'élevent par couches minces, ou se séparent suivant leur largeur en deux parties égales, hémisphériques ; on remarque une spirale sur leur surface intérieure, ou une ligne qui va en s'élargissant vers la circonférence : le long de cette spirale est distingué par de petites stries qui forment des especes de petites cloisons ou de chambres. *Voyez* PIERRE LENTICULAIRE. Quelques-uns regardent ces pierres comme l'opercule d'une coquille ; mais nous présumons que c'est un coquillage particulier & chambré, au reste, ceci n'est qu'une conjecture. On trouve près de Soissons une grande quantité de ces pierres

jointes ensemble, ou liées par la matiere de la pierre qui les environne ou les enclave; on en trouve aussi qui sont détachées & répandues dans le sable ou dans la terre.

PIERRE OBSIDIENNE, *lapis obsidianus*. On trouve dans *Pline* la description d'une pierre nommée *obsidienne* du nom d'*Obsidius*, qui l'apporta le premier de l'Ethiopie. On en faisoit les *vases mirrhins*: voyez *Myrrhina*, & ce qui est dit à la suite de l'article *Vases*. Feu M. le Comte *de Caylus*, si avantageusement connu des Savans, a étudié particuliérement ce passage de *Pline*; & ses observations lui ont donné matiere à un excellent Mémoire qu'il a lu à l'Académie des Inscriptions le 10 Juin 1760, auquel M. *Bernard de Jussieu* par ses profondes connoissances & ses grandes recherches, a fourni toutes les remarques qui sont du ressort du Naturaliste, & MM. *Majault* & *Roux* les expériences chimiques. Il résulte de ce Mémoire que l'Auteur voulut bien nous confier, en nous permettant d'en faire l'usage présent avant son impression; il résulte, dis-je, que le *lapis obsidianus* n'est ni le *lapis obsidius* du Commentateur *Saumaise*, ni une espece de jayet, comme l'a cru *Agricola*, & après lui *Cæsius* & *Wallerius*; ni un marbre noir comme le pensent *Aldrovande* & ses Sectateurs, mais une sorte de laitier fourni par des volcans, semblable en tout point à la *pierre de gallinace des Péruviens*: voyez ce mot.

PIERRES ODONTOIDES: *voyez* GLOSSOPETRES.

PIERRES ODORANTES. On donne ce nom à différens corps fossiles, tels que la *pierre porc* ou *puante*, la *pierre de violette* de *Ledelius*, les *petites cornes d'ammon* du mont Raudius, &c. Voyez l'*Observation, p. 296 du I. Volume de notre Minéralogie, II. Edit.* voyez aussi PIERRE DE VIOLETTE.

PIERRE DES OISEAUX, *lapis avium*. Sous ce nom on comprend la *pierre alectorienne*, qui est celle de *coq*, la *pierre d'hirondelle*, celle de *penguin*, & la *pierre de vautour*.

PIERRE D'OLIVE, *tecolithos*. C'est la *pierre judaïque* lisse & non rayée: *voyez ce mot*.

PIERRE

PIERRE OLLAIRE, *lapis ollaris*. Sous ce nom générique on comprend les *pierres ſmectites* ou *ſtéatites*; c'eſt-à-dire, celles dont la ſurface eſt gliſſante, & comme ſavonneuſe au toucher, qui ſont médiocrement peſantes, tantôt plus tantôt moins tranſparentes, de couleurs différentes ou mélangées, peu dures, propres à être ſciées, tournées & travaillées avec des outils de fer, ou qui admettent le poli, qui ne ſe diſſolvent point par les acides; en un mot, qui comme toutes les pierres argileuſes, ſe durciſſent dans le feu & y deviennent rarement friables. Telles ſont la *pierre de lard*, la *pierre de corne molle*, la *pierre de come*, la *pierre colubrine*, la *ſerpentine*, la *pierre de touche argileuſe*, & toutes les eſpeces de *talcites*. Voyez ces mots.

Bien des perſonnes regardent le *crayon noir molybdene* & le *crayon rouge* ou *ſanguine*, comme des eſpeces d'*ollaires ſtéatites métalliferes*: voyez ces mots.

M. *Guettard* fait mention dans les *Mém. de l'Acad. des Sciences*, *ann. 1752*, de quatre ſortes de pierres ollaires, leſquelles ſe levent par feuillets, comme les ſchiſtes. Il obſerve qu'elles ne ſont preſque qu'un amas confus de parties talqueuſes, réunies par une matiere non calcinable, mais qui lui a paru être de la nature du ſchiſte. La fineſſe du grain de cette pierre & le peu de dureté qu'elle a, dit-il, au ſortir de la carriere, permettent d'en faire différens ouvrages & différens vaſes, marmites, chauderons, &c. Ces vaiſſeaux ſe travaillent ſur une eſpece de tour mû par un courant d'eau. On en fait un commerce aſſez conſidérable, puiſque M. *Scheuchzer* aſſure qu'il va à plus de ſoixante mille couronnes d'or: c'eſt dans la Suiſſe que l'on trouve abondamment la pierre ollaire; on en a découvert auſſi dans le Canada, qui, ſelon M. *Guettard*, ne ſont pas ſi propres à être travaillées.

Les pierres ollaires varient pour la couleur & pour le tiſſu; il y en a de noires, qui peuvent ſervir de crayon & qui ſont auſſi onctueuſes que les ſtéatites; d'autres ſont grenelées & friables: conſultez *notre Minéralogie*; enfin il y en a de jaunâtres, de griſâtres ou cendrées, & d'un tiſſu comme ſtrié. Preſque toutes ces ſortes de pierres ſe diviſent à l'aide du fer en mor-

ceaux de figure indéterminée : communément on met cuire au fourneau des potiers dans des boîtes ou gazettes de fer battu, ou de tôle enduites de glaise, les vaſes qui ſont faits des pierres ollaires. Pour avoir une idée plus ample de cette eſpece de pierre, *voyez l'article* STÉATITE où ſe trouve celui de SMECTITE.

PIERRE OCULAIRE, *lapis ocularis*. Pierre tantôt tranſparente & tantôt opaque, dans laquelle on croit trouver la reſſemblance d'un œil. *Voyez l'article* ŒIL DE CHAT.

PIERRES DES ORCADES, *orcadum lapilli*. *Luidius* donne ce nom à des pierres cylindriques ou entrochites, liſſes, pleines de nœuds, d'une couleur blanchâtre, qui ſe trouvent en Angleterre dans le Flintſhire. Voyez *Luid. Gazoph. n°. 1154.*

PIERRE OSSIFRAGE, ou PIERRE DES OS ROMPUS. *Voyez* OSTÉOCOLLE.

PIERRE OVAIRE, *lapis ovarius*. Suivant les différentes formes & groſſeurs, on les appelle ou *piſolites*, ou *orobites*, ou *cencrites*, ou *oolithes*, ou *méconites*, ou *hammites*, *&c.* Voyez OOLITHE.

PIERRE D'OUTRE MER : *voyez l'article* LAPIS LAZULI.

PIERRE DE PANTHERE. Eſpece de jaſpe tacheté de noir, de rouge, de jaune & de vert : *voyez au mot* JASPE.

PIERRE DE PAON ou DE PLUME : *voyez* PLUME DE PAON.

PIERRE DE PARANGON. Eſpece de pierre de touche qui, ſuivant *Imperatus*, a beaucoup de rapport avec le *baſalte*.

PIERRES PEINTES NATURELLES. *Voy.* DENDRITE.

PIERRE DU PÉRIGORD. *Voyez ſon article à la ſuite du mot* FER.

PIERRE DE PHÉNICIE. *Voyez à l'article* PIERRE JUDAIQUE.

PIERRE PHRYGIENNE, eſt une eſpece de mine d'alun pierreuſe, dont les Teinturiers de Phrygie ſe ſervoient autrefois pour donner de l'intenſité à leurs couleurs rouges.

PIERRE A PICOT, ou DE LA PETITE VÉROLE : *voyez* VARIOLITE.

PIERRE DES PIERRES : *voyez* ONICE.

PIERRE PLANTE. On donne ce nom aux *lithophytes* : voyez ce mot.

PIERRE A PLATRE : *voyez* GYPSE.

PIERRE DE POISSONS, *calculus aut lapis piscium*. On donne ce nom à certains petits os particuliers, qui se trouvent dans la tête de quelques-uns des animaux piſciformes. Le merlan, la tortue, l'écreviſſe, la tanche, le muge, la perche, la dorade, le manati, la ſeche, &c. en fourniſſent des exemples. Voyez auſſi le *Mémoire* publié par *Bromel* en 1725 dans les *Actes d'Upſal*, & l'*Hiſt. des poiſſons de* J. Théod. Klein.

PIERRE-PONCE, *pumex*, eſt une pierre blanchâtre ou griſe, poreuſe & légere, qui nage ſur l'eau : elle eſt rude au toucher, d'un tiſſu fibreux & luiſant intérieurement comme de l'asbeſte, d'une figure irréguliere ou informe, ne faiſant point d'efferveſcence avec les acides, ne donnant point d'étincelles avec le briquet, excepté celle qui eſt aſſez peſante & colorée ; elle entre en fuſion dans le feu. On trouve celle qui eſt blanche en morceaux de différentes groſſeurs, flottant en pleine mer, & celle qui eſt griſe, en pains quelquefois carrés, aplatis & durs, vers les rivages, où ils demeurent ſuſpendus dans l'eau ſans s'y précipiter & ſans nager à ſa ſurface. Quant aux ponces qui ſont arrondies & flottantes ſur la ſurface de la mer, ce ſont des vents qui en les pouſſant loin des volcans, les ont abandonnées aux ondes de l'eau agitées ; là elles ſe ſont heurtées les unes les autres ; à force d'être roulées & portées vers le rivage, elles ſe ſont uſées & arrondies.

Les pierres-ponces ont communément une odeur marécageuſe, & une légere ſaveur ſalée. Les ponces blanches les plus légeres & les plus groſſes ſervent aux Parcheminiers & aux Marbriers, les petites ſervent aux Potiers d'étain, aux Menuiſiers & aux Doreurs. Les ponces griſes & plates ſervent aux Corroyeurs & aux Chapeliers. A Naples on choiſit toutes celles qui ſont de rebut, pour en faire du ciment avec de la

chaux ; ce mortier eſt employé dans la conſtruction des terraſſes, il a la même propriété que le ciment fait avec le *pozzolane :* voyez ce mot. Il prend corps avec un tel degré de dureté, qu'à peine les ferremens y ont priſe quelque temps après qu'il a été mis en œuvre. Il ſeroit peut-être à déſirer que dans les endroits où l'on trouve beaucoup de ces pierres, Meſſieurs les Ingénieurs en fiſſent uſage pour la conſtruction des parapets, des guérites & autres ouvrages expoſés au canon ; ils auroient moins à craindre les éclats, ainſi que cela arrive dans les murs de pierre ordinaire, & même dans ceux de brique. Il n'eſt pas rare de rencontrer des pierres-ponces griſes, marbrées de jaune & de rouge ; il y en a auſſi de brunes & de noirâtres comme les ſcories de charbon de terre & d'ardoiſe griſe.

Les pierres-ponces du commerce ſe trouvent de temps en temps flottantes, ou jetées ſur les bords de la mer Méditerranée, en Sicile, vers le mont Véſuve, & près les monts Etna & Hécla, ſur les parages des îles Santorin de l'Archipel. La plupart de celles qui ſe ramaſſent dans les terres voiſines de tous les autres volcans en éruption, ſervent au ciment. Preſque toutes les maiſons de Milo ne ſont conſtruites qu'avec des blocs d'une ponce ſtriée : ainſi il paroît que les ponces ſont des *productions de volcans :* voyez ce mot & celui de LAVE.

M. *Garcin* dit qu'en 1726 on a vu, entre le Cap de Bonne-Eſpérance & les îles de Saint Paul & d'Amſterdam, la mer toute couverte de ponces flottantes au gré du vent & fort loin des terres, ſur un eſpace de plus de cinq cents lieues, au travers deſquelles on vogua pendant dix jours de ſuite. Tous les rivages de la Zone torride ſont couverts de ponces, ſur-tout les îles de la Sonde & les Moluques, où il y a auſſi beaucoup de volcans.

PIERRE-PORC ou PIERRE PUANTE, *lapis ſuillus aut felinus aut fetidus*, eſt communément une pierre calcaire & ſpatheuſe, griſâtre ou noirâtre ou brune ; elle exhale une mauvaiſe odeur de charbon de terre ou d'urine de chat, quand on la frotte ou qu'on

l'égratigne ou qu'on l'écrase ; mais elle perd cette odeur à la calcination, & y devient blanche en décrépitant comme le sel marin. Nous avons rencontré cette pierre près de la charbonniere d'Ingrande & de la mine d'alun du Palatinat. Des Naturalistes croient que la pierre-porc n'est qu'une espece particuliere de spath cristallisé en hexagone : nous connoissons plusieurs pierres puantes qui ne sont que des schistes calcaires. On apporte aussi cette pierre de l'île d'Œland en Suede, d'Allemagne, notamment de Norwege, de Portugal & du Cap de Santé, à quelques lieues de Quebec ; on y en trouve de rayonnées, de prismatiques & de sphériques. Plusieurs personnes ont ramassé près de Villers-Coterets & de Plombieres en France une sorte de caillou qui étant frotté donne à-peu-près l'odeur d'urine pourrie ; c'est une espece de *pierre puante*. Il y a tout lieu de croire que les odeurs qui se sont communiquées à ces sortes de pierres, viennent de substances animales ou végétales qui sont entrées en putréfaction.

PIERRE DE PORC-ÉPIC, est la pierre qui se trouve dans la véficule du fiel du porc-épic des Indes, & sur-tout dans la province de Pama-Malacca. Cette pierre ressemble beaucoup à celle du sanglier, mais elle est plus petite. Les Indiens l'appellent *mastica de soho*, les Portugais *pedro de vassar* ou *piedra de puerco*, & les Hollandois *pedro de porco*. Les Indiens s'en servent intérieurement pour se guérir d'une maladie qu'ils appellent *mordoxi*, laquelle vient d'une bile irritée, & qui cause à ceux qui en sont attaqués des accidens aussi fâcheux que ceux de la peste. On voit un de ces rares bézoards dans le cabinet de Chantilly, il a plus de 16 lignes de diametre, & a coûté 100 louis d'or. *Voyez au mot* BÉZOARD.

PIERRE DE PORC DES INDES. Elle ressemble assez à la précédente, mais elle est plus grosse : on la trouve dans la véficule du fiel du sanglier de Malacca.

PIERRE DE PORTLAND. Pierre fort dure, d'un grain grossier, d'un tissu peu serré, grisâtre, compacte & pesante. Cette pierre donne difficilement des étincelles avec le briquet, mais elle bouillonne avec les acides : tous les grands édifices de Londres sont en pierre

de Portland dont les carrieres ſont dans l'île de ce nom ; en Dorſetshire, dans la Manche.

PIERRE DE PORTUGAL. *Voyez l'article* PIERRE QUARRÉE. On appelle auſſi *pierre de Portugal* la *pierre de ſerpent*. Voyez ce mot.

PIERRE POREUSE. *Voyez* TUF.

PIERRE A POTS. C'eſt la *pierre ollaire*. Voyez ce mot.

PIERRE POURRIE ou TERRE POURRIE, eſt une argile qui a perdu preſque entiérement ſon gluten, c'eſt-à-dire la partie liante qui uniſſoit ſes parties ; de ſorte qu'humectée, on n'en peut former aucune pâte qui ait de la liaiſon, elle retombe en pouſſiere à meſure qu'elle ſeche. On trouve ſouvent cette argile dans la carriere, diſpoſée par lits horizontaux & feuilletée: elle eſt ordinairement très-friable, très-fine ; il y en a de graveleuſe, que les Ouvriers rejettent.

La pierre pourrie nous vient d'Angleterre, elle conſerve la trace du métal ſur lequel on la frotte. On s'en ſert pour adoucir les petites inégalités des ouvrages fins ; elle eſt très-propre à donner le brillant neuf aux uſtenſiles d'argenterie ; mais ſur-tout à ceux de laiton, de ſimilor, de cuivre de roſette, &c. elle leur donne un luſtre & une couleur qui imite l'or. Les Horlogers, dit M. *Bourgeois*, en font uſage pour polir & luſtrer leurs mouvemens de montres.

PIERRES PRÉCIEUSES, *gemmæ*. Ces pierres ſont des criſtaux naturellement formés dans la terre, & qui ſe diſtinguent du criſtal de roche, par leur extrême dureté, la couleur vive & éclatante, la tranſparence, la figure extérieure, & la peſanteur ſpécifique, tous caracteres peu ſujets à l'erreur. Les pierreries ne ſe poliſſent que difficilement, mais elles prennent un éclat vif & merveilleux, qui jette de tous côtés des rayons de lumiere, ſans que la pierre chatoie : expoſées au feu dans le creuſet, il n'y en a qu'un très-petit nombre qui entrent en fuſion. L'eau-forte, ni la lime ne les alterent pas ſenſiblement : elles ſont feu avec le briquet. Une matiere criſtalline pierreuſe paroît être le principe & la baſe des pierres précieuſes. Leur variété ſemble naître des différens ſucs métalliques qui les colorent. On eſt

dans l'usage de distinguer les pierreries en Orientales & en Occidentales ou Européennes, moins par la raison du pays d'où elles nous parviennent, que par leur dureté, le brillant, la pureté ou transparence & la pesanteur spécifique.

Les pierres précieuses ont cependant d'autres propriétés qui les distinguent encore, puisque les pierreries Orientales peuvent souffrir assez long-temps une forte action de feu, sans que leur couleur en soit altérée, tandis que les Occidentales perdent en très-peu de temps la leur, & deviennent semblables à du cristal, si elles sont transparentes; ou d'un blanc mat, si elles sont opaques.

M. *d'Aubenton* fait trois genres principaux de pierreries: le premier contient les diamans proprement dits: *voyez* DIAMANT; le second, les pierres Orientales; & le troisieme, les pierres Occidentales, au nombre desquelles il met le cristal de roche. *Voyez ce mot.*

En général, l'on a peu de détails intéressans, ou pour mieux dire, on n'en a point de circonstanciés, sur les pierres précieuses transparentes. Presque tous les Voyageurs, qui jusqu'ici ont été plus Commerçans que Naturalistes, par conséquent plutôt Nomenclateurs que Méthodistes, ne nous ont encore rien donné de satisfaisant sur les pierreries, ni sur les matrices dans lesquelles elles se forment: c'est pourquoi la plupart des descriptions qu'on lit dans les catalogues des Lapidaires, sont si embrouillées: elles ne tendent qu'à expliquer les différences qui peuvent faire changer le prix des pierres fines, savoir le nombre des karats & des grains qu'elles pesent, leur forme par rapport à la taille; ajoutez à cela la mode & la fantaisie: on n'y trouve point la définition qui doit convenir à telle & telle espece de pierre; delà le défaut de connoissance que nous avons, dit M. *d'Aubenton*, des pierres des Grecs & des Romains. Cet Académicien prétend que le caractere le plus essentiel & le plus propre à fixer la nomenclature & la division des pierres, c'est leur couleur; la simple lecture des expériences qu'il a faites au moyen du spectre solaire, met à portée (en suivant son procédé)

de juger ſurement de la nature & de la qualité d'une pierre qu'on n'auroit jamais vue : *voyez* ſon *Mémoire inſéré dans le Recueil de ceux de l'Académie Royale des Scienees.* Nous ne diſconviendrons pas cependant, que l'habitude & l'attention donnent ſouvent aux Joailliers cette juſteſſe de coup d'œil, néceſſaire pour diſtinguer dès la premiere vue des pierres qui ſemblent avoir bien des caracteres communs.

Les pierres précieuſes ſe trouvent ou dans le ſein de la terre, ou dans le lit de quelques rivieres, parmi leurs ſables ; il faut de l'habitude pour les connoître ſous leur forme brute. Les îles de Borneo & de Ceylan, les Royaumes de Bengale, de Golconde, de Viſapour & de Pégu, ſont les parties de l'Inde Orientale où l'on trouve le plus abondamment de belles pierreries. Celles des autres parties du Monde ſont en général moins eſtimées, ſont moins dures, & par conſéquent ſuſceptibles d'un poli moins vif ; celles-ci ſont réputées Occidentales ; car c'eſt la dureté qui donne le caractere Oriental à une pierre précieuſe.

Toutes les pierreries ont des criſtalliſations & des couleurs aſſez différentes les unes des autres ; mais elles affectent communément une figure réguliere & déterminée, tantôt priſmatique, tantôt cubique, tantôt en rhomboïde, &c. *voyez les mots* AIGUEMARINE, AMÉTHISTE, BERIL, CHRYSOLITE, DIAMANT, ÉMERAUDE, GRENAT, HYACINTHE, ŒIL DE CHAT & ŒIL DU MONDE, OPALE, PERIDOT, RUBIS, SAPHIR, TOPASE, TOURMALINE, *&c.* & ce que nous avons dit *au mot* CRISTAL, & même à l'*article* CAILLOU. A l'égard des pierres précieuſes qui ſe trouvent parmi les ſables dans le lit des rivieres, on ſent aiſément que ce n'eſt point là le lieu de leur formation : ces pierres qui ſont roulées & arrondies ont été apportées d'ailleurs par les torrens & les eaux qui les ont arrachées des roches & des montagnes où elles avoient pris naiſſance : c'eſt pourquoi les Indiens ne recherchent les pierreries dans le lit des rivieres qu'à la ſuite des fortes pluies. Si les pierres colorées ſont moins dures que le diamant blanc, dont les parties ſont purement homogenes, c'eſt parce que les métaux qui

fournissent le principe colorant des pierreries n'ont pas eux-mêmes la dureté de la pierre où ils se trouvent combinés. Souvent aussi les pierres précieuses offrent tout à la fois les couleurs & les autres caracteres de deux ou de trois pierres ; par exemple le *saphir-topase* est bleu par une partie, & jaune par l'autre : on voit dans l'un des Cabinets de Chantilly une pierre moitié *rubis* & moitié *topase* : l'on connoît le *saphir verdâtre*, appelé *saphir œil de chat ;* le rubis moitié blanc & moitié rouge, c'est le *rubis onyx*.

Il y a différentes tailles pour les pierreries ; savoir, la taille à l'Indienne ou la poire, le brillant, le demi-brillant ou brillonnet, la rose, la pierre épaisse, la pierre foible, la tablette. A l'égard de leur valeur, tout dépend assez de la mode & du caprice : on les vend au karat ; le karat pese quatre grains, & le grain est moins fort que celui du poids de marc. Nous avons dit à l'article *diamant*, *tom. 3. pag. 202*, que quand un diamant pese plusieurs grains ou karats, le tarif du karat cesse, & la différence est très-grande, puisque le karat peut être estimé pour trente-deux grains, même pour soixante quatre, &c. en voici un grand exemple : le gros diamant du Roi de Portugal que nous avons dit peser douze onces, & qui ne pese absolument qu'onze onces, cinq gros, vingt-quatre grains, c'est-à-dire 1680 karats, ou 6720 grains, est estimé deux cents vingt-quatre millions de livres sterling, & en argent de France cinq milliars, cent cinquante-deux millions ; le grain est donc à 766,666 livres, 13 sous 4 deniers.

PIERRE DE LA PROVIDENCE. Des personnes donnent ce nom à un amas de pierres lenticulaires, qui ayant été roulées dans un courant d'eau, & présentant différentes faces, offrent par leur organisation intérieure qui se trouve à découvert des apparences de lentilles, de grains de froment, d'orge, &c. L'ignorance, la superstition ou la crédulité ont encore fait donner d'autres noms à cette pierre, sur-tout dans des temps de famine. *Voyez à l'article* PIERRE LENTICULAIRE.

PIERRE PUANTE. *Voyez* PIERRE-PORC.

PIERRE QUARRÉE D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL, est cette marcassite ou pyrite cubique, quelquefois ferro-arsenicale, qu'on taille en facettes, & dont on fait aujourd'hui tant de bijoux qui imitent l'éclat de certaines pierreries: *voyez à l'article* PYRITES. On trouve aussi beaucoup de pierres carrées en Piémont & en Boheme.

PIERRE A RASOIR, ou COS, ou QUEUX, ou PIERRE NAXIENNE, *lapis coticularis*. Cette pierre, au sortir de la carriere, est d'une consistance tendre; mais elle s'endurcit par l'usage que l'on en fait: elle est composée de particules fines & compactes; elle se divise par couches, dont la couleur est assez différente & facile à distinguer, ainsi qu'on le remarque dans toutes les pierres à aiguiser à l'huile ou à rasoir, qui sont quelquefois composées de deux couches, l'une brunâtre, & l'autre grise ou jaune-blanchâtre; toutes deux sont comme collées ensemble; ni l'une ni l'autre ne se dissout aux acides: la couche noire ou grise résiste plus long-temps à un feu violent; & avant qu'elle jette de l'écume, la jaune est déjà réduite en un verre très-fluide. On s'en sert pour faire des pierres à aiguiser les outils; on en fait aussi, en quelques pays, des meules & des tombes, c'est pourquoi on les appelle *lapides olearia, aquaria, molaria, salivaria*. Les véritables pierres à rasoir sont des pierres argileuses: on en tire de Lorraine qui sont très-bonnes. Le nom de *cos* & de *queux* est donné par quelques Auteurs à des pierres sableuses. L'île d'Elbe abonde en cette pierre. Il y en a de plus ou moins parfaites & dures.

PIERRE A QUEUE DE PAON. *Voyez* PLUME DE PAON.

PIERRE RAYÉE DE NANIEST ou PIERRE DE MORAVIE. M. *de Justi* donne ce nom à une substance précieuse nouvellement découverte en Moravie, dans les montagnes de la Seigneurie de *Naniest*. Cette espece de pierre qui n'a encore été rencontrée que dans un roc qui se trouve à l'endroit le moins accessible de ces montagnes, est extérieurement d'un beau blanc de lait, & se casse en morceaux de différentes grandeurs, qui sont

plus ou moins opaques, à raison de leur épaisseur. Cette pierre est singuliérement traversée & pénétrée dans toute sa longueur de raies couleur d'améthiste : ces raies qui ont environ une ligne d'épaisseur, s'étendent toujours en droite ligne, & se succedent avec assez de régularité. Le Lapidaire de Vienne, qui s'est transporté sur les lieux pour examiner la singularité de cette pierre dans le roc, présume d'après le bloc qu'il a vu, qu'on la trouvera de même dans toute la veine, qui est d'ailleurs assez large pour en faire des tables & autres meubles de pierre.

La *pierre de Nanieſt* dont nous avons un très-bel échantillon, est un grès quartzeux, & ressemble assez, après avoir été polie, à une étoffe à raies étroites : elle est entremêlée de petits grenats, qui y tiennent si fortement qu'on ne peut les en ôter : ils se coupent & se polissent avec la pierre, ce qui augmente sa beauté & son prix. La dureté de cette pierre nouvelle est inférieure à celle de l'agate ; mais elle surpasse celle du marbre, elle n'est ni calcaire, ni fusible au feu de fusion ordinaire ; elle donne des étincelles quand on la frappe avec un briquet d'acier, & ne fait point d'effervescence avec les acides.

PIERRE RÉFRACTAIRE : *voyez l'article* PIERRE APYRE.

PIERRE DES REINS, DE LA VESSIE & DU FIEL : *voyez* CALCUL.

PIERRE DES REMOULEURS : *voyez le mot* GRAIS DES REMOULEURS *à l'article* GRAIS.

PIERRE RETICULAIRE : *voyez à l'article* RETEPORE.

PIERRERIES : *voyez* PIERRES PRÉCIEUSES.

PIERRE DE ROCHE : *voyez* ROCHE.

PIERRE DES ROMPUS : *voyez l'article* OSTÉOCOLLE.

PIERRE DE SABLE : *voyez* GRAIS.

PIERRE A SABLON. C'est un grais peu compacte & qu'on brise très-aisément au marteau : on en fait le sablon dont on se sert pour nétoyer la vaisselle : *voyez* GRAIS & SABLE.

PIERRE SACRÉE. Les anciens nommoient ainſi un jaſpe noir-verdâtre, à grandes taches blanches qui forment une eſpece de réſeau irrégulier : on en faiſoit des amulettes.

PIERRE DE SAMOS. Eſpece de terre bolaire ou tripoli très-fin, dont les Orfevres ſe ſervoient autrefois pour polir leurs ouvrages.

PIERRE DE SANG. C'eſt une eſpece de jaſpe ſanguin que les Indiens taillent en cœur, & qu'ils portent en amulette pour arrêter le ſang. *Voyez* JASPE. La pierre ſanguine à brunir eſt l'*hématite*, & la pierre ſanguine à crayon eſt le *crayon rouge*. Voyez ces mots.

PIERRE DE SANTÉ. Nom que l'on donne dans le commerce à des pyrites ſouvent ferro-arſenicales (marcaſſites) taillées à facettes par des Ouvriers qui vont s'établir ſur le bord de certaines rivieres en Boheme : ce ſont les Genevois & les Piémontois qui en font le plus grand débit ; on en fait des boutons, des pierres de boucles & de bagues, &c. La pierre de ſanté eſt preſque la même que la *pierre de Portugal*. Voyez les mots PIERRE QUARRÉE, MARCASSITE & PYRITE.

PIERRE DE SARCOPHAGE : *voyez* PIERRE ASSIENNE.

PIERRE DE SARDE : *voyez* CORNALINE.

PIERRE DE SASSENAGE ou CHELYDOINE. Elle eſt connue auſſi ſous le nom impropre de *pierre d'hirondelle*. Voyez ce mot.

PIERRE SAVONNEUSE. Elle a une conſiſtance de cire, & eſt marbrée de rouge & de blanc : étant mâchée elle a le goût ainſi que les propriétés du ſavon ; elle rend l'eau laiteuſe, & blanchit ou dégraiſſe très-bien toutes ſortes d'étoffes. On s'en ſert en quelques pays & particuliérement en Angleterre : elle eſt encore plus onctueuſe que la ſtéatite proprement dite, & que la craie de Briançon. *Voyez ces mots.*

PIERRE SERPENTINE. *Voyez l'article* SERPENTINE.

PIERRE DE SERPENS, *lapides ſerpentum.* Bien des perſonnes donnent ce nom à la corne d'*Am-*

mon foſſile. *Voyez ce mot.* Les Voyageurs appellent *pierre de ſerpent du Cap de Bonne-Eſpérance*, une compoſition artificielle : les Bramines Indiens s'en réſervent le ſecret ; elle a la forme d'une groſſe feve ; elle eſt quelquefois large comme un de nos liards & en petit biſcuit ; ſa matiere eſt blanchâtre au centre, & d'un bleu céleſte ou brune dans les autres parties. Auſſi-tôt qu'elle eſt apliquée ſur la morſure d'une eſpece de ſerpent à lunette, eſpece de cobra (*couleuvre capelle* ou *à chaperon*), & même des autres ſerpens & autres bêtes venimeuſes, notamment ſur la piqûre du ſcorpion, elle s'attache à la plaie ſans bandage & ſans ſoutien ; elle attire autant de poiſon qu'elle en peut contenir, & ſur le champ elle tombe d'elle-même : on la trempe alors dans du lait, qu'elle rend jaune en s'y purgeant ; on l'applique de nouveau, juſqu'à ce qu'elle ceſſe de s'attacher, & de-là on conclut qu'il ne reſte plus de poiſon. Voilà ce qu'on raconte de la vertu de cette pierre, dont on doit faire uſage auſſi-tôt qu'on a été mordu ou piqué, afin de ne pas donner le temps au poiſon de s'introduire trop avant dans le corps, car alors elle ſeroit inutile. Nous n'en avons pas vu les effets, faute d'occaſion ; mais des faits auſſi merveilleux s'éloignent bien de la vraiſemblance : nous avons ſeulement reconnu que la pierre de cobra n'eſt qu'un morceau d'os (ou de corne calcaire) taillé & calciné : on l'appelle *piedra de cobra*. Le Pere *Joſeph Torrubia*, Chroniqueur général de l'Ordre de S. François, & qui a vécu environ quinze ans à Manille, Capitale de l'Ile de Luçon, dit poſitivement, dans ſon *Apparat pour l'Hiſt. Natur. d'Eſpagne*, *Tome I.* que les meilleures *pierres de ſerpent* ſont de compoſition ; qu'elles ſe font dans les Iles Philippines, & que les Ouvriers les plus habiles qui y travaillent, ſont les Indiens de la Province de Camarines, dans l'Ile de Luçon ; enfin, que ce ſont les Religieux de l'Ordre de S. François qui ſont les Trafiquans de cette divine drogue à Manille. Ce Pere détaille fort au long les ingrédiens & les propriétés admirables de cette pierre, dont les peuples des côtes de Malabar & de Coromandel font un grand uſage. Il eſt à préſumer que les Charlatans de l'Inde, qui ſe

font mordre & piquer devant le Public pour lui faire voir la bonté de la pierre, sont des particuliers gagés pour cela, & non les Religieux mêmes. On trouve dans la tête & dans l'estomac du serpent appellé *fenambi*, des pierres réputées alexiteres. On donne encore le nom de *pierre des serpens*, à une pierre onyx: *voyez* ONICE.

PIERRE DE SYRIE. *Voyez à l'article* PIERRE JUDAÏQUE.

PIERRE SMECTITE ou STÉATITE: en général c'est la même que la *pierre ollaire*: voyez ce mot & celui de STEATITE.

PIERRE DU SOLEIL, c'est le *girasol*: voyez ce mot.

PIERRE SORCIERE. On donne ce nom à la pierre lenticulaire calcaire, parce que quand on la met dans une liqueur acide, elle tourne & retourne sans cesse, jusqu'à ce que la liqueur soit entrée dans toutes ses concamérations, & qu'elle se soit trop affoiblie en se saoulant de la substance calcaire de la pierre. Cet effet, tout naturel qu'il est, paroît aussi singulier que l'aimant aux yeux des personnes qui ne connoissent point assez les effets chimiques.

PIERRE SPÉCULAIRE ou SÉLENITE: *voyez à l'article* GYPSE.

PIERRE STÉATITE: *voyez* STÉATITE.

PIERRE DE STOLPEN. C'est, dit-on, une espece de *basalte*: cette pierre, dont on fait des pierres de touche, se trouve en Misnie assez près de Dresde. *Voyez* BASALTE.

PIERRE THÉBAIQUE, c'est le *granite*: voyez ce mot.

PIERRE DE TIBURON ou DE MANATI: *voyez au mot* BALEINE *l'article* BALEINE DU GROENLAND, *& le mot* TIBURON. *Voyez aussi à l'article* OREILLE.

PIERRE DE TONNERRE ou DE FOUDRE: *voyez* PIERRE DE FOUDRE, BELEMNITE & CERAUNIAS.

PIERRE DE TORTUE, *lapis testudinum*: elle est oblongue, un peu écrasée, obtuse & un peu étranglée dans son milieu; mais intérieurement elle est semblable aux calculs & aux bézoards: *voyez ce mot.*

PIERRE DE TOUCHE, *lapis metallorum.* Celle dont les Orfevres se servent aujourd'hui n'est point un marbre noir, ni ne doit l'être, comme l'ont dit quelques uns; c'est communément une sorte de cos ou de schiste d'un grain fin & continu, noir ou verdâtre, dur & susceptible de poli, recevant facilement la trace du métal qu'on y frotte. Cette pierre, que l'on nous apporte de Bohême, de Saxe & de Silésie, ne fait point feu avec le briquet, ne se dissout point aux acides, ne se calcine pas dans le feu; mais elle s'y convertit, comme les autres schistes, en un verre poreux & brunâtre. L'on a de fort soupçons que la pierre de touche des Anciens, étoit une espece de basalte mêlé de stéatite: *voyez* SCHISTE.

On fait avec la pierre de touche ordinaire, des pierres à aiguiser les rasoirs, qui sont fort bonnes.

Toutes les especes de basaltes & de stéatites endurcies, ou de schiste ou de cos, peuvent servir d'éprouvette à métal, mais particuliérement pour connoître la bonté de l'argent & de l'or. Les véritables basaltes à éprouver les métaux, ne doivent pas être confondus avec les basaltes de Suede, ni avec ceux des volcans.

La pierre de touche des Potiers d'étain est une lingotiere faite avec de la craie blanche de Bourgogne, dans laquelle on verse de l'étain fondu: plus ce lingot est léger, & meilleur il est: *voyez* ÉTAIN.

PIERRE DE TUF: *voyez au mot* STALACTITES.

PIERRES DE VACHES, *lapides vaccini.* On donne ce nom à des pierres sillonnées ou creusées de part en part par des chûtes d'eau, ce qui ne peut se faire que par une suite de plusieurs années. Aussi, dit-on des eaux qui tombent par gouttes & par cascades: *Gutta cavat lapidem, non vi, sed sæpè cadendo.*

PIERRE DE VÉGÉTAUX. C'est un phénomene assez singulier qu'il se trouve des pierres renfermées dans le cœur d'un arbre, comme il se trouve des bé-

zoards dans l'eſtomac des animaux. On en a rencontré dans le bouleau, dans le chêne, dans le pin: *voyez* ce que nous en avons dit dans notre *Minéralogie*, *Vol. II. page 530, édit. de 1774.*

M. *Haller* dit qu'on trouve quelquefois une pierre, & même très-dure, dans les noix de coco; & que c'eſt une rareté eſtimée aux Indes.

M. *de Préſontaine* (*Maiſ. Ruſt. de Cayen.*) fait mention de l'arbre *couipo*, qui porte dans ſon cœur de petites pierres. Il y en a de deux ſortes, le *rouge* & le *blanc*. L'un & l'autre peuvent ſervir aux mêmes uſages que le bois du courbaril dont il a le grain. Ce même Auteur dit que le nom *couipo*, dans le langage des Sauvages, ſignifie *cœur de roches*.

PIERRE DE LA PETITE VÉROLE, *lapis variolæ*, eſt une pierre orbiculaire, aplatie, peſante, fort dure, de couleur verdâtre, parſemée de taches ou loupes d'une couleur infiniment moins foncée, & repréſentant aſſez bien des grains de petite vérole mûrs & aplatis. Cette pierre curieuſe & peu commune ſe trouve dans les Indes, &c. *Voyez* VARIOLITES.

PIERRE A VERRE, *quocolos*. *Lémery* donne ce nom à une pierre marbrée, un peu tranſparente, aſſez dure pour donner des étincelles avec le briquet, blanchâtre ou verdâtre, veinée comme le talc de Veniſe. Cette pierre devient opaque, plus légere & plus blanche au feu, & enfin ſe change en verre: elle ſe trouve en Toſcane, & en pluſieurs autres lieux de l'Italie, où on l'appelle *cuogolo*. Il ajoute qu'on l'emploie dans quelques Verreries: c'eſt la même qu'on appelle improprement *marbre-tarſo*.

PIERRE VERTE ou D'AMAZONE. *Voy.* JADE.

PIERRE DE LA VESSIE. *Voy. à l'article* CALCUL.

PIERRE DE VIOLETTE ou JOLITE, *iolitus*. Nom donné à des pierres de diverſe nature, & qui étant frottées ont une odeur de violette. Parmi ces pierres les unes ſont de grais noir & blanc, telles que dans la principauté de Blankenbourg; d'autres ſont des eſpeces de ſilex, telles qu'on en voit en Suiſſe. Ces pierres ont une odeur de violette plus ſenſible après les

les pluies & dans des temps d'orage ; quelques-unes sont recouvertes d'une mousse qui leur communique cette odeur. L'observation tournée sous ce point de vue pourroit faire reconnoître plusieurs pierres odorantes. M. *Ledelius*, dans les *Ephemer. Nat. Cur. Tome XVI, page 81, Obs. 28*, parle d'une pierre qui sent la violette : on la trouve, dit-il, près les bains de Hirseberg ; son odeur varie de temps en temps ; elle embaume les boîtes où on la serre ; elle est par lames, grise, brillante de points argentés ; elle ne contient pas d'usnée (mousse) ; elle a donc son odeur par elle-même. M. *Vagneri* parle des cornes d'Ammon qu'on trouve dans le mont Raudius & dans les pierres de la Misnie, qui ont la même odeur quand on les chauffe. M. *Eisen Manger* a trouvé proche Dresde des terres qui sentoient la girofiée. *Agricola* fait mention d'un géode qui sent la violette, mais cette odeur est dûe à la mousse ou usnée dont il étoit recouvert. *Boetius* parle aussi des pierres qui donnent la même odeur.

PIERRES VITRESCIBLES ou VITRIFIABLES. *Voyez au mot* PIERRE *& à l'art.* TERRE VITRIFIABLE.

PIERRE VITRIOLIQUE, *lapis vitriolicus*. Sous ce nom générique, on comprend le sory, le misy, le calchitis natif, la mélantérie & le rusma : *voyez ces mots & l'article* VITRIOL.

PIERRES DE VOLCANS : *voyez les mots de* LAVE, *de* PIERRE OBSIDIENNE, *de* PONCE, *de* POZZOLANE, *de* VERRE DE VOLCAN, *&c.*

PIERRE DE VULCAIN, est une pyrite ordinairement arsenicale : *voyez l'article* PYRITE.

PIERROT : *voyez* MOINEAU.

PIESACKI : *voyez à l'article* PELLETERIES.

PIETTE ou PIÉTÉ, *albellus*, oiseau de riviere que *Belon* dit être fort connu dans le Soissonnois, & dans le Beauvoisis : il est moitié noir & moitié blanc, mais ces couleurs sont mêlées diversement ; il est plus grand que la sarcelle, & plus petit que le morillon. Cet oiseau a ordinairement le dessous de la gorge & du ventre blanc, & le dessus du corps noir : ses ailes sont sem-

blables à celles de la pie ; ſes pattes & ſa queue ſont comme celles du morillon. La piette differe des autres oiſeaux de riviere & aquatiques, en ce qu'elle n'a pas le bec large, mais rond & dentelé par les bords. Cet oiſeau qui ſe nourrit de poiſſons & d'inſectes aquatiques, a une petite huppe ſur le derriere de la nuque, & cette huppe eſt placée à l'origine du cou. Il paroît que la piette eſt le *harle huppé*, *merganſer minor criſtatus* : voyez HARLE.

PIEUMART ou PIC-MARS : *voyez au mot* PIC.

PIEXEPOGADOR : *voyez* RÉMORE.

Fin du ſixieme Volume.